









103 (20) 20495

John James  
1754

Redland Court,  
Glouce.



Plukenet's *Blmaphytum* Vid. Trans.  
N<sup>o</sup>. 225 for Feb. 1696/7 page 434.



20451

LEONARDI PLUC'NETII  
PHYTOGRAPHIÆ

PARS QUARTA

CUI

*Nil nisi præmia desunt.*

LONDINI: MDCXCVI.

Sumptibus Autoris.







ALMAGESTUM BOTANICUM

S I V E

PHYTOGRAPHIÆ PLUC'NETIANÆ.

ONOMASTICON

Methodo Synthetica digestum

Exhibens

Stirpium exoticarum, rariorum, novarumque Nomina, quæ  
Descriptionis locum supplere possunt.

Cui (ad ampliandum regnum Vegetabilium) accessere Plantæ circiter  
*Quingentæ* suis Nominibus similiter insignitæ; Quæ nullibi nisi in hoc opere.  
(sex ferè Plantarum *Chiliadas* complectente) memorantur.

Adjiciuntur & aliquot novarum Plantarum.

I C O N E S

In gratiam Phylophitosophorum in lucem nunc editæ.

*Trahit sua Quemquæ Voluptas.*

*Nil non Herbarum vi effici posse, sed plurimarum vires  
esse incognitas. Plin. lib. 25. cap. 2.*

---

L O N D I N I: M D C X C V I.  
SUMPTIBUS AUTORIS.

# Sapientia Divina

Q U A

NATURA IPSA OMNIA VEGETANTIA

R E G I T à c G U B E R N A T.

Cujus Gloriam in excelsis  
celebremus Amore, More, Ore, & Re omni.

*Nam sine Te nostrum nil valet ingenium.*



# BENIGNO LECTORI.

**E**Udoxus ille splendidus tam Physicus tam Mathematicus olim (Solis contemplatione tantoperè raptus) è calore Phæbeo sese conflagraturum esse constantèr in *Votis* habuerat, solummodò luminis ipsius Solis Systema totum (Solaribus ex viciniis) satis deprehenderet. Adeò in me exarsit excitatus iste nec Mecænatum penuriâ, nec perversitate fastidiosâ Temporum, nec ullâ morum barbarie unquàm extinguendus Curiositatis igniculus, quo ad Vegetabilis nova & rariora Naturæ lustranda perpetuò accendor; Ut perindè mihi est, ac si Lucernæ more lucendo consumor: tam magnum in rei Herbariæ studio proficiendi desiderium, & ardorem aliquando concepi, non minùs quàm ex Nominis Anagrammatismo indigitatur, ubi levi literarum transmutatione effluxerit sententia Ut pene Nullus sic ardeo. Usque adeò verum est,

*Rebus convenient Nomina sæpe suis.*

Hinc Divinationis genus illud Veteribus ipsis usitatum, quo ex Nominibus effectus ab illis progressuros conjectare solebant, suam duxit originem; Quod (meo quidè m arbitrato) non omnino improbaretur, si Nomina (licèt ab ipsâ rerum Naturâ non sint) ab aliquo essent excogitata, arte quâdam & scientiâ; cujus ex Instituto, rebus ipsis formâ (vel externâ) adamussim quadrare viderentur.

Certo enim certius est Nomina ut Symbola quædam data esse ad exprimendas & significandas diversitates rerum & naturas. Ideoque Nomina ut & quibus vocibus tanquàm characteribus propriis, Antecessores nostri varia rerum genera, ab invicem discriminârunt. Nèc immeritò exclamavit Mærcellus Vergilius (Comm. in Dioscorid. lib. 4. cap. 53.) dicendo, Infelix profectò Ætas hæc nostra, quæ nèc antiqua in Plantis servaverit Nomina, nec novis appellare, & novisse eas gaudeat, patiaturque sine honore nunc esse quæ in Naturæ Majestate Antiquitas admirata est.

Pythagoras ipse, qui semper Ænigmaticè loquutus, cum rogatus Quid esset sapientissimum, respondet Numerum, Sic interrogatus, Quid secundum ad Sapientiâ, respondit Illum Qui imposuit Nomina rebus: per Numerum intelligens Mentem in quâ sunt rerum Exemplaria, per Nominum verò Impositorem intelligens Animam cujus sit dare Nomina ipsis exemplaribus conformia. Maxima enim (ut dicit Aristoteles) pars est humanæ Sapientiæ, valdè similia posse distinguere. Et Platonis erat effatum.

Ὅς τὰ ὀνόματα εἰδὼν καὶ τὰ πραγµατα.

Idèoque ex illius decreto Δεῖ πρῶτος ἐξετάζειν τὰ ὀνόματα. Cui illud Isidori maximè adstipulatur.

*Nomina si nescis perit Cognitio rerum.*

In hæc Plantarum serie reperiet Botanophilus peregrina plurima, Quæ suas quidè m Nomenclaturas gentilitias, ab Americanis secum attulèrunt in nostrum Orbem, sed nobis æquè barbaras ac ipsi sunt Americani: Is convenientiora Nomina & nobis magis familiaria



## AD LECTOREM.

familiaria indere consultum visum fuit; quod factum neque insolens hodiè aut heri usurpari cæptum; neque levitatis ullius. Enimverò Romanos & Græcos veteres, quibus acceptam ferimus linguarum quas possidemus propagationem, multa latuère, quorum possessione hodiernum sæculum gaudet

Non-omnia grandior Ætas  
Nos quæ scimus, habet; seris venit usus ab Annis.

Imprimis sicuti totus Novus Orbis Antiquiorum nemini cognitus erat, sic & divitiæ Plantariæ, quas Is suo ambitu complectitur: proinde cum plures sint res quàm vocabula, Necessitas imperat ὀνοματοποιεῖν & novās res novis Nominibus exornare.

Non est igitur ut quisquam Institutum nostrum in hoc Opere planè infructuosum & inutile futurum vereatur, Etsi nullas, Plantarum descriptiones Catalogo nostro publicare statuerimus, cum illarum Nomina adèd artificiosè sunt rebus ipsis secundum partium configurationes accommodata, ut descriptionis loco inservire apprime possint.

Neminemque velim moveat (Lector optime) nec id à nobis factum quisquam admiretur, Si nostro Almagesto plures Plantarum Imagines non appinximus, cum immensus ferè nobis sit Stirpium ex longinquis Regionibus advenarum, & à Nemine hætenus editarum numerus; Hoc (si veritatem fateri debeam) factum est, non quòd deessent Plantæ, nèc quia opus hoc aggrediendi voluntas defuerit.

Ardet adhuc animus, nec deficit usque voluntas.

Sed ob magnos ingentesque sumptus, quos diutiùs tolerare non poteram; Fortuna cæca vix nisi invita Melioribus taret, quasi dissonum fit & incongruum Pluti cum Apolline commercium.

In præsentiarum idèd festinandum duximus, ut paucis cum Iconibus, nuda tantummodò Plantarum Nomina, instar Fasciculi in unum collecta, in lucem propellamus, ut eorum recordatio apud Posteris tamdiù vigeret, donèc clarior quidam Medicus, vel Apollo, cui facultates ad Plantas explorandas, delineandas, ære incidendas magis abundè suppetant; cui itidè partes Stirpium tam memorabilium, & tam novitè inventarum magis essentielles, meliùs innotescant, loco eorum introducat nova Nomina Naturæ characterismis magis adæquata, & idonea.

Tu interea hoc Speculum Botanicum, περὶ φυτῶν verè μεγάλον, Opus siquid aliud, grande & magnificum, plurium annorum, & laboris improbi, ipsa etiam utilitate se commendaturum, eruditis Botanophilis tamdiù expetitur, nostroque hoc sæculo adèd necessarium, ut illo carere hæud facile possit, ad incrementum Medicinæ & Tuum oblectamentum jam publicè factum, benevolè suscipe, atque in usus Tuos liberalitè fruiere & benè vale,

——— Atque ab Arbore castâ  
——— Nobiscum nocte coronam  
Postibus, & densos per limina nocte corymbos.

Ex Ædib. nostr. ad Palatium  
antiquum apud Westmonast.  
Anno à nato Mundi Salvatore  
M DC XCVI.

Alma-



# Almagestum Botanicum.

A.



BAVUS, *Æthiopicus* fructus Bello, f. B. vid. *Curcubitifera Arbor*.

ABELMOLOCH *Mauritanorum Imperato*. C B P. vid. *Ricinus*.

ABELMOSCH vulgò vid. *Alcea*.

ABHEL. *Guilandini*. vid. *Cupressus*.

ABIES minor, longioribus setis, ramulorum ex omni parte, prorumpentibus; *Pinastrum* referens. Abies foliis prælongis, Pinum simulans, *Raji Hist. Pl. app.* 1916. an *Picea pumila Clus. Hist.* 33. f. B. T. 1. lib. 9. p. 241. *Park.* 1538. *Picea minor C B P.* 493. & fortè *Pinus Tubulus*, s. *Tibulus Plinio, Dalechamp. Hist. Lugd. Pag.* 47.

Hanc elegantem *Abiegnam* speciem, similitudinis propinquitate, à Cl. Hermanno in *Horti Acad. Lugd. Batav. Catalogo* pag. 497. inter Pinorum genera annumerari, & pro Pino maritimâ minore C B P. haberi, existimare æquum est, eò quòd hujus alioquin non reticendæ Arboris, nullam inter Abietes, mentionem facit, etiamsi in Hortis Batavorum celebrioribus, in hunc usque diem, nihil fermè frequentius colitur, ut nobis retulit D. *Tancredus Robinson*, M. D. vir omni eruditione clarus, & de re Herbariâ optimè meritis, qui æstate præterlapsâ è Belgia in Angliam rediens, hujus ramulum, inter alia selectiora illic collecta, secum attulit, & nobis amicissimè donavit. Similes admodum sunt Arbores *Picea* & *Pinastrum*, adeò ut plurimos *Botanices* peritos, hucusque decipere, unam pro alterâ assumentes: Tanta inter has convenientia verisimilè in causâ fuit; cur itidè Antiquorum Botanicorum *Coryphaeus* ipse *Dioscorides*, ita ambigè de *Peuce* & *Pity* loquitur, ut indè disci nequeat, utra earum Arborum sit *Pinus* vel *Picea*: Hinc etiam probabile est Cl. *Clus.* dubitationem oriri de *Picea*; Utrum sit *πίτυς Theophrasti*, an ejusdem *ἑλάτη ἀγέλω*. Inter tantas eruditorum altercationes circà hanc rem, quid si *Pityn* dicamus esse *Pinum*, & *Peucen* hanc nostram Abietem *Pinastro* consimilem, (i. e.) *Piceam* veram Antiquorum, concludamus. Hujus Ramuli picturam apposui in *Phytograph. Tab.* 1. fig. 1. & illius brevem descriptionem ab eruditiss. *Rajo* desumptam, subjungere haud gravabor. Folia *Abiegnis* multò longiora ut *Pinus* videri possint, non tamen bina simul ex eadem thecâ exeunt, sed singula è ramis enascuntur *Abietinorum* in modum creberrima, angusta, in mucrones acutos, & pungentes exeuntia, quem florem fructumve ferat, nobis incertum. Ubi. supra.

A

Abies



*Abies* major conis sursum spectantibus, foliis pectinatim *Taxi* modo dispositis, utrinque virentibus. *Abies* conis sursum spectantibus. s. mas. *C B P.* 505. *Abies Taxi*. foliis, *Herman. Hort. Lugd. Bat.* p. 1. qui recte hanc distinguit *Abietis* speciem, à *Fœminâ Theoph.* J. B. contra sententiam nostri celeberrimi *Raji*, ut videre est in *Hist. Pl.* p. 1395. in Hortis curiosorum apud *Belgas* ubique occurrit, ut nos monuit idem laudatus vir *D. D. Tancredus Robinson*, de quo hujus specimen accepi.

*Abies* minor pectinatis foliis, *Virginiana*, conis parvis, subrotundis, an *Avevetl' & Aboshoetl.* sive Tympanum aqueum, *Abies Mexicana* minor, *Hernand.* apud *Rec. Hist. Mexic.* p. 92. in Horto cultissimo, novisque & minus cognitis stirpibus instructissimo, *Reverendiss. Domini D. Hen. Compton, Episcop. Lond.* primò collegimus. à *D. Banister* è *Virginia* transmissa est, ubi Arbor vitæ nostratibus audit. Hujus Iconem videsis *Phytogr. Tab.* 121. fig. 1.

*ABROTANUM* mas. ex *Surinam*, molli hirsutie canescens, nostrum. *Raji. Hist. Plantar. app.* p. 1866. in Horto *Fageliano*, apud *Belgas*, jamdudum collegit, & nobis impertivit stirpium rariorum cultor eximius, & nunc Hortulanus *Regius D. Georgius London*; hirsutie exceptâ, hæud plurimum à magno *Camphorato* distare videtur.

*Abrotanum* elatius subincanum, foliis creberrimis, secundum caulem, in metæ formam fastigiatis. an *Abrotanum* mas. trifido viridique folio. *Lusitanicum P B P.* 303. hoc elegantissimum *Abrotani* genus, in Horto Medico *Chelseiano*, *Londini* suburbano, oculis nostris alioquoties lustravimus: Cujas autem erat, quibus locis, quâ Regione nascatur, aut undè huc advenit? nos omnino latet, hujus imaginem habes in *Phytogr. Tab.* 121. fig. 2.

*Abrotanum* mas. *Tingitanum*, ramulis ad tactum glutinosi; an *Abrotanum Campes- tri* simile *Tingitanum.* *Hort. Lugd.* p. 2. Nostra tota planta, viscoso quodam glutine, manus inficit.

*Abrotan.* inodorum, foliis *Crithmi* obscurè virentibus. *Schol. Botan.* 180.

*Abrotan.* fœmina verum *Dioscorid. Zanon.* vid. *Chrysanthemum.*

*ABRUS Alpini*, vid. *Phaseolus.*

*ABSINTHIUM* tenuifolium elegans, ex *Hispania Cl. Turnefortii, Phytogr. Tab.* 1.

*Absinth. Halepense* tenuifol. grati odoris, comâ delicatiori. *Phytogr. Tab.* 73. Fig. 2.

*Absinth. Santonicum, Arabicum.* *D. Bobart. Scheha Arabum, Absinthii Genus*, circa *Bethlehem. Rauwolf. Hist. Lugd. app.* p. ult. *Assenzo Seriphio vero di Dioscoride. Zannoni Histor. Botan.* fig. 14. Hæc pulcherrimâ *Absinthii* specie, cum plurimis aliis novis, & illustrioribus Plantis, quas summâ diligentia, ac indefessis peregrinationibus, per totam ferè Europam, sibi conquistavit, Ornatissimus Vir, & hujus *Botanices Scientiæ* verè Ornamentum, *D. D. Guliel. Sherard.* nos ditavit.

*Absinth. Erysimifolio, Achaovan Alpini* quodammodò accedens ex insulâ *Jamaicensi.* *Matricariæ Achaovan dictæ* similis, *Erysimi* foliis; *Absinthii* sapore, *Jamaicensis. Phytogr. Tab.* 45. fig. 3.

*Absinth.* minus odoratum, *Gangeticum*, floribus *Chamæmeli* solitariis, è foliorum alis; *Phytogr. Tab.* 1. fig. 2.

*Absinth.*



Absinth. Ponticum, repens vel supinum. CBP. Absinth. *Ponticum*, supinum Herbariorum *Obs. Lob.* Absinthium repens. *Tab. Icon.* hujus pictura, exhibetur in *Phytogr. nostr. Tab. 73. fig. 1.* Absinthii species quibusdam, Chamæmelum Chrysanthemum, *Fuchsi* *J B. T. 3. lib. 26. fol. 176.*

ABSUS. *J B. vid Sena.*

ABUTILON. ejusque species, vid. *Alcea.*

ACACIA vera, s. Spina Ægyptiaca, subrotundis foliis, flore luteo, filiquâ brevi pauciorib. isthmis glabris, & cortice, nigricantibus, donata. Acacia nigra *Theophrast.* & *Plin. lib. 13. c. 9.* Acacia Ægyptia, Neapolitana. *Fab. Column.* apud *Reccum.* 866. Acacia foliis scorpioides leguminosæ. CBP. 392. Acacia mas. *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt. p. 15.* Acacia vera. *Bellon. Obs. lib. 2. c. 56. J B. Hist. Pl. T. 2. l. 12. p. 429.* hujus *Icon* exhibetur in *Phytogr. nostr. Tab. 123. fig. 1.* sub titulo *Acaciæ Africanæ*, spinis candicantibus horridæ, subrotundis foliis odoratissimæ. *(see p. 398)*

Acacia altera vera, s. Spina Mazcatensis, vel Arabica, foliis angustiorib. flore albo, filiquâ longâ, villosâ, pluribus Isthmis, & cortice, candicantibus, donata. Acacia candida. *Theoph. lib. 4. Hist. Pl. c. 3. & Plinii, lib. 24. c. 12.* Acacia Sant, & Akakia, s. Acacia foemina. *Pr. Alpin. de Pl. Ægypt. Arbor Setan, quæ & Alcharad appellatur Bellunensis, in Interpret. vocum Avicenna.* Acacia fortè *Vesling.* in *Observat. Prosp. Alpin. de Pl. Ægypt. p. 6.* Hujus Iconem videsis in *Tab. nostra, 251. fig. 1. Phytogr.* *(see p. 398)*

Eadem floribus luteis, forte Acacia Ægyptiaca, foliis scorpioides, leguminosæ; filiquis albis, compressis, Isthmo interceptis; floribus luteis. *Hort. Lugd.*

Acacia Africana Abruxæ foliis, aculeata, spinis longiss. horrida *Phytogr. Tab. 123. fig. 2.* fortè Acacia Americ. spinosiss. floribus luteis globosis; fructu tenui, toroso, dulci. *Breyn. Prodr. 2. an Frutex Palæstinus Bellon. Myrrhæ arbor ab eodem creditus, Obs. lib. 2. c. 80.*

Acacia spinosa, foliolis perexiguis, & velutî crispatis, *Maderaspatana. Phytogr. Tab. 73. fig. 3.* fortè Frutex foliis Acaciæ Mesopotamicus. *Fab. Column. Not. in Reccum.* Acaciæ similis Mesopotamica minutiss. foliis, filiquâ integrâ, contortâ, crassâ, & obtusâ, sive filiquâ Nabathæâ. *Breyn. Prodr. 2.*

Acacia Indica, filiquâ tumidâ, tuberosâ, *Breyn. Prod. 2. Acacia Indica Aldin. Hort. Farnes. fol. 2.* Acacia Americana filiquis teretibus, ventriosis, floribus luteis. *P B P.* Eadem floribus albis. *P B P.* fortè *Uty Brasiliensibus. Marcgrav. lib. 3. c. 11.*

Acaciæ Indicæ Aldin. similis, ex *Insula Maderensi.*

Acacia Maderaspatana foliolis parvis, aculeis è regione binis, prægrandibus horrida, cortice cinereo. *Phytogr. Tab. 121. fig. 4.*

Acacia Maderaspatana, minutiss. foliis, aculeis ferocibus, alternis, frondosâ; cortice itidèm cinereo. *Phytogr. Tab. 121. fig. 5.*

Acacia Americana grandibus aculeis, ad ramulorum exortum, cornua bovina referentibus, filiquâ rostratâ. *Phytogr. Tab. 122. fig. 1.* Acacia Americ. cornigera, filiquis in spinam abeuntibus. *P B P.* Acaciæ similis, spinis corniformibus, Mexiocana quarta; s. Arbor cornigera Mexiocana quarta, s. Spinis magis expansis, rectis, & crassissimis,



- latifolia, fructu minore rostrato, rubro. *Breyn. Prodr.* 2. fol. 6. *Querna Lusitanis*; Hoitmamaxalli, sive Arbor cornigera *Hernandez.* apud *Recc.* fol. 86.
- Acacia Americana* cornigera, angustifolia, strictioribus aculeis. in *Hort. Reg. Hampt.* hodierno tempore colitur.
- Acacia Maderaspatana* spinosa, pinnis velut lunulatis, acutioribus Myrti æmulis, nervo pinnularum, ad unum latus vergente, filiquâ latâ. *Phytogr. Tab.* 122. fig. 2. an *Intsia Malabarorum.* *H M. P.* 6. p. 7.
- Acacia Maderaspatana*, spinosa, *Intsia* accedens, cortice cinereo, ramulis communi pediculo binis. *Phytogr. Tab.* 2. fig. 1. spinis aduncis.
- Acacia Maderaspatana* spinosa, ramosior, cortice cinereo, ramulis plerumque ex uno pediculo binis, aculeis rectis, brevioribus, crassis. *Phytogr. Tab.* 121. fig. 3.
- Acacia tenuifolia Maderaspatana*, spinis brevibus recurvis, albicantibus, cortice fusco; *Phytogr. Tab.* 121. fig. 6. ubi pinnula nimis lata & obtusa pinguntur, cetera, studiosissime celatâ, elegantè ejus ramulum in medio Tabula, seorsim pictum, vides. an *Mimosa arborea Javanensis* spinosa, tenuissimis pinnis, filiquâ latâ, pergrandi, spadiceâ. *Breyn. Prodr.* 2. fol. 73. Eadem fortè cum Mizquitl. s. *Acacia Mexicana.* *Hernand.* apud *Recc.* p. 59. 455. & 867.
- Acacia Zeylanica* minùs spinosa, pinnularum costis, & caule, rufescente hirsutie, villosa. *Phyt. Tab.* 122. fig. 3. in *Hort. Reg. Hamptonia* collegimus. Fortè Mizquitl. *Michuacanensis* s. *Acacia Nov. Hispan.* 2. *Hern.* apud *Recc.* p. 60. (i. e.) Tlacotic. 1<sup>a</sup>. ejusd. *Hernand.* *ibid.* pag. 417. ubi & Imago exhibetur.
- Acaciæ* fortè cognatus è *Maderaspatân.* Frutex *Vitis Idææ Bengalensis* nostræ foliis, & ramulis alternis, ad foliorum ortum, spinis exiguis asperatus. *Phytogr. Tab.* 122. fig. 3. Hanc ut & plures elegantissimas *Acaciarum* species, nec non quamplurimas alias perraras, & peregrinas stirpes, quas nitidè exsiccatas, & inter chartas repositas, à Fratre suo charissimo, ex *Orientali India* sibi advectas habuit, Ornatiss. & perhumanus Vir D. *Carolus du Bois Londinensis* Mercator celeberrimus, & rei *Herbariæ* cultor eximius, nobis ad exsculpendum benignè concessit.
- Acaciæ* quodammodò accedens, s. *Ceratiæ* & *Acaciæ* media *Jamaicensis* spinosa, bigeminatis foliis, flosculis stamineis, atro nitente fructu, filiquis intortis. *Phytogr. Tab.* 1. fig. 6. Unguis cati, arbor *Americana*, spinosa, filiquosa. *P B P.* Huic congener est *Guabipocacabiba Brasiliens.* *Pison.* *Cassia* fistulæ non purganti *Brasiliensibus* affinis *Jonstoni.* *Dendrolog.* p. 384. quam *Cl. Breyn.* eandem facit cum arbore suâ filiquosâ *Brasilianâ*, filiquâ tortuosâ, putrescente, *Fraxinellæ* foliis. *Cent.* 1. fol. 7.
- Acacia gloriosa*, *Lentisci* folio, spinosa, flore spicato, luteo, filiquâ magnâ muricatâ *Phytogr. Tab.* 2. fig. 2. Arbor spinosa Indica, muricatis filiquis *Park.* Arbor exotica spinosa foliis *Lentisci.* *CBP.* 399. itè Rubus exoticus ejusd. *CBP.* Rubi facie fenticosa Planta *Lobelio* *J B. Tom.* 2. itè Lobus *ἑχινώδης* cum pisô duro, cinerei coloris ejusd. *J B. Tom.* 1. lib. 12. 439. itè Fructus peregrinus tanquàm tor-  
no elaboratus argenteus ejusd. *Tom.* 1. lib. 3. fol. 311. & fructus rotundus, levis, argenteus, *J B. T.* 1. lib. 3. c. 48. Inimboy *Brasiliensibus* *Marcg.* p. 12. Icon autè minùs artificiosè delineata, exhibetur pag. 56. Arboris truncus spinosus *Hist. Lugd.* descript. at figura sub titulo *Nerii* facie secundo loco, habetur p. 1831. Bonduch *Zanoni* *Caretti.* *H M.* p. 2. fig. 22. fol. 33. Lobus echinatus, fructu cæcio, foliis longioribus. *P B P.*



*Acacia gloriosa*, Lentisci rotundioribus foliis, spinosa, fructu flavo. Fructus peregrinus 6. orbiculari penè rotunditate, tanquàm torno elaboratus, flavus. *Clus. exot.* lib. 2. c. 29.

Eadem, fructu rubicundo.

*Acacia gloriosa Golcondæ*, spinis crebrioribus, Lentisci foliis, Inimboy triplò minoribus.

*Acacia gloriosa* Lentisci folio, spinis Vidua. an Bonduch *Indorum*, filiquâ minimè spinosâ. *Raji Hist. Pl.* 1800. cujus filiquam, in *Illustri Medii Templi Londinens.* & omnium Rerum Naturalium refertissimo, *Musæo Corteniano*, aliquandò se conspexisse memoratur.

*Acacia gloriosa Zeylanica*, tinctoria, amplioribus foliis, spinosa. Crista pavonis, Coronillæ foliis 2.<sup>a</sup> s. tinctoria Indica, flore luteo racemoso minore, filiquâ latissimâ glabrâ, lignum rubrum *Sappan* dictum, ferens. *Breyn. Prodr.* 2. p. 37. *Erythroxylum*, s. lignum rubrum *Indicum* spinosissimum, Coluteæ foliis, floribus luteis, filiquis maximis. *P B P.* Santalum 8.<sup>m</sup> s. Ligno *Brasiliano* simile. *C B P.* 393. Lignum *Sappou* lanis tingendis percommodum. *Linschot.* p. 2. *Ind. Or.* cap. 24. *Jonst. Dendrogr.* lib. 9. f. 458. *Tsjampangam. H. M.* p. 6. *Tab.* 2. cujus lobus *Pathanga Zeylanensibus* audit. & *Clusio* sub nomine *Lobi membranacei nigri, tumidi, exot.* lib. 3. cap. 16. (ex sententiâ *Cl. Raji Hist.* 1737. & 1775.) describitur, & depingitur. Lobus cortice membranaceo atro tumido *C B P.*

*Acacia gloriosa* spinis armata, (cujus lignum *Brasilîa* dictum) tinctoria, Crista pavonis Coronillæ folio 3.<sup>a</sup> s. tinctoria maxima *Brasiliana* flore variegato, parvo: odoratiff. filiquâ aculeatâ, lignum *Brasilium* dictum, ferens. *Breyn. Prodr.* 2. 37. *Erythroxylum Brasilian.* spinos. foliis *Acaciæ.* *P B P.* Arbor *Brasilîa Theveti. Hist. Lugd.* Santalum. 5.<sup>m</sup> vel Pseudo-Santalum rubrum. s. Arbor *Brasilîa.* *C B P.* 393. *Ibirapitangha*, s. Lignum rubrum. *Pisonis* p. 164.

*Acacia Orientalis gloriosa*, Coluteæ foliis, rachi medio ad genicula, solummodò spinis, gemellis aculeata. Crista pavonis Coronillæ fol. 1. s. floribus spicatis ampliff. ex aureo & coccineo variegatis, filiquâ Pisi. *Breyn. Prodr.* 2. 37. Frutex pavoninus. s. Crista pavonis *ejusd.* in *Cent.* 1. *Erythroxylum Indicum* minùs spinosum, Coluteæ foliis, filiquis augustioribus, flore ex luteo & rubro elegantèr variegato. *P B P.* Flos Indicus, Cauda pavonis dicta, *Cat. Hort. Leyd. jam olim edit.* *Monarakudimbija Zeylonensibus.* Flos pavoninus, *Lusitanis.*

*Acacia gloriosa* Coluteæ folio *Chinensis*, rachi medio tam ad genicula quam ad internodia, spinis curtis duplicatis, deorsum inflexis, munito, an *Wawoulathya Cingalensibus* dicta, à *Wawoulæ (i. e.) Vespertilione*, quod ejus spinulæ, similes sint unguiculis *Vespertilionum*, quibus tanquàm hamulis, Arborum ramis, in *India* observantur affixæ.

*Acacia gloriosa* Insulæ, *Jamaicensis*, foliis minoribus subrotundis, spinis ad genicula simplicibus, floribus flavo-purpureis. an *Acacia Orbis Americani* altera, flore pulcherri-  
mo. *Cat. H R P.* p. 3. fortè *Camolxochitl Maxiocan.* s. Arbor floribus *Cassîæ Hernandez apud Recc.* 361. *Superba Barbadosum* Nostratibus vulgò.

*Acacia gloriosa* spinis carens. *Tsietti Mandaru. Hort. Malab.* p. 6. *Tab.* 1.

*Acacia gloriosa Benghalensis*, *Sesban Egyptiæ* foliis augustioribus, floribus ardenter rubentibus, non spinosa. à *D. Parry Chirurgo Londinensi* peritissimo, nobis fuit communicata.

Acacia



*Acacia Javanica* non spinosa, foliis maximis splendentibus. *Hort. Beaumont. Cadawang* Indigenis dicta. an *Acacia Coluteæ* foliis ex *Java*, non spinosa, filiquis longissimis. *Cl. Herman. Cat. Mss.* vid. hujus Iconem in *Phytogr. Tab. 123. fig. 3.*

*Acacia* non spinosa, *Jamaicensis*, foliolis latâ basi, in metæ formam fastigiatis. Hujus exhibetur Icon, in *Phytogr. nostr. Tab. 251. fig. 2.*

*Acacia* non spinosa *Wagæ Malabaricæ* similis, è *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab. I. fig. 4.* sub titulo *Codomoric*, aliquandò etiam habuimus, ex oris *Cochinensibus.*

*Acacia* non spinosa minor è *Quaracoa. s. Curassavica*, flore albo globofo. *Phytogr. Tab. 2. fig. 3.* *Acacia Americana* non spinosa, foliis Scorpioides leguminosæ, flore albo globofo, filiquis fuscis. *Hort. Amstelod. p. 4.* fortè *Tehoaxin* *Mexicensibus* *Hernand. apud Recc. 409.*

*Acaciæ* similis non spinosa, ramulis alternis, *Maderaspatana.* *Phytogr. Tab. 1. fig. 5.* an *Nilicamaram. H. M.* pro hujus Synonymo, *Canna Indica* arborea *Zanoni*, ponitur à *Breynio. Prodr. 1.* cùm *Nellikam ejusd.* huic magis convenire videatur.

*Acaciæ* affinis *Virginiana* spinosa, filiquâ membranaceâ planâ, floribus albis papilionaceis. *Anagyridis* modo in *Uvam* propendentibus. *Phytogr. Tab. 73. fig. 4.* *Acacia Virginiana* filiquis glabris. *Raji Hist. 1790.* *Anagyris Americana* spinosa floribus albis odoratis *P B P. 311.* item *Laburnum odoratum Cannadense*, foliis *Coluteæ* ejusd. *P B P. 345.* *Laburnum spinosum Mauritanicum*, foliis *Glycyrrhizæ*, flore albo. *Breyn. Prodr. 1.* item *Glycyrrhiza, s. Glycyrrhizæ affinis spinosa*, arborescens *Mauritanica.* *Laburni* flore albo. ejusd. *Br. Prodr. 2.* Arbor filiquosa *Virginienfis* spinosa, Locus nostratibus dicta. *Park 1550.* *Acacia Africana Cornuti.* *Florenti Schuyl Cat. Hort. Lugd. Bat. fol. 6.* *Cl. noster Rajus* præcitato loco monuit, hanc arborem, *Acaciam Americanam Robini*, ab Hortulanis nostris, aliisq; sæpissime falsò nominari; at pro hujus Synonymo, ab autore *P. B. Prodr. 1.* *Acacia Americana Robini*, ponitur p. 311. ubi subjungit, *per errorem* in *Horto Lugd. Batav.* titulo *Acaciæ, Americanæ Coluteæ* foliis monococcæ, filiquis echinatis indigitata fuit; insimul autem, hunc errorem ex *Cornuto* conceptum esse, planè innuens, ac si hæc nostra *Acaciæ affinis Virginiana* spinosa, (*i. e.*) *Anagyris Americana* spinosa, floribus albis odoratis *P B P.* esset re verâ unum & idem cum *Acaciâ Americanâ Cornuto, Robini.*

Hujus arboris cortex interior, suavis admodum est saporis, adeò ut *Glycyrrhizæ* quam plurimum accedat, quâ cum sapore, & foliorum figurâ, in tantum convenit, ut proindè à quibusdam Nostratium in *Virginia* degentium, *The Liquorice Tree, (i. e.) Glycyrrhiza* arbor, vulgò nuncupatur.

*Acacia trifolia. C B P.* vid. *Cytiso-spartum.*

*A C A J A I B A* arbor, cujus fructus *Acajou Pisonis.* Vide *Anacardium.*

*A C A N T H I U M.* ejusq; species. vid. *Carduus.*

*A C A N T H U S* Sylvestris, mitioribus spinis. *Acanthus* medius, rarioribus & brevioribus aculeis donatus. *D. Fagon. Sch. Botan. 219.* *Acanthus spinosus Syriacus.* *D. Bobart.*



**ACER** majus latifolium, *Sycomorus falso*, foliis ex albo & viridi, elegantèr variegatis.

*Acer* majus folio rotundiore minusq; laciniato. *Raji Hist. Pl.* 1710. *Acer montanum flavum*, s. crispum. *C B P.* 431. *Opulus montanus.* *Hist. Lugd.* 94.

*Acer Virginian.* folio majore, subtùs argenteo, suprà viridi splendente. *Phytogr. Tab.* 2: fig. 4. *Acer floescens Virginiana*, vulgò. Arborem hanc magnitudine & proceritate eximiam, in *Hort. D. Joh. Tradescanti Lambethæ* ad Austrum, jam olim enutritam, sæpè conspeximus, sed eam ibi unquam floruisse, à nemine memoratum audimus. Floribundam autèm hujus arborem, ac numerosis floribus ruberrimis, ornata, in *Hort. Med. Chelseian.* nuperrimè observavimus.

*Acer montanum, Orientalis* Platani foliis atro-virentibus. *Phytogr. nostr. Tab.* 252.

*Acer montanum* tenuissimis, & acutis foliis. *C B P.* 431. *Acer montanum.* *Park. Theatr.* 1426. *Aceris* majoris varietas. *J B. Tom.* 1. l. 8. p. 168.

*Acer trifolia.* *CBP.* 431. *Acer monspessulanum.* *J B. T.* 1 l. 8. p. 167. an *Acer Cretica.* *Pr. Alpini exot.* p. 9. hujus Arboris hætenùs nullibi exhibetur genuina figura, nisi in *nostr. Phytogr. Tab.* 251. fig. 3.

*Acer maximum* foliis, trifidis & quinquifidis, *Virginianum.* *Phytogr. Tab.* 123. fig. 4. & 5. Negundo perperam dicta, *Arbor Virginiana.* *Hort. Beaum.* Arbor exotica, foliis Fraxini instar, pinnatis, & ferratis. Negundo perperam credita, *Raji Hist. Pl.* 1798. Arbor fortè *Saccharifera Canadensium Indorum.* vid. *Rajum* 1701.

*Acer Benghalense*, Laurinis foliis, fructu tergemino, totidèm membranulis extantibus alato. *Phytogr. Tab.* 3. fig. 1: hujus ipsissimæ Arboris exemplar, non ità pridèm ex Insulâ *Jamaicensi* allatum, accepimus.

Cui folia Lauri parùm abludentia, crassa, venosa, ex brevi pediculo, cauli appensa, bijuga, fructu ad ramulorum summitatem tergemino, vasculis, duriusculis ternis, arctè cohærentibus, & ferè in unum conjunctis, membranis totidèm extantibus, alis muscarum similibus, unum è directo, cæteris lateralitèr adnexis, incluso. Plura non licet; sufficiet hujus Iconem genuinam demonstrasse, quam invenies in *Phytogr.* loco prius citato.

*Aceris cognata*, foliis oblongis, rugosis, ferratis, ad *Ulmum* accedentibus; vasculis disjunctis, membranis foliaceis, feminibus ipsis appositis pluribus confertis. *Ostrya Ulmo* similis, fructu in Umbilicis foliaceis. *CBP.* 427. *Fagus Sepium* vulgò; *Ostrya Theophrasti* *J. B. Tom.* 1. l. 8. fol. 146. & *Caspar Bauh. in Matthiolum* lib. 1. cap. 95. *Carpinus Matthiol.* ibid. *Ostrya.* s. *Ostrya Theophrasti.* *Park. Theatr.*

*Aceris cognata* *Ostrya* dicta, floescens, *Virginiana.* *Carpinus Virginiana* floescens. *Phytogr. Tab.* 156. fig. 1. *Fagus floescens Virginiana*, *Carpini* foliis. *Horti Beaum.* ex feminibus à *D. Banister*, è *Virginia* transmissis, in *Horto Comptoniano* copiosè provenit. Forte *Tzitzin. Nov. Hispan.* apud *Terentium*, qui *Recci* Icones explicavit, quam vid. ad *Theaur. Recc.* fol. 436.

*Acer minus* fructu orbiculari, *Salicis* folio *Brasilianum*, s. foliis & fructibus majoribus. *Breyn. Prodr.* 2. fol. 8. *Salix Brasiliensis* folliculifera. *Johnston Dendrograph. Tab.* 126. Frutex innominatus instar *Salicis pumilæ*, in arenosis locis nascens. *Marcgr.* fol. 76.

*Acer Virginianum odoratum.* *Herman Cat. H. Lugd.* vid. *Liquidambari arbor.*



ACETOSA *Virginiana*, angusto longoq; folio. fortè *Acetosa Pyrenaica*, angustissimo, & longissimo folio. *Sch. Bot.* 97.

*Acetosa Vesicaria Tingitana*, perennis repens, foliis longis sinuatis. *Moris. Hist.* 2. 583.

*Acetosa dentata perennis, Tingitana. Zanon. Hist. Botan.* 14. *Lapathum maritimum*, foetidum. *C B P.* 116. & in *Prodr.* 56.

*Acetosa Vesicaria*, utriusq; *Indiæ* annua. *Acetosa Americana*, longissimis pediculis donata. *C B P.* 114. *Acetosa Vesicaria American. Parkinsono, Raji Hist.* 179.

*Acetosa rotundifolia hortensis. C B P.* 114. *Raji Hist.* 180. *Oxalis sativa Franca. s. Romana rotundifolia. Park.* *Oxalis folio rotundiore repens. J B. T.* 2. lib. 23, 991.

*Acetosa scutata, repens. Triumphetti. fol.* 68. hujus autèm *Icon.* ad fol. 26. apponitur.

*Acetosa repens Westmorlandica, Cochleariæ foliis, apicibus nonnihil sinuatis. Phytogr.*

*Tab.* 252. *Acetosa rotundifolia, repens, Eboracensis, folio in medio deliquium patiente.*

*Moris. Hist. Pl.* 583. *Acetosa scutata repens. C B P.* 114. & *Prodr.* 55. ut & *Acetosa rotundifolia Alpina. ejusd. in Pinac. & Prodr. ibidem. Park. Theatr.* 744. Itèm

*Acetosa Cambrobritannica montana. ejusd.* 745.

Hæc elegans *Acetosæ* species, non solùm *Westmorlandiæ* Provinciæ nostræ, Alumna est, ubi à D. *Thoma Lawson*, viro rariorum Plantarum, in Angliâ spontè nascentium, industrio admodùm Indagatore, primùm fuit inventa, sed etiàm, copiosè provenit in Cambriâ juxtà Scaturigines aquarum, cautibus clivosis *Montis Snowdon*, supra Vicum *Llandberis*, necnon ad rivulos in confragosis rupibus *Montis Cader Idris*, suprâ lacum quendam, nostratibus *Lhiny-Cau* dictum, ut Amicus noster plurimùm venerandus, & alter quidam Anglorum *Plinius D. D. Rajus* ex sua propriâ Observatione reliquit, *Hist. Plant. app.* 1856. at in agro Eboracensi à nullo unquàm (quantùm ego intelligerem) hætenùs reperta fuit, ideoq; nomen à *Morisono*, minùs propriè adaptatum erat; potiori etenim jure, Natali *Westmorlandiæ* solo, hujus titulus exornari debet.

*Acetosa arborescens, subrotundo folio; ex Insulis Fortunatis. Phytogr. Tab.* 252. *Oxalis* (fortè) *rotundifolia, à Rovillio picta. Pona.* Et *Lunaria Magorum Arabum. Penæ ejusd. Descript. Montis Baldi ad finem.* *Lunaria magorum Arabum. J B. T.* 2. lib. 23. 994. *Lob. Obs.* 470. & *Icon.* 808. *Lunaria magorum Arabum quid? C B P.* 355. *Lunaria Oxalidis rotundæ folio, quam nondùm videre licuit. C B. Phytopin.* 145.

ACHIOTL *Mexicana, s. Medicina tingendo apta, Hernand. vid. Orleana.*

ACINOS vid. *Clinopodium.*

*Aconitum vid. pag. 398*

ACORUS verus *Asiaticus*, radice tenuiore, vel Calamus aromaticus *Garcia.* Vaembù. *HM. P.* 11. *Tab.* 48 hæud multùm differt à Nostrati. fortè *Capicatinga*, aliis *Jacarecatinga*, *Acori Species. Pisonis lib.* 4. cap. 57.

ACULEOSA *Mauritanica*, *Ericæ* foliolis hirsutis, rigidis, infesto mucrone pungentibus, flore amplo tetrapetalo, colore lurido, unguiculis magnis, atropurpureis. *Phytogr. Tab.* 252. fig. 4.



**ADHATODE** *Zeylonensium*, *Mus. Zeyl.* hoc est Medicina foetum mortuum expellens *Græcis* *Ecbolium Hort. Lugd. app.* Dictamno fortè affinis *Indica* arborefcens *Lauri Americanae* foliis. s. *Ecbolium Zeylanicum* foliis *Laurinis Breyn. Prod.* 2. fol. 41. *Wanæpala Malabarorum*. Exstat hujus Icon in *Phytogr. nostr. Tab.* 173. fig. 3.

**ADIANTHUM**; s. Filix *Trichomanoides Jamaicensis* pinnulis auriculatis ad basim strictioribus & rarius dentatis major, *Phytogr. Tab.* 253. fig. 5. an *Polytrichum*. saxatile dentatum. *Carol. Plumier Descript. des Plant de L'Amérique Tab.* 50. Filiculæ petrææ ex *Insulis Stæchadibus. CBP.* five *Chamæfilici marinæ* nostratî proximè accedere nobis videtur.

*Adiantum maritimum* segmentis angustioribus *Caribæarum. Phytogr. Tab.* 124. fig. 5 præcedentis videtur esse speciem minorem.

*Adiantum*; s. Filix *Trichomanoides Jamaicensis*, pinnulis auriculatis, dentatis, ad basim amplioribus, radículas ex nutante apice, in terram demittens. *Phytogr. Tab.* 253. fig. 4.

*Adianth.* s. Filix *Trichomanoides Jamaicensis* pumila pinnulis auriculatis, ad petiolum angustis per ambitum minutissimè denticulatis. *Phytogr. Tab.* 251. fig. 4.

*Adiantum maritimum* segmentis rotundioribus. *Schol. Botan.* p 4. *Adiantum mas Tabern. Icon.* 797, *CBP.* 355. ubi planè fatetur, Quid sit hoc *Adianthi* genus se nondùm assequi. Iconem hujus videsis in *Phytogr. nostrâ, Tab.* 73. fig. 6.

*Adiantum Trichomanes* dictum, caule viridi, foliis serratis. *Mentzel. pugill. Trichomanes* minus & tenerius. *CBP.* 356. *Trichomanes montana*, costâ viridi, foliis altiùs incis. *Raij. Synops. Stirp. Britannic.*

*Adianth. Trichomanes* dictum *Virginianum* in ramulos divaricatum. *Trichomanes ramosum. CBP.* 356. hanc speciem in *Cambriâ* nostrâ à *D. Lloyd* nuperrimè inventam esse audio, ac eleganter ramosum muris faxeis innatum ipsemet conspexi in Horto amicissimi Viri *Philippi Owen Armigeri*, apud *Maidstoniam* in agro *Cantiano* non ignobile Oppidum.

*Adianth.* s. *Trichomanes Bermudense*, maximum, ferratis foliis auriculatum. *Phytogr. Tab.* 125. fig. 1. ex dono *D. Petever* accepimus. > vide Pag. 398

*Adianth.* s. *Trichomanes maximum, Americanum*, subtùs argenteum, pinnulis productioribus, ferratis, summo caule involutis, ex insulâ *Jamaicens.*

*Adianth. album floridum.* s. Filicula petræa crispa *Raij Hist. Pl.* 153. Filicula montana florida perelegans *ejusd. Cat. Angl.* 109. *Adianth. album crispum Alpinum Schwenckfeld. J B. T. 3. l. 37. 753.* Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 3. fig. 2.

*Adianth. album floridum, Cicutariæ folio, Virginianum, nostrum. Raij. Hist. app.* 1854. vid. *Phytogr, Tab.* 3. fig. 4.

*Adiantum* foliis inferioribus *Coriandri*, cæteris *Rutæ murariæ*, vel *Fumariæ, Schol. Bot.* p. 4. *Lunariâ racemosa multifido folio. CBP.* 355. *Lunaria botryites* ramosa *Silestaca J B. T. 3. l. 35. 711.* de hujus *Synonymis* ut ex probabili suâ sententiâ, nunquam satis laudatus Vir *D. D. Sherard* candidè nos monuit, cujus & exemplar, è penu suo paulo antè, humanissimè impertivit, ubi statim suspicabar eandem esse hanc plantulam cum *Adiantho* vero affini minore, *Scoticâ*, folio obtuso, saturatè viridi. *D. Sibbaldi Prodr. Scotiæ. P. 2. l. 1. f. 8. vide Pag. 398*



Adianth. foliis minutim in oblongum scissis, pediculo viridi. *C B P.* 355. Adianthum album tenuifolium Rutæ murariæ accedens *J B. T.* 3. l. 37. 743. in *Walliâ* nuperri-  
mè ( ut aiunt ) à *D. Lloyd* reperta est. Exhibetur hujus Icon *Phytogr. Tab.* 3.  
*fig.* 3.

Adianthum exoticum Rutæ murariæ æmulum pinnulis oblongis, angustis in summi-  
tate tripartitè retusis. hanc elegantem Capillarem, æri incidendam, nobis commu-  
nicavit *D. Parry Chirurgus Londinensis* ; cujus Icon habetur in *Phytogr. Tab.* 73.  
*fig.* 5.

Adianthum nigrum *Chinense* tenuitè divisum, pinnulis minimis, obtusis, plerum-  
que bifidis. *Raji Hist. Pl. app.* 1854. iste consummatissimus Philosophus qui  
apud suos omnium Botanicorum Pater & Princeps facilè æstimandus est, non de-  
dignatus fuit, viva voce, nos commonefacere, se dudum opinari, hanc pulcherri-  
mam *Indiæ Orientalis* alumnam, eandem esse Filici saxatili crispæ. *Park. Theatr.*  
1044. cujus Icon habetur in *append. fol.* 1686. descriptio *Rajana* subsequitur.  
*Hujus cauliculus, s. Scapus folii medius ramulos emittit alternos, in surculos paritèr al-*  
*ternatim positos divisos, & hos demum, in pinnulas minimas ab angusto principio pau-*  
*latim dilatatas ad summum usque, quod latiusculum & plerumque bifidum est.* Hujus  
ramulum descriptionis Autor habuit ab egregio Botanico, & Pharmacopæo *Londi-*  
*nensi, D<sup>o</sup> Jacobo Petever* ; qui postea ad Iconem exsculpendam, nobis libentè con-  
cessit, quam videsis *Phytogr. Tab.* 4. *fig.* 1. Adianthum minus foliis, in summi-  
tate retusis. *Carol. Plumier Descript. des Plant. de l'Amériq. Tab.* 50. *fig.* 6. huic  
nostro accedere videtur, & fortè idem est cum proximo præcedenti.

Adianthum *Africanum* Rutæ murariæ æmulum, segmentis longioribus acutis. *Phytogr.*  
*Tab.* 123. *fig.* 6.

Adianthum radicosum humi-sparsum, s. Filicula pellucida nostras, Coriandri foliolis  
mollicellis, globuliferum. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 5. Adianth. petræum, perpusillum,  
Anglicum, foliis bifidis vel trifidis, *Newtoni. Raj Hist. Pl.* 141. fortè Filicula  
saxatilis fol. Coriandri. *Mentzel. pugill. Amicus noster Dom' Georgius Daire Phar-*  
*macopæus Londinensis* peritissimus, & ad *Herbariam Scientiam* promovendam pa-  
ratissimus ; fuit primus qui circa *Tunbrigiam Cantii* oppidum, hanc plantulam  
spectabilem, antea nobis invisam, feliciter adinvenit, & inter amicos suos specimi-  
na liberè diffudit.

Adianthum radicosum erectius, foliolis imis bisectis, cæteris verò integris, tenuissi-  
mè crenatis. *Phytogr. Tab.* 3. *fig.* 6.

Adianthum fruticosum Coriandri folio Jamaicense pediculis foliorum politiori nitore  
nigricantibus. fortè Adianthum fruticosum *Brasilianum.* *C B. Prodr.* 150. vid.  
*Phytogr. Tab.* 254. *fig.* 1.

Adianthum fruticosum *Æthiopicum*, pinnulis amplis, subrotundis, supernè dentatis,  
media pinnarum parte, petiolis infidentibus. *Phytogr. Tab.* 253. *fig.* 2.

Adianth. fruticos. *Bermudense* summis ramulis erectis, & in metæ formam fastigiatis.  
*Phytogr. Tab.* 124. *fig.* 1. à peritissimo Botanico Dom' Jacobo Petever habuimus.

Adianth. fruticosum *Americanum* summis ramulis reflexis, & in orbem expansis. *Phy-*  
*togr. Tab.* 124. *fig.* 2. Adianth. *Americanum Cornuti de Pl. Canad. p.* 7. Adianth.  
fruticos. *American.* *Park. Theatr.* variis Curiosorum in Hortis, circa *Londinum.*

Adiantho *Canadensi* similis ex insulâ *Maderensi.*

Adian-



*Adiantum Chinense* perelegans ramosum, folio flabelliformi cum rubedine perfuso *Phytogr. Tab. 4. fig. 3.* *Adiantum* foliis *Coriandri* ramosum, *Raij Hist. Pl. app. 1853.* Flabella perminuta ex *Indiâ* pro foeminis nostris illata, cum sint plurimum expansa, hujus folia; ubique alterno situ disposita, non malè exprimere videantur, ut vide-  
fis ex *Icone* ad *Tab. supradictam* apposita. hujus ramulum optimè siccatum è *Chinâ* advectum, nobis, ut & *Cl. Raio*, communicavit superiùs laudatus *D. Jacobus Peterer.*

*Adiantum Jamaicense*, pinnulis auriculatis ramosum, quinque ramulis ex eodem cau-  
liculi puncto expansis, ornatum. *Phytogr. Tab. 253. fig. 3.* *Adiantum* ramosum  
radiatum, *Carol. Plumier. Descript. Pl. Americ. Tab. 49.* *Polytrichum American.*  
*Terterii, traite 3. des Antilles. Tom. 2. c. 1.*

*Adiantum Barbadense*, auriculatum ramosum majus, segmentis crassioribus minutis-  
simè denticulatum. *Phyt. Tab. 125. fig. 2.*

*Adiantum Jamaicense*, *Lonchitidis* amplioribus foliis, non ramosum, pediculo atro-  
nitente. *Phytogr. Tab. 252. fig. 5.*

*Adiantum Jamaicense* *Lonchitidis* falcatis foliis, ramosum, pediculis splendentibus  
nigris. *Phyt. Tab. 253. fig. 1.* huc fortè spectat *Adiantum nigrum* pinnulis, *Lon-*  
*chitidis* serratis, minus. *Carol. Plumier. Tab. 48.*

*Adiantum Narbonense* foliis longioribus & acutioribus pulverulentis, pediculo nigro  
*Sch. Bot. munere D. Sherard* accepimus, hujus pictura exhibetur in *Phytogr. Tab.*  
*124. f. 4.*

*Adiantum nigrum* s. *Dryopteris Chinensis*, lanuginosa. *Raij Hist. Pl. app. 1854.* an  
*Lonchitis Maranthæ*, *Ceterach* ramosum quorundam, *Lob. Icon. 816.* s. *Polypodi-*  
*um, Iluense Hist. Lugd. 1230.* quæ secundum utrosque *Bauhinos* sunt unum & idem.  
Descriptio talis ex *Cl. Raio* ubi supr. *Hujus folia (totalia) longiora & angustiora*  
*sunt, magnitudinis ratione habitâ, quam Dryopteris nigra Officinarum, in ramulos ex*  
*adverso plerumque sitos divisa: at pinnula in ramulis alternatim plurimum dispositæ*  
*sunt, hæ autem divisurâ suâ folium Quernum quodammodo imitantur; pediculi, ut in*  
*Dryopteride vulgari, ex spadiceo nigricant: Verùm hæc planta insigni notâ ab omni-*  
*bus nobis hætenùs visis Capillarium speciebus differt, quod non pediculi tantum, sed pin-*  
*nula, seu folia ipsa hirsuta, & lanuginosa sunt.*

*Adiantum Calomelanos Americanum*, s. *Adianth. nigrum*, foliis pronâ parte candi-  
dissimis. *Phyt. Tab. 124. f. 3.* fortè *Adiantum nigrum Americanum*, pulvere can-  
didissimo aspersum. *Breyn. Cent. 1. 190.* fortè etiam *Conambai Miri* s. *Adianthi*  
*Brasiliæ* species 2<sup>a</sup>. *Pison. p. 234.* & *Avenqua Lusitanis minor*, *Marcgr.* Ex insulis  
*Jamaicensi*, & *Barbadensi* nobis advecta.

*Adiantum album Canariense*, ramosius.

*Adiantum maritimum* segmentis longioribus, angustis, auriculatis, & crenatis, s.  
*Filicula maritima* ex *Insulis Caribæis.* vid. *Filix.*

*ADONIA* pusilla, segetum foliis tenuibus trifidis spicâ leviter pilosa caudam vul-  
pinam referente. *Ranunculus Alopecuroides* *Ajugæ* foliis *Boccon. de Pl. Siculis. fol.*  
*28.* *Ranunculus Ceratophyllos* feminibus falcatis in spicam adaectis *Morif. Præhud.*  
*Bot. 299.* *Melampyrum perpusillum luteum*, *Park. Th. 1328.* *Melampyrum lu-*  
*teum minimum.* *C B P. 234.*



Adonia pusilla fegetalis gramineis foliis spissis, flore obsoleto, spicâ caudam murinam æmulante. Myofuros. *J. B. Tom. 3. l. 31. 512.* Holotheo affinis Cauda muris. *CBP. 190.* hujus profapiæ sunt inter *Herbas semine nudo polyspermas*; & ad Ranunculorum genus accedunt.

AESCHYNOMENE spinosa, latifolia, filiquis radiatis. *Breyn. vid. Onobrychidi affinis.*

Aeschynomene, s. Mimosa non spinosa, major, *Zeylanica. Breyn. vid. Onobrychis.*

Aeschynomene, foliis minimis, nostra. *Raij. vid. Mimosa.*

AGATY HM. vid. *Galegæ affinis.*

AGERATO affinis *Peruviana* frutescens. *P B P.* Elichryso affinis *Peruviana* frutescens. *H. Lugd. Phyt. T. 27. f. 1.* Quinquina s. Arbor amara & Febrifuga quibusdam falso, & fastuosè nuncupata, meo quidè arbitrato, eadem arbor est cum Acapatli *Hernandez Recc. l. 3. c. ult.* quæ nascitur apud *Panucenses*, ubi etià vocatur à quibusdam Quauhecatli.

Agerato *Mesues* cognata procerior, Corymbis è luteo albicantibus. *HRP. 6:*

AGERATUM umbellâ candidâ folio millefolii minoris rigidiorè tamen. *Cat. Lælii Triumphetti, apud Fratrem. fol. 65.*

Ageratum *Persicum* foliis laciniatis, *Breyn. vid. Chrysanthemum.*

Ageratum ferulaceum *Dalechamp. vid. Chrysanthemum.*

Ageratum purpureum *Dalech. vid. Lysimachia purpureæ affinis.*

AGNUS CASTUS. vid. *Vitex.*

AGRIFOLIUM vulgò, vid. *Aquifolium.*

AGRIMONOIDES *Fab. Column. ecphras. fol. 144.* ubi satis accuratè pictam invenies. Agrimonoides, *Park. 594.* àn Agrimonix similis. *CBP. 321.*

AGUARA Quiya. *Pison. vid. Solanum.*

AGUL *Persarum. vid. Genista.*

AHATE de Panucho *Hernandez. vid. Anona.*

AIN-PARITI. HM. vid. *Alcea.*

AIRI *Pisonis. vid. Palma.*

ALATERNUS latifolia, Celastrus dicta, *Hort. Lugd. 11. Celastrus Theophrasto. Clus. Cur. Posterior. fol. 2. CBP. 477. Park. Theatr.*

Alaternus latifolia, major, limbis purpureis, *Africana. Phytog. Tab. 256.*

Alaternus, s. Phyllica elatior. *CBP. 476. Alaternus 1<sup>a</sup>. Clus. Hist. Pl. 50. Spina Burgi*



Burgi *Monspeliensium*. *J.B. T. 1 l. 5. fol. 542.* Bourge spine *Monspeliensium*. *Adw. & Obs. Lob.*

*Alaternus aurea*, s. foliis ex luteo variegatis. *HR P. fol. 6. Moris. HR B. 227.*

*Alaternus* s. *Phylica humilior* *C B P. 477.* *Alaternus* 2<sup>a</sup>. *Clus. Hist. Pl. 50. J.B. T. 1. l. 5. fol. 542.*

*Alaternus argentea*, s. foliis ex albo variis *HR P. 6. Moris. HR B. 227.*

*Alaternus elegans*, foliorum denticulis, ad oras magis extantibus, asperata. *Phytogr. Tab. 256.* *Alaternus*, fortè, s. *Phylica* foliis angustioribus, & profundius ferratis. *Hort. Lugd.*

*Alaternus minima*, *Buxi minoris* foliis. *HR P.* àn *Alaternus cristata*. *Hort. Lugd. app. 642.*

*Alaternus cristata*, foliis minoribus, ex aureo pictis.

*Alaternus Hyssicanensis Africana*, *Lauri* ferratae, odoratae, *Stapeliana* foliis *Hort. Beaumont. 3. Phytog. T. 126. f. 1.*

*Alaternus Arbuti* foliis, lucidis, *Promont. Bon. Spei. Phytogr. T. 126. f. 2.*

*Alaternus sempervirens*, *Africana*, foliis lucidis, spinosa; è dictariis. *Cl. Herm. Phytogr. T. 126. f. 3.*

**A L C E A** *Cretica* flore immaculati candoris peramplo. *Phytogr. T. 6. in Hort. Med. D. Morgan Londini* suburbano, jam olim exulta fuit. àn *Alcea* foliis in summitate incis, *D. Bobart.* fortè etiàm *Alcea* major & procerior, *Raij Hist. Pl. 605.* qui dubium movet àn sit *Alcea* amplissimo folio. *J.B. T. 2. app. fol. 1067.* fortè etiàm *Alcea* foliis in summitate incis. *Florent. Schuyl. Cat. Leyd. edit. 1672.*

*Alcea*, àn *Malva* potiùs exotica, *Pentaphylli* folio, profundè secto, purpurea, floribus sinè pediculis. *Phytogr. T. 73. f. 7.*

*Alcea tenuifolia* humilis maritima *Gallo-provincialis*, foliis inferioribus, nonnihil ad *Geranium* accedentibus. *Sch. Bot. 223.* à peritissimo Botanico & *Hort. Academiæ* apud *Oxonienfes* custode diligentissimo *D. Jacobo Bobart*, nomine *Alceæ*, tenuissimis *Pulsatillæ* foliis, primò accepi; deindè in *Viridario* industrii Hortulani *Gulielm. Darby.* feminibus ab ornatiss. viro *D. Gulielm. Sherard* ei communicatis, natam collegi hujus exhibetur Icon sub *Malvæ* titulo, in *Phytogr. T. 44. f. 4.*

*Alcea pentacoccus* *Ranunculi auricomi* folio, & facie *Maderaepatensis*, hujus ramulo amicus noster plurimùm honorandus *D. Carolus du Bois*, munere nos ditavit. Iconem videsis in *Phytogr. T. 125. fig. 3.*

*Alcea vesicaria* *Capitis* *Bon. Spei. Raij Hist. Pl. 1067. Breyn. Prodr. 2.* *Althæa vesicaria* *Cap. Bon. Spei. Morison. Hist. Pl. 533.*

*Alcea vesicariæ* similis *Æthiopica* moschum redolens, summo tantùm folio, circà margines, crenato. *Phytogr. T. 254. fig. 2.*

*Alcea Indica* frutescens hastato folio, flore parvo, pupureo, longo petiolo insidente, pericarpio compacto, duro, in quinque cellulas, totidem semina includentes, dispartito. *Phytogr. T. 7. f. 1.*

*Alcea* procerior, *Ricini* folio *Virginiana*, quintuplici parva, capsulâ, flore albo tubulato. *Alcea Ricini* folio *Virginiana* flore albo parvo, *Breyn. Prodr. 2.* àn *Althæa* magna *Aceris* folio cortice *Cannabino* floribus parvis, semina rotatim in summitate caulium, singula singulis cuticulis rostratis co-operta, ferens. *D. Banister. Cat.*

*Stirp.*



- Stirp. Virginian.* apud *Cl. Raij Hist. Pl. fol. 1928.* *Tlallaala* alia, *Nov. Hispan. Recc.* 419. huic quodammodo accedit.
- Alcea pusilla* supina *Gerranii* exigui maritimi folio, & facie *Maderaspatensis*. sub *Althææ* talis titulo, exhibetur *Icon, in Phytogr. T. 132. f. 4.* hujus autem pericarpium est verè capsulatum, ideoque rectius inter *Alceæ* genera adnumerari debet, cum hoc additamento, *fructu, summo caule glomerato, pericarpio duro.* àn *Malva* altera repens *Betonicæ* folio *Zanon. Istor. Botan.*
- Alcea arborescens* glabra, *Ketmia* dicta. *J B. T. 2. lib. 23. 956.* *Alcea arborescens* *Syriaca. C B P. 316.* *Althæa frutex 2<sup>a</sup>. Clus. Hist. Pl. 2. fol. 25.*
- Eadem flore candido. *C B P. floribus ex albo & rubro variis. H R P. 6.*
- Eadem flore purpureo-violaceo ejusd. *H R P. ibid.*
- Alcea fruticosa, Pentaphylloides, æmula, floribus amoenissimè rubellis, calyce producto, è Maderaspetan. Phytogr. T. 126. fig. 4.*
- Alcea fruticosa Malabariensis, angustioribus foliis rigidiusculis; floribus amoenè rubellis, semine papposo. Phytogr. T. 254. fig. 3.* huc fortè pertinet *Tsjeruparva H M. P. 10. T. 53.* licèt à *Commelino* ad *Not. Cabritte vulgo,* nimis incautè assimilatur,
- Alcea Americana* *Morifolia* quinque capsularis, *Hispaniolensibus, Moho* dicta, fructu magno, lignoso, *Pyramidali, plano; semine alato.*
- Alcea Indica* *Ulmi* folia, prægrandis, subtus incana, flore amplo purpureo. *Phytogr. Tab. 6: fig. 3.* *Althæa magna* quinque capsularis, foliis integris, subtus albicantibus, floribus magnis. *Banister Cat. Stirp. Virg. apud Hist. Pl. Raii.* inferiora enim hujus folia sunt prorsus integra, superiora tamèn in lacinias ternas, levitè incisa, & aversâ parte albicantia.
- Alcea Javanica* arboresc. flore rubicundo, simplici. *Breyn. Cent. 1. 122.* *Rosa Batavico-Indica, inodora; s. Malva frutesc. Bontii. Hist. l. 6. p. 141.* *Ain-Pariti, H M. P. 6. Tab. 43.* *Anonyma* fortè 8a. *Hernandez. apud Recc. fol. 352.* Harum etiàm classi adjudicanda est, *Atlatzopillin Mexicensibus, Hernand. lib. 4. c. 22.*
- Alcea Javanica* arborescens, flore pleno, rubicundo. *Breyn. Cent. 1. 121.* *Schempariti H M. P. 2. T. 17.* sed multùm errasse *Cl. Commelinum* nobis videtur, cum in Annotatiunculis suis, poneret hanc Plantam, pro immediatâ specie, *Althææ frutescentis, folio rotundiore incano. C B P.*
- Alcea arborescens Japonica* pampineis foliis, subasperis, flore mutabili; s. colorem mutante, *Breyn. Prodr. 2. 10.* *Alcea Cadaharensis* arborea, pampineis foliis, flore mutabili pleno ejusd. *Br. Cent. 1. 122.* *Althæa rosea Sinensis, Moris. Hist. Pl. 530.* Qui inter Tabulas suas, pro hujus fructu, *Alceæ Americane, Ochroa* dictæ fructus, exprimitur; ut rectè animadvertit idem *Cl. Breynius Prodr. 2.* ubi suprâ. *Meutang. Chinensium. Ogilbey. Rosa sinensis Ferrarii. Flor. cult. 479.* *Hina-paretti H M. P. 6. T. 38. &c.* fortè etiàm *Macpalxochitl. Nov. Hispan. Terent. apud Recc. fol. 382.*
- Alcea Indica* arborea folio molli flore amplo, elegantè coccineo. *Phytogr. Tab. 255.*
- Alcea arbore Indica, villosa, quinis foliorum lobis, flore magno sulphureo. Phytogr. Tab. 255. nondùm edit. fig. 2*
- Alcea Egyptiaca, villosa C B P. 317.* *Belmoschus Egyptia. Honor-Bello. J B. T. 2. lib. 23. 960.* *Alcea Egyptia moschata, Park. Theatr. Cattu Gasturi, H M. P. 2. Tab. 38.* *Abelmosch, s. Mosch Arabum. Vestling. Obs. in Alpin. 65.* *Quigombo* prior



- prior. s. *Alcea moschata* *Pison. lib. 4. p. 27.* *Alcea hirsuta* flore flavo, & semine moschato. *Marcgr. lib. 1. p. 45.* *L'Herb de Musc. D. Rochforti des Antilles. fol. 120.* & apud nostrates, hujus, semina Moschi (i. e.) *Musk.Seed*, vulgò vocantur.
- Alcea moschata villosissima*, foliis crassis, trilobatis, in profundiores lacinias incis, ab honesto viro *Jacobo Reede*, ex Insulâ *Barbados* allata est. Picturam habes in *Phytogr. Tab. 127. fig. 1.* àn *Malva Curassavica* folio trilobato, molli, & hirsuto. *P B P.*
- Alcea Maderaspatana* trilobatis, s. hastatis foliis, glabris, pericarpio tantummodò villosa. *Phytogr. Tab. 127. fig. 2.* è *Collectaneis du Boissianis* habuimus.
- Alcea Indica* frutescens, foliis ad marginem exasperatis, Bryoniæ albæ divisuris. *Phytogr. Tab. 5. fig. 3.*
- Alcea Indica* frutescens, foliis in lacinias, variè dissectis. *Phytogr. Tab. 74. fig. 1.* àn *Alcea arborescens Japonica*, folio *Quercûs*, flore pleno, carneo, in medio roseo; *Breyn. Prodr. 2. fol. 10.* *Sanfangua Japonensibus.* è *Maderaspatan*, in *Angliam*, illata est. Cujus ramulum siccum, nobis ad exsculpendum, favore *Clariss. viri*, & in *Arte Medica* exercitatissimi, *D. Frederici Slare, M. D.* ab amico suo, *D. Hileard. Mercatore Londinensi*, communicata fuit.
- Alcea Indica*, vitis folio flore amplo flavescente, quinis ad singulos flores thecis, *Katan-belloueren. HM. P. 6. Tab. 46.* *Althea Indica*, folio vitis flore amplo, flavo, pendente. *H. Lugd. ubi figuratur. fol. 28.* *Althea Indica* non spinosa, flore amplo, pendulo, flavo. *Breyn. Prodr. 2.*
- Alcea Indica* spinosa, magno flore, ex albido flavescente. *Commelini. in Not. Nari-nampulli HM. P. 6. T. 44.* *Althæa Indica* spinosa, Acetosæ sapore, flore flavo pendente. *P B P.* *Alcea acetosa, Indica*, spinosa, foliis profundè laciniatis, flore sub-luteo, amplo. *Breyn. Prodr. 2. fol. 9.* quæ pro *Acetosa Indica*; *Bontii*; à *Cl. Breyn.* habetur.
- Alcea spinosa Maderaspatana*, saporis acidi, foliis profundè laciniatis, *Cannabis* in modum, *Pentaphyllæa*. àn *Acetosa Indica Bonti. lib. 6. 113.* Hujus in Insula *Zeylon*, spontè provenientis, meminit, *Cl. vir*, & sedulus exoticarum Plantarum explorator, *D. D. Hermannus*, in *Cat. Hort. Acad. Lugd. Batav. fol. 27.* hujus pictura habetur in *Phytogr. Tab. 5. fig. 4.*
- Alcea acetosa Indica*, mitis, foliis superioribus, *Gossipii* in modum, tripartito divis. *Phytogr. Tab. 6. fig. 2.* *Alcea acetosa*, trifido folio *Ind. Orient. Breyn. Prodr. 1. fol. 1.* *Althea Indica*, *Gossipii* folio, Acetosæ sapore. *Hort. Lugd. 25.* àn *Althea magna* quinque capsularis, cortice cannabino, foliis *Malvarum* more divis, subtùs viridibus, eua-  
alba pars floris, aliquantulum rubet. *D. Banister Cat. Stirp. Virginian* apud *Raij Hist.*
- Alcea acetosa Indica*, *Gossipii* folio, pericarpio coccinei coloris, *Capfici* siliquam æmulante. ex Insulâ *Antegoanâ*. hujus semina, ab honesto viro, *D. Horsnel*, illic pro tempore commorante, & in *Angliam* reduce, nos accepimus. Hujus etiam prosapiæ, est *Quauhxocotl. Cullulensis*, s. *Oxymalva, Hernandez apud Recc. lib. 6. f. 216.* ut aliquandò rectè nos monuit peritiss. *Botanicus, D. Samuel Doody, Horti Medici apud Chelseianos* nunc *Præpositus fidelissimus*, huic etiàm affinis (fortè) *Ayacachquahoitl. Nov. Hisp. Terentii apud Recc. f. 357.* ut & *Quauh Ytzapoli; Mexicensibus ejusd. apud eund. f. 404.*
- Alcea Americana*, foliorum pediculis spinosis, flore magno. *Alcea Americana Clus. Hist. Pl. 2. fol. 26.* *Alcea Indica* magno flore. *C B P. 317.* *Sabdariffa*, s. *Alcea Americana Park.* *Bamiæ* aliquatenùs affinis, *Sabdariffa. J B. T. 2 lib. 23. fol. 960.* àn *Althæa vesicaria maxima*, spinosa, *Bengalens. P B P. 303.* Foliis variè  
ludit



Iudit hæc planta ; prima aliquandò integra, communiter in très lacinias divisa, aliquandò instar foliorum Elleborastri in septenas profundas lacinias, secta ; cum gravissimo Autore, *Casparo Bauhino*, sæpiùs observavimus. An hùc spectat *Hezmaytl. Nov. Hisp. Terent.* apud *Recc. p. 377.* dubius sum : certus autem quòd *Cattu Gasturi H M.* malè ponitur pro hujus Synonymo, à *Cl. Herman.* in *Hort. suo Lugd. Bat. pag. 25.* Itèm *Horti Medici Chelseiani* quondam demonstratorem hanc *Alceæ* speciem pro *Bangue Indorum* ostentasse potius, quàm ostendisse, animadversum est ; adeò tamèn ut quibusdam suspicor errandi dedit occasionem, *Cannabim Orientalem, s. Bangue Indorum* pro *Althææ* specie haberi. Hæc etiàm ut opinamur, est verè *Trionum Theophrasto, Ranwolf Hist. Lugd. app. 31.* quanquàm à *Casparo Bauhino*; proxime sequenti, synonymo proponitur.

*Alcea Indica*, parvo flore. *C B P. 317.* *Alcea Egyptia Clus. Hist. 2. 27.* *Bamia. J B. T. 2. lib. 23. fol. 959.* *Bamia s. Alcea Egyptia Park. Paradis. Sabdariffa alia. Hist. Lugd. p. 595.*

*Alcea Bengalensis*, *Sabdariffæ* similis. ex *Codice Beningiano. Phytogr. Tab. 240. fig. 1.* *Alceæ* fortè *Ægyptiacæ* affinis. *C B P. 317.* Fructus 18. è *Navig. Batav. Clus. exot. lib. 2. cap. 15.*

*Alcea s. Bamia Americana*, parvo flore, petalis rotundioribus. *Phytogr. Tab. 6. f. 4.*

*Alcea Indica, s. Bamia Surinamensis*, *Urtica* foliis nostra. *Raij Hist. Plant. app. 1900.*

*Alcea Brasiliæna*, fructu maximo, pyramidali ; sulcato. *Bamia Ethiopica*, siliquâ decagonâ. *Clus. Hist. app. alter ad lib. 4.* *Alcea Indica*, parvo flore, altera. *C B P. 317.* *Quinjambo, s. Quillobo ; Marcg. lib. 1. p. 31.* *Quigombo altera, Pisonis. fol. 211.* *Ochroa, & Kinkanbau, Sirinamensibus.*

*Alcea Indica*, *Quigombo & Ochroa dicta*, siliquis prælongis, planis, quinquefariàm divisis. ex *Insulâ Barbadosi.*

*Alcea Indica* arborea, pericarpio carnosio, in plura loculamenta partito. *Raij Hist. Pl. 1902.* *Adamboë H M. P. 4. Tab. 20, & 21.* *Alcea Indica* arborefc. *Lauri folio, 1a. s. Alcea Indica*, arborefc, foliis *Laurinis*, subasperis, polyanthos minor, flore purpureo, hexapetalo, petalis rotundioribus, & latioribus, fructu minore, caudato. *Breyn. Prodr. 2. p. 11.*

*Alceæ Indica* arboreæ, genus peculiare, foliis *Beidel Offaris, Alpini*, fructu intùs carnosio. *Alcea Indica* arborefc. *Laurifolio. 2a. s. Alcea Indica* arborefc. foliis *Laurinis*, lanuginosis, & hirsutis, flore purpureo, hexapetalo, petalis angustioribus, fructu majore. *Breyn. Prodr. 2. p. 11.* *Katou-Adamboë. H M. P. 4. Tab. 22.* *Alcea Indica* arborea, elatior, pericarpio carnosio, subaspero. *Raij Hist. Pl. app. 1902.*

*Alcea Jamaicensis* fruticosa, floribus purpureis, oblongo, crenato, folio acuminato, molli ; & incano. *Phytogr. Tab. 255.* àn *Sjasmin H M. P. 10. Tab. 1.* *Blattariæ* species à *Commelino* habetur sed perperàm. An *Althæa Sida dicta* quibusdam *J B. Tom. 2. lib. 23. fol. 957.*

*Alcea Malabarica*, *Epimedii folio*, molli, & incano. *Nela vaga H M. P. 10. Tab. 69.*

*Alcea Malabariensis*, *Abutili folio*, flore minore, ex albo flavescente, exterius subaspero. *Arnold. Syen. in Hort. Malabaric.* *Alcea* arborea *Indica*, *Tiliæ folio*, crassiore, flore minore, flavescente. *Breyn. Prodr. 2. Pariti, s. Tali pariti. H M. P. 1. fig. 3.*

*Alcea* arborea *Indica*, maxima, *Populi folio*, flore majore, flavescente. *Breyn. Prod. 2.*

*Alcea Malabarensis*, *Abutili folio*, flore majore, ex albo flavescente ; *Arnoldi Syen.*

in .



- in *Not. HM.* Bupariti *HM.* P. 1. fig. 20. *Althæa arborea Indica*, *Populi folio*, flore ephemero. *Hort. Lugd.* 22. *Surijaghas*, vel *Arbor Solis Zeylonensium*. *Poveressa Lusitanis*.
- Alcea Indica*, *Abutilon dicta major*, pericarpio membraneo, orbiculari, compresso, vertice corniculis extus coronato, intus, in decem, aut duodecim loculamenta diviso. *Althæa Theophrasti*, flore luteo. *CBP.* 316. *Althæa Theophrasti* flore luteo, quibusdam *Abutilon*. *J. B. Tom.* 2. lib. 23. 958.
- Alcea Indica*. *Abutilon dicta*, minor, petiolo ad florem, geniculato. *Beloere, HM.* Part, 6. Tab. 45.
- Alceæ adfinis Indica*, *Abutilon dicta*, flore flavo, foliis mollibus, profundè venosis, filiculis lanuginosis. *Phytogr. Tab.* 126. fig. 5. An *Althæa Abutilon dicta Indica*, flore luteo, minore, *H. Lugd.* Anoda *Zeylonensium*. *Abutilon Indicum*, flore luteo minore. *Br. Prodr.* 2. fortè etiam *Althææ Theophrasti* similis. *CBP.* 316. *Abutilon Indicum*. *J. B. Tom.* 2. lib. 23. 959. *Abutilon Indicum, Camerarii. Park. Theatr.*
- Alcea Jamaicensis*, *Abutili facie*, floribus exiguis, flavis, folio vix crenato, pronâ parte, molli, & tenuissimo lanugine, canescente. *Phytogr. Tab.* 254. fig. 5. an *Althæa Abutilon dicta*, minima, *Curassavica*. *PBP.* 309. itè *Althæa Scammonii* folio floribus luteis *Curassavica*. ejusd. *PBP.* fortè etiam *Alcea Americana*, vel *Populi nigræ* foliis longius mucronatis incanis flore luteo *Abutili*. *Breyn. Prodr.* 2. p. 10.
- Alcea Orientalis Scammoniaæ folio major* floribus albis. *Althæa Scammonii folio* flosculis albis *Zeylanica*. *PBP.* *Phytogr. Tab.* 74. fig. 7. *Nilavonanghu & Wiffadulu Zeylonensibus dicta*. in *HRH.* longè celeberrimo conspeximus, & in *Hort. Comptoniano* collegimus.
- Alcea Abutilon dicta*, foliis lobatis, minima. *Ind. Orient.* an *Althæa Abutilon dicta*, folio lobato. *PBP.* floribus parvis luteis ex alis foliorum longis pedunculis insidentibus, ab *Althæâ Morifoliâ Ind. Orient.* *Phytogr.* plurimum diversa.
- Alcea Americana* frutesc. *Melochiæ foliis angustioribus*. Sub *Althæa* tali exhibetur in *Phytogr. Tab.* 74. fig. 8. an *Malva frutesc. Melochiæ angusto folio*, floribus albis fasciculatim congestis *PBP.* inter *Addenda*. huc fortè spectat *Tsjeru-Uren. HM.* P. 9. Tab. 43.
- Alcea cibaria, Corchorus, & Melochia, dicta* : ad foliorum basim, barbulis donata, quinque capsularis. *Corchorus folio auriculato, major, Ægyptiacus*, siliquâ longissimâ. *Breyn. Prodr.* 2. 36. *Corchorus Plinii. CBP.* 317. *Melochia. Prosp. Alpin. de Pl. Ægypt. fol.* 92. *Corchorus. s. Melochia, Camer. H. Medic.* 47. *J. B. T.* 2. lib. 23. fol. 982. *Park. Theatr.* Olus Judaicum nonnullis, eò quod *Judei, (Rauwolfio annotante, in suo Hodeporico)* cocta folia cum carne edunt, sapore enim acetoso prædita sunt; crescit copiosè in *Hortis Alepi*; & in cibus, nihil est ipsâ *Ægyptiis familiaris, vel gratius*.
- Alcea cibaria, vel Corchorus Americana, Carpini foliis*, sextuplici capsulâ prælongâ; *Phytogr. Tab.* 127. fig. 3. an *Corchorus Americanus*, minor, *Carpini folio*, siliquâ angustiss. ex lateribus ramulorum proveniente. *Breyn. Prodr.* 2. 36.
- Alcea olitoria, s. Corchorus Americana, angusto, barbato, folio, capsulâ strictiori. Phytogr. Tab.* 127. fig. 4.



*Alcea olitoria*, s. *Corchorus Americana*, prælongis foliis, capsulâ striatâ, subrotundâ, brevi. *Phytogr. Tab. 255. fig. 4.*

*Alceæ cibariæ*, s. *Corchoro*, affinis, *Maderaspatana*, flore flavo, oblongis, glabris, & nigrioribus foliis, capsulâ Caryophylloide brevi. *Lyfimachia* non papposâ, *Melissophylla*, *Maderaspatana. Phytogr. Tab. 44. fig. 1.* fortè *Melochiæ* genus filiquâ quinque capsulari ejusd. *Phytogr.*

*Alceæ cibariæ* affinis, *Orientalis*, brevioribus foliis, flore flavo, fructu caryophylloide, longiori. An *Corchorus* folio auriculato, rotundiore, *Zeylanicus. Breyn. Prodr. 2. 36.* folia autèm nostra, auriculis, s. barbulis, sunt destituta. Huic fortè congener est *Hacoyochitl, Mexicensibus Terent. apud Recc. fol. 376.*

*Alceæ Indicæ* cognata Planta, *Cannabinis* foliis particularibus, ex oris *Cormandel. Naga-pu HM. P. 10. fol. 111. Hujus exhibetur Icon in Phytogr. Tab. 255 fig. 3.*

**ALCHIMILLA** Alpina pubescens minor. *Hort. Reg. Paris. Phytogr. Tab. 240. fig. 2.*

**ALHAGI** J.B. vid. *Genista.*

**ALLIUM** *Amboinense* folio rotundo: P B P. *Cepa Sylvestris Amboinensis Rumphii.*

**ALNI** folia *Americana*, ferrata, floribus pentapetalis, albis, in spicam dispositis. *Phytogr. Tab. 115. fig. 1. An spiræa altera Virginiana D. Banist. Cat. Sharp.*

**ALNI** facie *Americana*, foliis non ferratis. *Phytogr. Tab. 128. fig. 1.* fortè *Alni* folio, & facie, *Curassavica* P B P. 305. an *Alno* similis, arbor. J.B. lib. 6. fol. 255. ex *Pena & Lob. Advers.*

**ALNO** affinis *Americana*, *Ligustri* folio, fructu spicato, rubro. *Breyn. Prodr. 2. Manghala* arbor *Curassavica* foliis salignis. P B P. Frutex innominatus, instar *Salicis pumilæ*, foliis salignis. *Marcgr. fol. 70.* Utramque primum in *Comptoniano*, deindè in *Hort. Regio Hamptoniens.* observavimus & hujus picturam ad *Tab. 128. fig. 2.* nostræ *Phytogr.* apponere curavimus.

**ALNUS** vulgari-nostrati similis, ex *Promont. Bonæ Spei.*

*Alnus maritima*, myrtifolia, *Coriariorum*; *Buttonwood, Bermudensibus* vulgò. *Phytogr. Tab. 240. fig. 3.* à D. *Jacobo Petever* accepimus.

**ALOE** perrara, Regni *Andelusiæ*, albescente folio, rarioribus at robustis aculeis atronitentibus, armato, spinâ crassâ admodum, & feroci, ejusdem nitoris, mucronato. ab ornatissimo Viro, D. *Joanne Fishwick*, jam olim accepimus.

*Aloe Americana*, folio in oblongum aculeum abeunte, minor. P B P.

*Aloe Americana*, ex *Vera cruce*, foliis latioribus glaucis. H. *Beaum.* fortè *Aloe Americana*, foliis cæsiis latioribus. P B P.

*Aloe Americana* sobolifera. *Hort. Leyd.* spinis crebrioribus. P B P. ex hujus truncis, (adnotante Cl. D. *Kiggelaero*) ad ignem tostis, succus exprimitur, qui fermentatus,



- & per residentiam clarificatus, vini loco Incolis est, largiusque potus inebriat. Hort.  
*Beaum fol. 4.*
- Aloe Americana* sobolifera, spinis paucioribus. P B P.
- Aloe Americana* sobolifera, foliis elegantè variegatis. P B P. *Aloe Americana*, foliis ex albo & viridi elegantè variegatis. H. *Beaum.*
- Aloe Americana*, foliis erectis, aculeis robustissimis armatis. P B P.
- Aloe Americana*, radice tuberosâ foetidâ, major. Pit. Pita. P B P. *Aloe Americ.* viridi, rigidissimo & foetido folio, Piet. dicta Indigenis. H. *Beaum.*
- Eadem minor, spinosa. P B P. *Phytogr. Tab. 258. fig. 1.*
- Eadem minor, non spinosa. P B P. *Phytogr. Tab. 258. fig. 2.*
- Aloe Zeylanica* pumila, foliis variegatis. P B P. *Aloe pumila*, serpentaria *Zeylanica*. Breyn. Prodr. 2. 121. Icon habetur in *Phytogr. Tab. 257. fig. 4.*
- Aloe Africana* vulgari similis, floribus rubris, & paucioribus, è dictariis Cl. *Hermani*. *Phytogr. Tab. 129. fig. 1.*
- Aloe Americana*, non spinifera, *Tuccæ* foliis, D. *Bobart.* *Aloe Americana*, fol. angustioribus, absque spinis. Raii *Hist. Pl.* *Aloe* (fortè) purpurea lævis *Munting.* *Aloedar.* àn *Pati*, s. *Metle* lenissimum. *Hernand.* apud *Recc. lib. 8. fol. 275.* hujus autem folia sunt *Hyberno* tempore, decidua, ut monuit nos, idem *Dom. Bobart.*
- Aloe Americana*, spinifera, angustis foliis, radice bulbosâ, cujus folia ad pannum conficiendum sunt apta. *Caraguata-guazu Brasiliensium* *Pison. lib. 4. fol. 192.*
- Aloe Americana* lævis, latissimo folio splendente. Hort. *Amstelod. 15.*
- Aloe Americana*, *Surinamensis*, foliis latioribus, lucidis serratis. H. *Beaum.*
- Aloe Africana*, foliis erectis, superficie muricatis. *Phytogr. Tab. 129. fig. 2.*
- Aloe Americana* minor, foliis per margines frequentissimis, & molliusculis spinis armatis. Hort. *Leyd. 16.* *Aloe vera* minor *Munting.* *Aloedar. p. 2.* àn *Theometl. s. Maguei* divinum. *Hernand.* apud *Recc. Hist. Mexic. lib. 8. fol. 274.*
- Aloe Americana*, *Ananæ* foliis, floribus suavè rubentibus, ex Codice *Bentingiano*. *Phytogr. Tab. 240. fig. 4.* An *Aloe Americana*, ferrata, floribus coccineis. P B P.
- Aloe Indie Orientalis*, ferrata, s. *Succotrina* vera, floribus phœniceis. H. *Beaum.*
- Aloe Succotrina*, angustifolia, spinosa, flore purpureo. Breyn. Prodr. 2.
- Aloe Americana*, *Ananæ* folio, & facie, caulescens. *Phytogr. Tab. 257. fig. 1.*
- Aloe Tuccæ* folio caulescens ex *Veracruc.* P B P. *Phytogr. Tab. 257. fig. 2.* *Aloe Americana*, *Tuccæ* foliis arborescens. Hort. *Beaumont. vid. p. 398. Add.*
- Aloe* caulescens, foliis reflexis, margine spinosis *Africana*. *Phytogr. Tab. 129. fig. 3.*
- Aloe* spinosa, arborescens, ramosa, *Prom. Bon. Spei*, *Phytogr. Tab. 129. fig. 4.* Hujus picturam curiosissimè delineatam, & ipso *Promontorio* vivis coloribus illustratam, Nobilissimi, atque Reverendissimi admodum *Henrici Episcopi Londinensis* gratiâ, ad exsculpendam impetravimus.
- Aloe Africana* foetida folio triangulo, longissimo & angustissimo, radice luteâ. Hort. *Leyd.* *Iris Uvaria*. *Prom. Bon. Spei*, *Stapelii* in *Theophrastum. fol. 336. in p. 398. Add.*
- Aloe* folia palustris *Anglicana*, spinifera, flore albo, tripetalo, seminibus croceo colore. *Aloe* palustris. C B P. 286. *Aloe* s. *Aizoon* palustre. J B. T. 3. lib. 38. f. 787. *Stratiotes*, s. *Militaris Aizoides* *Park.* *Stratiotes aquaticus* *Belgicus*. *Stapelii* in *Theophrast. 436.*
- Aloe* in pag. 398, *Aloe vulgaris* C. B. P. 286 *Kadarakû* aut *Gatevala*. H. *Malab. Lar. 11. Tab. 3.*



AL SINE montana minima, Acinos effigie, rotundifolia, nostras. *Raii Synops. Stirp. Britannic. app.* 240. an Alfine minor foliis rotundis. *CBP.* 251. Alfines minoris alia species. *Thalii. Harcyniæ.* p. 11.

Alfine *Americana* Nummulariæ foliis. *PBP. Phytogr. Tab.* 75. fig. 7. à D. *Sherard.* communicata.

*Alfine palustris repens foliis lanceolatis floribus albis perexiguis. Phytogr. Tab.* 74. fig. 4. Alfine palustr. exigua, foliis lanceolatis, Plantaginellæ aquat. instar, flosculis albis vix conspicuis *Mentz. pugil.* Plantago aquatica minima *Clusii Hist. Park.* Plantaginella palustris. *CBP.* 190. Ranunculus palustris minimus Plantaginis folio *Hort. Leyd.* sed perperam.

Alfine rotundifolia, s. Portulaca aquatica. *Ger. emac.* Anagallis serpyllifolia aquatica. *J B. T. 3. lib.* 29. 372. Alfine aquatica minor folio oblongo, s. Portulaca aquat. *Park.* Alfine palustris minor Serpylli folio. *CBP.* 251. & *Prodr.* 118. an Planta palustris Nummulariæ facie, pericarpis ad nodos immediatè hærentibus, semine intus exiguo luteo. *Lælii Triumphetti Catalog. apud Fratrem.* pag. 65.

Alfine aquatica major repens foliis acuminatis *Virginiana.* *Phytogr. Tab.* 74. fig. 5. ex *India Orientali* etiàm habuimus.

Alfine aquatica perennis foliis Becabungæ. *Morif. Hist. Oxon.* 324. itèm Veronica aquatica folio subrotundo, non crenato. *ejusd.* 323. Anagallis aquatic. folio rotundo non crenato *CBP.* 252. Samolus *Valerandi J B. Tom. 3 lib.* 38. 791. Anagallis aquatica 3<sup>a</sup>. *Lob. Icon. Park. Th.*

Alfine Lotoides *Sicula Bocc. de Pl. Sicul. fol.* 21. Alfine palustris minor folio oblongo. *CBP.* 251. quæ 2<sup>a</sup> in *Prodr.* 118. & Portulacæ aquaticæ nomine missa, ut *eidem Boccono* videtur.

Alfine maritima lignosior Anthylloides foliis tomentosis *Bisnagarica.* Anthyllis, s. Alfine talis. *Phytograph. Tab.* 12. fig. 3.

Alfine maritima Centumgrana *Cæsalpino* dicta. Poronychia s. Alfinefolia incana *J B. Tom. 3. lib.* 29. 367. Anthyllis maritima Alfines folio. *CBP.* 282. *Icon Roberti* Polygonum polyspermon. maritimum folio Alfines. *Morif. Hist.* 2. 594. Paronychia altera *Matth. Hist. Lugd.* 1213. fortè Herniaria Alfinites annua marina *Grisley. Virid. Lusit.*

Alfine maritima Centumgrana crassiore folio perennis. Anthyllis maritima perennis Portulacæ folio. *Scholæ Botan.* 121. Herniaria Alfinites annua major *Viridar. Lusit.*

Alfine minima polyspermos Millegrana dicta. Polygonum minimum, s. Millegrana minima. *CBP.* 282. Millegrana minima s. Herniaria minor. *Park. Theatr.*

Alfine Scorpioides minor procumbens Polygoni folio, flosculis in cauliculis summis. Polygonum litoreum minus flosculis spadiceo albicantibus *CBP.* 281. Polygonum, polyspermon litoreum minus, flosculis ex spadiceo albicantibus *Morif. Hist.* 2. apud quem hujus Iconem satis feliciter exsculptam invenies *Tab.* 29. *Seç.* 5. *Num.* 1. Polygoni-folia per terram sparsa, flore scorpioide *J B. T. 3. lib.* 29. 379. Alfine Paronychiæ facie 2<sup>a</sup>. *Matthiolo. Baccos. fol.* 71. Herniaria Alfinitis annua *Grisleyi Viridar. Lusit.*

Alfine Scorpioides procumbens major Telephii facie tricapsularis. Telephium repens folio non deciduo. *CBP.* Telephium legitimum Imperato *Clus. Park. Helianthes.*



- lianthes species rara, comâ inflexâ ut in Heliotropio *J B. Polygonum perenne* procumbens, folio breviori, floribus in capitulum congestis. *Morif. vid. Suppl. pag. 3*
- Alfine-formis Portulacæ foliis, maxima, *Americana*, capsulâ tripartitò divisâ, per impetum diffiliente. Portulacæ affinis *Americana* tricapsularis erecta, flore albo, pediculis angulosis. *Phytogr. Tab. 105. fig. 6. Portulaca Americ. s. Curassavica* latifolia erecta floribus albis. *P B P. 367.*
- Alfine litoralis foliis Portulacæ. *C B P. 251:* itè m Anthyllis maritima lentifolia. *ejusd. p. 282.* Alfines genus pelagicum. *Clus. Hist. Anthyllis lentifolia* Peplios effigie maritima *J B. T. 3. l. 29. fol. 374.* Rubiæ affinis maritima Portulacæ foliis *Hort. Leyd. 530.* itè m Tithymalus lentifolius minimus. *ejusd. H. Leyd. 602.* nimis erroneè.
- Alfine-formis paludosa tricarpos flosculis albis inapertis. *Phytogr. Tab. 7. fig. 5.* Alfine palustris Portulacæ aquatic. similis *Raii Hist. 1032.* Alfine palustris minima, flosculis albis, fructu Coriandri exiguo *Mentzel. pugil. rarior. Plantar. an Alfine* aquatica surrectior *J B. T. 3. l. 38. 786.* an Alfine palustris Serpylli folio *Ger. emac.* dubitat Celeberrimus noster *Raius* ubi suprâ, siquis autè m descriptionem Portulacæ exiguæ s. arvensis *Camerar. Hort. Medic. 131. & apud J B. T. 3. l. 35. 678.* cum hujus Herbulæ descriptione. *Raiana* diligentèr contulerit, eandem omninò judicabit Plantam.
- Alfinis palustris facie pusillâ repens foliolis carnosis didymophoros. fortè Alfine palustr. serpylli folio *Bocc. 48.* fortè etià m Callitriche *Plinii Fab. Column. ecphras. 316. (i. e.)* Lenticula palustris bifolia fructu tetragono *C B P. 362.* quam in Rivulo circâ *Lunel* propè Molendinum nuper invenit *Cl. Magnol. Botan. Monsp. app. fol. 300.* nostra autè m a viro his sacris versatissimo *D. Hans Sloane* non præcul à *Londono* in palustribus, apud *Ericetam Putneyensem* offenditur, ut audio.
- Alfine procumbens *Gallii* facie *Africana* *Hort. Lugd. 20.* Rubiæ Sylvaticæ lævi similis exotica, floribus Alfines muscosæ, fructu trigono, & tricapsulari *Breyn. Prodr. 2. 87.* re verâ nec Alfine, nec Rubia propriè vocatur.
- Alfine *Maderaspatana* *Gallii* foliis, flosculis communi pediculo ternis. *Phytogr. Tab. 128. fig. 3.* à proximè præcedenti plurimùm est diversa.
- Alfine *Spergulæ* facie *Maderaspatensis*, foliis latioribus, semine minutissimo nigro. *Phytogr. Tab. 118. fig. 1.* an fortè Alfine *Spergula* latifolia reptans *Becabungæ* folio *D. Banister. Cat. Stirp. Virg. apud Raii Hist. app. 1928.*
- Alfine multifolia floribunda glabra ex *Sinu Bengalensi*, foliis in acumen desinentibus. flore minore. *Phytogr. Tab. 256.* à præcedenti in quibusdam discrepat.
- Alfine multifolia floribunda glabra ex *Sinu Bengalensi* foliis subrotundis, flore majore. *Phytogr. Tab. 256.* à proximo subsequente haud multùm differre videtur, hæc autem re verâ est *Veronicæ* species.
- Alfine *Indica* quadrifolia & quinquefolia, flosculis longiori pediculo insidentibus. *Phytogr. Tab. 130. fig. 5.* fortè *Kaipa Tsiira. HM. P. 10. Tab. 24. Vide Suppl. pag. 3*
- Alfine *Spergulæ* facie *Bengalensis* foliis angustis ad genicula binis, flosculis autem plurimis ad caulem radiatis, semine minutissimo fulvo. *Phytogr. Tab. 75. fig. 6.*
- Alfine *Indica* polyanthos tenuifolia è *Maderaspatana*. *Phytogr. Tab. 125. fig. 1.*
- Alfine holostea glabra, s. *Gramen Leucanthemum Ind. Orient. Anagallid* aquat. *43. Lob. foliis angustioribus. Phytogr. Tab. 130. fig. 3.* fortè *Parpadagam. HM. P. 10. Tab. 35.*



- Tab. 35. Spergula Indica major fl. candido Commelin. in Not. an Acoxochitl. Nov. Hispan. Terent. apud Recc. fol. 353.*
- Alfine holostea glabra, s. Gramen Leucanthemum *India Orient.* folio brevi. *Phytogr. Tab. 130. fig. 4.*
- Alfine holostea villosa foliis caulem ambientibus multiflora è *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab. 130. fig. 6.* huic ultimæ Schanganam-pullu *HM. P. 10.* propius accedere videtur, ut & Tsjeru-Jonganani pullu ejusd. *HM. P. 10. fol. 51.*
- Alfine Veronicæ affinis, Gratiolæ foliis *Maderaspatana: Phytogr. Tab. 130. fig. 2.*
- Alfine Veronicæ affinis, Trissaginis folio & facie *Maderaspatana. Phytogr. Tab. 125. fig. 4.*
- Alfine *Indica* Glaucis maritimæ folio; flosculis ex alis longo pedunculo innixis. *Phytogr. Tab. 130. fig. 1.* ab Alfine fluvialis *Tabernemontani* foliis, hæud multum abludit. Plurimas has novas Alfinarum species à nunquam satis laudato viro, sæpius in his nostris Exoticorum *Tabellis* nominando, D. *Carolo du Bois* accipiebam.
- Alfine *Orientalis* Serpylli foliis incanis, flosculis ad nodos plurimis, pediculo brevi in-nitentibus. *Phytogr. Tab. 256.*
- Alfine maritima *Maderaspatana* summo caule ramosa, & instar Androsaces *Matthio-li* Umbellata. *Phytogr. Tab. 259.* Utriusque specimina, nec non quamplurimas rariores novas, & exoticas stirpium species, propriâ suâ manu collectas, quas secum adferebat, cum ex *India Orientali Londinum* redierit Ornatissimus Vir, & Chirurgus peritiss. D. *Alexander Brown*, nobis mutuò donavit.
- Alfine Caryophylloides *Africana* radice magnâ Astragalite ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab. 128. fig. 4.*
- Alfine Caryophylloides angustifolia, multiflora, glabra, purpurascens, radice Astragaliti. *Phytogr. Tab. 75. fig. 2.* an Caryophyllus sylvestris repens multiflorus. *C B P.* fortè etiâ Caryophyllus saxatilis foliis gramineis, umbellatis corymbis ejusd. *C B P. (i.e.)* Symphytum Petræum. s. Gypsophyton majus *Thalii Harcyn.* nuperrimè nos monuit egregius Botanicus, D. *Sherard.* (cujus munere & ipse habui) hanc se recepisse apud *Patavinos* sub nomine Saxifragiæ tertiæ à *Turre.* ideòque fortè sit, Alfine Alpina cauliculis nudis prolifera ejusd. *C B P.* quæ ut ille gravissimus Autor suspicatur, eadem est cum Saxifragiâ tertiâ *Columnæ.*
- Alfine Polygonoides foliis tenuissimis per genicula binis ad summum caulium polyanthos. *Phytogr. Tab. 74. fig. 3.* Alfine nodosa multiflora *Schol. Botan.* à D. *Sherard* habuimus.
- Alfine Polygonoides tenuifolia flosculis ad longitudinem caulis veluti in spicam dispositis nostra *Raii Synops. Phytogr. Tab. 75. fig. 3.* Polygonum angustissimo gramineo folio erectum. *Botan. Monsp.* in maritimis circa *Bostoniam* agri *Lincolniensis* invenimus.
- Alfine Caryophylloides tenuifolia, flore albo punctato. *Phytogr. Tab. 7. fig. 3.* an Alfine Caryophylloides tenuifolia montana Lini flore *Raii Hist. Pl. 1027.* quam in Monte *Thuri* ad finem Mensis Junii florentem invenit Autor; ex semine natam in *Hort. cultissimo Comptoniano* collegi: Polygonum Caryophylli Holostei flore. *HRB. 164.* Betonica s. Tunice minimè similis Planta. *J B. T. 3. l. 29. 338.* quoad descriptionem.



- Alfine palustr. *Ericæ folia Polygonoides*, articulis crebrioribus, flore albo pulchello. *Phytogr. Tab. 7. fig. 4.* Saxifraga palustris *Anglica Goodjero Park. Th. 4 28.* item Alfine nodosa *Germanica ejusd. 764.* Alfine nodosa *Germanica* aliàs *Arenaria*. *CBP. 251. & Prodr. 118.* *Arenaria*. *J. B. T. 3. l. 36. fol. 723.*
- Alfine polygonoides *Lini Cathartici capitulis*, tenuifolia. Alfine tenuifolia *J. B. T. 3. l. 29. 364.* *Raii Hist. Pl. 1031.* hæc Alfinæ species pro Alfine nodosa *Germanic. C B P. à Schola Botanic.* malè proponitur.
- Alfine Alpina glabra foliolis reflexis. *Phytogr. Tab. 75. fig. 5.* an Saxifraga *Bavarica Park. Th.* ejusdem *D. Sherard* humanitate accepi.
- Alfine pusilla pulchro flore, folio tenuissimo nostras *Raii Hist. Pl. 1033.* an Alfine Alpina minima glabra. *Park. Th. 763.* fortè etiàm Alfine littoralis graminea. *Botan. Monspel. app. 290.*
- Alfine Saxifraga perexigua tenuifolia, flore parvo tetrapetalo, radice reptatrice. Saxifraga graminea pusilla, flore parvo tetrapetalo, *Raii Hist. Pl. 1026.* Caryophyllus minimus muscosus nostras. *Park. Th. 1340.* Saxifraga *Anglicana* Alfine folia *Ger. emac. descript.*
- Alfine Saxifraga Graminifolia, flosculis tetrapetalis herbidis & muscosis. *Phytogr. Tab. 74. fig. 2.* an Saxifraga *Anglica* annua. Alfine folio. *D. Plot. Raii Hist. Pl. 1026.* Saxifrag. graminea pusilla, foliis brevioribus crassioribus & succulentioribus. *Synops. Britan. Raii 146.* pro hujus tantùm varietate habemus, & non specie distinctâ.
- Alfine montana capillaceo folio. *C B P. Phytogr. Tab. 75. fig. 1.* an Alfine Saxifraga angustifolia, minima montana; *Column. ecphraf. 292.* quæ & parùm distat ab Alfine tenuifolia muscosa. *ejusd. C B P. 351.* Alfini muscosa quibusdam *J. B. T. 3. l. 29. 365.* Alfine muscosa *Park. Th. 764.*
- Alfine montana lignosior, foliis Laricis in modum ex uno puncto confertim exeuntibus. Auriculæ muris pulchro flore, folio tenuissimè diviso. *J. B. T. 3. l. 29. fol. 360.* Lychnis minima foliis Laricis seu tenuissimè divisis *Moris. Hist. 2. 547.*
- Alfine fortè, s. Lychnis *Africana* foliis Lariceis tenuissimè divisis, floribus ferè Umbellatis. *Phytogr. Tab. 256.* Auriculæ muris pulchro flore, folio tenuissimè diviso. *(Tab. 300)* Joannis Bauhini; proximè cognata: ex *Capite Bon. Spei.*
- Alfine polygonoides herbacea minor, Laricis foliis capillaceis, ex uno pediculo plurimis. *Phytogr. Tab. 75. fig. 4.* à *D. Sherard* habui.
- Alfine spuria pusilla repens, foliis Saxifragæ aureæ. *Raii Cat. Pl. Britan. 17.* Hujus notitiam doctiss. nostro *Raio* debemus; proindè miratus sum, quo casu in *Cl. Autoris Hist. Pl. Universal.* hæc plantula omissa fuit; cujus tamèn descriptionem, è *Catalogo suo Stirpium Britannic.* decerptam, hoc loco adhibere placuit. *Parvula admodum est & tenella Hederae terrestris modo per terram repit; sunt autem caules ejus, seu propagines hirsutæ, folia longis pediculis insident rotunda hirsuta per margines crenata Morsus Gallinæ vel Saxifragæ aureæ foliorum æmula, quibus tamèn longè minora sunt; Ex alis foliorum singulis, singuli flores exeunt, brevibus pediculis nixi subrubri aut carnei quinque foliolis compositi aut fortè uno in quinque lacinias, diviso, nam in tantâ flosculorum parvitate accurate discernere non potui; ad margines Rivulorum in aggeribus udis, unà cum Campanulâ Cymbalariae foliis in Cornubiâ & Devonîâ frequens; Julio & Augusto mensibus floret.* Icon habetur in *Phytogr. Tab. 7. fig. 6.*
- Alfine.



- . Alfine spuria repens ex *Insulis Fortunatis* folio *Hederæ* terrestreis, molli, & incano. *Phytogr. Tab.* 256.

ALTHÆA vulgari similis nostras folio retuso brevi *Raii Synops. Brit. app.* 240. Althæa folio rotundiori, s: minùs acuminato. *Hort. Edinburg.* 19.

Althæa frutescens folio acuto virente molli, flore specioso. *Phytogr. Tab.* 8. fig. 1. àn Alth. frutesc. folio acuto, flore magno. *Schol. Botan.* 226. Althæa profundè serrato, s. dentato folio *J B. T. 2. lib. 23. fol.* 955. itèm Althæa flore grandi *Alceæ Thuringiacæ Camerarii ejusd. ibid.* Althæa flore majore. *C B P.* 316. itèm Althæa laciniato folio ejusd. *C B P. ibid.* & fortassè eadem cum Althæa arboreâ *Olbiæ Provincialis Advers. Lob. & Icon.* 653. Malva sylvestr. perennis, folio profundè laciniato, & dentato *Moris. Hist.* 2. 522. multis abhinc annis hoc pulcherrimum Alth. arboreæ genus, nobis innotuit, sub Titulo *Malvæ Hispanic.* perennis folio acutiore.

Althæa frutescens *Bryoniæ* folio incana, flore minore: *Phytogr. Tab.* 8. fig. 2. Althæa species quibusc. arborea altera, vel *Bryoniæ* folio, *J B. Hist. Pl. Tom. 2. lib. 23.* 956. Althæa sempervirens *Bryoniæ* folio *Park. Th.* 303. Alth. frutesc. *Bryoniæ* folio. Itèm Alth. frutescens, folio acuto parvo flore. *C B P.* 316. Malva frutesc. folio acuto auriculato *Hederæ* instar. *Moris. Hist.* 2. 523. Althæa *Olbiæ* vulgò putata.

Althæa fruticans *Hispan.* *Aceris Monspeffulan.* incanis foliis grandiflora, saponem spirans: *Phytogr. Tab.* 8. fig. 3. Althæa frutescens folio rotundiore incano. *C B P.* 316. Alth. arborefcens. *J B. T. 2. l. 23. p.* 956. Althæa frutex 1<sup>a</sup> *Clus. Hist.* 2. 24. Althæa lignosa *Dalech. Hist. Lugd.* 592. Alcea frutescens folio rotundiore incano *Moris. Hist.* 2. 526. itèm Malva *Hispanica* foliis mollibus undulatis in margine, superiùs micis Sulphureis ad solem lucentibus donatis *ejusd. Moris. Hist.* quoad descriptionem, at in Tabulis huic titulo alterius *Icon* substituitur. Althæa *Provincialis Pennæ Adversarior.* ex sententia. *D. Raii Hist. Pl.* 603.

Althæa fruticans *Malabariensis* rotundifolia incana, flore amplo pallidè purpureo, à *D. Alexandro Brown* accepimus.

Althæa frutescens *Ind. Orient.* Populi albæ minoris folio tenuitèr dentato molli. *Phytogr. Tab.* 7. fig. 2. àn Althæa *Americana* frutescens Populi albæ foliis. *P B P.* intèr *Addend.*

Althæa *Indica* splendente folio Alni subrotundo. àn Malva incana frutescens Alni folio. *P B P.*

Althæa *Indica* Ribesii folio. *Schol. Botan.* àn Malva *Indica* Ribesii folio. *P B P.* 350.

Althæa *Jamaicensis* arborea, foliis oblongis mucronatis glabris; floribus amœnè rubellis. *Phytogr. Tab.* 259. fig. 3.

Althæa *Jamaicens.* Cacaliæ foliis subhirsutis, caliculis flor. longiusculis & tenuissimè divisis. hujus *Icon* inter Alceas *Indianas* exhibetur. *Phytogr. Tab.* 255. fig. 1.

Althæa arborefc. *Americana* amplissimis *Verbasci* foliis crassis, & incanis. *Phytogr. Tab.* 131. fig. 1. àn Althæa *Americana*, flore luteo spicato lanuginosa major, ex *Insulâ Curacao Breyn. Prædr.* 2. 13.

Althæa *Indica* *Abutili* subrotundo folio, flore luteo spicato. *Phytogr. Tab.* 74. fig. 6. fortè Malva *Americana* *Abutili* folio, flore luteo spicato foliis incanis. *P B P.* 349.

Althæa



*Althæa arborea Indica*, flore luteo, folio tripartito *P B P.* 307. an *Malva Curassavica* folio trilobato molli & hirsuto *ejusd.* 350. vid. *Phytogr. Tab.* 259. *fig.* 4.

*Althæa arborea Indica*, villosa, folio Ricini in modum laciniato.

*Althæa Jamaicensis*, oblongo, mucronato, glauco folio profundè venoso, margine undulato crispo. *Phytogr. Tab.* 259.

*Althæa* (fortè) vulgari similis, *Planta Jamaicensis* flosculis exiguis, ramulis tenuibus fasciculatim appensis. *Phytogr. ibid.* fortè *Welia Cupomeni H M.* *P.* 10. *Tab.* 83. At has duas novissimè nominatas plantas de Ricinorum genere haberi, nobis verisimiliùs videtur.

*Althæa Brasiliiana* frutescens incarnato flore, Fagopyri semine. *P B P. Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 3. *Planta innominata 1a. Marçgr. lib.* 1. *p.* 47. *Althæa Brasiliiana Pisonis. fol.* 222. fortè *Malva Curassavica* Carpinii foliis latioribus. *Nehu Indigenis, Hort. Beaum.* 29.

*Althæa Americana*, incana, frutescens, flore coccineo *P B P. Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 4. in *Horto Aula Regis nostr.* longe celeberrimo *Hamptoniensi* cum proximè præcedenti, sæpiùs observavimus.

*Althæa Maderaspatana* subrotundo folio molli & hirsuto, multipilis, sive seminibus ad apicem crinitis. *Phytogr. Tab.* 131. *fig.* 2. fortè *Katou-Uren H M.* *P.* 10. *Tab.* 54.

*Althæa Morifolia Ind. Or.* ad foliorum sinus, capitulis singularibus parvis. *Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 1.

*Althæa Brasiliiana* fructu hispido pentacocco. *Althæa altera Brasiliiana Pison. Hist.* 222. Trifolio affinis *Ind. Orientalis Xanthii* facie *Breyer. Cent.* 1. *fol.* 82. Huic accedit *Uren H M.* *P.* 10. *Tab.* 2. & eandem nobis esse videtur, *Alcea Malabarica* folio *Vitis*, flore minore rosaceo colore, fructu lappaceo, semine rostrato *Comelin.* in *Notis.*

*Althæa Abutili* foliis, fructu hispido *Americana. Phytogr. Tab.* 132. *fig.* 5.

*Althæa peregrina* longiore *Betonicæ* folio, floribus albis perexiguis capitulis arctè conglomeratis. *Malva Orientalis* elatior longiori folio, flore albo minimo, capitulis conglomeratis. *Phytogr. Tab.* 44. *fig.* 5. an *Malva frutescens Melochiæ* angustio folio floribus albis fasciculatim congestis. *P B P.* intèr *Addenda.* huc fortè spectat *Tsjeru-Uren H M.* *P.* 9. *Tab.* 73. ut & *Niuren ejusd. H M.* *P.* 10. *Tab.* 55.

*Althæa Maderaspatana Melochiæ* angustis foliis, fructu ex alis foliorum, pediculo curto. *Phytogr. Tab.* 240. *fig.* 5.

*Althæa Ulmifolia* semine rostrato, *Herba Brasiliiana* Incolis *Basourinha* dicta. *HRP.*

*Althæa annua fruticosa Fernambucensis* flore luteo. *Zanon. Hist. Bot.* *Alth. Carpinii* folio flosculis luteis. *Boccon. de Pl. Sicul.* f. 11. *Alcea Pernambucana Carpinii* folio, flosculis minimis, semine simplici rostro donato. *Morif. Hist.* 2. f. 528.

*Althææ Ulmifoliæ* species pumila, è *Maderaspatan.*

*Althæa Virginiana* bidens *Pimpinellæ* majoris acutiore folio, flosculis minimis luteis. *Phytogr. Tab.* 9. *fig.* 6. fortè *Alcea Morifolia Virginiana* minor. *Schol. Botan.* 224. *Alcea Virginiana* Carpinii folio, flosculis minimis luteis, semine duplici rostro, s. aculeo prædito, *Morif. ibidem.*



*Althæa rostrata Cormandeliensis* Pimpinellæ majoris folio subrotundo. *Phytogr. Tab. 9. fig. 3. semine bicorni.*

*Althæa Indica* flosculis parvis folliculatim (fortè fasciculatim) ramulis adfixis. *Breyn. Prodr. 1. Malva Americana* Carpini folio, floribus aureis fasciculatis parvis. *P B P. è Maderaspatan. nobis allata est. vid. Suppl. pag. 298*

*Althæa Indica* latiori folio cordiformi ad summum sinuato. *Phytogr. Tab. 9. fig. 2. Malva Indica* frutescens folio cordato. *P B P. 350. Alcea Zeylanica* folio latiori cordiformi. *Hort. Lugd.*

*Althæa rostrata* frutescens orbiculari ferè folio, flore luteo *Ind. Oriental. Phytogr. Tab. 132. fig. 2. honestus vir & apud Oxonienses olim Hortulanus ingeniosiss. D. Harrison* communicavit.

*Althæa fruticosa minor Gangetica* foliis exiguis margine spinosis. *Phytogr. Tab. 9. fig. 4.*

*Althæa minima surrecta* *Veronica villosa* foliis è *Maderaspatan. Phytogr. Tab. 132. fig. 3.*

**AMARANTHUS** sericeus, Populneâ fronde viridi, spicâ albâ flavicante.

*Amaranthus spicatus* sericeus, Populneâ fronde, totus sanguineus.

*Amaranthus auriculatus spicatus* angustiori folio, guttis sanguineis asperso.

*Amaranthus spicâ longâ candidissimâ. Spicæ foliis Maderaspatana. Phytogr. Tab. 118. fig. 2.*

*Amaranthus spicatus albus* *Lychnidis* folio *Maderaspatensis. Phytogr. Tab. 260. fig. 1.*

*Amaranthus albus Gangeticus* *Salviæ* angustis foliis paniculâ conglomeratâ. *Phytogr. Tab. 10. fig. 1. an Amaranthus Alopecuroides Indicus* frutesc. lanuginosis foliis *Salviæ* angustioribus & longioribus. *Breyn. Prodr. 2. Salvia Amaranthoides Mich. Nutii Fascic. Herbar f. 60.*

*Amaranthus Indicus* minor lanuginosis *Sampfuchi* foliis, spicâ albâ ad folior. exortum gemellâ. *Phytogr. Tab. 10. fig. 2. an Amaranthus Alopecuroides Indicus* frutescens lanuginosis foliis *Salviæ* latioribus & brevioribus. *Breyn. Prod. 2.*

*Amaranthus nodosus* pallecentibus *Bliti* foliis parvis, *Americanus*, multiplici, speciosâ, spicâ, laxâ, s. paniculâ sparsâ candicante. *Phytogr. Tab. 261. fig. 1.*

*Amaranthus Spicatus Dictamni* *Creticæ* folio *Maderaspatensis. Phytogr. Tab. 10. fig. 4. fortè Scheru-Cadelari Malabarorum H M. P. 10. Tab. 79. Veronica* similis spicata *Indica* repens *Commelin. in Not. supr. loc.*

*Amaranthus Siculus* spicatus, radice perenni. *Bocc. de Pl. Sicil. 16. ex Insulâ Maderensi. Phytogr. Tab. 260. fig. 2.*

*Amaranthus Indicus* spinosus spicâ herbaceâ. *H. Lugd. 31. Blitum monospermum Indicum* aculeatum capsulâ rotundâ. *Breyn. Prodr. 1. 18. Blitum spinosum Americanum. Hort. Edinburg. 51. Kathutampala Zeylonensibus dicta.*

**AMARANTHOIDES** *Indicum* monospermum, foliis *Ocymastri* capitulis purpureis. *P B P. 309. Amarantho* affinis, s. *Amaranthoides* major *Indica* *Ocymoidis* folio & facie, flore globoso purpureo. *Breyn. Prodr. 2. 13.*

*Amaranthoides Benghalens.* purpureum capitulis minoribus nudis sive foliolis ad basin florum viduatis. An *Amarantho* affinis *Brasiliana* glomeratis parvisque flosculis *Breyn. Cent. 1. 110. è Sinu Benghalensi* nobis transmissa fuit. *Amar-*



- Amaranthoides *Indicum* globosum ad caulium nodos floridum, foliis solitariis summo apice barbatis. *Phytogr. Tab. 133. fig. 2.*
- Amaranthoides humile *Maderaspatanum* capitulis candicantibus folio molli. *Phytogr. ibid.*
- Amaranthoides humile *Curassavicum* foliis Cepææ lucidis, capitulis albis. *P B P. 310.*
- Amarantho affinis Aizoides, s. Amaranthoides minor *Americana* procumbens, Sedi teretifoliis & facie, flore oblongo niveo. *Breyn. Prodr. 2. Trifolii spicâ, Crithmum maritimum non spinosum Brasiliense. Raii Hist. Pl. 1331. Perexil do Mar. Lusitanis, s. Caaponga 1<sup>a</sup>. Brasiliensium Pison. 243. vid. Supp. p. 398.*
- Amaranthoides *Maderaspatanum* foliis angustis ex adverso binis, floribus ad nodos verticillatis. *Phytogr. Tab. 132. fig. 6. àn fortè Coluppa. H M. P. 10. Tab. 11. fortè etiàm Amaranthoides humile Curassavicum angustissimo gramineo folio. P B P. 310.*
- Amaranthus Verticillatus foliis variè coloratis Psittaci plumas referentibus. *Morif. Hist. 2. 602. Amaranthus tricolor. Park. Symphonia Dalechampio, s. Amaranthus tricolor. J B. T. 2. lib. 23. 970. Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui scemina C B P. 121.*
- Amaranthus verticillatus melancholicus, maculâ nigrâ in medio foliorum infectus. Amaranthus folio variegato serotinus. *H R P. 11. Amaranthus folio variegato, colore obscuriori, s. mas. C B P. ibid. Symphonia notha.*
- Amaranthus *Maderaspatanus* Origani vulgaris facie frutescens paniculis intèr foliola sparsis.
- Amaranthus *Indicus* verticillatus albus Origani foliis lanugine incanis. *Phytogr. Tab. 75. fig. 8. àn Amaranthus Alopecuroides Indicus herbaceus Atriplicis folio. Breyn. Prodr. 2. Scheru-bula Malavarorum. H M. P. 10. Tab. 29. fol. 57.*
- Amaranthus verticillatus minor *Benghalensis* Serpylli foliis incanis. *Phytogr. Tab. 10. fig. 3. àn Amaranthoides humile Curassavicum foliis Polygoni. P B P. ibid. Amarantho affinis Aizoides, s. Amaranthoides minima Americana procumbens, Polygoni foliis & facie, flore oblongo cinereo, seu subalbido. Breyn. Prodr. 2. 14. àn Herniaria African. major. Park.*
- Amaranthoides *Indicum* verticillatum Parietariæ hirsutis foliis aculeatum. *Phytogr. Tab. 133. fig. 3. hùc fortè spectat Bula Malavarensium. H M. P. 10. Tab. 30. licet spinis destituta sit, incuriâ Pictoris fortè omissis.*
- Amaranthi semine & facie *Americana* foliis Circææ. *P B P. vid. Solanum.*
- AMBROSIA *Americana* inodora foliis non divisis, *D. Banist. Cat. Stirp. Virgin. apud Raii Hist. Pl. app. 1928. àn Ambrosia Americ. foliis Platani Orientalis. H. Oxon. D. Sherard.*
- Ambrosia Gigantea inodora foliis asperis trifidis. *Banist. Cat. Virgin. ubi suprâ.*
- Ambrosia maxime inodora Marrubii aquatici foliis tenuiter laciniatis, *Virginiana. Phytogr. Tab. 10. fig. 5.*
- Ambrosia (forsàn) è China Anguriæ foliis accedens. *Phytogr. Tab. 10. fig. 6. àn Katusjetti pu. H M. P. 10. Tab. 45. Ambrosia Malabarica Artemisiæ folio odoratiss. floribus flavis. Commelin. in Not.*



Ambrosia foliis Artemisiæ inodoris elatior. *Hort. Lugd.* 32. Seminibus è *Carolinâ* illatis, in *Horto D. Samuelis Doody* enata est, ubi ramulum hujus decerpimus.

AMERI, *HM.* vide *Colutea*.

AMINIJU, *Pison.* vid. *Gossypium*.

AMMI majus exoticum foliis per ambitum elegantèr incis. *Phytogr. Tab.* 11. fig. 1. hujus folia à *Dauco Cretico Zanon.* haud multum abluunt.

Ammi minus. *H. Oxon. D. Bobart.*

AMOMUM genuinum *Pona Park. Th.* 1566. Amomum racemos. quod verum credimus, Amomum *Martinelli & Pona. CBP.* 413. Amomum novum Cardamomi vulgaris facie, sive *Indicus racemus. J B. T. 2. l.* 15. 195.

Amomum *Virginianum* Euonymo *Virginianæ* simile, floribus, & fructu sparsim erumpentibus *Phytogr. T.* 11. fig. 2. Amomum *Virginian.* Corni foemin. facie. *Raii Hist. Pl.* 1799.

Amomum *Novæ Angliæ* quorundam.

Amomum *Virginianum* foliis candidissimis.

} Vid. *Cornus*.

Amomum Quorundam. *Park.* vide *Caryophyllus*.

AMYGDALO-PERSICA *Virginiana* foliis inordinatè laciniatis & veluti circumrosis. *Malus Persica* dilaceratis foliis & veluti circumrosis *Virginiana. Phytogr. Tab.* 204. fig. 1. in *Hort. Comptoniano* permultos annos exulta est.

Amygdalo-Persica nana, flore carneo pleno, *Africana. Phytogr. Tab.* 11. fig. 4. *Persica Malus Africana* nana flore incarnato pleno. *Hort. Lugd.* munere *Nobilissimi Domini Henrici, Baronis de Colranc,* hujus elegantissimè florentem ramulum primò accepimus.

AMYGDALUS *Indica* nana. *HRP.* Amygdalus pumila *HRBl. Phytogr. Tab.* 11. fig. 3.

Amygdalus (fortè) *Indiæ Orientalis* Officulo reniformi. àn Amygdala *Granatensis.* de *Laet.*

Amygdala *Benghalensis*, cristato fructu magno, figurâ fermè prismoidali.

Amygdalæ *Peruvianæ Clus.* exot lib. 2. cap. 18. Fructus secundus *Simonis Tovar, s. Almendras del Peru.* ejusd. *ibid.* *Walgonné Benghalensibus* dicta.

Amygdala *Indica*, sive *Adamaram. HM. P.* 4. cujus meminit *Joh. Niehus,* in suo *Itinerario.*

Amygdalæ affinis *Indica* fructu umbilicato, nucleo nudo, cortice pulvinato trifido, testato *Raii Hist. Pl.* 1482. *Paenoe HM. P.* 4. *Tab.* 15. Arbor Gummi Anime fundens ut *Commelino* videtur in *Not.*

ANACARDIUM *Orientale.* Anacardium, *Arabibus* Balado, *Lusitanis* Faba *Malaccana. Linschot. P.* 4. *Ind. Orient. cap.* 39. Anacardium. *CBP.* 511. fortè *Oepata Malavarensium. HM. P.* 4. *Tab.* 45. vid. *Suppl. pag.* 398

Anacardii alia species *CBP.* 512. Anacardium *Occidentale* *Cajous* dictum Officulo reni leporis figurâ. *Hort. Lugd.* 36. *Cajous J B. T. 1. lib.* 3. 336. *Kapamava HM. P.* 3.



P. 3. 65. Acajaiba cujus fructus Acaju *Pison. Hist.* 120. Arbor Acajou vulgò Cajou ejusd. *Mantiss. Arom.* 193. Pomifera seu potiùs Prunifera *Indica* nuce reniformi, summo pomo innascente; Cajous dicta *Raii Hist. Pl.* 1649. Kiagiu, s. Kagiù *Sinarum Mich. Boymii, Flor. Sinens.*

ANACHUNDA. *H M.* vid. *Solanum.*

ANACOCK *Virginienſium*, vid. *Phaseolus.*

ANAGALLIS phœnicea mas foliis amplioribus ex adverſo quaternis.

Anagallis cærulea foliis binis terniſvè ex adverſo nascentibus. *C B P.* Anagallis tenuifolia *Monelli. Cluſ. Hiſt. app. alterâ.* Anagallis fœmina tenuifolia, flore cæruleo copioſo amplo elegantiffimo. *Griſl. Viridar. Luſit.* Videſis hujus picturam inter *Icones Roberti* curioſè exſculptam.

Anagallis lutea Nemorum. *C B P.* 252. Anagallis lutea Numulariæ ſimilis. *J B. T.* 3. l. 29. 370. fortè Tlanatoa huizpatli. *Nov. Hiſpan. Hernand.* apud *Recc.* 424. hujus *Iconem* apud *Roberti* elegantiffimè depictam abſque titulo invenies.

Anagallidis facie Frutex *Canarienſis.*

ANAGYRIS non fœtida major Alpina, foliis ex albo & viridi elegantèr variegatis.

Anagyris non fœtida latifolia, floribus denſiùs congeſtis in breviorẽ Uvam. *Schol.*

*Botan.* 269.

*vide Suppl. pag. 298*

Anagyris *Americana* ſpinofa floribus albis odoratis. vid. *Acacie Affinis.*

ANANAS. *Acoſta: cap.* 44. Ananas fructus, *Bonti. lib.* 6. fol. 145. Ananas *Pison. lib.* 4. 195. Nana *Brasiliẽſibus*, Ananas *Luſitanis.* *Marcgr. lib.* 1. fol. 33. Strobilium, s. NuxPinea *Monardes. cap.* 63. Matzatli, s. Pinea *Indica Hernand.* apud *Recc. lib.* 8. cap. 78. 511. *Nieremberg. lib.* 15. cap. 1. Nana s. Strobilus *Peruvianus* & Ananas. *J B. T.* 3. l. 25. 94. itẽm Pinea *Inda Hiſpanis* ejusd. *T.* 1. l. 9. 264. Tatama *Oviedi. Hiſt. Nat. Ind. lib.* 7. cap. 13. Kapa-tſiakka *Malabaror. H M. P.* 11. *T.* 1. Carduus *Brasilianus* foliis Aloes. *C B P.* 384.

Ananas Sylveſtris *Brasiliانا* Kerbita vulgò. *P B P. Phytogr. Tab.* 258. fig. 3. an Caraguata acanga. *Marcgr. fol.* 88. itẽm Aloe *Brasiliانا* foliis arcuatis? Fortè Ananas *Americana* Sylveſtris Spinofiſſ. flore purpureſcente, fructu albo lanuginoſo, pugni magnitudine, Teckus *Americanis. Hort. Beaumont.* 7. Fortè etiã Ananas *Brasiliانا* Sylveſtris *Acoſta Hiſt. Lugd. fol.* 1871.

Ananas *Americana* Sylveſtris altera minor *Barbados*, & *Infulæ Jamaicæ* noſtratibus colonis *Pinguin* dicta. *Phytogr. Tab.* 258. fig. 4.

ANAPODOPHYLLON quibuſdam. vid. *Nymphaea congener.*

ANA-VANGA. *H M. P.* 4. *Tab.* 49. Baccifera *Indica* fructu rotundo cuſpidato Ceraſi magnitudine polypyreno. *Raii Hiſt. Pl.* 1632.

ANCHOAS *Mexicẽſium Hernand.* vid. *Zingiber mas.*

AN-



**ANCHUSA** repens Lithospermi facie floribus cæruleis secundum folia prorumpentibus. *Phytogr. Tab. 76. fig. 2.* Lithospermum virgatum *Thalii. fol. 74.* Lithospermum vulgare maj. *Camerar. Hort. Medic. 91.* Lithospermum. maj. *Dod. Pemptad. 1. lib. 3. 83. Lob. Obs. 245. Adversar. 192. Hist. Lugd. lib. 10. 1177:* Lithospermum majus *Dodonæi*, flore pupureo semine Anchusæ. *J B. T. 3. l. 33. 592.* ubi Icon minus fælicitè exsculpta per errorem ad paginam 692. transposita est. Lithospermum repens majus. *Clus. Hist. 2. 143.* Lithospermum majus repens latifolium *C B P. 258.* flores nostri sunt vivaci cæruleo colore extremis ramulis velut in umbellam non hærentes, sed ad longitudinem caulium ex alis foliorum singulatim prorumpentes, adeò ut spicam quodammodò imitantur: nisi hic ramulus sit unus tantum è pluribus radiis quorum singuli ad summum caulem convenientes, Umbellam fortè conficerent ex *Herbario vivo Cl. D. Gulielm. Cortene* habuimus; ex quo ejus imaginem delineatam damus.

*Anchusa lutea minor. C B P. 255. J B. T. 3. l. 33. 592. Park. Theatr. itè Symphytum angustifolium Apulum ejusd. Park. Theatr. 523.* *Anchusa Echioides lutea Cerinthes flore, montana Column. ecphraf. 182.* hujus exhibetur pictura in *Phytogr. Tab. 6. fig. 5.*

*Anchusa minor lutea Virginiana, Puccoon* Indigenis dicta, quæ se pingunt *Americani.*

*Anchusa Primulæ veris flavo flore Virginiana. D. Banister.*

*Anchusæ degeneris facie India Orientalis, Herba quadricapsularis. Phytogr. Tab. 76. fig. 3.*

*Anchusa angustifolia, verticillis, longis aculeis armata è Maderaspatan. Phytogr. Tab. 133. fig. 4.* Ex Plantis siccis liberalitate humanissimi Viri, *D. Caroli du Bois* nobis communicata.

**ANEMONE** elatior *Caroliniana*, flore parvo virescente. Forsàn *Anemone Virginiana* tertiæ *Matthioli* similis, flore parvo. *Hort. Lugd. app. 645.* àn *Anemone latifolia sylvestr. alba. D. Banister. apud Raii Hist. Pl. app. 1928.* Fortè etiàm *Anemonæ nemorosæ* affinis peregrina secunda, flore herbacei coloris. *C B P.* Hæc autèm ad *Ranunculum* genera accenferi debet.

*Anemonæ adfinis Ethiopica* fibrosâ radice, flore Asteris, *Taraxaci* foliis subincanis. *Hort. Lugd. vid. Jacobæa.*

**ANGELICA** montana maxima, flosculis candicantibus, ad caulium nodos umbellifera. *Phytogr. Tab. 134. fig. 1.* Fortè *Archangelica. J B. T. 3. l. 27. 143.* *Angelica sylvestr. montana. C B P. 156.* *Archangelica, s. Angelica Tabernæmontani, s. Scandiaca. Hort. Leyd. Raii Hist. Pl. 434.* *Angelica Silesiaca* maxima, sive *Archangelica Schwenckfeld. Cat. Pl. Siles. Archangelica Clus. Pann. l. 4. c. 14. 694.* Fortè etiàm *Angelica Alpina*, ad singulos nodos florida *Acad. Paris. Flor. Batav. fol. 10.* ubi quæritur àn *Ligusticum* quorundam foliis *Angelicæ. J B. T. 3. l. 27. p. 147.* quod in Alpibus *Liguria* vulgò *Imperatoria* vocatur ut in hujus descriptione notat *Cæsalpinius.* *Ligusticum* quorundam foliis *Angelicæ. J B. Schol. Botan. 166.* ubi *Angelica Alpina* ad singulos nodos umbellifera huic Synonymo proponitur.



*Angelica lucida Canadensis Cornuti* 97. *Panax Heracleum alterum Americanum* splendente folio, *Laferpitium creditum* quibusd. *Park. Theatr.*

*Angelica Charibæarum* elatior *Olusatris* folio, flore albo, feminibus striatis; Cumini odore & sapore. *Phytogr. Tab. 76. fig. 1.* àn *Myrrhis Americana* foliis *Angelicæ*, semine brevi crasso. *Breynii. Prodr. 2. 75.* *Podagrariæ* instar radicem habet longè latèque reptatricem.

*Angelica Acadensis* flore luteo *Acad. Reg. Par. Dodart. Schol. Botan. 168.* àn *Umbellifera Alsatica* magna, *Umbellâ* parvâ, subluteâ. *J B. T. 3. l. 27. fol. 106.*

*Angelica baccifera* vulgò. vid. *Christophoriana.*

*Angelica arborescens spinosa*, seu *Arbor Indica* *Fraxini* folio, cortice spinoso *Raii* vid. *Christophoriana*

ANGOLAM (fortè) *H M. P. 4. Tab. 17.* *Arbor Indica* baccifera, fructu umbilicato rotundo *Cerasi* magnitudine dicocco *Raii Hist. Pl. 1497. vid. Suppe. pag. 398*

ANHUIBA. *Pison.* vid. *Cornus mas.*

ANIL, s. *Anir Indorum.* vid. *Colutca.*

Anil Sylvestre *Barbadensium.* vid. *Cytisus.*

Annil, s. *Indigo Gali*, s. Nil *Herba Rorismarini* facie *Linschot.* vide *Genistæ.*

Anil, s. *Indigo Guadelupensis.* *H R P.* vid. *Crotalaria.*

Anil Sylvestre *Cynanchicæ* foliis *Bisnagaricum.* vid. Nil.

ANIMIFERA arbor *Brasiliæ.* *PBP.* vid. *Ceratia.*

ANINGA *Pisonis.* vid. *Arum.*

ANISUM Herbariis. *CBP. 159.* Anisum *J B. T. 3. l. 27. 92. Dodart. Mé-  
moir. 59.*

Anisum dulce *Mèlitense.* *Moris. de Umbel. 75.* *Cuminum* semine rotundiore & minore, dulce *Melitenibus.* *CBP. 146.*

Anisum *Africanum* fruticescens, folio & caule rore cæruleo tinctis. *Phytogr.* vid. *Ferula.*

ANODA *Zeylonensibus.* vid. *Alcea Indica.*

ANONA *Americana* folio splendente, ex *Vera Cruce.* *PBP. Phytog. Tab. 135. fig. 1.*

Anona *Indica* latifolia fructu squamato aspero, feminibus ex flavo nigricantibus turgida. *Phytogr. Tab. 134. fig. 2.* fortè *Fructus prima.* *Garth. s. Aratacou Clus. Exot. l. 2. cap. 17.* *Araticu-ape Brasiliensium* *Pison. 142.* Anona *Americana* Sylvestris. fol. & fructu maximis *PBP. Soor Sack* *Belgarum.* *Nostratibus* colonis. *Sowresop* nuncupata.

Eadem, fructu major. *Hort. Leyd. 645.* fortè *Guanabana Nierembergii*, folio 331.



Anona *Indica* fructu ex viridi & luteo, cortice squamato aspero, nucleis nigricantibus parvis. *Phytogr. Tab. 134. fig. 3.* Pyro similis Fructus alter in *Novâ Hispaniâ*. C B P. Guanabanus Oviedi fructu squamato. *J B. Hist. Pl. T. 1.* Anona *Mexicana*, s. Quautzapotl. *Hernandez. apud Recc. l. 3. fol. 90.* Anona *Curassavica* fructu dulci. P B P. Honig Appel Belgarum. Sappa quibusdam. Sugar Apple, & Sweet Sop nostratibus vulgò. àn Yata *Malacensium*. Boim. *Flor. Sinens.* fortè etiàm Yllamatzapotli *Nov. Hisp. Terentii* apud *Reccum. fol. 444.* Anona *Americana*, folio non splendente ex *Sirinamâ*. P B P. 312.

Anona *Indica* angustifolia fructu cæruleo cortice squamato glabro: *Phytogr. Tab. 134. fig. 4.* Anona-maram *HM. P. 3. fol. 23.* Ahate de Panucho, vel Ate *Pannicensis Terentii Not. in Hernand. apud Recc. 348 & 454.* Cachima pomum in *Insulis Caribeis. Mundii Biochrest. 167.* Anon Oviedi. hujus fructus à *Garcilasso de la Vega & Hispanis* Mangier blanco, atque Custard-Apple Nostratibus dictus: *Supim* fructu purpureo *Sinarum Michael Boyme. Flor. Sinens.*

Anona *Indica* fructu conoide viridi, squamis veluti aculeato. *Phytogr. Tab. 135. fig. 2.* Atamaram. *HM. P. 3. fol. 21.* Araticu-ponhe *Marcgr. & Pison. 141.* Nostratibus colonis, The Pickly Apple nuncupatur.

Anona *Americana* juxtà fluviorum ripas innascens pyriformi fructu, semine ampliori pallido. *Phytogr. Tab. 240. fig. 6.* àn Mala *Americana*, Pyri specie. C B P. 433. fortè Araticu-pana *Brasiliensium Pison. 142.* & Hoitzochitl, s. Arbor Lonchifolia *Mexicensibus Hernand. apud Recc. Hist. Mexic. fol. 39.* itèm Pyro similis Fructus in *Novâ Hispaniâ* nucleo magno. C B P. Enchrasicolos Salsamentis conditos olet; & fortè indè Nomen, viz. Anchovie Pear, & aliquandò River Pear, Nostratibus nuncupatur.

Anona (fortè) *India Orient.* foliis oblongis, ex adverso binis plurimis conspicuis venis, in parallelos secundùm latitudinem venustè discurrentibus. *Phytogr. Tab. 135. fig. 3.*

Ejusdem arboris folium (ut nobiscum existimamus) ex *Americâ* delatum adpingi curavimus. fortè Mangaiba *Brasiliensium Pisonis. 155.* & satis propriè nominari possit: *Anona utriusque Indiae levis, fructu Ovali aureo. parte Soli, obversâ, rubris punctis insignito.*

ANONIS purpurea procumbens verna, s. præcox fruticosa, annua, viscosa, siliquis crassis, lentiformibus rariùs dispositis. *Morison. Hist. 2. 169.* fortè Anonis *Hispanica* frutesc. folio *Ciceris* sylvestris triphylli. *Schol. Botan. 248.* Anonis annua ramosa foliis rotundis ferratis. *H. Edinburg. 29.* hujus Icon habetur. *Phytogr. T. 76. fig. 4.*

Anonis arboresc. flore rubello. *Abr. Munting Hist. Pl. Belgicæ. lib. 3. fol. 337.* Anonis purpurea verna, s. præcox perennis frutesc. flore rubro amplo *Moris. Hist. 2. 170.* Cicer arboreum *Indicum* perenne *Zanon. Istor. Botan. fol. 66.* Anonis purpurea frutescens non spinosa. *Dodart Memoir. 57.* Cicer Sylvestre alterum triphyllum. *Park. Theatr. Caspar Bauhinus, hanc perelegantem Anonidis speciem nimis inadvertentèr cum proximè sequenti confundit.*

Anonis latifolia, Cicer sylvestre trifolium. *J B. T. 2. l. 17. 295.* Cicer sylvestre latifolium triphyllum. C B P. 347. Anonis purpurea perennis foliis latioribus, rotundioribus profundè ferratis, *Moris. Hist. 2. 170.* Ano-

vide *Suppl. pa. 398*



- Anonis procumbens maritima* nostras foliis hirsutis pubescentibus. *Raii Synops. Stirp. Britan. app.* 240. ad maritimas arenosas *Cornubiæ* oras reperta, & ad nos delata est.
- Anonis non spinosa Cretica*, flore pupureo. *H. Patavini Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 4.
- Anonis lutea mitis*, oxytripylla, ad florum petiolos capreolata, foliis levissimè crenatis. *Phytogr. Tab.* 135. *fig.* 5.
- Anonis lutea mitis*, obtusis longioribus & crenatis foliis; capreolis donata. *Ononis Senensis Spigelio*. fortè *Anonis lutea annua recta*, hirsuta, viscosa, siliquis hirsutis brevioribus. *Morif. Hist.* 2. 171. *Anonis non spinosa capreolis donata*. *C B P.* 389.
- Anonis viscosa spinis carens lutea major*. *C B P.* 389. *Anonis lutea non spinosa Dalechampio*, *Natrix* f. *B. T.* 2. l. 17. 393. *Anonis lutea perennis major*, *Natrix dicta*, *Morif. Hist.* 2. 170: cujus Icon non placet. *Huic optime quadrat pictura quæ apud Hist. Lugd. habetur.*
- Anonis maritima mitis folio lucido ferrato*. *Boccon. vid. Astragalus.*

- A N O N Y M O S** *Americana* *Ribesii* foliis, Umbellata, *Melanthi* capsulâ minore.
- Anonymos Ribesii foliis* *Icon. Roberti, Raii Hist. Pl.* 1708. *vid. Suppl. p.* 398
- Anonymos baccifera Verticillata*, folio molli & incano, ex *Americâ*. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 3. hujus baccæ sunt latè rubentes & quasi murice tinctæ. àn *Solanum verticillatum baccis nudis Virginianum*. *D. Banist. Cat. Mss. Posthum?*
- Anonymus Maderaspatan*. *Senecionis Hieracii folio similis*, spicâ foliaceâ & *Hormini* adinstar squamatâ. *Phytogr. Tab.* 241. *fig.* 1. àn *Belutta adecamanjeu H M. P.* 10.
- Amarantho affinis Ind. Orient.* spicatus capsularis? An potiùs *Adel-Odagam. H M. P.* 9. *Tab.* 43. *Digitali* (fortè) adfinis *Ind. Orient.*
- Anonymos Americana*, foliis *Parietariæ* scabris, floribus albis ad foliorum ortum, vix conspicuis. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 4. *Fœnugræci* flore, *Parietariæ* folio, *Planta Americana*. *P B P.* 335. An *Kali* genus *Americanum*?
- Anonymos Linariæ folio Orientalis Gallii lutei* flore, *Herba capsularis Verticillata*. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 2. à *D. du Bois* habui.
- Anonymus flore Coluteæ*, *Clusii*. *vid. Astragalus.* 1

**A N O T A** quibusdam. *vid. Orleana.*

- A N T H O L I S T H O S** *Convolvulaceus Americanus*, *Barbadensibus Anglis* *Ullid Slip-Blossom* nuncupatur, fortè *Convolvuli* species *Americana*, floribus caducis. *Phytogr. Tab.* 136. *fig.* 1.

- A N T H Y L L I S** leguminosa ejusque species *Park.* vide *Loto affinis*.
- Anthyllis maritima* *Alfines* folio. *C B P.* vide *Alfinc*.
- Anthyllis maritima Lentifolia*. *C B P.* *vid. Alfinc*.
- Anthyllis Pr. Alpini* prior *Dioscoridis* quorund. *vid. Lysimachie affinis*.
- Anthyllidis* species quibusd. f. *B.* *vid. Lysimachie affinis*.

- A N T I R R H I N U M** *Lusitanicum* semper-virens, flore rubro elegantissimo. *P B P.* inter addend.



Antirrhinum luteo flore. C B P. 211. Antirrh. pulcherrimum flore luteo grandi *Camerar. Hort. Medic. p. 18.*

Antirrhinum album ferrato folio. J B. Tom. 3. lib. 30. fol. 437. Antirrhinum folio dissecto. C B P. 212. *Plurimum accedere videtur ad Cristam Galli, istam quam Cl. Raius in lateribus montium Messana imminentium jam olim invenit, & fortè eadem fuerit, ut Autor ipse conjectatur.* Hist. Pl. 761. *fortè etiàm Trixago Apula unicaulis τερεξσaxus, Column. Crista galli spicata, flore vario ex albo & purpureo. Raii Hist. 770. a quo in iisdem locis cum precedenti reperiatur, & a quâ fortasse non differt specie.*

Antirrhinum purpureum multicaule, foliis tenuissimis fursùm inflexis, floribus sparsis, calyce spinulis asperato. *Phytogr. Tab. 12. fig. 4.*

Antirrhinum saxatile folio Serpylli. C B P. 212. & Prodr. describitur. Antirrhinum saxatile *Bauhini, Park. Th. à Campanulâ Serpylli folia Joh. Bauhin. J B. T. 2. l. 20. fol. 816, haud multùm abluere videtur. vide Supple. p. 398*

Antirrhino affinis pusilla planta foliis scabris, *Maderaspatana. Phytogr. Tab. 118. fig. 3.*

*Aphyllon vide Supple. pa. 399*  
APIOSCORODON, s. Arbor *Americana* triphyllus, Allii odore, poma ferens. *Phytogr. Tab. 137. fig. 7. Arbor Americana trifoliata pomifera, seminibus reniformibus, Hort. Beaumont. Therebinthus Verae crucis latissimo folio, Arach vulgò. P B P. Arach Symmaron (i. e.) Aurantium sylvestre Indigenis audit. à Nyrvala H M. P. 3. àn potiùs Tapia Marcgr.*

APIUM hortense latifolium, s. maximum. C B P. 153. Apium hortense magnum vulgari hortensi, s. Petroselino vocato, sapore idem, s. *Anglicanum* quibusc. J B. Tom. lib. 27. 99. Petroselinum majus, sive *Virginianum* Park. Theatr. Fortè Petroselinum *Lusitanicum* Hort. Groning.

Apium petræum Peucedani facie nostras. Selinum montanum pumilum *Clusii*, foliis Fœniculi aut Peucedani, flore albo, semine Selini. J B. T. 3. l. 27. 17. Peucedanum minus. C B P. 149. Peucedani facie pusilla planta. *Lob. Icon.*

Apium maritimum dulce *Scoticum*. vid. *Ligusticum*.

APOCYNUM *Americanum* erectum, tuberosâ radice non incanum, foliis rigidioribus latis, subrotundis, floribus albis intus purpureis, summo cauli Corymbum magnum efformantibus. *Phytogr. Tab. 77. fig. 1. àn Apocynum Americanum arborescens, foliis rigidis subrotund. amplissimis. P B P? Apocynum erectum non ramosum, latiore folio, Umbellis florum albicantibus. D. Banister. itèm Apocynum erectum foliis omnium ampliss. minimè acuminatis, fl. albidis, & capsulis echinatis. ejusd. Cat. Mss. ab honesto viro Jacobo Harloe ex America, in Angliam primò illata est hæc amœnissima Apocyni species.*

Apocynum erectum majus latifolium *Ægyptiacum*, flore luteo spicato *Breyn. Prodr. 2. fol. 14. Beidelsar Alpini, s. Apocynum Syriacum. J B. T. 2. lib. 15. 136. Beidel Ossar. Pr. Alpini. de Pl. Ægyptiac. 85. Lapathum Ægyptiac. lactescens siliquâ Asclepiadis. C B P. 116. Edit. 1623. Apocyn. Ægyptiac. lactescens siliquâ Asclepiadis, ejusd. C B P. Edit. 1671. Fortè Ossar Frutex, Belli Epist. 4. ad Clusium.*

Apoy:



- Apocynum erectum majus latifolium Indicum*, flore concavo amplo, carneo suave-purpurascete. *Breyn. Prod.* 2. 15. *Apocynum* (fortè) rectum latifolium novum *Comelin. Hort. Amst. fol.* 31. *Apoc. latif. Aegyptium* incanum erectum floribus magnis pallidè violaceis. *P B P.* 313. *Ericu. H M. P.* 2. *fig.* 31. *Waraghaha Zeylonensis* dicta. vid. *Phytogr. Tab.* 175. *fig.* 3.
- Apocynum latifolium Syriacum*, incanum, erectum, floribus umbellatis minoribus, obsoletè purpurascetibus, filiq. folliculatis rugosis. *Hort. Leyd.* 52. *Apocynum majus Syriacum* rectum *Cornuti. fol.* 91. *Beidel-Ossar Vestlingii Obs. in Alpin. fol.* 28. *Apocynum erectum medium latifolium peregrinum*, flore umbellato, ex obsoleto dilutè purpurascete, petalis reflexis. *Breyn. Prodr.* 2. 15. *Apocyn. rectum latifol. American. Park. Theatr.* 385. *Bel Ericu Hort. Malab. P.* 2. *fol.* 56. *absque figurâ.*
- Apocynum rectum minus Canadense Cornuti* 93. *Apocyn. angustifolium Canadense* viride erectum floribus umbellatis minoribus rubicundis. *H. Leyd.* 52. *Apocyn. rect. angustifolium. American. minus. Park. Theatr.*
- Apocynum Canadense* maximum flore minimo herbaceo. *HR B.* itèm *Apocyn. Virginianum*, flore herbaceo, filiquâ longiss. & tenuissimâ *Moris. Prælud. Botan. Phytogr. Tab.* 13. *fig.* 1.
- Apocynum Portoricense* fruticescens, foliis crassis hastæ cuspidi similibus. *Hort. Beaum. Tithymalus Portoricens. foliis crass. hastæ cuspidi similibus. P B P.* in *HR H.* collegimus: Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 137. *fig.* 5.
- Apocynum arboreum, Lauri-folium*, filiquis Nerii *Maderaspatanum*, fortè *Codaga pala*: *H M. P.* 1. *fig.* 47. *Arbor Malabarica* lactescens *Jasmini* flore odoro, filiquis oblongis. *Arnold. Syen. in Not.*
- *Apocynum arboreum* ad *Elæagni* faciem accedens *Canariense*, filiquis binis Nerii æmulis, (*Cornicar Insulanis* vulgò) apicibus recurvis. *Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 3. huc fortè spectat *Nelem-pala H M. P.* 9. *vid. Supp. p. 399*
  - *Apocynum erectum Virginianum* ramosum, caule subrubente, *Efulæraræ* foliis, filiquis (ex flosculis albis) tenuissimis, binatim ad extremitates conjunctis. *Phytogr. Tab.* 260. *fig.* 4. *Flosculis evanidis, filiquæ sunt binæ, una arcus instar incurvata, altera recta nervum constitucns.*
- Apocynum maritim. erectum, Venetum*, flore albo & purpureo. *Hort. Leyd. app.* 646. *Tithymalus maritimus*, s. *Efula* rara è *Lio Venetorum* *Insulâ* flore albo, & purpureo. *HR P.* 176. *Tithymalus maritimus* purpurascetibus floribus: *C B P.* 291. *Pityusæ species Venetis. Aliis Turbith nigrum.*
- Apocynum Canadense*, folio *Androsæmi*. *HR B.* *Apocyn. Canadense*, foliis *Androsæmi* majoris. *Boccon. de Pl. Sicul.* 32. *Apocynum Americanum*, foliis *Androsæmi* maj. floribus *Lilii convallium* suaverubentis. *HR P.* 22. *Dodart. Memoir.* 59. Fortè *Tangaraca* tertia. *Pisonis. lib.* 5. *fol.* 303.
- Apocynum Virginianum* folio plicis undulatis intorto. *D. Banister. Cat. Mss.*
- Apocynum Dioscoridis* *Fab. Column. Phytobas.* *fol.* 110. *Apocynum Asclepiadis* folio, flore nigro. *H. Leyd.* 51. *Asclepias* nigro flore. *C B P.* 303. *Asclepias* flore nigro quorundam. *J B. T.* 2. l. 15. 140.
- Apocynum Virginianum* erectum, alternis *Asclepiadis* foliis, floribus pallidè cæruleis, radice crassâ. *Phytogr. Tab.* 115. *fig.* 3. Fortè *Moyotliayacatli. Nov. Hispan.*



- Anton. Recc.* 388. cui, & Totocuit-Laxil. *Nov. Hisp. ejusd. Recc.* fol. 433. in plurimis convenit.
- Apocynum petræum* ramosum, Salicis folio venoso, filiquâ medio tumente, *Virginianum. Phytogr. Tab.* 261. fig. 3.
- Apocynum serrato* Salicis folio *Americanum*, ex *Codice Benting. Phytogr. Tab.* 241. fig. 2.
- Apocynum rectum* elatius, Salicis angusto folio, immaculatis flosculis in umbellam, folliculis pilosis. *Phytogr. Tab.* 138. fig. 2. àn *Apocynum Hysicanense* erectum, salicis foliis angustioribus. *Hort. Beaum. Cenanam* (fortè) *Tezquoquensis Mexicanis* sub *Matris Spicæ Maizii* titulo apud *Recc.* fol. 185. quæ huic nostro plurimum convenit, quoad Iconem, repugnare tamèn videntur *folia verbasci lanuginosa* in descriptione. Huic etiàm proximè accedit
- Apocynum Americanum*, floribus umbellatis carneis, s. *Yocolxochitl Nova Hispan. Terentii* apud *Reccum.* fol. 445.
- Apocynum erectum* Salicis latiori folio umbellatum, floribus aurantiis. *Phytogr. Tab.* 138. fig. 3. àn *Apocynum Hysicanense* erectum, Salicis foliis latioribus. *H. Beaum.*
- Apocynum Curassavicum* fibrosâ radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis latioribus. *P B P.* Hujus ut & præcedentis ramulum, floribus ornatum *Cl. Vir.* & olim Condiscipulus noster, *D. D Uvedal. L L D.* ex ejus *Horto omnium Stirpium* exoticarum varietate, & copiâ instructissimo, collectum, nobis amicissimè communicavit.
- Apocynum Africanum* tuberosum latiori Salicis folio erectum, folliculis hirsutis, flore pallidè punicante, è *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 139. fig. 1. Huic proculdubio congener est *Quaquahutzontic. Nov. Hisp. s. Truncus parvus Terentii* apud *Recc.* fol. 250.
- Apocynum tuberosum* angustifol. erectum, flore ex luteo virescente, folliculis pubescentibus *Africanum*, ex *Cod. Compt. Phytogr. Tab.* 137. fig. 6. Fortè *Yztacpatli 6<sup>a</sup> Nov. Hispan. Terent.* apud *Reccum*, fol. 450. Fortè etiàm Apocyno similis angustissimo folio *Curassavica*, tuberosâ radice, caule geniculato nodoso. *P B P.* 314.
- Apocynum Curassavicum* fibrosâ radice, floribus aurantiis, Chamænerii foliis angustioribus: *P B P. Phytogr. Tab.* 76. fig. 6. Apocyn. erectum minimum angustifolium *Americanum*, flore umbellato aurantio, petalis reflexis. *Breyn. Prodr.* 2. Sed nostri florum petala deorsum non flectuntur, è contrario ità disponuntur ut flosculum concavum efformant.
- Apocyn. Canadense* angustifolium flore Aurantii, *Moris. Prælud.* 232. *Apocynum Nov. Angliæ* subhirsutum, tuberosâ radice, floribus aurantiis. *H. Leyd. app.* 646.
- Apocynum erectum* min. latifolium *Americanum*, flore umbellato aurantio, petalis reflexis, radice tuberosâ. *Breyn. Prodr.* 2. 15. *Apocynum minus* non lactescens caule, & folio hirsutis, floribus saturatè luteis. *Banister. Cat.* apud *Raii Hist. Pl.*
- Apocynum rectum* non ramosum, Rorismarini foliis, Umbellis florum candidis, *D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.* ibid.
- Apocynum Curassavicum* triphyllon flosculis albis. *P B P. Phytogr. Tab.* 139. fig. 2. Idem tetraphyllum. *P B P.*



- Apocynum scandens angusto Rorismarini folio, ex *Insulis Fortunatis*. *Phytogr. Tab.* 261. *fig. 2.* *Henio Hispanis* vulgò, fortè Naru-nindi. *H. M. P.* 10. *Tab.* 34. *vid. Supp. p.*
- Apocynum angusto Salicis folio. *C B P.* 303. *Park. Theatr.* Apocyno affinis Secamone flore albo. *J B. T. 2. l. 15. 134.* Apocyn. secund. species altera. *Clus. Hist.* Phaseolus *Indicus* quartus, qui Secamone *Alpino* dictus, *Bontii lib. 6. fol. 138.* Yxpatli *Nov. Hispan. Terentii* apud *Recc. fol. 446.* è *Maderaspatan.* nobis allata fuit.
- Apocynum, s. Periploca, scandens folio longo, flore purpurante. *J B. T. 2. l. 15. 134.* Apocynum folio oblongo. *C B P.* 303. Apocyn. angustifolium, s. repens. *Park. Theatr.* Apocyn. secundum angustifol. *Clus. Hist.*
- Apocynum scandens radice tuberosâ *Prom. Bon. Spei. ex Codic. Comptonian.* *Phytogr. Tab. 138. fig. 4.*
- Apocynum latifolium amplexicaule. *J B. T. 2. l. 15. 135.* Apocynum tertium latifolium *Clus. Hist.* Apocynum Scammoniaë facie *Monspeliaco* affine, foliis acutioribus. *H. Leyd. 51.* Scammoniaë *Monspeliacæ* affinis foliis acutioribus. *C B P.* 294. Scammoniaë *Monspeliacæ* affinis. *Park. Theatr.*
- Apocynum Scammoniaë facie *Monspeliacum* foliis rotundioribus. *H. Leyd. 51.* Scammonia *Monspeliaca* foliis rotundioribus. *C B P.* 294. Scammonia *Monspeliac.* flore parvo. *J B. T. 2. l. 15. 136.* Apocynum quartum latifolium Scammonia *Valentina.* *Clus. Hist.* Scammonia *Monspeliaca* dicta. *Park. Theatr.*
- Apocynum scandens Scammoniaë *Monspeliacæ* foliis, *Curassavicum.* *Hort. Reg. Hampton. àn Wattou-valli. H. M. P. 7. Tab. 32. s.* Apocynum rotundifolium *Malabaricum*, floribus ex flavo dilutis, punctulis nigricantibus interiùs insignitis.
- Apocynum folio subrotundo. *C B P.* 302. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo pallescente. *J B. T. 2. l. 15. 134.* Apocynum primum latifolium. *Clus. Hist. lib. 1. 124.* Periploca latifol. *Gerard. emac.*
- Apocynum amplexicaule frutescens, *Brasilianum* cortice albo fungoso. *P B P.* 313. Apocynum *Brasilian.* amplexicaule, fructu magno Beidelfaris *Raii Hist. 1088.* Ibatì *Brasilensibus* *Marcgr. fol. 19.* Apocynum (fortè) majus scandens, siliquâ oblongâ, tumidâ & glabra. *Carol. Plumier. fol. 81. Tab. 95.* qui eandem esse plantam cum Ibatì *Brasilensibus* suspicatur & ipse *Fr. Plumier.*
- Apocynum incanum scandens, *Maderaspatanum*, Violæ martiæ foliis, floribus purpureis. *Phytogr. Tab. 137. fig. 3.*
- Apocynum *Malabaricum* scandens, latifolium, flore rubescente, siliquis longissimis & angustissimis. *Palualli. Hort. Malab. P. 9. T. 12.*
- Apocynum hirsutum scandens *Americanum* flore amplo purpureo. *Phytogr. Tab. 76. fig. 5.* è spectatissimi Vir. *D. Fosteri Horto* plurimar. Plantar. exoticar. instructissimo *Lambethæ* ad Austrum sito, florentem vidimus & habuimus. *vid. Supp. p. 399*
- Apocynum scandens *Africanum* Convolvuli minoris folio & caule hirsutis. *Phytogr. Tab. 137. fig. 4.* Apocynum *Indicum* minus Nummulariæ foliis *Breyn. Ephem. Germ. Ann. 4. & 5, 6. Obs. 138. Raii Hist. Pl. 1089.* àn Apocynum scandens *Africanum* hirsutum. *P B P.* 313.
- Apocynum humile Aizoides, siliquis erectis, *Africanum.* *Hort. Leyd. 52. flore fritillarico.* Fritillaria crassa *Promontorii Bon. Spei. Stap. in Not. ad Theophrast. 335.*
- Idem cauliculis longissimis, denticulis rarioribus, donatum.



*Apocynum trifolium Indicum* vulgò, *Epimedium*. *Bod.* à *Stapel.* vid. *Hedera triphylla*.

**A P P E L**, s. *Nalla-Appella*. *H M. P. 1. fig. 53.* Arbor baccifera *Malabarica*, flore umbellato odoro. *Arnold. Syen. in Not. Tetragonia Indica Raii Hist. Pl. 1598.* àn *Sorbi sylvestris* genus *Indie Orientalis*?

**A Q U I F O L I U M** baccis luteis. *Hort. Leyd. 56.*

*Aquifolium*, s. *Agrifolium* foliis ex luteo variegatis. *H R. P. 22.*

Idem foliis ex albo variegatis. *H. Leyd.*

Idem foliis subrotundis, limbis & spinis utrinque argentatis, *Aquifolium elegans*, *D. Doctoris Eales.*

Idem longioribus foliis, limbis & spinis, ex unico tantum latere per totum argenteo pictis.

Idem foliis oblongis spinis & limbis aureis. *H. Leyd.*

*Aquifolium Americanum* supernâ facie spinis horridum. *Aquifol. echinatâ* folii superficie, *Cornuti de Pl. Canad.*

*Aquifolium* amplissimis foliis, ex *Insulis Fortunatis*. *Phytogr. Tab. 262. fig. 1.*

*Aquifoliæ* facie arbor *Malabarica*, *Acanthii* flore albo cucullato. *Phytogr. Tab. 261. fig. A.* *Paina Schulli. H M. P. 2. fig. 48.*

**A Q U I L E G I A** *Virginiana* flore rubescente. *Park. Th.* *Aquilegia pumila præcox Canadens.* *Cornut. de Pl. Canad.*

**A R A C H** vulgò. vid. *Apioscorodon.*

**A R A C H I D N A** *Indie* utriusque *tetraphylla*. *P B P.* vid. *Sena tetraphylla.*

**A R A C U S** sub terrâ filiquifera *Americana* magna. *Park. Theatr.* vid. *Sena tetraphylla.*

**A R A N T I A** nana *Sinensis*, ex *Cap. Bon. Spei.* vid. *Malus arantia.*

**A R B O R** *Americana* amplissimis, rugosis foliis; ferè orbiculatis, glabris, ex *Syrinam*: àn Arbor *Brassicæ* folio excelsissima. *C B. P. 512.* *Uhebebasou. Thevet. Singul. cap. 51.* *Uhebebasou* fructu pedis longitudine, quo apum examina nutriuntur *Thèvet. Hist. Lugd.* Quam arborem inter *Venenatas*, binis nucleis (*Diaphragmate Cartilagineo*) à se invicem secretis, *C. Bauhinus* recenset.

Arbor *Americana*, ampliss. foliis, aversâ parte, nervis extantibus, hirsutie ferrugineâ refertis. **Leather-Coat Tree** (i. e.) *Scortea* arbor *Barbadensibus* dicta. Fortè *Ezquahuitl* secunda foliis orbiculatis hirsutis & asperis. *Fr. Hernandez. apud Recc. lib. 3. cap. 23.* hujus imaginem, sub *Scortex* titulo in *Phytograph.* exhibetur. *Tab. 222. fig. 8.*

Arbor *Indica* baccifera *Verbasci* foliis lanuginosa, **Loblolly** *Barbadensibus* dicta. Fortè *Lablari* arbor *Americana*, ex *Bonairo*. *P B P. 345.* àn *Mureci Pernambucensium*; *Pison. lib. 4. cap. 32.* Fortè etiam *Ezquahuitl.* (i. e.) *Sanguinis* arbor 1a. *Verbasci* folio, *Hernand. apud Recc. lib. 3. cap. 22.* Arbor



Arbor *Americana* ampliff. pergamenis foliis, superficie nitidissimâ, fructu Pyriformi, crustaceo cortice loricato. *Phytogr. Tab. 267. fig. 1.* *Pyrus Hispanica Hughesii, Medic. Americ. fol. 40.* **Spanish Pear** nostratibus; & quibuld. **Shell-Pear**, (*i. e.*) *Pyrus corticosus & testaceus*; aliisque **Avocata-Pear**, *Hispanis* verò *Aguacata*, sive *Aguacata* nuncupatur; & indè fortè *Agnacat Scaligeri*. Pyri specie cujus fructus validos adeò efficit ad coitum, ut propius miraculo sit ejus efficacia. Ad Cucurbitiferas potiùs releganda est. Jaracaba fortè *Americana*, D. Ogilbey. *Americ. p. 512.* & Irucaba Insulæ *Maragnanae*. de *Laet. Ind. Occid. lib. 16. cap. 11.* & nominari possit, *Cucurbitifera arbor Americana, Prunos ferens Pyriformes.*

Arbor *Americana* amplioribus subrotundis duris & nervosis foliis, fructu pugni majoris magnitudine. *Insulis Fortunatis & Jamaicensibus* nostratibus Mamee nuncupatur. *Phytogr. Tab. 268. fig. 1.* à *Mommina*, s. *Mamee arbore.* *Phytogr. Tab. 204. fig. 2. plurimum diversa: Est equidem Arbor vinifera, & fortè Arbor vinifera Conton Juglandi similis.* J. B. T. 1. atque hùc fortè spectat *Anda Brasiliensibus Marcgrav. l. 3. c. 4. f. 110.* àn *Mamey Nierembergio. lib. 14. cap. 102.* Hujus autem fructus ut *Mala-granata* sunt putamine corticoso.

Arbor *Americana* pomifera frondosis ramulis, foliis amplis longioribus, obtusis, duris & venosis margine æquali. Mamee Sappota *Jamaicensibus* audit. *Phytogr. Tab. 268. fig. 2.* Mamei arbor *Castaneæ* formâ, fructu etiâ maximi *Cydonii* globum superante, *Scaligeri, Hist. Lugd. fol. 1836.* cujus fructus officulum, falsò *Avellanæ Indicæ* titulo à *Clusio* depingitur, & describitur. *Annot. in Garcie. lib. 1. cap. 26.* Occurrit etiâ elegans ejus & accurata Icon in *Musæo Calceolariano. Sect. 5. ad Pag. 602.* Itèm in *Historia Lugd. lib. 18. fol. 1767.* sub *Avellanæ Indicæ* tertio genere *Matthioli* ponitur. Fructus oblongus utrinque acuminatus, s. conicus, lævis, splendens, spadiceus, quæ *Castaneæ* species videtur, *Musæi Cortenian. Raii Hist. Pl. 1800.* Fortè *Eyrires Brasilianorum. Ogilv. Americ. fol. 488.* Balsami Peruviani fructus. *Clusii exot. lib. 2. cap. 29.* Eum accepit *Lusitanus* quidam Mercator, *Petrus de Frias* nuncupatus, à *Provincia Peru* Prorege, pro fructu illius arboris in *Nov. Orbe* nascentis, ex quâ Balsamum elicitur, cum ipso Balsami Oleo; *Historia Lugd.* eandem Iconem habet nomine Fructus Balsami. *lib. 18. fol. 1859.* Ut plurimæ sunt Arbores *Novi Orbis* alumnæ, quæ Balsamum fundunt; sic plures apud *Indos*, diversi generis arbores extant, quæ sub hoc cognomine militarunt, ità Fructus ille *Clusianus* quanquam non sit de arbore Balsamifera prima, *Hernandez, apud Recc. fol. 51.* Sed potiùs ex arbore quam *Pecuniæ* vocant, adnotante *Terentio*, ad *Henricum Corvinum Batavum*, Pharmacopæum Romanum, exoticorum diligentissimum Scrutatorem missus fuit, sub nomine *Mamei*. Itèm *Cachima*, pomum in *Insulis Caribeis*, s. *Anon Oviedi* in *Tabulis* suis, à *Tertræo* inscribitur *Momins*, quod idem est cum *Corasol* apud *Rochfortum des Antilles. 651.* cujus itidè *Prunes de Moubain*, ex quorum succo fit *Ouicon*, potus qui non secùs atque optimum vinum inebriat, quibusdam Autoribus *Mommina*, titulo insigniuntur.

Arbor *Utriusque Indiæ* pomifera, cujus fructus officula describit *Clusius* *Avellanæ Indicæ* minoris nomine erroneo. *Annot. in Garc. ubi suprà.* *Avellana Indica* pro Balsami fructu missa, ejusque species alia minor. J. B. T. 1. l. 3. 294. Fructus Balsami *Petri de Frias* minor *Herculis Saxonie*. de *Mespilorum* genere nobis videtur. Ex *Utraque Indiâ*, hujus nucleos habuimus. Proindè nominetur, *Mespilus* arbor.



- arbor *Utriusque Indiae*, fructu oblongo, parvo, nucleis binis, prænitentibus, inclusis, *Sappadillæ Hispaniolensium* æmulis.
- Arbor *Cacavifera Americana*, cujus fructus folliculo inclusus *Amygdalorum* speciem refert. *Phytogr. Tab. 268. fig. 3.* *Cacava Quahuitl.* seu Arbor *Cacavi*, *Cacavifera Hernandez*, apud *Recc. fol. 79. Nieremberg. Hist. exot. l. 15. c. 22. Cacao Jof. Acoft. vel Ind. Occ. p. 9. l. 4. c. 22. Clus. exot. Amygdalis similis Guatimalensis. C B P. 442. Cacavate Benzoini Ind. Occid. Part. 5. l. 2. cap. 16, & 17. Avellana Mexicana* cujus fructum *Indigenæ Cacao* appellant *Guilandini.*
- Arbor *Malabarica mucronatis*, firmioribus, venosis foliis, *Cacaviferæ* æmulis, floribus ad summum ramulorum comantibus. *Phytogr. T. 262. fig. 3.* Fortè *Tlalcacahuatl Nov. Hispan. s. Cacavifera minima*, quarta *Hernand. apud Recc. fol. 80.*
- Arbor *Americana* ampliore folio trinervi inferius alba lanugine incano. *Phytogr. T. 250. fig. 2.* Fortè Arbor racemosa *Brasiliana*, foliis *Malabathri. Breyn. Cent. 1.* Fortè etiàm *Miva Brasiliensibus Marcgr. 117.*
- Arbor *Americana* foliis è concursu nervorum imâ parte longiùs productis, subtus lanugine candicante tomentosis. *Rotennissade Syrinamensibus dicta. Phytogr. Tab. 249. fig. 2.*
- Arbor *Americana Malabathri* subrotundis foliis, subtus lanugine ferrugineâ villosis ex *Sirinam. Phytogr. T. 249. fig. 3.*
- A R B U S C U L A *Jamaicensis* pentaneuros, foliis crassis, levitèr dentatis, supernâ facie ferrugineâ, pronâ, candicante, & molli lanugine, villosis. *Phytogr. Tab. 264. fig. 3.* àn *Texhuatl. Nov. Hispan. Terentii* apud *Recc. fol. 413.*
- Arbuseula *Jamaicensis* *Malabathri* angustioribus foliis levitèr crenatis, supernâ facie per siccitatem nigris, subtus autèm argenteis & præ lævore splendentibus. *Phytogr. T. 265. fig. 1.*
- Arbuseula *Jamaicensis* quinquenervis minutissimè dentatis foliis, & caule pubescentibus; flosculis ex sinu foliorum gemellis. *Phytogr. T. 264. fig. 1.*
- Arbuseula trinervis, aut potiùs pentaneuros foliis crassis hirsutis, ad ambitum rarioribus ferris ex *Insulâ Jamaicensi. Phytogr. T. 264. fig. 2.* Fortè *Coaghyuyo Brasiliensibus. Pison. fol. 217.*
- Arbor *Americana* latiori, & acuminato folio trinervi, utrinque glabro, & margine levitèr crenato. *Mespilboom Belgis Syrinamensibus* nuncupatur. *Phytogr. T. 249. fig. 4.* àn *Mespilus*, folio *Laurino*, ex *Syrinamo Hort. Amstelod. 232.*
- Arbor *Syrinamensis* *Canellæ* folio máximo utrinque glabro. *Phytogr. T. 249. fig. 5.*
- Arbor *Americana* quinque-nervia, comantibus flosculis, foliis amplissimis glabris pronâ parte albicantibus. *Phytogr. T. 264. fig. 4.*
- Arbor *Syrinamens. & Antegoana*, foliis venosis supernâ parte glabris, subtus densâ lanugine *Veluti* instâr velatis. *Pau-boom Belgarum. Phytogr. T. 250. fig. 1.*
- Arbor *Americana* folio prægrandi acuminato venustè venoso, aversâ parte villis virentibus obrito, ad pediculum strictiori. *Phytogr. T. 250. fig. 4.* àn *Ibacuru-pari Brasiliensibus Marcgr. lib. 3. cap. 11. fol. 119.*
- Arbor *Americana* densioribus foliis pronâ parte villosis, supinâ splendentibus, glabris. *Phytogr. T. 250. fig. 3.* *Cinnamomum* putatum ex *Syrinam.*



Arbor *Sirinamensis* Hydrolapathi foliis, fulvâ lanugine, pronâ parte villosis. *Gumbboom* à *Belgis Sirinamensibus* nominatur. Habetur Icon in *Phytogr. Tab. 250. fig. 5.*

Arbor *Americana* prælongo, & angusto, mucronato folio, inter Garyophyllum & Piper Orientale, medio sapore, aromatico. ex *Sirinam. Phytogr. Tab. 250. fig. 6.* Nucis Moschatæ titulo inscriptam inveni. àn Nux Moschata Sylvestris *Surynamensis*, foliis majoribus, nucleo olivari, oblongo parvo. *Breyn. Prodr. 2. fol. 77.*

Arbor *Indica*, Mali Medicæ amplioribus foliis *Maderaspatana. Phytogr. Tab. 147. fig. 3.* fortè Ponna, s. Ponnamaram. *H M. P. 4.* Cujus Lachryma resinosa, àn sit species Guttæ Gambi, quæritur à *Commelino* in Not.

Arbor *Cambodiensis* Guttam Gambi fundens, ex dictæ, *Cl. D. Herm.* à præcedenti plurimùm diversa.

Arbor *Africana* subrotundo folio, margine denticulis acutis asperato, floribus pentapetalis atro-purpureis. *Phytogr. Tab. 263. fig. 1. & 2.* à *Promontor. Bon. Spei* allata est, & munere humaniss. Viri *D. Alexandr. Brown* accepimus. Ejusque ramulum aliquandò habuimus ex *Oris Cormandel.*

Arbor *Maderaspatana* Galactoxyli *Americani* foliorum æmula. *Phytogr. Tab. 143. fig. 4.* fortè *Tsjola Malabarensium. H M. P. 3.*

Arbor *Indica* *Tsjocatti Malabarensium* haud absimilis, è *Maderaspatan.* foliis autem non crenatis. *Phytogr. Tab. 147. fig. 2.*

Arbor *Maderaspatensis* Pavette, s. Malle-amothæ *Malabarorum*, & *Vasaveli* quorund. haud abludens; foliis autem alternis. *Phytogr. Tab. 147. fig. 1.* àn Arbor *Malabarensium* fructu *Lentisci. C B P. & Joan. Nieuhof. Itiner. fol. 167.*

Arbor *Americana* *Sindophoros Laurifolia*, *Ficus Indicæ* modo radicata, linteaminis speciem miræ tenuitatis, quasi telam araneam, sub externo cortice proferens. Logato arbor, & *Gawle-Tree Jamaicensibus* nostratibus dicta. *Enzanda* (fortè) *Philip Pigafetta. Regn. Congo descript. lib. 1. cap. 4. in Loandâ Insulâ ad ostia fluminis Coanza. regn. Congo, proveniens; sub ejus externo seu primo cortice invenitur quasi tela quædam, quâ contusâ, purgatâ, deindè in longitudinem expansâ, plebi in Vestimentorum usus servit. Eadem est (ut suspicor) Mahot arbor Caribana Rochfort, des Antill. Ex cujus cortice, decoris gratia, pro vestibus fiunt institæ & lacinix, ut notavit Ogilbeius Americ. fol. 348. Eadem & Matombe arbor Æthiopica ejusd. Ogilb. Afric. Ex hujus enim corticibus, panniculos quosdam; & linteamina in longitudinem evulsos Fungenenses, Populi Inferioris Æthiopiæ, pro mercibus permutant: Iisdem etiam panniculis Lusitani in Lovando Insula, semper pro nummis usi sunt; atque etiamnùm hujus loci Indigenæ, vice monetæ probæ utuntur, non minùs eorum copiâ, quàm nostri suo auro superbi-entes. Insulæ *Jamaicensis* alumna est. Et à Ficu arbore nostra *Americana* Arbuti foliis non ferratâ, *Phytogr. Tab. 178. fig. 4.* haud multùm abludere videtur. àn Gelsomoro arboris ab incolis dictæ cortex, in quibusdam *Indiæ* locis pecunia est. *C B P. 513. Pigafett. ibid.**

Arbor *Americana* *Tænidophoros*, Vittas & tæniolas plurimas tramosericas, se invicem incumbentes longitudinalitèr, sub externo cortice ferens. *Virginienfibus* nostratibus, the Riband Tree & interdùm Lace Tree, & Wasse Tree, nuncupatur. àn hæc sit veriùs Mahot arbor Caribana *D. Rochforti. Vid. Ogilb. Americ. fol. 377.*



Arbor *Indica* Lauro-cerasi foliis, è *Maderaspatan*. fortè Kopang arbor *Novanglicana* antiarthritica. P B P. Hujus Icon habetur *Phytogr.* 148. fig. 2.

Arbor *Jamaicensis* Laurifoliis, pronâ parte Cyprii expoliti colore fulgentibus, & quasi *Sandyce* tinctis: *Chrysodendros Americana*. *Phytogr.* Tab. 263. fig. 2. Hujus fructus *Star-apple* nostratibus audit. *Melanastrorodendros*. Et fortè de genere *Mespilorum*. *Sappadillia's Hispaniolensibus* dicta.

Arbor *Jamaicensis* inodora, foliis *Camphoriferæ* similibus. *Phytogr.* Tab. 265. fig. 2.

Arbor *Sycophora*, *Caryophylli* aromatici foliis & facie, *Jamaicensis*. *Phytogr.* Tab. 266. fig. 1.

Arbor *Sycophora Jamaicensis* foliis minoribus. Fortè Itti alu. *H M. P. i.* fig. 26. Fortè etiâ, *Ficus* arbor densioribus foliis parvis integris *Ambonensis*. *Phytogr.* Tab. 243. quam accepi ab honesto Viro *Casparo Gemperle Germano*, *Æstuarii* in *HRH.* custode diligentissimo. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr.* Tab. 266. fig. 2.

Arbor *Jamaicensis* Bon *Arabum* foliis haud multum impar.

Arbor *Americana* *Sebestenæ* foliis pallidioribus, longis petiolis infidentibus, cortice candicante. *Phytogr.* Tab. 270. fig. 2.

Arbor *Orientalis* baccifera, Laurifoliis crassis, & venosis, per siccitatem atronitentibus, quasi *Vernice* tinctis, polypyrene. *Phytogr.* Tab. 140. fig. 2. àn *Perin Panêl HM. P. 5:*

Arbor (fortè) *Balsamifera*, àn *Nerio* affinis *Malabarica* summo folio mucronato? *Phytogr.* Tab. 269. fig. 4. ad oras *Malabaricas* collegit *D. Alex. Brown*. Et ejusd. ramulum jam olim accepimus ex *Oris Cormandel*.

Arbor (fortè) *Balsamifera*, àn *Nerio* affinis *Malabarica*, prælongis rigidioribus & subrotundis foliis per siccitatem nigris. *Phytogr.* Tab. 270. fig. 1.

Arbor *Virginiana* *Pisaminis* folio baccata, *Benzoinum* redolens. *Phytogr.* 139. fig. 3: Fortè *Balsamum* ex *Peru*. *J B. T. i.* àn *Benjoinum*, cujus Arboris folio *Citri*. ejusd. *J B.* *Benzoinifera* aut Arbor *Benevifera Garcia*. Fortè *Izacariba Brasiliensibus Pison. fol. 122.* *Horti Comptoniani* est singulare Ornamentum. Depingitur & in *Phytogr. ubi supr.* ejusdem ramulus sub Verni temporis exortum, flosculis hexapetalis muscosis, ex luteo virescentibus, plurimis simul ad foliorum ortum onustus; quos succedunt baccæ monopyrenes.

Arbuseula baccifera *Canariensis*, *Syringæ* cæruleæ foliis, purpurantibus venis, fructu monopyreno. *Yerva-mora Hispanorum. vid. Suppl. pag. 399.*

Arbor *Americana* *Guaiaci Patavini* folio, *Styracis* fructu, *D. Herm.* monente insigni Botanico. *D. D. Richardson.* fortè *Guaiaco Occidico* similis Arbor, *Park. Th. 1587.*

Arbor Insulæ *Jamaicensis*, *Guaiavæ* foliis & facie, fortè *Guititoroba Brasiliensium. Marcgr. lib. 3. cap. 9. fol. 113.* *Steen Apple Belgis. Phytogr. Tab. 267. fig. 2.*

Arbor *Malabarica* folio *Sambac Arabum* τετραπτερό, s. quadripinnato fructu, quatuor foliaceis secundum longitudinem, extantibus alis, donato. *Phytogr. Tab. 263. fig. 3.*



Arbor *Indica* Mali aurantiæ foliis obtusioribus è *Maderaspatan*. *Phytogr. Tab. 142. fig. 2.* àn Akara Patsjotti. *H M. P. 5.*

Arbor lonchifolia *Ind. Or.* comantibus floribus, & ferè corymbosis. *Phytogr. Tab. 142. fig. 1.* Haud tam pridem didici, hanc arborem re verâ nihil aliud esse quàm Mao, s. Mau, vel Mangas, *H M. P. 4. Tab. 1. & 2.* Arbor Mangifera *Bontii*, lib. 6. cap. 5. Cujus fructus, Persicæ similis putamine villoso à *Casparo Bauhino* vocatur in *Pinac. 440.* & quibusdam Ambo & Amba nuncupatur.

Arbor *Javanica* Persicæ foliis. *Herm. Cat. Mss.* è *Maderaspatan*. Fortè Curutu-pala *H M. P. 1.* àn Arbor *Indica* Mali Persici folio? *Hort. Beaum. fol. 10.*

Arbuscula viscosa, Elæagni foliis lætè virentibus, *Americana* tricoccos; aliàs, Ricini fructu Arbuscula *Bermudensis* foliis longioribus viscosis, nostratibus colonis *Broom* nuncupata. àn Saponaria tricoccos minor *Americana*? Hujus exhibetur Icon in *Phytogr. Tab. 141. fig. 1.*

Arbor aculeata *Barbados* Infulæ, ramulis incurvis, Scenam topiariam efformans Lachrymifera, fortè Staecteflua, s. Myrrham liquidam fundens *Americana*. Nostratibus Colonis *Weeping Bower* nuncupata. *Phytogr. Tab. 145. fig. 3.* àn Acaciæ cognata planta? *I B. T. 1. foliis & spinis Fjubar concoloribus, cui surculi tortiles, per crebra intervalla geminis aculeis donantur; cornua limacis exerta referentibus, &c. gerunt.*

Arbor lactescens aculeata, foliis Quernis *Americana*, Bdellifera (fortè.) Arbor, s. Bdellium ferens in *Americâ*. *Phytogr. Tab. 145. fig. 2.* Arbusculâ *Portoricensis* lactescens, foliis Quercinis, spinis geminis ad singulorum foliorum ortum, exasperata. *H. Beaum.* Quercinis foliis Arbuscula spinosa lactescens, *Portoricensis* *P B P.* àn Ahuapatlis Tilacensis? *Hernand. apud Recc. fol. 91.*

Arbor aculeata, *Caroliniana*, spinis grandioribus, crebris tuberculis innascentibus; cortice urens. Arbor spinosa *Virginiana* caudice & ramis Lanigeræ spinosæ *Malabaricæ* similis, *Raii Hist. Pl. 1800.* Clava *Herculis Grevii* in *Mus. Societ. Regia. in Horto Med. Chelseiano* auspiciis *D. Samuel Doody* nunc colitur.

Arbor *Bisnagarica* Myrti amplioribus foliis crassis, per siccitatem nigris, Cubebæ sapore. *Phytogr. Tab. 140. fig. 1.* àn Myrtidanum Hippocratis? fortè Comacum Antiquorum, s. Cumuc Javanensibus modernis, quo nomine & Cubebæ ab iis insigniuntur.

Arbor è *Cormandel* vasculifera, foliis amplis Myrsinites rigidioribus nostra *Raii. Hist. Plant. Phytogr. Tab. 13. fig. 4.*

Arbor *Orientalis* Bellidis spinosæ solidioribus foliis, capsulis parvis quadripartitis: *Kiluke Cingalensibus* dicta. *Phytogr. Tab. 77. fig. 3.* Hujus specimen exsiccatum Insigni Botanico, *D. D. Tancred. Robinsono* debemus.

Arbor *Aristolochiæ* foliis *Maderaspatana*, fructu parvo Medicæ aduiscar involuto. *Phytogr. Tab. 13. fig. 2.* àn Gummi Elemi fundens Arbor *Orientalis*?

Arbor *Bisnagarica* Tiliæ foliis, Canschi *Malabaricæ* aliquatenus accedens, *Phytogr. Tab. 143. fig. 2.*

Arbor *Americana* Oleomelliflua, cuspidatis foliis, crenatis, & dilutè virentibus, polypirene. *Phytogr. Tab. 142. fig. 3.* Wild Honey Tree, (i. e.) Agriomelodendros, *Barbadensibus* dicta, eò (fortè) quòd in hujus Arboris ramos, Sylvestres Apes pro mellificiis suis, favos construunt. àn Micatzonte camimiaoatl. *Nov.*



*Hisp. Terentii* apud *Reccum. fol. 333.* fortè etiam Arbor *Brasiliana* cujus ramorum extremitatibus, Vespæ nidificant apud *Pisonem. lib. 5. cap. 12. fol. 287.*

Arbor *Americana*, foliis ad *Chenopodii* ampliora folia, accedentibus, ex Insulâ *Barbadosi.* *Phytogr. Tab. 242. fig. 1.*

Arbor *Americana* Faginis foliis glabris, crenis rarioribus, per marginem dentatis, ex Insula *Barbadosi.* *Phytogr. Tab. 241. fig. 3.* Arbor (fortè) ex quâ gummi *Almefiga* dictum, destillat in *Angolâ.* *Ogilb. Afr. fol. 557.*

Arbor *Zeylanica*, Cotini foliis subtus lanugine villosis, floribus albis, *Cuculi* modo lacinatis. *Phytogr. Tab. 241. fig. 4.* àn Frutex innominatus secundus, *Marcgr. Hist. Pl. lib. 2. cap. 14. Jonst. Dendrol. 465?* àn fortè Sorbi species. à *Cl. viro D. Tancred Robinsono* accepimus.

Arbor *Americana* Mancinello dicta, fructu pomi venenato, nucleis septenis & pluribus, in Officulo muricato, totidem loculis dispertito, inclusis. *Phytogr. Tab. 142. fig. 4.* Mantionel *Ligonis* nostri *Hist. Barbadosi. fol. 68.* Prunifaciè fructus Mansamillias dictus *Purchesi Navigat. T. 1. Sect. 1. lib. 4. c. 4. fol. 415.* Macamillo de *Laet. Ind. Occid. lib. 1. cap. 1.* àn Arbor venenata fructum ferens pilæ magnitudine, visu speciosum, sed venenatum? *Thevet. Hist. Lugd. 1834. forte Juglandis ferè facie, Fructus exoticus, sulcatus, tuberosus. J. B. T. 1. lib. 3. fol. 399. forte etiam Fructus peregrinus orbiculatus novem nervis distinctus minor, cum Officulo anguloso ejusd. J. B. Fructus Orbicularis minor novem venis, ut & semen distinctus. C B P. Fructus Orbicularis peregrinus secundus nervis distinctus. Clus. exot. lib. 2. cap. 10.* Hujus poma liquamen illud pretiosum, quod voce peregrinâ nominamus *Ceshup*, & in divitum ganneam ab *India* usque adfertur, maximè olent.

Arbor *Americana* Salicis folio frondosa, *Bermudensibus Birch Tree* (i. e.) Betula arbor dicta. *Phytogr. Tab. 241. fig. 5.* fortè *Salsaf Syrorum* *Rawolf. Hist. Lugd. app. ad D. Petever* transmissa.

Arbuscula *Ind. Or.* perrara, Saligneis rigidioribus foliis è regione binis, quodammodo adumbratis, Lithospermi augulosa semina, in spicâ magnâ speciosâ, quàm plurimis ramulis falcatis, coagmentatâ, proferens.

Arbuscula *Canariensis* Salicis, aut potiùs Oleæ *Sylv. Barbadosium* foliis & facie, seminibus ad tactum (quando maturis) è capsulis cùm strepitu profilientibus, *Snap Tree* nostratibus, vulgò. in *Hart. Reg. Sancti Jacobi* apud *Westmonasterium* præterito anno curâ *D. Georg. London* ex Seminibus natæ sunt quamplurimæ hujus adolescentæ arbusculæ. Iconem videsis in *Phytogr. nostrâ Tab. 313. fig. 1. nond. edit.* Quoad Vascula seminalia magnam habet convenientiam cum *Curini* Speciebus *Malabarorum.*

Arbor *Æthiopica* leguminosa, cordatis foliis, filiquis latis, brevibus, ruffâ lanugine vestitis, *Phytogr. Tab. 266. fig. 3.* ab Ornatisissimo viro *D. Alexand. Brown* accepi.

Arbuscula *Indica* filiquosa, Coryli foliis parvis ferratis, summâ parte sinuatis. *Phytogr. Tab. 139. fig. 5.* àn Uxana *P. Amman. Charact. Plant. 443.* Karin *Tagera H M. P. 6. Tab. 25.*

Arbor filiquifera Faginis foliis *Americana*, floribus comosis. *Phytogr. Tab. 141. fig. 2.* àn Arbor *Sinus Sancti Augustini* Fagi species, quæ fructum Fabis similem fert. *Jonst. Dendrograph. fol. 209.* Fortè etiam Frutex innominatus, ligno saligno, foliis ad



ad Myrti folia accedentibus, sed longè majoribus, *Marcgr. fol. 82. Spanish Oak*, (i. e.) *Quercus Hispanica Barbadosibus* nostratibus dicta.

*Arbuscula Zeylanica*, *Aceris* folio baccifera, foliis è directo, magis angulosis. *Phytogr. Tab. 14. fig. 3.*

*Arbuscula Bisnagarica*, *Aceris* folio parvo, aculeata, foliis è regione binis. *Phytogr. ibid.*

*Arbuscula è Maderaspatan*, foliis *Aceris*, alternâ vice, lucidè virentibus. *Phytogr. ibid.* àn *Buebenda Planta Orientalis Zanon. Istor. Bot. cap. 31. fig. 23. fol. 60.*

*Arbuscula Bengalenfis*, *Aceris* minore folio incano, alternatim posito. *Phytogr. ibid.*

*Arbuscula Indiae Orient.* corticem tenuissimum, lævem, colore & sapore *Coryophylli aromaticum* proferens. àn. hujus cortex sit *Seitaragi Arabum?* *J B. T. 1. l. 4. fol. 462.*

*Arbuscula Vetadagû Malabarica* similis è *Maderaspatan*. *Phytogr. Tab. 143. fig. 3.*

*Arbuscula Jamaicensis* *Betulæ* foliis accedentibus, levitè crenatis. *Phytogr. Tab. 262. fig. 2.*

*Arbor Jamaicensis* *Pruno sylvestri* affinis *Cannadensis* simili folio, *Betulæ* in modum virgulosa; *Phytogr. Tab. 268.* àn *Glans Unguentaria Matthioli, C B P.* *Balanus Myrepica Pharagon* incolis ad Montem *Sinai Bellonii Obs. l. 2. c. 61.* *Macalep album Rawolf. fortè etiam Avellana purgatrix, & Ben Monardis, cap. 47.*

*Arbor Insulæ Jamaicensis* alterno situ, *Fraxini* foliis, margine non crenatis. *Phytogr. Tab. 270. fig. 3.* Bacciferam esse suspicor.

*Arbor Jamaicensis* *Fraxini* alatis foliis, floribus pentapetalis, corymbosis. *Phytogr. Tab. 269. fig. 1.* àn *Cuitlacopalli, s. Stercus Copallis, Copallifera sexta, Leprosa secunda Hernandez apud Recc. fol. 48.*

*Arbor Malabarica* *Fraxini* ferè folio, Officulo fructus octangulari. *Phytogr. Tab. 269. fig. 2.* àn *Neli-pouli, s. Bilimbi altera minor. H M. Part 3. fol. 57.*

*Arbor Americana* alatis foliis pomifera, *Jamaicensibus Anglis, the Nasebury Tree*, (i. e.) *Arbor Naseburiensis* nuncupatur. *Phytogr. Tab. 269. fig. 3.* de *Mespilorum* genere ut suspicor. *Sappodillias Hispaniolensibus* dicta.

*Arbuscula Azederachti* ferè foliis alatis, ex *Oris Cormandel.* *Phytogr. Tab. 270. fig. 4.* àn *Frutex Petroselini* foliis *Virginianus, D. Banist. Cat. Virgin?* àn *Copalli montana, s. Tecopalli Quahuitl, Copallifera 5a. montana, Hernand. apud Recc. fol. 47?*

*Arbor Americana* alatis foliis, succo lacteo venenata. *Phytogr. Tab. 145. fig. 2.* Fortè *Ahoay-miri. Pison. fol. 308.* Fortè etiam *Ahoay-guacu, s. major.* *Arbor nucifera Brasiliana* Mali foliis foetidissima; sed nostra folia non foetant; ideoq; àn potius *Tangaracæ* secunda species, *Pisonis fol. 301?*

*Arbor Americana* *Lentisci* foliis fervida. *Phytogr. Tab. 141. fig. 3.* àn *Holoquohuitl, s. Arbor Chilli, Mexicensium Hernand. fol. 50. Fustickwood Nevissensibus Anglis* perperam dicta.

*Arbuscula Arbuti* alatis foliis, *Africana*, fortè *Jamboloins. Park. Th. 1636.* Hujus exemplar apud *Promontorium Bonæ Spei* collectum, singulari amicitia nobis communicavit, Ornatiss. nec non Clariss. vir *D. Patricius Adair* Medicinæ & Chirurgiæ facultatibus exercitatissimus. àn *Carandas Garcia C B P. 460 Auzuba Oviedi, &c.*



Arbuscula *Maderaspatana* Ligustri facie, folio Visci arborei colore & consistentiâ pari: *Phytogr. Tab. 143. fig. 1.* àn Kasjou-panel. *H M. P. 5.* est enim Baccifera, ut nuperrimè nos monuit D. *Jacobus Petever.*

Arbor Ingæ *Brasilianæ* foliis *Africana* tricoccus, fructu Mehenbethene *Cortusi Clusio*, accedente, ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab. 144. fig. 2.*

Arbor *Americana* pinnatis Fraxini foliis, fructu reniformi, Phaseolum exprimente, *Spanish Ash* (i. e.) *Ornus Hispanica*, *Barbadensibus* nostratibus dicta. *Phytogr. Tab. 140. fig. 3.* est Balsamifera fortè. àn *Hoitziloxitl Mexicensibus? Hernand. fol. 51?* fortè *Taxoetliferà Mexicana Nierembergii Hist. exot. lib. 14. cap. 62.* huic nostræ quodammodò accedit. àn huic fortè convenit ~~Pekey arbor Maragnane Insulae de Lact. Ind. Occ. lib. 16. cap. 11. / vid. Supp. p. 399~~

Arbor *Americana* baccata, cujus baccæ *Crapulariæ* (i. e.) *Tippie Berrys Barbadensibus* audiunt, eò (fortè) quòd in potu aliquandiù infusæ, crapulam inducunt. *Phytogr. Tab. 140. fig. 4.* Huic fortè spectat *Quauhcoyoli Chietla Nov. Hispan. Terent. apud Recc. fol. 400: Botanicis studiosis serius inquirendum propono; àn non hæc sit Arbor illa pumila, à Monarde, Benzone, Petro Ciecâ; aliisque de Rebus Americanis Scriptoribus memorata, quam Peruviani Cocam appellant, cujus foliorum gestatione, in ore, ut Orientales suo Betre delectantur Indigenæ, & velut Panchrestum quoddam Pharmacum circumferunt, quippè ejus præsidio freti, integrum diem, nullius nec cibi, nec potus egentes, iter faciunt. Imò hanc nostram Coca non accedere tantum, sed eandem planè arborem esse existimo. Myrto similis *Indica* fructu racemoso. *C B P. 469. Coca herba Benzoni. Part 6. l. 3. c. 10. & Part. 9. l. 3. c. 20. & lib. 4. cap. 22.* ubi habetur, *Indis hujus folia, pro pecuniâ esse. Arbor pumila foliis Myrti, vel ab aliis Rhoeis Coriariorum, cujus in toto Peru usus est folio ore detento famem & sitim aliquandiù inter peregrinandum levantes. Coca Indorum foliis Myrti. J B. plura de hæc vid. in Hist. Pl. J B. T. 1. lib. 4. fol. 240. & quomodò inebriat.**

Arbor tristis Myrto similis. *C B P. 469.* Arbor tristis, *Garcia, Acoftæ, Fragosi*, aliorumq; àn *Tsjovanna Amelpodi, H M. P. 6. Tab. 47?* Huc etiam spectat *Manjapumeram* ejusd. *H M. P. 1. fig. 21.* & rectius possit nominari. *Jasminum* arborefcens bacciferum, ex *Oris Malavaricis.* Hujus Iconem in *Phytogr. nostr.* depingi curavimus, ad *Tab. 262. fig. 4.*

Arbor *Americana* baccifera Myrtifolia, viminalibus virgis, s. Flagellifera major, *Barbadensibus Rodwood* dicta. *Phytogr. Tab. 139. fig. 6.* Myrtho Laurifolio similis *Americana. Hort. Beaum. 30.* & fortè Myrthi species ex *Vera Cruce P B P.* àn *Ibipitanga, s. Cerasus Brasilianus. Pisonis lib. 4. cap. 101.*

Eadem longiùs mucronatis, s. cuspidatis & punctatis foliis, sive Flagellifera minor. *Phytogr. ibid. fig. 7.*

Arbor spinosa rigidioribus Fraxinellæ foliis in aculeum abeuntibus, *Maderaspatana. Phytogr. Tab. 148. fig. 1.*

Arbuscula *Ind. Orient.* Hexaphylla, flosculis exiguis, in spicam positis, folio teneriori. *Phytogr. Tab. 148. fig. 3.*

Arbuscula *Ind. Orient.* Hexaphylla foliis firmioribus, sicatis floribus, calyce amplo. *Phytogr. ibid. fig. 4.*



- Arbor *Malabariensis* alatis foliis quinis, floribus muscosis in spicam digestis. *Phytogr. Tab. 265. fig. 4.*
- Arbor Prunifera Sphærulas saponarias ferens tetraphylla, ex *India Orient. Phytogr. Tab. 14. fig. 6.* àn Saponaria arbor *Zeylanica* trifolia semine Lupini. Conghas *Zeylonensibus. P B P ?*
- Arbuscula *Barbadensis* Cisti foliis ferrugineis, hirsutis, circa caulem, ad intervalla confertis. *Phytogr. Tab. 144. fig. 4.*
- Arbor *Syrinamensis* Lauri densioribus foliis, quinis, ab uno exortu prodeuntibus. Hujus ramulum, humanissimus Vir. D. *Geo. London* nobis amicè communicavit, qui à Reverendiss. Viro Domino de *Marces Hagæ-Comitis* in *Hollandiâ* rerum Botanicarum æstimatore insigni, cum aliis quamplurimis resiccatis plantis *Syrinamensibus* adhuc incognitis, accipiebat. Hujus habetur Icon in *Phytogr. T. 144. fig. 1. &* fortè sit Abavus *Æthiopicus Bello. J B. Tom. 1. lib. 1. fol. 109.* àn Baobabifera arbor *Alpini* de *Pl. Ægypt. fol. 66.*
- Arbor *Orientalis* digitatis *Samounæ* foliis, ferratis, floribus stamineis in spicam pendulis, fructu oblongo quadrilatero coronato. *Jambos Sylvestris, Samstravadi* dictus, alter *Raii Hist. Pl. 1480. Tsjeria Samstravadi. HM. P. 4. Tab. 7.*
- Arbuscula *Æthiopica* hexaphylla, s. Lauri *Stapelianæ* foliis, sericeâ lanugine obductis, circa caulem ad intervalla senis. *Phytogr. Tab. 265. fig. 3.* Domino *Alexandro Brown* debemus.
- Arbor venenata, *Lyfimachiæ* luteæ in modum trifoliata ex *Insulis Caribæis.* àn *Tangaraca 1. Pisonis fol. 301. Ervo de Rato. Marcg. lib. 2. fol. 60. Phytogr. Tab. 144. fig. 3.*
- Arbor *Americana* triphylla, fructu Platani quodammodò æmulante, Lignum fibularium (i. e.) *Buttonwood* nostratibus dicta. *Phytogr. T. 77. fig. 4.* De *Scabiosarum* est genere; & verius nominari possit *Scabiosa dendroides Americana* triphyllus, &c. Huc fortè spectat *Katou Tsjaka. HM. P. 3. Tab. 33.*
- Arbor *Ulmifolia Jamaicensis* baccifera, foliis ternis, ad nodos circa caulem ambientibus. *Phytogr. Tab. 266. fig. 3.* fortè *Tlahueliloca Quahuatl Mexicensibus. (i. e.)*
- Arbor *Infaniæ, Caragna* nuncupata. *Hernandez. apud Recc. lib. 3. fol. 56. Cujus Iconem videtis apud eundem Rescum. fol. 455.*
- Arbor aromatica è *Cormandél* Laurinis foliis binis, ternisve nostra *Raii Hist. Pl. fol. 1801. Phytogr. T. 14. fig. 5.*
- Arbor *Jamaicensis* densiori *Tiliæ* folio triphyllus, floribus coactiùs, s. spissiùs dispositis. *Phytogr. T. 267. fig. 2.* Eadem quæ *Phytogr. nost T. 147. fig. 5.* adposita est; sed hæc multò perfectior Icon. Hujus folia, sunt gustu acria & aromatica.
- Arbor *Americana* teneriori folio, floribus circa ramulos veluti corymbosis, ex *Insulâ Jamaicensi. Phytogr. T. 147. fig. 3.*
- Arbor *Americana* triphylla, numerosis staminulis, purpureis apicibus præditis, floris umbilicum occupantibus. *Phytogr. T. 147. fig. 6.* Huc fortè spectat *Nyrvala HM. P. 3. T. 42.*
- Arbuscula *Jamaicensis* *Ælæagni* foliis ternis, communi pediculo longissimo insidentibus. *Phytogr. Tab. 266. fig. 4.*



- Arbor Venenatæ quorundum similis trifolia, è *Maderaspatan*. àn Katou Mail-elou. *HM. P. 5. Tab. 2. Raii Hist. Pl. 1801.*
- Arbuscula *Jamaicensis* baccifera, *Hederæ Virginianæ* triphyllæ foliis crassioribus subtus lanuginosis. *Phytogr. Tab. 267. fig. 4.* Molaga maram. *HM. P. 5. T. 25.* huic maxime convenit.
- Arbuscula *Barbadensis* amplexicaulis triphyllus, Mail-elou *Malabarica* foliis tenerioribus, & petiolis alatis. *Phytogr. T. 145. fig. 4.*
- Arbuscula volubilis *Americana*, subrotundis *Cassia* fistulæ foliis lætè virentibus. *Phytogr. Tab. 146. fig. 3.* Arbori *Mandathiæ Ind. Orient.* haud absimilis, *Barbados* Insulâ, in sepibus frequens. àn *Colubrinum* lignum tertium *Garcia*, foliis *Lentisci*, f B? àn *Lauri* facie *Curassavica* Volubilis fructu *Mori*, radice croceâ, &c. *Hort. Beaum.* Rubi vel *Mori* fructu *Americana* Arbor foliis *Laurinis Morillie* vulgò: P B P. Hujus ramulum ex Insulâ *Barbadensi*, modò cum aliis quampluribus exsiccatis Plantis exoticis, ab honesto Viro *Jacobo Reede* in *Angliam* primò allatum observavimus. *vide Suppl. pa. 399.*
- Arbusculum *Americanum* amplexicaule, Cerasi folio corymbosum. *Hort. Chelseiano* in hodiernum viget. *vide Suppl. p. 399. Tab. 146 fig. 2.*
- Arbor *Americana* convolvulacea. *Broadleaf* (i. e.) *Platyphyllos Barbadosibus* dicta, foliis ferratis. *Phytogr. Tab. 146. fig. 1.*
- Eadem foliis non ferratis.
- Arbor Vitæ, *Park. Theatr.* Arbor Vitæ, s. *Paradisiaca* vulgò dicta, odorata ad *Sabinam* accedens. f B. T. 1. l. 9. 286. *Thuya Theophrast.* C B P. 488. Arbor *Filici* similis *Oviedo*. *Thuyæ* genus tertium. Arbor Vitæ *Gallis.* Hist. Lugd. fol. 60. *Hac Arbor è Canadâ Francisco primo Galliarum Regi Arboris Vitæ nomine oblata; fortasse ab odoris vehementia, vel ob immortalem ejus comam, sic dicta.*
- Arbor *Americana* Morifolia vasculo feminali verrucoso, Coni æmulo ovali, Balsamum olente. *Phytogr. vid. Cenchramidea ejusd.*
- Arbor amara falsò dicta. vid. *Agerato affinis.*
- Arbor *Brasilia Theveti.* Hist. Lugd. vid. *Acacia.*
- Arbor *Indica* Fraxino similis *Olex* fructu. C B P. vid. *Olea Malabarica.*
- Arbor *Indica* Fraxini folio, cortice spinoso *Raii.* vid. *Christophoriana.*
- Arbor *Indica* spinosa muricatis filiquis, *Park.* vid. *Acacia gloriosa.*
- Arbor exotica spinosa foliis *Lentisci* C B P. vid. *Acacia.*
- Arbor exotica *Lentisci* folio. C B P. vid. *Moringa.*
- Arbor *Indica* Juglandis folio Balsamifera. *Hort. Lips.* vid. *Balsamifera.*
- Arbor lanigera spinosa *Malabarica Commelin.* vid. *Gossypium.*
- Arbuscula *Americana* *Limonix* fructum ferens *Jamaicensibus Pinguin* dicta. vid. *Cucurbitifera.*
- Arbor *Mexicana* fructu *Castaneæ coccifera*, C B P. vid. *Orleana.*
- Arbor *Platani* folio, fructu *Peponis* magnitudine eduli, P B P. vid. *Cucurbitifera Ficus*
- Arbor *Saponaria Americana Raii.* vid. *Prunifera.*
- Arbor *Sancti Thomæ*, s. *Affitra Zanono Breyn.* vid. *Mandaru.*
- Arbor *Solis Zeylanensibus.* vid. *Alcea Indica.*
- Arbor trifolia *Indica.* f B. vid. *Phaseolus.*



Arbor Venenata quorundam. *HRP.* vid. *Hedera trifolia*.

Arbuseula exotica, foliis umbilicatis, Pada-Kelangu, nukulam Nuculæ Indicæ sc-  
noræ *Joh. Bauhini* similem, ferens. *Breyn.* vid. *Nux.*

ARBUTUS folio ferrato. *CBP.* 460. Arbutus Comarus *Theophrasti* *J.B.T.* 1. l. 1. fol. 83. Unedo *Plinii* vulgò.

Arbutus *Attica* foliis longioribus, & angustioribus, levitè crenatis. à *præcedenti di-*  
*versa videtur.*

Arbutus ferratis foliis *Canarina*, cortice circumrupto, sivè duodecies Anni spatio,  
corticem abjiciens, ex Insula *Tenerifa* nobis est allata:

Arbutus folio non ferrato. *CBP.* 460. Adrachne *Theophrasti*. *J.B.T.* 1. l. 1. fol. 87.  
Adrachni, five Portulaca *Theophrasti*. *Prosp. Alpin. exot. fol. 7*: Hujus ut & penul-  
timæ ramulum, in *Greciâ*, propriâ manu collectum, nobis munere donavit Spectatifi-  
simus & admodum Reverendus Vir D. *Georgius Whelerus Eques auratus* & in Ec-  
clesiâ *Dunelmensi* Prebendarius dignissimus.

Arbutus angustiori folio non ferrato ex *Insulis Fortunatis*. Aut potiùs Cerasus *Ca-*  
*nariensis* Adrachne foliis magis acuminatis, fructu parvo, Fragiformi, monopy-  
reno: àn *Morocoks Virginienfibus* dicti; qui sunt Fructus Fragis admodum si-  
miles, & Cerasis nostratibus plurimùm diversi *Ogilv. Americ. 196*.

Arbutus non Arbutus *Virginiana* vulgò. vid. *Mespilus*.

AREALU. vid. *Ficus*.

ARECA, s. Faufel. vid. *Palma*.

ARENARIA, *J.B.* vid. *Alsine*.

ARIA-BEPOU, *H.M.* vid. *Olea Malabarica*.

ARISTOLOCHIA Clematitis *Ind. Orient.* àn Aristolochia Clematitis non vul-  
garis. *J.B.T.* 3. l. 32. 561. Hujus neminem facere mentionem scripsit *Clusius* (cum  
*Hispanicarum* quarund. Stirpium Historiam publici juris faceret) præter unum  
*Bellonium*, qui eam, *Obs. lib. 1. cap. 17.* in *Creta* se observasse scribit. Aristolochia  
Clematitis altera *Hispanica*, *Lob. Obs. fol. 333. & Icon. fol. 608*.

Aristolochia Clematitis è Monte *Hymetto*, foliis minoribus in extremo bifidis, *Whele-  
Itinerar. lib. 6. fol. 414.* ab *Inventore* accepi.

Aristolochia Clematitis *Gangetica*, foliis in aculeum abeuntibus, radice odoratissimâ.  
àn Aristolochia Clematitis *Indica*, odorata. *B.P.B. Addend. Careloe-Vengo. H.M.*  
*Part 8. Sacfanda Zeylonensibus.* Volubilis *Gaugetica* sapore acri, & aromatico.  
*Phytogr. T. 69. fig. 5.*

Aristolochia Clematitis *Bisnagarica*, spinis gemellis aculeata, s. Volubilis talis,  
*Phytogr. ibid.*

Aristolochia Pistolochia dicta, *CBP.* 307. Aristolochia polyrhizos. *J.B.T.* 3.  
*lib. 32. 561.*



*Aristolochia Piftolochia dicta Cretica*, *Smilacis folio sempervirens*. *Hort. Leyd.* 59. *Piftolochia Cretica sempervirens*. *Park. Theatr.* 292. *Piftolochia Cretica*. *CBP.* 307. *Aristolochia Piftolochia altera*. *J B. T.* 3. l. 32. 563. *Aristoloch. Cretica, s. Virginiana Ger. emac.*

*Aristolochia Maurorum*. *C B P.* *Aristolochiæ similis Rhafut & Rumigi Maurorum*. *J B.* *Aristolochia peregrina Rawolfio. Clus.* Hanc elegantissimam *Aristolochiæ* speciem conspeximus tantum inter *Collectaneas Rawolfianas*, in manibus Reverendiss. *D. D. Vossii* apud *Windsoræ* *Prebendarii* dignissimi.

*Aristolochia Polyrhizos*, *auriculatis foliis Virginiana*; *Phytogr. T.* 78. *fig. 1.* fortè *Polyrhizos Virginiana*. *Park. Theatr.* 420. *Serpentaria altera Virginiana*, vulgò.

*Aristolochia Violæ fruticosæ foliis, Virginiana*, *cujus Radix Serpentina dicitur*. *Phytogr. T.* 15. *fig. 2.*

*Aristolochia Piftolochia, s. Serpentina Virginiana*, *caule nodoso*. *D. Banister. Phytogr. Tab.* 148. *fig. 5.*

**ARTEMISIA** *Chinensis* *cujus Mollugo Moxa dicitur*. *Phytogr. T.* 15. *fig. 1.* Fortè *Ytzequinpatli Nov. Hisp. Terent.* apud *Recc.* 446. àn *Artemisia Virginiana*, *Park. Theatr.* fol. 90. *Moxam vero tam celebrem in curatione Podagræ per unctionem nihil aliud esse quam Molluginem Artemisiæ ostenditur in Ephem. Germ. Ann.* 11. *Obs. 6.* & *clarè demonstratur in Tractatu singulari de hujusmodi Curatione per eruditiss. D. D. ten Rhine.*

**ARUM** *Brasilianum* *arborescens, folio Sagittariæ*. *P B P.* *Plumier. Descript. Plant. Americ. T.* 60. & *T.* 51. *fig. 9.* *Aninga-iba. Pison. l. 4. cap. 49. fol. 220.*

*Arum caulescens, Cannæ Indicæ foliis, Plumier. T.* 61. & *T.* 51. *fig. h.* *Aninga altera Brasiliana Pisonis. ibid.*

*Arum caulescens, Rumicis agrestis foliis sibi invicem implicitis, Virginianum*. *Dracunculus major Matthioli, lib. 2 cap. 160.* *Dracunculus Bistortæ folio. C B P.* 194. *Ubi hunc se nec dum vidisse, ingenue fatetur Gravissimus Autor, de quo Dodoneus. Edit. Lat. àn in rerum naturâ sit, dubitat. Et si sit, Bistortæ speciem esse: At Adversaria inveniri negant; Guiland. in suo Theo. quasito pretextu, ut doctior videretur, Matthiolum, tantum virum, & de re herbariâ optimè meritum, effinxisse scribit. Sed de Clarissimo Matthiolo me longè meliora augurari juvat, cum & ejusdem Plantæ ex Virginiâ nobis allata, veram effigiem præstare licet.* *Hujus caulis interdum maculatus, interdum non, aliorum penis est albus, aliorum ater, sicut in Vulgari Aro. vid. Phytogr. Tab.* 271. *fig. 2.*

*Arum majus Veronense. Lob.* *Arum venis albis. C B P.* 195.

*Arum Arabicum flore maculato. Hort. Oxon. D. Sherard.*

*Arum maximum Zeylanicum, foliis nervosis. P B P.* 314.

*Arum maxim. Ægyptiacum, quod vulgò Colocasia. C B P.* 195. *Colocasia Clusio. J B. T.* 2. l. 19. 790. *Culcas, s. Colocasia. Pr. Alpin. de Plant. Ægypt. pag. 101.* àn *Colocasia macrorhiza (i. e.) longæ radicis ejusd.* *Pr. Alpin. exot. fol. 230.* Hoc est sterile genus.



- Arum Ægyptiacum* florigerum & fructum ferens, radice magnâ orbiculari. *Colocassia Strogylorhiza* (i.e.) rotundæ radicis. *Pr. Alpin. exot. lib. 2. cap. 18. fol. 236.* *Colocassia Ægyptia* florida, s. *Culcas. Vesling in Alp. fol. 38.* *Arum Ægyptium* multiflorum *Fab. Col. ecphras. Part. 2. fol. 1.* *Arum Ægyptiac.* rotundâ & longâ radice vulgò *Colocassia* dicta, *Park. Theatr. 374.* *Qui aliorum vestigia insistens, has duas Plantas inter se vere diversas male confundit.* Fortè *Arum Ægyptium* flore albo, *Moschum* olente. *Hort. Leyd.* *Arum Africanum* flore albo odorato, *P B P. 314.*
- Arum minus Bengalense*, *Colocassia* foliis; àn *Talasse Indorum Linschotani. Ind. Orient. Part 4. Tab. 15.* Fortè *Arum Zeylanicum* minus, cauliculis viridantibus, foliis *Colocassia* similibus. *Hort. Med. Amstel. 37.*
- Arum Zeylanicum* minus, *Colocassia* facie, pediculis puniceis. *P B P. 315.*
- Arum Annabonense* pumilum. *Hort. Beaum. fol. 9.* *Tliltollin Nov. Hispan. Terent. apud Recc. fol. 430.* àn *Parvâ Kelangu. Hort. Malab. Part. 11. Tab. 15.*
- Idem foliis *Lapathi Bononiensis* in modum sinuosis, pediculis nigricantibus.
- Arum minus Zeylanicum* *Sagittaria* folio, *P B P.*
- Arum minus Sagittaria* foliis ex *Insulâ Barbados. Phytogr. Tab. 149. fig. 2.* àn *Arum montanum. Pr. Alpin. exot. p. 335.* Fortè etiâ *Arum aquaticum Virginianum* foliis in acumine desinentibus. *Banisteri, Cat. Virg. de hujus radice, Tockavaugh apud Ogilveium dicta, & aliis Tockahoe. panem conficiunt Indigenæ Virginenses, sicut olim Ægypti fecerunt de suâ Colocassia radice.*
- Arum Colocassia* dictæ similis, radice arundinaceâ. *Weli-ila. H M. P. 11. Tab. 22.* àn *Dracontium* (fortè) amplis foliis cordatis, radice nodosâ rubrâ. *Plumier. Tab. 63.* *Schine Caribeorum* vulgò.
- Arum palustre* radice *Arundinaceâ. Hort. Leyd. 61.* *Dracunculus palustris, s. radice Arundinaceâ. Plinii C B P. 195.* *Dracunculus aquaticus J B. T. 2. lib. 19. fol. 789.*
- Arum aquaticum Virginianum*, foliis longis fluctuantibus, pene non cucullato. àn *Colocassia hederacea* sterilis angustifolia. *Plumier. descript. Pl. Americ. Tab. 54. & Tab. 51. fig. c. Nostra autem non est sterilis. Hujus enim fructus Ocoughtanamins secundum Ogilveium Americ. vel ut nostrates pronuntiant, Kuttanemmons ab Indigenis nuncupatur, & Capparibus sunt similes.* Fortè *Capparibus* similes baccæ in *Virginia C B P. 488.* fortè etiâ *Sacquennumner* baccæ Plantæ, quæ in stagnantibus aquis reperitur. *Part. 1. Ind. Occid. Capparibus* ferè similis *Alhaut. J B. T. 2. l. 14. fol. 66?*
- Arum moschatum* *Ophioglossoides*, s. pene nudo *Jamaicense*; àn meliùs *Ophioglossum moschatum Jamaicense*, *Limonii* foliis in extremo sinuatis. *Phytogr. Tab. 77. fig. 6.* Fortè *Saururus humilis*, folio carnosio subrotundo. *Plumier. descript. Pl. Americ. Tab. 70.*
- Arum humile Arisarum* dictum latifolium, pistillo brevi, incurvo, obtuso. *Hort. Leyd. 60.* *Arisarum latifol. Park. Theatr. Arisarum latifol. quibusd. J B. Tom. 2. lib. 19. 786.* *Arisarum latifol. alterum. C B P. 196.* *Arisarum latifolium majus ejusd. ibidem.*



- Arum humile *Arifarum* dictum angustifolium, pistillo longissimo, tenui, inflexo, mucronato. *H. Leyd.* 60. *Arifarum angustifolium.* *J. B. Tom.* 2. lib. 19. 787. *Arifarum longifolium.* *Park. Theatr.* *Arifarum angustifolium Dioscoridis* (fortè) *C B P.* 196.
- Arum humile *Virginense* triphyllum. *Phytogr. Tab.* 148. fig. 6. àn Arum triphyllum humilius & minus. *P B P.* 315.
- Arum triphyllum majus, & elatius *Brasilianum.* *P B P.* 315. *Dracunculus*, s. *Serpentaria triphylla Brasiliana.* *C B P.* 135. *Dodart. Memoir.* 81. *Arifarum triphyllum* pene viridi. *Banist. Cat. Stirp. Virgin.* apud *Raii Hist. Pl.* 1926.
- Arum, s. *Arifarum triphyllum minus*, pene atro-rubente *Virginianum.* *Phytogr. Tab.* 77. fig. 5.
- Arum, s. *Arifarum Virginianum*, *Dracontii* foliis, pene viridi, longo, acuminato: *Banisteri, Phytogr. Tab.* 271. fig. 1.
- Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, caule maculato, majus, & elatius. *Hort. Leyd.* 60. *Dracunculus polyphyllus.* *C B P.* 195. *Dracunculus major vulgaris.* *J. B. T.* 2 l. 19. 789. Fortè etiàm *Erva de Sancta Maria*, s. *Dracunculus major.* *Pison.* 240.
- Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, foliis venis albis elegantè striatis.
- Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum; *Sirinamense*: caule atro-rubente, glabro, & elegantè variegato. *Hort. Beaumont.* àn Arum polyphyllum, *Dracontium* & *Serpentaria* dictum, folio ramoso, *Pæoniæ* instar, caule levi. *P B P.*
- Arum majus maculatum foliis laciniatis, quâlibet laciniâ, rursus multiscissâ. *Phytogr. Tab.* 149. fig. 1.
- Idem caule aspero ex Insulâ *Zeylon.* *B P B. Mulenschena. H M. P.* 11. *Tab.* 19.
- Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, *Ceylonicum*, caule glabro, viridi, diluto, maculis albis notato. *H. Amst. Schena. H M. P.* 11. *Tab.* 18.
- Arum *Americanum* polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, *Ambaiibæ* foliorum divisuris. *Dracontium hederaceum polyphyllum.* *Plumier Descript. Plant. Americ. Tab.* 64.
- Arum polyphyllum, *Dracunculus* & *Serpentaria* dictum, caule non maculato, minus, & humilius. *H. Leyd.* forte. *Hoaca-xochitl Nov. Hispan. Terent.* apud *Recc.* 377. àn Arum *Malabaricum* minus polyphyllum, radice globosa. *Commelin. in Not. H M. P.* 11. *Tab.* 21. *Kataschena*, quasi-diceres, *Schena sylvestris.* ejusd. *H M.* ubi suprâ. Hùc for. è spectat *Pentaphyllum Indicum*, quod in hortulis *D. Nicolai Colii* inventum est apud *Clus. exot. lib.* 4. cap. 18.

ARUNDO sativa quæ ἄρυνξ. *Dioscoridis* & *Theophrast.* *C P B.* 17. *Arundo maxima* & *hortensis.* *J. B. Tom.* 2. lib. 18. 486. *Harundo Donax.* *Park. Th.* *Arundo Donax Cypria.* *Dod.*

*Arundo Saccharifera.* *C B P.* 18. *Arundo Saccharina.* *J. B. T.* 2. lib. 18. 531. *Harundo Saccharifera.* *Park. Theatr.* *Folia habet Typha palustris amula, paniculam quodammodo Melicæ similem, & (monente D. Doody) pappescentem;* *Arundo Saccharifera Viba, & Tacomareë Brasiliensium.* *Pison.* lib. 4. cap. 1. *Canna d'Azuquave Lusitanis.*

Arundo



- Arundo Indica* variegata, s. *Laconica* Theophrasto. *Cornut. de Plant. Canad.* 55.  
*Arundo arborea* *Mambu* vel *Bambu* dicta. *Arundo Mambu*, cum suo Sacar. s. *Tabaxir*.  
*Pisonis Mantiss. Arom. cap.* 10. *Arundo arbor* in quâ humor lacteus gignitur qui  
*Tobaxir Avicennâ* & *Arabibus* dicitur. *C B P.* *Tabaxir*, s. *Mambu arbor.* *J B*  
*Canna ingens Mambu* vel *Bambu* dicta. *Park. Th. Ily. H M. Part* 1. *fig.* 16.  
*Arundo arborea* *Bambu* species altera. *Raii Hist.* 1316. *Beesha*, *H M. P.* 5.  
*Tab.* 60.  
*Arundo nucifera Rotang* dicta, fructu spadicei coloris, striis purpureis venustè tessu-  
lato. *Arundo Rotang* dicta. *Pison. Mantiss. Arom. fol.* 188. *Fructus squammo-*  
*sus minor, Avellanæ magnitudine.* *C B P.* *Fructus peregrinus squammosus se-*  
*cundus parvæ Avellanæ nucis magnitudine.* *Clus.* *Itèm Fructus exilis Cannæ de*  
*Bengala creditus, ejusd. Clus. exot. lib.* 2. *cap.* 3. *fig.* 2. *Fructus Cannæ de Bengalâ.*  
*J B T.* 1. *l.* 3. *fol.* 402.  
*Arundo Indica* latifolia, ejusque species. *C B P.* vid. *Canna Indica.*

ASARINA *Lobelii.* vid. *Pedicularis.*

*Afarina major Curassavica.* Et *Afarina minor Ceylanica.* *P B P.* vid. *Ranunculus.*

ASARUM. *C B P.* 197. *J B. T.* 3. *lib.* 32. 548. *Asarum vulgare.* *Park.*  
*Theatr.* 266.

*Asarum majus Americanum*, subhirsutis foliis in mucronem productis. *Asarum Cana-*  
*dense Cornut. de Pl. Canadensib. fol.* 24. *Asarum Americanum.* *Park. Theatr.* 266.  
*Asarum Americanum majus, H R P.* 25.

*Asarum Virginianum*, *Pistolochiæ* foliis subrotundis, *Cyclaminum* more maculatis.  
*Phytogr. Tab.* 78. *fig.* 2. *Asarum Cyclaminifolio, Virginiana, Banisteri Cat. Stirp.*  
*Virgin.*

*Asarum* è *Terrâ Mariana*, *Violæ luteæ*, vel *Afarinæ* foliis; *Serpentaria nigra*, *Black*  
*Snake Root*, nostratibus dicta. *At reverâ malè cognominatur Asarum; cum po-*  
*tiori jure sit de Plantis corymbiferis, ut jam suspicor; & forte Herba ista Brasiliانا*  
*quæ ob alexiterias suas virtutes, nomen Ipecacuanha sibi vendicat; & Caa-apia Indi-*  
*gênis vulgè nuncupatur. Caa-apia altera species. Pison. lib.* 4. *fol.* 232. *Bellis*  
*Brasiliانا, Raii Hist. Pl. hujus picturam habes in Phytogr. Tab.* 15. *fig.* 3.

ASCLEPIAS flore nigro. *C B P.* vid. *Apocynum.*

ASCYRUM ejusque species. *C B P.* vid. *Hypericum.*

ASPALATHUS secunda *Monspeliensis.* *J B.* vid. *Genisto-spartium.*  
*Aspalathus secunda trifolia.* *J B.* vid. *Cytiso-spartium.*

ASPARAGUS fativa. *C B P.* 489. *Asparagus domestica.* *Morison. Hist.* 2. *fol.* 3.  
*Asparagus hortensis.* *J B. T.* 3. *lib.* 36. 725.  
*Asparagus sylvestris tenuissimo folio, C B P.* 490. *Asparagus pratensis, J. B.*  
*ibid.*

*Asparagus*



*Asparagus maritimus* crassiore folio, *C B P. ibid.* *Asparagus marinus*, *J B. ibid.*  
*Asparagus foliis acutis*, *C B P. ibid.* *Corruda*, *J B. T. 3. l. 36. 726.* *Corruda prior*,  
*Clus. Hist. Pl.*

*Asparagus aculeatus* tribus, aut quatuor spinis ad eundem exortum, *C B P.* *Aspara-*  
*gus petræus*, s. *Corruda aculeata. Park. Theatr.* *Corruda altera. Clus. Hist. lib. 5.*  
*fol. 178.*

*Asparagus aculeatus minor sarmentosus*, è *Maderaspatan. Phytogr. Tab. 15. fig. 4.*

*Asparagus aculeatus maximus sarmentosus, Ceylanicus, H. Leyd. Schada-veli-kelanga,*  
*H. M. P. 10. Tab. 10.*

*Asparagus aculeatus*, triplice spinâ surrectus, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 78. fig. 3.*  
 àn *Asparagus aculeatus Africanus, H. Leyd. Asparagus sylvestris spinosa Africana,*  
*H. Amstelod. Corruda (fortè) spinis horrida, foliis Asparagi sylvestris Africana.*  
*Breyn. Fascic. Rarior. Plantar. nunc colitur in Hort. Reg. Hamptoniensi.*

*Asparagus aculeatus spinis horridus, C B P.* *Asparagus spinosus, s. Corruda spi-*  
*nis horrida, Park. Theatr. Corruda 3a. Clus. ibid. Corruda Africana Hippuris*  
*facie Breyn. Fascic. Rarior. ex Africæ Oris ab Ornatissimo Viro D. Johanne Fish-*  
*wicke ad nos allata est.*

*Asparagus (fortè) aculeatus major*, spinas plurimas ab eodem exortu, pro foliis fe-  
 rens. *Phytogr. Tab. 15. fig. 5.* àn *Asparagus aculeatus Siculus, Raii Hist. app. 1877.*  
 à suprâ laudato Viro D. *Fishwicke* ad Mare *Mediterraneum* collecta est hæc rara &  
 minùs cognita species, qui nobis amicè impertivit. àn vera & genuina *Asparagi*  
*species sit, profecto nescimus, cum nunquam sese Obtulerit fructus.* Fortè *Drypis*  
*Theophrasti Anguillaræ, Lob. Obs. 460. J B. T. 3. l. 36. 728.* Spina umbellâ foliis  
 viduâ, *C B P. 388.*

*ASPERULÆ (fortè) congener, Planta peregrina. Phytogr. Tab. 149. fig. 3.* hujus  
 picturam *Illustrissimi Comitis Portlandiæ* favore, ex Codice suo plurimis rariorum &  
 exoticarum Plantarum Iconibus, vivis coloribus elegantissimè manupictis, in-  
 structo accepimus.

*ASPHODELUS major* ramosus flore albo, *J B. T. 2. lib. 19. 626.* *Asphode-*  
*lus major albus ramosus, Park. Th. 1218.* *Asphodelus albus ramosus mas,*  
*C B P. 28.*

*Asphodelus major* flore albo non ramosus, *J B. T. 2. 625.* *Asphodelus non ramosus,*  
*C B P. Park. Paradis.*

*Asphodelus luteus*, & flore & radice, *C B P. 28.* *Asphodelus folio fistuloso, striato,*  
*non ramosus, luteus, & flore, & radice. Moris. Hist. 2. 331.* *Asphodelus luteus,*  
*J B. T. 2. lib. 19. 632.*

*Asphodelus luteus Autumnalis elatior*, spicâ florum prælongâ, gracili. àn *Asphode-*  
*lus autumnalis, s. major, Camerar. Hort. Med. 23.* *Asphodelus autumnalis,*  
*C B P. 28.*

*Asphodelus spurius elatior Alpinus*, floribus ex herbaceo pallefcentibus. *Pseudo-as-*  
*phodelus minor, s. pumilio, folio Iridis, Clus. Pann. s. secunda, Clus. Hist. 198.*  
*Pseudo-asphodelus Alpinus, C B P. 29.* *Pseudo asphodelus minor folio Iridis,*  
*Park. Theatr. 1217.*

*Asphodelus*



*Asphodelus spurius palustris*, *Anglicus*, *Acori foliis*. *Pseudo-asphodelus palustris*, vulgaris, nostras. *Raii Hist. Pl.* 1195. *Pseudo-asphodelus primus*, vel major. *Clus. Hist.* *Pseudo-asphodelus palustris*, *Anglicus*, *C B P.* 29. *Asphodelus luteus Acori foliis*, palustris *Anglicus*, *Lobelio*. *J B. T.* 2. l. 19. 633. *Asphodelus Lancastriæ verus* *Ger. emac. descript.*

*Asphodelus spurius minimus palustris Scoticus*. *Pseudo-asphodelus palustris Scoticus minimus*, *Raii. Hist.* 1195. àn *Pseudo-asphodelus palustris, Scoticus*, *C B P.* 29.

*Asphodelus bulbosus, Dodonæi*, *J B. vid. Ornithogalum.*

*Asphodelus Allobrogicus*, magno flore *Lilii*. *Herm. vid. Phalangium.*

*Asphodelus foliis fistulosis*, *C B P.* vide *Phalangium.*

**ASSITRA** *Zanoni*, vid. *Mandarin.*

**ASTER** *Sirinamensis & Caroliniensis*, subrotundis *Baccharidis foliis*, lanugine obductis; sub nomine *Tea* primò missus, *Phytogr. Tab.* 149. fig. 5. *Ex hujus Fruticis foliis Tincturam* (mediante aquâ calidâ) eliciunt *Floridani* quâ potionem *Cassine* illis dictum, potui *Thea* haud absimilem pro suis parant, indè à nostratibus *Colonis* nomen *Tea* huic plantæ inditum opinor, & per errorem idem esse cum *Orientali* à quibusdam habetur, vid. *Ogilv. Amer.* 206. & 219. *Herba Cassiana* famem sitimque retardans, *J B. T.* 3. l. 34. 631. *Cassiana herba*, è cujus succo, potionem conficiunt in *Floridâ*, quam bibunt, ubi in locum periculosum se conferunt, quo famem & sitim per horas 24 tollunt. *Part 2. Amer. Navigat.* 4. Hanc perperam inter *Nicotianas* enumerat *Casp. Bauhinus*, in *Pinac.* 170.

*Aster Nova Belgia latifolius*, umbellatus, floribus dilutè violaceis, *H. Leyd.* 65.

*Aster Nova Belgia latifolius*, paniculatus, floribus saturatè violaceis, *H. Leyd.*

*Aster Nova Anglia altissimus*, hirsutus, floribus omnium maximis, purpureo-violaceis, *P B P.* 315. àn *Aster Nova Anglia hirsutus*, floribus majoribus saturè violaceis *Dominæ de Flines*, *Sch. Bot.* 204.

*Aster Americanus latifolius maximus puniceis caulibus*. *Dnæ. de Block. H. Leyd. app.* 649. *Aster serotinus*, ramosus alter, flore purpurascente. *H R P.* 27. *Schol. Bot.* 203.

*Aster cæruleus præcocior*, hirsutis foliis, per margines obiter crenatis, floribus amplis. àn *Aster Pyrenæus præcox*, flore cæruleo majore, *H R P.* 27. *Aster præcox*, flore cæruleo majore, *H R B.* 24. *Dodart. Memoir.* 63.

*Aster Atticus Italicorum florè purpureo*, *Park. Th.* 132. *Aster Atticus cæruleus vulgaris*, *C B P.* 267. *Aster Atticus purpureo & albo flore*, *J B. T.* 2. l. 24. 1044.

*Aster Atticus*, *Alpinus alter*, magno flore, *Sch. Bot.* 203. *Aster Atticus maj.* flore cæruleo, *H. Eyst.*

*Aster purpureus montanus*, *J B. T.* 2. l. 24. 1046. *Aster Alpinus*, cæruleo magno flore, *Park. Theatr.* *Aster Alpinus cæruleo flore*, s. 7us. *Clus.* *Aster montanus cæruleus*, magno flore, foliis oblongis, *C B P.* 267.

*Asteri montano purpureo similis*, vel *Globulariæ*, *J B. T.* 2. l. 24. 1047. àn *Aster alpinus*, flore purpurascente, *Raii Hist. Plant.* 268.

*Aster.*



- Aster *Americanus* frutescens, Satureiæ foliis scabris, floribus amplis, saturatè violaceis, *Phytogr. Tab. 14. fig. 7.* Huc fortè spectat Tzitziqui *Nov. Hispan. Terent. apud Recc. fol. 435.*
- Aster minor *Narbonensium*, Tropoli flore, Linariæ folio, *Leb. Icon. Pl. 349.* Aster *Atticus, Monspeliensis* purpureus, angustioribus foliis, *J. B. T. 2. l. 24. 1045.* Aster Tripolii flore, *C. B. P. 267.* hujus accuratior Icon exhibetur in *Phytogr. nostra Tab. 271. fig. 3.*
- Aster latifolius, Tropoli flore, *Dodart. Memoir. 57. H. R. P. 27.* Tripolium altissimum *Americanum*, caulibus viridantibus, *H. Leyd. 608.*
- Aster maritimus purpureus, Tripolium dictus, *Raii Hist. Pl. 270.* Tripolium majus & minus. *J. B. Tripolium majus, cæruleum, & minus, C. B. P. 267.*
- Idem flore niveo. Tripolium flore albo, *Breyn. Prodr. 1. 52.*
- Aster Autumnalis elatior, flore cæruleo minori, *H. R. P. 27.* Aster elatior, flore cæruleo minore, *H. R. B. 24.* Aster vulgò *Tradescanti.*
- Aster cæruleus serotinus fruticescens *Tradescanti, Raii Hist. Pl. 269.* Aster serotinus angustifolius, *Canadensis*, flore cæruleo, *H. R. B.* Aster tenuifolius ramosus *Canadensis* flore minori violaceo, *Sch. Bot. 204.*
- Aster cæruleus *Americanus* non fruticosus serotinus angustifolius, humilis flore amplo, floribundus, *Phytogr. nondum edit. Tab. 326 fig. 1.*
- Aster *Americanus*, Belvidere foliis, floribus ex cæruleo-albicantibus, apicis prælongis, *Phytogr. Tab. 78. fig. 5.* àn Aster *Novæ Angliæ*, Tripolii floribus, in spicis longis dispositis, *P. B. P. 315.*
- Aster *Virginienfis*, angustifolius, serotinus, parvo albente flore, *Park. 132.* Aster flore *Bellidis sylvestris minoris*, *H. R. B.* Aster serotinus, procerior, ramosus, *Bellidis sylvestris* flore, *H. R. P.* Aster procerior, *Canadensis* alter, *Bellidis* flore minore, *Sch. Bot.*
- Aster *Americanus*, multiflorus, flore albo *Bellidis*, disco luteo, *Dominae de Flines Sch. Bot. Phytogr. Tab. 78. fig. 6.* Aster *Novæ Angliæ*, Linariæ folio, *Chamæmeli* flore, *P. B. P. 316.*
- Aster autumnalis *Americanus*, foliis latis, crenatis, parvo purpurascente flore, *H. Leyd.* Aster *Virginicus*, latifolius, serotinus, purpurascente flore parvo, *Park. 1676.* Asteriscus latifolius, autumnalis, *Cornut. de Pl. Canad. 4.*
- Idem folio longiori, *H. R. P. app.*
- Aster *Americanus* albus, caule ad summum brachiato, *Phytogr. Tab. 79. fig. 1.* Si color florum, & foliorum conjugata positio, non obstarent, hanc *Tlaloceloxochitl Nov. Hispan. Terent. apud Recc. 422.* eandem plantam esse suspicaremur.
- Aster *Americanus* albus, *Mezerei Arabum* exasperatis foliis, floribus penta-petalis reflexis, *Phytogr. Tab. 79. fig. 2.* àn *Bellis Leucanthema*, conyzoides, *Ptarmicæ* effigie, *Americana. Breyn. Prodr. 2. 23.*
- Aster *Africanus*, *Stæchadis* inodoræ foliis incanis, flore albicante, *Phytogr. Tab. 15. fig. 7.* Aster *Africanus*, *Stæchadis* folio, noster, *Raii Hist. Pl. app.*
- Aster exoticus, *Hyoseridis* folio minore, *Phytogr. Tab. 15. fig. 6.* *Raii Hist. Pl. app.* Aster parvus *Æthiopicus*, *Chamæmeli* floribus, *Tamaricis Ægyptiæ* foliis, tenuissimè denticulatis, *Phytogr. Tab. 271. fig. 4.*



- After *Bengalensis*, omnium minimus, summo caule biflorus, *Phytogr. Tab. 15. fig. 8.*  
 After *Conyzoides Ind. Orient.* ramosior, cauliculis sparsis, *Phytogr. Tab. 149. fig. 4.*  
 After angustifolius luteus, maritimus glaber. *Conyza marina, Hist. Lugd. 1366.*  
*Conyza tuberosa lutea, foliis angustis & rigidis. Bot. Monsp. 77. Hæc verè Asteris genus, sub Chondrillæ Conyzæ facie, foliis angustioribus titulo, malè proponitur à Casparo Bauhino in Pinac. p. 130. Edit. Ann. 1623. in noviss. autem editione, planè omissa est. Apud exsiccatas rariores, in Hort. Patavino, à Cl. Viro D. D. More, multis abhinc annis collectas, sub nomine Asteris Persicæ folio, conspeximus.*  
 After luteus angustifolius. *C B P. 266.* After *Conyzoides. Gesneri, Obs. Lob. 188.*  
*Conyza marina. J B. T. 2. l. 24. 1055.*  
 After luteus *Linariæ rigido, glabro, folio. C B P. 267.* After angustifolius, s. 6<sup>us</sup>. *Austriacus 4<sup>us</sup>. Clus. Hist. quoad descriptionem.* After luteus angustifolius. *J B. Park. Theatr.*  
 After montanus, luteus, *Salicis, glabro, folio. C B P. 266.* After montanus foliis *Salicis. Park. Th. Conyza media Monspeliensis; quibusd. Asteris Attici genus, folio glabro, rigido. J B. T. 2. l. 24. 1049.*  
 After luteus, latifolius glaber, foliis rigidis, & minutissimè crenatis, *Phytogr. Tab. 16. fig. 2.* àn After luteus, folio glabro, & crenato, *C B P?* ubi *Synonyma huic plantæ, à Casparo Bauhino malè sunt appropriata.*  
 After peregrinus, *Cisti folio, non crenato, flore magno luteo, Phytogr. Tab. 16. fig. 2.* àn After odoratus, flore luteo stellato, exoticus? *H. Patav. à Turre. 13* fortè After *Conyzoides luteus, perennis, Icon Roberti.*  
 After peregrinus, *Cisti angustiore folio, & magis acuminato, flore minore.*  
 After luteus *Cisti hirsutis, & crenatis foliis, summo caule ramoso, floribus amplis, Phytogr. Tab. 78. fig. 4.* àn *Herba Vulneraria, ad fluvium Pfrim. Hieronymi Tragi?* *Conyzæ affinis Germanica, C B P. 266. Consolida Saracenica 3a. Tragi. Hist. Lugd. 1271. Conyzis affinis, Herba Vulneraria, s. Solidago Saracenica 3a. Trago hirsuta, J B. Tom. 2. lib. 24. fol. 1051. hujus exemplar nobis communicavit D. Doody, qui & ipse inter Siccatas exoticas, & quamplurimas rariores plantas in H. Patavino, jamdudum collectas, & in Chartis asservatas, quas sibi impetravit, absque titulo invenit.*  
 After *Atticus luteus montanus, villosus, magno flore, C B P. 267.* After montanus alter, folio & caule hirsutis. *Adversar. Lob.*  
 After luteus, hirsuto *salicis folio, C B P.* After lanuginoso folio, s. 5<sup>us</sup>. *Clus. Hist.*  
 After luteus lanuginosus. *Park. Theatr.* After 3. *Pannonicus Clusio, luteus folio hirsuto salicis, J B. T. 2. l. 24. 1047.*  
 After montanus luteus, mucronatis nigricantibus foliis, flore majore. *Conyza montana lutea, foliis oblongis, C B P. 265. Conyza major montana, Thalii Harcyn. 20. àn Bellis lutea, Dalecampii Hist. Lugd. 1349?*  
 After montanus procerior, longioribus mucronatis foliis, flore luteo minore. *Conyza major altera, Thalii Harcyn. 21. Britannica vera Delacamp. Hist. Lugd. 1082. Conyzis affinis, C B P. 265. Britannica Conyzoides quibusd. After Pannonicus Clusio dictus, J B. ibid. Camerario in suo Herto, hujus pictura exhibetur; Harcyniar. Stirp. Icon. 2.*  
 After *Pannonicus major, s. tertius, Austriacus 1<sup>us</sup>. Clus. Hist. 2. fol. 13.* After lu-



teus major, foliis Succisæ, C B P. 266. Aster luteus major *Austriacus*, Park. Th. reverà Aster est, ut à Cl. Hermanno ad Chrysanthemorum genus averruncetur, Hort. Leyd. 144.

Aster *Africanus* luteus flore maximo, *Musei Corteniani*. àn Aster montanus luteo magno flore? C B P. 267. Aster montanus prægrandi flore *Helenii*, Adv. Lob. 148. At si Lobelius hanc plantam rectè descripsit cum unico flore in caule: à nostro Corteniano Astere diversus sit oportet. Propterea; àn potius Conyza Pannonica lanuginosa? C B P. Conyza 3a. *Austriaca*, legitima fortè *Dioscoridis*, Clus. Hist. 2. fol. 20. Cujus floris extremo cauli, & ramulis illi inhaerentibus, insident magni, *Helenii* florum formâ, multis foliolis luteis, medium discum, s. orbem pallescentem ambientibus, nullo odore præditi. Cujus nota, huic nostro ad amissim quadrare videntur.

Aster *Ragusin*, Verbasci foliis, Zanoni Ist. Botan. Aster tomentosus luteus Verbasci folio, Boccon. de Pl. Sicul. fol. 60. Fortè Aster Verbasci folio non descriptus Thom. Bellucci Hort. Pisan. 11.

Aster maritimus folio tereti-crasso, in summo tricuspido, H. Leyd. 70. Aster maritimus flavus, Crithmum Chrysanthemum dictus, Raii Hist. 268. Crithmum maritimum flore Asteris Attici, C B P. 288. Crithmum maritimum tertium *Matthæoli* flore luteo Bupthalmi, J B. Tom. 3. lib. 26. 106.

Idem folio in summo obtuso, Hort. Leyd.

Aster luteus foetidus Crithmi Chrysanthemi folio, floribus umbellatis, Phytogr. Tab.

16. fig. 3. Jacobæa Crithmi litorei foliis, H R B. 102. Jacobæa foetida Crithmi

Chrysanthemi facie Brunyeri, Hort. Iconquet. Jacobæa Rorismarini folio quibusd. *Supp. p. 399* Aster fruticescens luteus, *Mauritanicus*, folio Stæchadis incano, Seriphii facie, & sapore. àn Aster *Æthiopicus*, Stæchadis citrinæ foliis, flore aureo, Hort. Leyd. 68? ubi satis bene convenit descriptio. àn *Jacobæa Montis Tabulari*. Breyn. Cent. fol. 178? *Supp. p. 399*

fortè etiâ, Absinthio Seriphio similis. Capitis Bon. Spei. ejusd. append ad Cent. f. 19. Tab. 326 f. 2

Aster ramosus annuus *Canadensis* Moris. vid. Bellis.

Aster *Canadensis* annuus flore papposo, H R P. vid. Conyza.

Aster luteus foliis ad florem rigidis. vid. Chrysanthemum.

Aster *Atticus* foliis circa florem mollibus, C B P. vid. Chrysanthemum.

Aster luteus supinus, C B P. vid. Chrysanthemum.

Aster Conyzoides *Monspeliensis*, Moris. H R B. vid. Chrysanthemum.

Aster supinus Conyzoides *Africanus*, Park. vid. Chrysanthemum.

Aster luteus alatus *Cornuti*, Sch. Bot. vid. Chrysanthemum.

Aster luteus radice odorâ, C B P. vid. Conyza.

Aster Jacobæa foliis vulgò, s. Anemonæ affinis *Æthiopica*, Hort. Leyd. vid. Jacobæa.

Aster aizoides, Prom. Bon. Sp. Zanon. vid. Mesembrianthemum.

Asteriscus latifolius autumnalis *Cornuti*. vid. Aster.

ASTRAGULUS perennis, spicatus, *Americanus*, scandens caulibus, radice tuberosâ donatus, Moris. Hist. 2. 102. Terræ glandes *Americanæ*, s. *Virginianæ*, Park. Th. 1062. Apios *Americana*, Cornut. Pl. Canad. pag. 201.

Astragalus purpureus, perennis, spicatus, *Pannonicus*. Moris. Hist. 2. 106. Onobrychis prima, Clus. Hist. 238. Onobrychis spicata flore purpureo, C B P. 350. Onobrychis quibusdam purpureo flore, J B. T. 2 l. 17. 337. àn Astragalus conopho-



- ros *Pyrenaicus*, *Turnefortii*, *P B P.* 316. *Astragalus Alpinus Conophoros*, s. *Alopecuroides Schol. Botan.* 243?
- Astragalus perennis* spicatus, floribus pallidis, nigris radiis notatis, *Morif. Hist.* 2: 107. *Onobrychis spicata* floribus pallidis, nigris radiis notatis, *C B P.* 350. *Onobrychis* 3a. *Clus. Hist.* 2. 239. *Onobrychis* quibusd. flore pallido, vel *Polygonum*, *J B. T.* 2. lib. 17. 337. *Onobrychis* foliis *Viciæ* longioribus, *Park. Th.*
- Astragalus* quidam montanus, vel *Onobrychis* aliis, *J B. T.* 2. lib. 17. 339. *Onobrychis* 4a. *Clus. Hist.* 2. 240. *Onobrychis* floribus *Viciæ* majoribus, cæruleo-prupurascentibus, vel foliis *Tragacanthæ*, *C B P.* 351.
- Astragalus purpureus perennis*, *Monspeliens.* *Morif. Hist.* 2. 107. *Astragalus Monspessulanus*, *J B. T.* 2. lib. 17. 338. *Botan. Monspel.* 33. *Securidaca minor Adversar.* 401. quoad descriptionem.
- Astragalus luteus perennis*, procumbens, vulgaris, s. sylvestris. *Morif. Hist.* 2. 107. *Glaux vulgaris* leguminosa, s. *Glycyrrhiza sylvestris*. *Park. Th.* *Glycyrrhiza sylvestr.* floribus luteo pallescentibus. *C B P.* 352. *Fœnum-græcum sylvestre*, s. *Glycyrrhiza sylvestris* quibusdam. *J B. T.* 2. l. 17. ~~365~~ 330
- Astragalus luteus perennis*, siliquâ gemellâ rotundâ, vesicam referente. *Morif. Hist.* 2. 108. *Cicer sylvestre multifolium*. *J B. T.* 2. lib. 17. 294. *Cicer sylvestris* foliis oblongis hispidis majus. *C B P.* 347. *Glaux altera perennis*, folliculis turgidis, *Raii Hist. Pl.* 935.
- Astragalus Alpinus incanus*, *Halicacabus*, foliis *Tragacanthæ*, flore purpurascente. *Schol. Botan.* 243.
- Astragalus incanus*, parvus, purpureus, nostras. *Glaux montana purpurea nostras*, *Raii Hist. Pl.* 939. *Glaux Hispanica*. *J B. T.* 2. l. 17. 341. *Ciceri sylvestri* minori affinis, si non idem. *C B P.* 347.
- Astragalus* (fortè) s. *Glaux Æthiopica*, floribus purpureis amplis. *Phytogr. Tab.* 270. fig. 5.
- Astragalus Hispanicus*, siliquâ *Epiglottidi* simili, flore purpureo major *Turnefortii* *Cat. Hort. Leyd.* 74. an *Astragalus Hispanicus* humifusus, capitulis conglobatis, villosis & hamatis, apud *Collectaneas Sherardinas*? Fortè etiam *Glaux Catalonica* non descripta, *Raii Hist. Pl.* 940.
- Astragalus Hispanicus* siliquâ *Epiglottidi* simili, flore albo, minor, *Turnefortii*. *Cat. Hort. Leyd.* 76. *Glaux Dioscoridis* (per errorem) putata, *Raii Hist. Pl.* 940.
- Astragalus incanus* siliquis incurvis. *Botan. Monsp.* 33. *Onobrychis incana* foliis longioribus. *C B P.* 350. & *Prodr.* 149.
- Astragalus luteus annuus Monspeliacus*, procumbens. *Morif. Hist.* 2. 108. *Astragalus Monspeliensium*. *Clus. Hist.* 2. 234. *Securidaca altera*. s. minor. *J B. Tom.* 2. l. 17. 347. *Securidaca lutea minor*, corniculis recurvis. *C B P.* 349.
- Astragalus Canadensis*, flore viridi flavescente. *Acad. Reg. Paris. Dodart. Memoir.* 65.
- Astragalus Africanus*, flore luteo odoratus. *Breyn. Cent.* 1. 72. *Astragalus Africanus*, luteus odoratissimus *Icon Roberti. Bot. Monsp.* 285. *Astragalus perennis* foliis hirsutis, caule recto aphylo, flore ochroleuco odoratissimo. *Morif. Hist.* 2. 203.
- Astragalus Pyrenaicus*, flore albo, folio subrotundo. *Schol. Botan.* 243. an *Onobrychis incana*, foliis rotundis. *C B. Pin.* 350. & in *Prodr.* 149.
- Astragalus Pyrenaicus incanus*, foliis *Viciæ*, flore Sulphureo. *Schol. Botan.* 243. cu-



- jus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab. 79. fig. 5.*
- Astragalus annuus*, floribus, & filiquis hirsutis, plurimis, in foliorum alis sessilibus. *Phytogr. Tab. 79. fig. 3.* *Astragalus filiquis*, & foliis hirsutis, floribus parvis. *Morif. Hist. 2. 109* *Astragalus marinus Beticus Park. Th. 1084.* *Vicia Sesamea Apula. Column. ecphras. 301.* Fœnu-græco sylvestri *Tragi* in quibusdam accedens planta. *J. B. T. 2. lib. 17. 331.*
- Astragalus annuus Tamarindi foliis incanis*, filiquis curtis, turgidiusculis, glabris, ad foliorum ortum, communi pediculo nixis. Succrevit in Horto cultissimo, D. *Caroli du Bois*, à quo accepimus.
- Astragalus annuus*, foliis & filiquis longioribus, glabris, è foliorum alis, longo pedunculo insidentibus. *Securidaca Sicula*, filiquis foliaceis. *Boccon. fol. 7.* àn *Astragalus filiquâ triangulari Grisei Viridar. Lusitan.? V. Supp. pa. 399.*
- Astragalus hirsutus*, corniculis plurimis, uno pediculo stelliformiter adaptis. *Phytogr. Tab. 79. fig. 4.* *Ornithopodio affinis*, hirsuta, fructu stellato. *CBP. 350.* *Stella leguminosa. J. B. T. 2. lib. 17. 350.*
- Astragalus purpureus*, annuus, peregrinus, filiquis utrinque ferræ similibus. *Morif. Hist. 2. 107.* *Securidaca peregrina. Clus. Hist. 2. 238. Park. Th. Securidaca filiquis planis utrinque dentatis. CBP. 349.* *Lunaria radiata Robini. J. B. T. 2. lib. 17. 348.* *Arachus palustris filiquâ radiatâ, Grisei Virid. Lusit.*
- Astragalus maritimus lucidus*, *Anonidis* facie triphyllus, flore luteo. *Anonis lutea parva*, procumbens maritima, *Raii Hist. Pl. 958.* Fortè etiâ *Anonis maritimæ mitis*, folio lucido ferrato. *Boccon. 70.* *Anonis maritima non spinosa*, folio lucido, ferrato. *Thom. Bellucii. Ind. Hort. Pisan. p. 9.*
- Astragalus aculeatus fruticosus Massiliensis*, *Tragacantha dictus. Tragacanth. CBP. 388.* *Tragacantha Massiliensibus. J. B. Tom. 1. lib. 11. pag. 407.*
- Astragalus aculeatus fruticosus*, foliis subhirsutis. *Tragacantha Alpina sempervirens*, foliis viridioribus, subhirsutis. *Schol. Botan. 244.* àn *Tragacanthæ affinis lanuginosa. s. Poterium. CBP. 388.* *Tragacantha altera, Poterium fortè Clusio J. B. T. 2. lib. 11. 408.*
- Astragalus Monspelianno candidior*, & *Onobrychis* quorundam. *J. B. vid. Loto affinis.*
- Astragalus purpureus montanus. Park.*
- Astragalus villosus floribus globosis CBP.* } *Vid. Loto affinis.*
- Astragalus Romanus. J. B. vid. Onobrychis.*
- Astragalus Sylvaticus, s. Astragaloides. J. B. vid. Orobus.*
- Astragalus Indicus spicatus Polylobes, D. Hernan. vid. Onobrychis.*
- Astragalus humilis Buxifolius. Hort. Leyd. vid. Polygala.*
- ASTRANTIAE genera. vid. *Imperatoria.*
- ATAMARAM *Hort. Malabar. & Ate Hernandez. vid. Anona.*
- ATRIPLEX *maritima J. B. T. 2. l. 23. 974.* *Atriplex maritima laciniata CBP. 120.*
- Atriplex marina repens. Park. Th. 747.*
- Atriplex maritima nostras procerior*, foliis angulosis, incanis, admodum sinuatis. à *precedenti plurimum diversa est.* àn *Atriplex maritima perennis*, folio deltoide triangulari, minus incano. *Morif. Hist. 2. 607?* Fortè etiâ *Atriplex sylvestris fructu compresso roseo, vel stellato. CBP. 119. & in Prodomo. Raii Hist. Pl. 192.*



192. Itèm Atriplex sylvestr. *Montpefful.* cum pulchris involucris. *J B. Tom. lib. 23. 973.* Atriplex sylvestris secunda *Matthiol. in Comm. cum magn. fig. 461.*
- Atriplex maritima ad foliorum basin, velut auriculata, procumbens, & nè vix sinuata. Fortè Atriplex maritima nostras, *Raii. Cat. Angl. & Hist. Pl. 193.* àn Atriplicis maritimæ species *Valerando. J B. T. 2. lib. 23. 974. foliis albis?*
- Eadem foliis rubris, *D. Raii Hist. Plant. 194.*
- Atriplex angustifolia *Canariensis*, maritima, dentata, repens. Flos de Alumo *Hispanis dicta.* àn Atriplex argentea dentata, *Curassavica. P B P. 316?* Fortè etiàm Atriplex maritima dentata, *Raii Hist. Pl. 192. V. Tab. 326 fig. 3.*
- Atriplex maritima, folio integro, angustissimo. *Hort. Leyd. 79.* Atriplex minima angustifolia maritima. *Boccon. de Pl. Sicul. 29. Raii Hist. Pl. 194. Moris. Hist. 2. 607.* àn Atriplex maritima angustifolia. *C B. Pin. 120. & Prodr.*
- Atriplex maritima nostras, ocimi minoris folio:
- Atriplex Halimi folio. *C B P. 120.* Atriplex sylvestr. Halimi folio *Park. Theatr.* Atriplex halimoides *Lobelio. J B. T. 2. l. 23. 974.* Itèmque Atriplex sylvestr. foliis integris, racemosa. *ejusd. J B. fol. 973. ex mente Morisoni, Raii & nostrâ.*
- Atriplex maritima *Mauritanica*, frutescens, Polygoni foliis argenteis, racemosa. *Phytogr. Tab. 16. fig. 4.* Atriplex maritima *Mauritanica*, foliis Polygoni argenteis, semine amplo fusco, vasculis rotundioribus nostra. *Raii Hist. Pl. append. 1856.*
- Atriplex maritima fruticosa, Halimus dicta, latifolia. *Halimus Clusii. J B. Tom. 1 lib. 8. 227.* Halimus latifolius, s. fruticosus. *C B P. 120.* Halimus latifolius, s. Portulaca marina incana, major. *Park. Th.* Atriplex Halimus dicta latifolia, *Raii Hist. Pl. 194.* Atriplex latifolia, s. Halimus fruticosus latifolius. *Moris. Hist. 2. 607.*
- Atriplex maritima Halimus dicta surrectior, & vulgaris Halimus, s. Portulaca marina. *C B P. 120.* Portulaca marina nostras. *Park. Th.* Portulaca marina fruticosa, quæ Halimus secundus *Clusii. J B. Tom. 1. lib. 8. 228.*
- Atriplex maritima Halimus dicta, foliis angustioribus, cæsis, & magis carnosis. Halimus angustifolius procumbens. *C B P. 120.* Atriplex maritima angustifolia procumbens. *Moris. Hist. 2. 608.* itemque Atriplex maritima angustissimo folio. *ejusd. ibidem.* Halimus tenuifolius, s. Portulaca marina, incana, minor, *Park. Th.* Hanc plantam cum proximè præcedenti, Joannes Bauhinus eandem facere videtur; verùm *Clusio potius fides adhibenda, qui distinguit, ut recte notat Cl. Raius Hist. Plantar. 194. & nostrâ antopsiâ comprobatur.*
- Atriplex maritima Halimus dicta erecta, semine folliculis membranaceis bivalvibus, in latitudinem porrectis, & utrinque recurvis, longo pedunculo insidentibus, clauso. *Phytogr. Tab. 36. fig. 1.* Halimus angustifolius, seminibus singularibus vasculis, Bursæ pastoris æmulis, bicornibus, inclusis. *Raii Hist. Pl. app. 1856.* Fortè Halimus minor *Germanicus. Park. Th.* Halimus minor. *C B P. 120. & Halimus aurei arvi in Prodromo descriptus 59. à D. Feurero ad Casparum Bauhinum Northusâ transmissus.*
- Hanc plantam jampridem in palustribus maritimis, prope Scirbeck, juxta Sepulchretum, unum milliare à Bostoniâ oppido remotum, in agro Lincolnensi copiosissimam invenimus. Invenit etiàm nuperrimè in maritimis Belgicis spectatissimus Vir, & insignis Botanicos, D. Carolus du Bois, cujus ramuli summitas, rudi manu delineata,



& satis infelicitèr exsculpta apud Joannem Bauhinum, ad *Portulacæ marinæ* fruticosæ Iconem appingi videtur. Tom. 1. lib. 8. 229. itemque apud Bodæi à Stapel Annotat. in Theophrast. lib. 4. 509. sed hujus genuinam picturam adponere curavimus, Phytograph. nostr. ubi supra.

- AURICULA** *Ursi* *Myconi* pilosa cærulea. *J B. T. 3. app. 869.* Auricula *Ursi* flore violaceo. *Belluc. Ind. Hort. Pisan. app. p. 60.* Auricula *Ursi*, flore cæruleo, folio *Boraginis*. *Park. Th. Sanicula alpina* foliis *Boraginis* villosa. *C B P. 243.* *Verbascum humile*, *Alpinum*, villosum, *Boraginis* flore & folio. *Hort. Leyd. 619.* Auricula *Ursi*, aut potius *Cortusæ Matthioli* facie, *Planta Æthiopica*, foliis ad lacinias supernâ parte, spinis stellæ in modum diductis, echinata, & ad oras, pilis longioribus fimbriata. *Phytogr. Tab. 271. fig. 5.*
- Auricula *Ursi* montana, angustis, & levitèr crenatis foliis, floribus purpureis, in Horto *Patavino* collecta. *Phytogr. Tab. 149. fig. 6.*
- Auricula *Ursi Virginiana* floribus albis, *Boraginis* instâr rostratis, *Cyclaminum* more reflexis. *Phytogr. Tab. 79. fig. 6.* à Celeberrimo Botanico, D. *Banister* è *Virginîâ*, in *Angliam* transmissa fuit.
- Auriculæ *Ursi* affinis, *Androsacæ* dicta major. *Hort. Leyd. 82.* *Saniculæ* affinis *Planta*, *Androsacæ* dicta major. *Morif. Hist. 2. 556.* *Alsine* affinis *Androsacæ* dicta major. *C B P. 251.* *Androsacæ Matthioli* altera. *J B. T. 3. l. 29. 368.*

- AZEDER AETH** arbor *Fraxini* folio, flore cæruleo. *C B P. 415.* *Azederacth.* *Dod. Pempt. 6. lib. 4. c. 26.* *Azederach Avicennæ.* *Park. Th. Azederacheni* arbor. *J B. Tom. 1. l. 5. 554.* *Azadirachta* foliis ramosis majoribus *Syriaca*, s. vulgaris flore cæruleo majore. *Breyn. Prodr. 2. 21.*

- AZEDER ACH** floribus albis sempervirens. *Hort. Leyd. 652.* *Azadarach Indica* foliis non deciduis, officulo-polypyreno. *P B P. 316.* *Azadirachta* foliis ramosis, minoribus *Indica*, flore albo, subcæruleo-purpurascente majore. *Breyn. Prodr. 2. 21.*

## B.



- ALSAMINA** foemina. *C B P. 306.* *Balsamina* foemina, *Persici* folio, vel *Salicis* folio. *J B. Tom. 2. lib. 21. 909.* *Balsamina* *Herba Impatiens*, s. *Noli me tangere*, flore patulo, elegantèr dilutè rubente. *Morif. Hist. 2. 231.*

*Balsamina* foemina, foliis amplioribus, flore majore, amoenè purpurascente. *Morif. Schol. Botan. 132.*

*Balsamina* foemina, angustis & elegantèr crenatis foliis, flore albo minore. *Balsamina* foem flore candido. *Hort. Amst. 48.* *Balsamina Indica* flore albo. *Breyn. Prodr. 2. 22.* *Balsamina* foemina angustifolia *Diiakudalu Zeylanensibus.* *P B P. 317.* an *Tilo-Onapû*, s. *Notenga.* *H M. Part. 9. Tab. 52.*

*Balsamina*



Balsamina lutea, s. Noli me tangere. *C B P.* 306. Balsamina altera, Noli me tangere. *Fab. Col. ecphr.* 150. Noli me tangere. *J B. T. 2. l. 21.* 903. Balsamina Herba Impatiens, s. Noli me tangere, flore patulo luteo. *Moris. Hist.* 2. 282. Mercurialis sylvestris, Noli me tangere dicta, s. Perficaria filiquosa. *Park. Th.*  
Balsamina lutea, s. Noli me tangere major, *Virginiana*, floribus saturatè luteis, rubentibus maculis intus notatis.

Balsamina rotundifolia repens, s. mas. *C B P.* vid. *Cucumis.*

Balsamina *Indica* repens, pomifera. *Francisc. de Honuphriis.* vid. *Passiflora.*

**B A L S A M I F E R A** *Brasiliana* cujus Balsamum *Cabureizica* Indigenis dictum. Cabureiba, s. Balsamum *Peruvianum.* *Pison. lib. 4.* 119. Cabu-Iba. *Marcgravii. lib. 3.* 137. Balsami *Peruviani* Fructus *Clus. exot. lib. 2. cap. 29.* qui, filiqua est spadicea, cum duobus nucleis inclusis, ex *Indiâ Orientali* Nobis advenit.

Balsamifera arbor, *Novæ Hispaniæ Mexicensibus* Hoitziloxitl dicta. *Hernand. apud Recc. lib. 3.* 51. Balsamum purius. *Monard. cap. 9.* Balsamum album. *Park. Th.* Goaconaz *Oviedi Hist. Ind. lib. 10. cap. 13.* & fortè Copaiba *Pisonis. lib. 4.* 118. Balsamum certarum quarundam Plantarum quas Copaibas (*Brasiliani*) vocant. *J B. è Maffeo. Tom. 1. lib. 3.* 306. Plerique enim *Americani*, (adnotante *Gulielmo Pisone*) communi nomine, omnes Resinas odoratas, & Gummi, vocant Copal; variasque illarum species, peculiaribus distinguunt nominibus; Ita *Brasiliani* Arborem hanc resiniferarum facile principem, Copaliba, vel Copa-iba nominant.

Balsamifera arbor *Jamaicensis*, Siliquæ s. *Ceratonix* foliis, Amygdalorum sapore suavis. Fortè Balsamum de *Tolu.* *J B. T. 1. l. 3.* 296. Balsamum *Provinciæ Tolu,* s. Balsamifera 4<sup>a</sup> *Hernand. apud Recc. lib. 3.* 53. Arbor *Americana* *Ceratiæ* foliis ex quâ colligitur Balsamum de *Tolu.* *Monardes. cap. 10.* Balsamum *Tolutanum* foliis *Ceratiæ* similibus, quod candidum est. *C B P.* 401.

Balsamifera *Iuglandis* folio *Americana.* Arbor *Indica* *Iuglandis* folio. *Cat. Hort. Lipsiens. olim edit.*

**B A L S A M U M** *Caprarium Antegoanum* & *Nevisense* foetidum; Arbuscula *Americana* Ballote olens, Scammoneæ foliis punctatis, ferrugineâ lanugine obductis, floribus parvis, pentapetalis, spicatis. *Phytogr. Tab. 80.* hæc autem re verâ est de *Ricinorum* genere. Est Planta sempervirens, totâ enim hyeme, perpetuâ fronde ornatam hæud semel observavimus; ab honesto Viro *Jacobo Harlow* in *Angliam* primò allata est.

**B A M B U** *Indorum.* vid. *Arundo arborca.*

**B A M I A.** *J B.* vid. *Alcea Indica.*

**B A N A N A** *Marcgr. & Bananeira* *Pisonis.* vid. *Ficus Indica.*

**B A N D U R A** *Zeylanensibus.* vid. *Utricularia Vegetabilis.*

**B A N G U E** *Cannabi* simile. *C B P.* vid. *Cannabis.*

**B A O B A B** *Alpini.* vid. *Cucurbitifera arbor.*



**BASELLA** *H M.* vid. *Mirabilis Peruviana* & *affinis*.

**BATATAS** Camotes *Hispanorum Clusii*. *C B P.* & Batatas Inhame *Lusitanor.*  
*Clus.* vid. *Convolvulus*.

Batatas trifoliata *Capensis*, & Batat. *Capensis* tetraphyllos vulgò, vid. *Phaseolus*.

Batatas Tajaoba *Brasilensibus*. *Pisonis*, vid. *Campanula*.

**BATLESCHAIN** *Æthiopicum*. *Breyn.* vid. *Solanum*.

**BENNEL**, *Hort. Malabar. Part. 5. Tab. 4. p. 7.* Frutex baccifer *Malabaricus* floribus Umbellatis, simplici officulo tetraspermo. *Raii Hist. Pl. 1557.*

**BEESHA** *Hort. Malabar.* vid. *Arundo Indica*

**BELAMODAGAM** *Hort. Malab.* vid. *Prunifera*.

**BELDROGA** *Marcgr.* vid. *Portulaca*.

**BELERICU** *Hort. Malab.* vid. *Apocynum*.

**BELI** *Bengalensium*, vid. *Cucurbitifera*.

**BELINGELA** *Pisonis*, vid. *Solanum*.

**BELLIS** pratensis duplici florum serie. *HR B.* 28.

Bellis media nudicaulis, non ramosa. *Raii Hist. Pl. 349.* Bellis sylvatica. *J B. T. 3. l. 26. 114.* Bellis sylvestris media, caule carens. *C B P.* 261.

Bellis hortensis prolifera. *C B P.* 262. Bellis nova suave-rubens umbellifera, *Belgarum.* *HR P.* 29.

Bellis hortensis pediculo folioso. *C B P.* 262. *Naturæ lusus est.*

Bellis minor hortensis rubra multiplex, florum petalis fistulosis. Bellis hortensis rubra, flore multiplici fistuloso. *HR P.* 49. *variat flore albo & Sulphureo.*

Bellis hortensis globofo flore viridi. Bellis hortensis flore herbaceo. *Morif. HR B.* 28. *hanc etiam Naturæ lusum esse suspicamur.*

Bellis major. *J B. T. 3. l. 26. 114.* Bellis major sylvestris caule folioso. *C B P.* 260. Bellis major vulgaris, s. sylvestris. *Park.* Bupthalmum majus *Loniceri*, *Consolidam* media *Vulnerariorum.* *Lobel.*

Bellis alpina major, rigido folio. *C B P.* 261. & in *Prodromo* 120. Bellis Alpina major, foliis angustis rigidis. *J B. T. 3. l. 26. 115.* Bellis alpestris major densiore folio *Cesalpini Hort. Patav. à Turre. 15.* Bellis Alpina major. *C B P.* in *Phytopinac* 505.

Bellis montana major, folio acuto. *C B P.* 261. & in *Prodr.* 121. Bellidis Alpinae majoris altera species. *ejusd. Phytopin.* 505. Bellis Alpinae alia species minor, folio non rigido. *J B. T. 3. l. 26. 115.*

Bellis *Virginiana* densiore folio. *Morif. Prælad.* 238. an Bellis *Pyrenaica* latissimo folio, flore maximo. *Schol. Botan.* 184. Bellis peregrina, denso, fragilique folio. *Cat. Hort. Juncquet.* fortè Bellis Alpina major, rigido folio, brevior, & latior. *Cat. Hort. Acad. Leyd.*

Bellis



Bellis *Americana* procerior, serotina, ramosa, flore amplissimo. *Hort. Leyd.* 85. àn Bellis radice repente, foliis latioribus ferratis? *H R B.* 27. & *Praelud.* 239. fortè Tlally-yetl *Novæ Hispaniæ Hernand.* apud *Recc.* 423. Bellis *Indica* maxima. *Hort. Patav. à Turre.* 15. àn Bellis major *Indica* latifolia, *Ciass.* *Fascie Nutii.* 21? Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 17. fig. 2.

Bellis major *Africana*, Camphoram redolens, aut potiùs Zedoariam.

Bellis Myrtifolia humilis, cauliculo ad florem folioso. *Promontorii Bon. Spei.* ex *Codice Comptoniano. Phytogr. Tab.* 150. fig. 2. Fortè ad hanc Plantam, ceu proximum locum sibi vendicare potest Tepetlachichix Xihuitl *Mexicensibus*, s. Herba amara in montibus proveniens. *Hernandez.* apud *Recc.* 192.

Bellis montana minor. *J B. T.* 3. lib. 26. 115.

Bellis montana gramineis foliis. *Botan. Monsp.* app. 291.

Bellis montana incana, & crenata, foliis & crenis obtusis. *Phytog. Tab.* 17. Bellis montana, folio obtuso, crenato. *C B P.* 261. & in *Prodr.* 121. Bellis sylvestris folio crasso, & villoso. *Schol. Botan.* 184. ubi ponitur pro non descripto.

Bellis alexiteria *Brasilensibus*, Caa-apia dicta, & aliquandò Ipecacuanha, Nostratibus, **Black Snake Root**, vulgò. Sub Afari titulo è *Terrâ Marianâ* in *Phytogr. Tab.* 15. videtis Iconem.

Bellis montana foliis Coronopi laciniis, s. denticulis rarioribus, & magis extantibus. *Phytogr. Tab.* 17. fig. 3. àn Bellis Alpina foliis profundius dissectis. *Schol. Botan.* 184? Bellis leucanthema, (s. Anthemis) frutescens, foliis profundè laciniatis. *Breyn. Prodr.* 2. Bellis montana, foliis Chrysanthemi. *Magnol. ejusd. ibid.* Bellis Chrysanthemi Segetum folio, D. *Hans Sloane, Raii Hist. Pl.* 351. Cujus ramulum exsiccatum in Horto, D. *Magnol. Monspelii* collectum, idem D. *Sloane* sub eodem titulo exhibuit *Cl. Raio*. Hujus species habetur altera elatior; Chamæmelo *Lusitanico* latifolio *Breyn.* plurimum conveniens, & fortè eadem.

Bellis montana foliis imis Coronopum, superioribus Linum referentibus. àn Bellis Alpina foliis laciniatis? *Schol. Botan.* 184.

Bellis ramosa *Chinensis*, Scabiosæ Ovillæ foliis incanis.

Bellis ramosa umbellifera *Cornuti* 194. Bellis major ramosa, umbellifera, *Americana. Park. Theatr.* After ramosus annuus *Canadensis Moris.* hujus autem semina sunt longa, minimè papposa, utcunque *Morisonus* in *Praelud.* p. 236. Flores in pappos abire scribat.

Bellis pumila crenata, Agerati æmula, crenis bicornibus, asperiusculis. *Phytogr. Tab.* 17. fig. 4. Bellis maritima, foliis Agerati. *C B P.* 261. & in *Prodr.* 121.

Bellis Alpina pumila, Abrotani foliis multifidis. Fortè Bellis Alpina foliis laciniatis. *Schol. Botan.* 184.

Bellis Alpina pumila, Lavendulæ multifidæ foliis, caule aphylo.

Bellis montana, Tanaceti foliis, caule singulari annua. *Phytogr. Tab.* 17. fig. 5. Chamæmelo affine, Bupthalmum *Italicum* segetum altissimum. *J B. T.* 3. l. 16. 120.

Bellis Alpina, Bupthalmi foliis, summo caule ramoso. Chamæmelum *Leucanthemum Hispanicum*, magno flore. *C B P.* 135. quod in *Prodromo* describitur. p. 70. àn Bellis montana major, foliis Chysanthemi *Cretici* angustioribus? *Botan. Monsp.* app. 307.



Bellis Alpina, Parthenii foliis elatior. *Phytogr. Tab. 17. fig. 6.*

Bellis Leucanthema, Tanaceti foliis inodori, flore majori. *Morif. Præhud. 362. Tanacetum inodorum, flore majori. C B P. 132. Tanacetum album, flore ampliore. J B. T. 3. l. 26. 133. hujus picturam videsis apud Icones Roberti.*

Bellis montana minor, Tanaceti folio. *Morif. Præhud. 239. Phytogr. Tab. 82. fig. 1. Tanacetum montanum inodorum, minori flore. C B P. 132. Tanacetum album. J B. Tom. 3. l. 26. 133. Tanacetum inodorum 2m. Clus. Hist. lib. 3. 338. Fortè Bellis Tanaceti folio minor, Lusitanicum. Griseii Viridar. Lusitan.*

Bellis lutea spinosa, arborescens Cretica, flore aphylo. Bellis spinosa. *Pr. Alpin. exot. lib. 2. 327. Bellis spinosa, foliis Agerati. C B P. 262. Bellis major spinosa, flore luteo nudo. Park. Theatr. Bellis spinosa elatior, & fruticosior Herbariorum, bullatis, aureis floribus. Adversarior. part. altera. Lobel. 372.*

Eadem foliis non spinosis. Bellis foliis Agerati non spinosis. *Hort. Leyd. 86.*

Bellis Africana lutea minor, flore nudo cernuo. Bellis African. capitulo aphylo luteo, Coronopi folio, cauliculis procumbentibus. *Hort. Leyd. 86. Chrysanthemum Capit. Bon. Spei, s. repens flore aphylo; D. Syen. Breyn. Cent. 1. 156. Chrysanthemum exoticum minus, capitulo aphylo, Chamæmeli nudi facie Breynii. Schol. Botan. 183.*

Bellis lutea foliis profundè incis, major & minor. *C B P. vid. Chrysanthemum.*

Bellis lutea, foliis subrotundis. *C B P. vid. Chrysanthemum.*

BELMUSCUS *Agyptia. Honor. Belli. vid. Alcea.*

BELOEERE. *H M. vid. Alcea.*

BELOXYLUM Myrti majore folio, bacciferum, vid. *Lycium.*

BELUTTA *Tsjampacam. H M. vid. Castanea.*

BEM-NOSI, *Hort. Malabar. vid. Negundo.*

BEM-MOENJA, *H M. Part. 5. Tab. 57. Arbor Indica foliis alatis, flore, & fructu vidua, Ben-moenja dicta, Raii Hist. Pl. 1787.*

BENGI-EIRI *Hort. Malabar. vid. Ricinus.*

BENIVIFERA *Garzia, vid. Arbor Virginiana, Pisaminis folio baccata, Benzoinum redolens.*

BENKA-LESJAM, *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 34. fol. 71. Arbor Indica foliis alatis, floribus & fructu nondum compertis. Quos enim pro fructibus describunt Horti Malabarici Autores, meræ excrescentiæ sunt, Gallarum æmula, Insectorum Matrices ad foliorum ortum, vel ipsis foliis innascentes, intus cavæ, ac substantiâ farinacâ refertæ, intrâ quas, unum alterumve insectum volatile, è Papilionum genere hospitatur.*

BER *Indica fructu Iujubino. J B. vid. Iujuba.*

BERBERIS Dumetorum, latissimo folio *Novæ Angliæ. P B P. 307.*

Berberis



*Berberis Indica* Aurantiæ folio, s. Noela-Tali *Hort. Malab. Part. 4. Tab. 56. fol. 119.*

**B E T A** alba vel pallescens, quæ *Sicula* & *Sicla* Officinarum. *Morif. Hist. 2. 296.*

Beta communis alba *Park. Paradis.* Beta candida. *J B. Tom. 2. lib. 23. 961.*

Beta *Sicula*, s. *Syriaca* platyneuros alba. *Morif. Hist. 2. 596.* Beta pallidè virens major. *C B P. 118.* Beta *Italica* *Park.*

Beta *Sicula* costâ latâ, luteâ, aureâ, rubrâ, ruberrimâ. *Morif. Hist. 2. 596.*

Beta rubra radice Rapæ. *C B P. 118.* Beta radice rubrâ crassâ. *J B. Tom. 2. lib. 23. 961.* Beta *Romana* rubra, *Raposa* dicta *Park.*

Beta *Cretica* semine aculeato. *C B P. 118.* Beta *Cretica* spinosa *Park.* Beta *Cretica* semine spinoso. *J B. Tom. 2. lib. 23. 963.* Sub titulo *Acetosa Cretica semine aculeato, variis è locis olim accepimus, ad Spinachia genus potiori jure ableganda.*

**B E T O N I C A** flore albo *Clusii.* *J B. Tom. 3. lib. 28. 302. C B P. 235.*

Betonica purpurea, spicâ longiore, molliore & seriùs florente, *D. Turnefort. Raii Hist. Pl. app. fol. 1871.*

Betonica major *Danica.* *Park. Theatr. 614.* Betonica amplissima Alpina. *Belluccii. Indic. Pisan.*

Betonica Alpina, latifolia, major, villosa, flore luteo. *HR P. 30. Phytogr. Tab. 150. fig. 4.*

Betonica *Virginiana* elatior, *Scrophulariæ* folio, flore ochroleuco. *Phytogr. Tab. 150. fig. 3.* Betonica maxima *Scrophulariæ* folio, flore è luteo pallescente. *Schol. Botan. HR P. 64.* Hanc Betonicae speciem Mamozt-lacotl *Novæ Hispan. Terentii* apud *Recc. 383.* (s. florem *Chrysanthemi* in Descriptione excipias) haud multùm abludit.

Betonica arboresc. *Maderaspatana*, villosis foliis profundè venosis. *Phytogr. Tab. 150. fig. 5.*

Betonica arboresc. foliis amplioribus, ex *Insulâ Barbadosi*, flore luteo minimo. *Phytogr. Tab. 150. fig. 6.* præcedentis fortè varietas major.

**B E T R E**, s. Betelle. *J B. Tom. 1. l. 4. 437.* Betre, s. Tembul. *C B P. 410.* Betre *Malaccensium.* Volubilis modo arbores scandens, fructu lacertæ caudam æmulante. *eiusd. ibid.* Betre, Betle, Betele, s. Bethle. *Park. Theatr.*

Betre *Garzia* ab horto. *Hist. Lugd. app. 14.* Betelle, s. Betre. *Linschot. Part. 4. Ind. Orient. c. 5. p. 97. fig. 14.* Betys vel Betre. *Pisonis. lib. 4. 196.* Betele & Siriiboa *Malaiis* dicta, *Jacob Bontii. lib. 6. 91.* Buyo-buyo *Philippicarum Hernand. lib. 4. fol. 125.* Betla-Codi. *Hort. Malabar. Part. 7. Tab. 15. fol. 29.*

**B E T U L A** nigra *Virginiana.*

*Betula* arbor *Americana*, feminibus *Lithospermi* frumentacei æmulis, *Witch-Tree.* *Barbadosibus* dicta. *Phytogr. Tab. 151. fig. 1.*

**B I S T O R T A** major, radice minùs intortâ. *C B P. 192.* Bistorta major, rugosioribus foliis. *J B. T. 3. l. 31. 538.* Bistorta major vulgaris. *Park. Theatr.*

Bistorta media, folio minùs rugoso. *J B. T. 3. l. 31. 538.* *Phytogr. Tab. 151. fig. 2.*

Bistorta major, radice magis intortâ. *CBP.* Bistorta magis intortâ radice. *Park. Th.*



*Bistorta Alpina maxima*, *Lapathi grandioribus foliis*. Eadem fortè cùm *Bistorta Alpina maxima*. *C B P.* 192. & in *Prodromo*. 100. *Bistorta Alpina maxima Casparo Bauhino*. *J B. Tom. 3. l. 31. 539.* *Bistorta Alpina major*. *Park. Theatr.* *Bistorta Alpina media*. *C B P.* 192. Itèm *Bistorta Alpina minor*. *C B P. ibid.* has enim species. *Cl. Raius* in *Synops. Stirp. Britan.* non separat. *Bistorta minor nostras*. *Park. Theatr.* *Bistorta minima*. *J B. Tom. 3. l. 31. 539.* *Bistorta*, cujus quædam species minima *Alpina*. *Joch. Camerarii. Hort. Med. fol. 28.* *Bistorta Alpina minima Sobolifera*. *Morif. Hist. 2. 585.*

*Bistorta minima Alpina*, foliis imis subrotundis, & minutissimè ferratis, *D. Lloyd, Raii Synops. 45.* *Bistorta Alpina, pumila, varia*. *Park. Theatr.* *Bistorta pumila*, foliis variis, rotundis & longis. *Morif. Hist. 2. p. 585.* *Hujus Icon præcedenti appingitur apud J. Bauhinum. Tom. 3. l. 31. 539.*

**BITI** *Malabarica accedens*, *Arbor Maderaspatana*, flore peculiari. *Phytogr. Tab. 18. fig. 1.*

**BLITUM** *Atriplex dictum*, folio sinuato, saturè virente, *Mexiocanum*. *Hoauhquitl Nov. Hispaniæ, s. Olus*, seminibus in cristam compositis. *Hernandez. apud Recc. l. 8. fol. 269.* Fortè *Atriplex fimetaria minor*. *Thalii Harcyn. 8.* *Atriplex sylvestris altera*. *C B P. 119.* *Atriplex sylvestris altera*, folio sinuato, saturè virente, spicâ subrubrâ. *Morif. Hist. 2. 604.*

*Blitum odoratum Mexiocanum*. *Epazotl, s. Atriplex odorata, Mexicana. Fr. Hernandez. lib. 5. 159.* *Botrys Ambrosioides Mexiocana. C B P. 138.* Cujus semen *Parote Mexiocanæ* nomine missum. *Botrys fruticosa Americana. Park. Theatr.*

*Blitum Americanum humile lucidum. P B P. 318.*

*Blitum minus Indiæ Orientalis*, summis foliis lunulatum. *Phytogr. Tab. 272. fig. 1.* àn *Blitum Indicum nodosum?* *D. Bobart.*

*Blitum Virginianum polyspermon*, erectum, viride, *D. Sherard.*

*Blitum erectum minus Suecicum*, Cauliculis punicañtibus, à Reverendis. Viro *D. Stonestreet*, habuimus.

*Blitum minimum Arabicum.*

*Blitum erectum Barb idense* *Megasporon. Phytogr. Tab. 151. fig. 3.* àn *Cararú Brasiliensium. Pisonis, lib. 4. fol. 241.* Wild Spinache (i. e.) *Spinachia sylvestris*, *Nostratibus* vocata.

*Blitum Africanum*, *Galthæ palustris* folio, caule nudo cubitali, spicam pedalem & ampliùs sustinente. *Phytogr. Tab. 18. fig. 2.* *Petasites Africanus*, *Galthæ palustris* folio. *Hort Leyd. 488.* *Petasitidis* folio, *Bliti* fructu, *Raii Hist. Pl. append. Hujus Panicula spissatim sparsa, onusta est innumerâ herbaceorum flosculorum racematim coherentium fœturâ, seminibusque nudis.* àn *Petasites Indica?* *J B. T. 3. l. 32. 568.*

*Blitum Scoparium, Bellevidere dictum. Linaria Scoparia. C B P. 212.* *Linaria Bellevidere dicta. J B. T. 3. l. 30. 462.* *Scoparia, s. Belvidere Italarum. Park. Paradis.*

*Blitum Scoparium, Bellevidere Indicum pusillum, è Maderaspatan.*

*Blitum arborescens Vermiculatum marinum*, *Sedum minus fruticosum. C B P. 284.* *Cali species, s. Vermicularis marina arborescens. J B. T. 3. l. 35. 704.*

*Blitum*



Blitum arborescens Vermiculatum elatius, Virgulis tenuioribus albis, foliis longioribus, viridibus, minùs confertis obfitum. àn Sedum minus fruticosum alterum? *C B P.* 284. Itèm fortè Anthyllis Chamæpityides frutescens. *ejusd. Pinac.* 282. Chamæpitys Vermiculata. *Adv. Lob. Icon* 381. Cali species, s. Vermiculati fruticis varietas major. *¶ B. ibid.*

Blitum arborescens Vermiculatum marinum, foliis exiguis, glaucis, densissimè Stipatis. àn Vermiculatæ fruticis varietas major? *Lob. Icon.* 382. Chamæpitys altera *Dioscoridis. lib. 3. c. 176?* *Vide Supp. p. 399*

Blitum monospermon *Indicum*, aculeatum, capsulâ rotundâ. *Breyn. vid. Amaranthus.*

BON, vel Ban, ex cujus fructu *Ægyptii* potum *Caova* conficiunt. *Pr. Alpini ad Plant. Ægypt.* fol. 63. Bon, vel Ban, arbor. *¶ B.* Itèm Buna, Bunnû, & Bunchos *Arabum ejusd. Tom. 1. lib. 4.* 421. Bon arbor, cum fructu suo Buna. *Park. Th.* Buna ex quâ in *Alexandria* potio fit. *Clus. not. in Garz.* Euonymo similis *Ægyptiaca*, fructu baccis Lauri simili. *C B P.* 428. Sed malè *Ægyptiaca* vocatur, cum neque sponte, neque culta in *Ægypto* invenitur, sed in *Arabia fælici* tantum. *The Coffee Tree*, Nostratibus vulgò. Icon habetur *Phytogr. Tab.* 272.

BRASSICA arvensis. *C B P.* 112. àn Brassica rubra minor? *J B. Tom. 2. l. 21.* 833. Brassica 3<sup>a</sup> *Fuchsii. Hist. Lugd.* 524. *Hæc est ut nobis videtur ista caulis, s. Brassicæ agrestis species, quæ Insulâ Eliensi feritur ad Oleum conficiendum, quæque ibi Cole, & ejus semen Cole-Seed, dicitur; Oleum autem quod inde exprimitur Cole-Dyl, nuncupatur.*

Brassica arborea, s. procerior ramosa, maritima, *Morif. Hist.* 2. 208. àn Brassica sylvestris. *J. B. T. 2. l. 21.* 833. *C B P.* 112. *Park. Theatr.*

Brassica maritima monospermos. *C B P.* 112. Brassica marina monospermos. *Park. Theatr.* Brassica monospermos *Anglica.* *¶ B. Tom. 2. l. 21.* 830. Brassica maritima major, repens, multiflora, alba, monospermos, *Morif. Hist.* 2. 209. *Foliis carnosiss, cæsiis cum Brassica convenit, floribus albis, capsulis subrotundis monospermis, ab eadem differt; ut recte notat. Celeberr. noster Raius.*

Brassica campestris, flore albo, *Clus. Hist.* Brassica campestris perfoliata flore albo. *C B P.* 112. Perfoliata, filiquosa. *¶ B. T. 2. l. 21.* 835. Perfoliata filiquosa vulgaris, seu Brassica campestris, *Park. Theatr.*

Brassica sylvestris, s. Brassicæ affinis Turritis dicta. Turritis vulgatio. *¶ B. T. 2. l. 21.* 836. Brassica sylvestris, foliis integris, & hispidis. *C B P.* 112. Brassica foliis integris per terram stratis, & in caulibus hispidis, *Morif. Hist.* 2. 211. Itèm Leucoium, flore albo, filiquis uno versu positis, & reflexis, *ejusd. Hist.* 2. 243.

Brassica sylvestris ramosa, tota penè glabra. *C B P.* 112. Turrita major, *Clus. Hist.* 2. 126. Turritis major. *Park. Theatr.* àn Eadem cum proximè subsequenti; àn verè diversa, ut nobis videtur.

Brassica sylvestris, foliis circà radicem Cichoraceis. *C B P.* 112. Glastifolia Cichoroides *Joannis Baubini*, & Turritis 2<sup>a</sup> *Clusii.* *¶ B. Tom. 2. l. 21. fol.* 836. Brassica sylvestris, foliis circà radicem Cichoraceis, asperis, caulibus autèm adhærentibus planis, seu glabris, *Morif. Hist.* 2. 210.

Brassica



*Brassica sylvestris Alpina.* C B P. 112. Quæ sub 3<sup>a</sup> in *Prodromo* describitur ; itèm *Erysimo* similis hirsuta, non laciniata, alba, *ejusd.* C B P. 101. *Turritis Alpina,* Park. Th. itèm *Erysimo* similis, hirsuta Planta, *ejusd.* Park. Th. *Barbarea muralis.* J B. libr. de *Plantis,* à Sanct. Et Hist. Pl. Tom. 2. lib. 21. 869.

*Brassica Alpina spuria,* foliis *Bursæ pastoris* instàr laciniatis, hirsuta. *Phytogr. Tab.* 206. fig. 3. *Nasturtium Alpinum* insipidum. C B P. 105. *Cardamine Alpina* insipida. *Fab. Column. ecphr. Part. 2. fol.* 69.

*Brassica spuria exilis,* non laciniata, hirsutior, subrotundis foliis, caule magis folioso. *Phyt. Tab.* 80. fig. 2. *Brassica spuria minima,* caule magis folioso, hirsutior, nostra, *Raii Synops. Stirp. Britann. append.*

*Brassica spuria exilis,* non laciniata, foliis longioribus juxtà Terram hirsutis, ad colliculos verò glabris. *Bursæ pastoris* similis, filiquosa major, s. majoribus foliis. C B P. 108. *Bursa pastoria,* s. *Pilosella filiquosa.* J B. Tom. 2. l. 21. 870. *Dra-bæ filiquosæ* similis, Planta præcox, annua, *Morif. Hist.* 2. 235.

*Brassica spuria exilior,* s. minima, foliis glabris, & hirsutis, *Bursæ pastoris* similis, filiquosa minor, s. minoribus foliis. C B P. 109.

**B R U N E L L A** major, folio non dissecto. C B P. 260. *Prunella* flore minore, vulgaris. J B. Tom. 3. lib. 30. 428. variat flore purpurascente, & albo.

*Brunella folio laciniato.* C B P. 261. variat etiàm, flore albo.

*Brunella Boetica* annua, foliis laciniatis, *Morif. Prælud. Botan.* 481. *Brunella minor* alba, laciniata. C B P. 261. *Prunella* flore albo parvo, folio laciniato. J B. T. 3. lib. 30. 429. *Melissa Boetica.* H R B. 132. *Symphytum petræum,* *Lob. Obs.* 251. Et *Icon.* 475. Fortè *Brunella minima.* *Belluc. Ind. Hort. Pisan.* 13.

*Brunella Alpina grandiflora,* & elatior, mucronatis, integris foliis, flore cæruleo. *Brunella cæruleo magno flore.* C B P. 261. *Prunella* 1a. *Clusii Hist.* 2. fol. 42. *Prunella* flore magno, folio non laciniato. J B. Tom. 3. lib. 30. 429. *Prunella grandiflora Camerar.*

Eadem flore albo. *Prunella alba. Tabern. Icon.*

Eadem foliis laciniatis, flore saturatiùs purpurascente. C B P. *Prunella laciniata,* flore magno purpureo. J B.

Eadem flore albo ; *Prunella* flore magno albo, folio laciniato. J B.

*Brunella rotundifolia,* flore cæruleo, maxima. àn *Brunella Lusitanica* flore, & spicâ majore, *Dodart. Memoir.*

*Brunella Alpina purpurea,* verticillis grandioribus, aculeatis. Fortè *Prunella spinosa, Wheleri Itinerar.*

*Brunella minor,* folio rigido integro. C B. *Phytopin.* 503. ubi descriptio habetur. *Brunella Hyssopifolia.* C B P. 261. *Prunella angustifolia.* J B. Tom. 3. lib. 30. 430. Hujus *Icon* exhibetur in *Phytogr. Tab.* 80. fig. 3.

*Brunella cærulea perelegans,* *Chamæpitys Austriaca,* dicta. àn *Brunella Alpina* folio glabro, angusto, integro. H R B. 32? *Brunella Alpina Hyssopifolia mas.* *Schol. Botan.* *Chamæpitys cærulea Austriaca.* C B P. 250. *Chamæpitys Austriaca,* *Clus. Hist. Pl.* *Chamæpitys cærulea,* *Camer. Hort. Medic.*

**BRYONIA** aspera *Maderaspata*na, limbis foliorum spinulis rarioribus, denticulatis.

Bryonia



*Bryonia Africana*, foliis Lupuli scabris; *Phytogr. Tab. 151. fig. 5. in Hort. Comptoniano*, ex feminibus, à Cl. Hermanno, transmissis enatam conspeximus.

*Bryonia Zeylonica*, foliis profundè laciniatis, *Hort. Leyd. 95.* *Bryonia Zeylonica* foetida, flore luteo major, fructu rubro oblongo. *P B P.* *Kopalam Zeylonensibus* dicta. *Momordica minor Indiae Orientalis*, *Bryoniae* facie, fructu glabro, molli. *Uvae crispae* magnitudine, & effigie, suave purpurascens, lineis niveis striato. *Breyn Prodr. 2. 74.* *Balsamina Cucumerina Malabarica*, fructu minore, oblongo, rotundo, glabro. *Hort. Medic. Amst. 47.* *Nehoëmaka Hort. Malabar. Part. 8.* à *Comelino* falsò putata.

*Bryonia alba levis Americana*, cortice albo nitente; fortè *Yztaczazalic Mexicensibus*, s. *Herba glutinosa*, & candens. *Hernandez, apud Reccum. lib. 8. fol. 283. Phytogr. Tab. 272. fig. 3.* àn *Bryonia Aurubica*, floribus albis *Jasmini* æmulis, radice magnâ tuberosâ, quâ exsiccata & comminuta, panis loco utuntur *Incolae*, quibus *Neboy* audit, *Hort. Beaumont. 11.* *Cassavi Orubicum* sylvestre; àn *Cuguacucuremia*, & *Cuacu-Mandyba. Pisonis. P B P. 320?* Fortè *Rapum Americanum*, foliis *Bryoniae. C B P. 90.* àn Fortè *Lupulus Mechiocanus* ejusd. *C B P. 298.*

*Bryonia Americana* fructu aureo, *Cerasi parvi* magnitudine, tetrapyreno venenato, *Barbadsibus* nostratibus *Doyleon-Wythe*, vocata. *Phytogr. Tab. 191. fig. 4.* àn *Saxivolvula*, *Hernand. fol. 211?*

*Bryonia Coromandeliensis* umbilicatis foliis, crassis, acuminatis, villosa. *Pada Kelengu, Hort. Malab. Part. 7.* *Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 24. fig. 6.* Sub *Convolvuli instar Volubilis*, &c. titulo.

*Bryonia Curassavica*, floribus albis *Jasmini. P B P. 318.* Fortè etiâ *Momordica* flore fistuloso, radiato, albo, *Hederæ* foliis *Malabarica. Breyn. Prodr. 2. 74.* Planta scandens, *Hederaceis* foliis, *Zeylanica* ejusd. *Breyn. in Miscellan. Curiosor. Ann. 4. & 5. Obs. 137.* àn *Tota Piri, Hort. Malabar. Part. 8.* Cujus autem folia longitudine sunt nimis producta; vel fortè *Padavalam. ejusd. Hort. Malabaric.* quærendum proponit, idem, *Cl. Breynius ubi supra.*

*Bryonia levis Americana* *Epimedii* foliis plurimis, ad caulium nodos verticillatim dependentibus, ex *Insulis Caribæis.*

*Bryonia Sideritidis* folio multiplici, dispermis, flore cæruleo, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 152. fig. 1.*

*Bryonoides trifoliatum Indicum*, foliis succulentis crassis, & crenatis. *Phytogr. Tab. 152. fig. 2.* *Bryonia Curassavica*, folio dentato, crasso & succoso caule. *P B P. in Addend. Trifoliata Portoricensis* Planta capreolata, foliis crassiusculis serratis, *Hort. Beaumont. 41.*

**BUCANEPHORON** *Americanum* *Limonio* congener dictum, *Clusio.* *Limonium peregrinum*, foliis formâ floris *Aristolochiæ. C B P. 192.* *Limonium Canadense. Dodon. edit. Belg. in Append. Nepenthes Americanum*, flore majore. *Breyn. Prodr. 2. 76.* *Trumpet-Leaf* nostratibus dictum. *Hujus folium optime respondet figuræ* (*Joan. Bauhini. Tom. 1. lib. 9. 307.*) posita pro *Thuris limpidi* folio, è *Floridâ*, proinde, *Cl. Raio* nostro, una cum *Parkinsono*, *Thuris limpidi folium*, nihil aliud esse videtur, quam *Limonio congeneris Plantæ. Clusio dictæ folium*, ut videtur.



in Hist. Pl. At Banduræ foliorum folliculum appensum, vel ipsissimum hoc Thuris limpidi folium, vel eidem valde simile esse opinatur, Cl. Breyn. Prodr. 1. 18.

BU CANEPHYLLON elatius *Virginianum*, s. Limonio congeneris altera species elatior, foliis triplo longioribus. *Phytogr. Tab.* 152. fig. 3.

BUGLOSSUM sylvestre majus nigrum. *C B P.* 256. Buglossum alterum flore nigro, *Matthiol. cum magnis fig.* 1188. Buglossum sylvestre majus, flore nigro. *Park. Theatr.* àn *Echium nigrum*, flore eleganti; *Pr. Alp. exot.* 311.

Buglossum sylvestr. minus. *C B P.* *Echium Fuchsii*, s. *Borrage sylvestris*. *J B. Tom.* 3. lib. 33. 581.

Buglossum latifolium sempervirens. *C B P.* 256. Bugloss. folio *Boraginis Hispanicum*. *J B. T. 3. l.* 33. 577. *Borago Echiodes*. *Pr. Alp. exot. lib. 2. fol.* 209.

Buglossum sempervirens minus. *H R B.* 33. *Symphytum minus*, *Boraginis facie*. *C B P.* 259. Bugloss. minus *Symphyti foliis*, *Hort. Leyd.* 98. *Symphytum pumilum repens*, s. *Borago minima Herbariorum*. *J B. Tom.* 3. l. 33. 597. *Borago minor Herbarior.* *Park. Theatr.*

Buglossum angustifolium maximum *Creticum*, floribus rubris, striis albis elegantissime pictis.

Buglossum, s. *Borago sylvestris Cretica* perennis, flore rubro cremesino. *Zanon. fol.* 49. Buglossum *Creticum* majus, flore cæruleo purpurascente. *HRP.* 33. àn *Echium Creticum angustifolium rubrum*, *C B P.*?

Buglossum *Lusitanicum* bullatis foliis, *Morif. Præhud. Botan.* 241. àn Buglossum *Creticum*, *Verrucosum* perlatum quibusd. *H R P.*? *Blister'd Bugloss*, nostratibus vulgò.

Buglossum sylvestre caulibus procumbentibus. *C B P.* 257. *Cynoglossa* fortè *Topiaria Plinio*; *Echium lappulatum* quibusd. *J B. Tom.* 3. lib. 33. 590. *Alyssum Germanicum Echiodes*. *Lobel.* *Borago minor sylvestr.* *Park.* *Aparime major.* *Plinii Tabernæm.*

Buglossum annuum, pullo flore minimo, vesicarium, *Raii Hist. Pl.* 495. Buglossum procumbens annuum, pullo minimo flore. *H R B.* 33. Itèm *Echium procumbens*, flosculis atrorubentibus. *ejusd.* 68. *Boragine sylvestre annua di Candia*. *Zanon. Istoria Botan.* 48. *Borago Cretica*, flore violaceo. *Icon Roberti.* variat etiàm flore albo.

Buglossum *Creticum* minimum odoratum, flore vario eleganti. *H R P.* 33. Buglossum *Creticum*, cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, *Echii foliis verrucosis*, *Hort. Leyd.* 98. Ubi *Synonyma* malè adhibentur. àn *Borago Cretica minima Contareni* non descripta, *Bellucii Ind. Hort. Pisan. app.* 60. *Boragine Marale variegata cum Fiore odorato di Candia* *Zanon. Istor. Botan.* fol. 46. Hujus varietatem in Monte *Hymetto*, propè *Athenas*, invenit Reverendiss. Vir, *D. George Wheler.* vid. *Itiner. lib. 6. fol.* 415. Hujus florum calyces, in vesiculas turgidulas, *Solani Halicacabi* ferè modo extumescunt.

Buglossum *Echiodes Indicum*, *Convolvuli cærulei minoris folio*. *Breyn.* apud *Ephem. Germ.* vid. *Euphrasie affinis*.

Buglossum marinum incanum cæruleo flore, *Hort. Leyd.* vid. *Lappula*.



Buglossum dulce, ex Insulis *Lancastriae*. *Park.* vid. *Cynoglossum*.

Buglossæ affinis, femine *Cotylode*, s. umbilicato *Raii*, vid. *Cynoglossa*.

BUGULA cærulea Alpina: *Park. Th.* 525. *Phytogr. Tab.* 18. *fig.* 3. *Consolida media cærulea Alpina. C B P.* 260. *J B. T.* 3. *lib.* 30. 432. Itèm *Consolida media Genevensis, ejusd. ibid.* àn *Consolida media pratensis hirsuta, H R P.* 55?

Bugula non crenata tomentosa, *Suecica*, feminibus albis. à Reverendiss. Viro, D. *Stonestreet* accepimus.

BULBOCASTANUM, vulgari simile, ex Oris *Malabaricis*.

BUPHTHALMUM, Tanaceti minoris foliis exoticum. *Bupthalmum Alpinum*, flore candido, *Triumfetti Obs.* 79.

*Bupthalmum Creticum*, cotulæ facie, flore albo, *Breyn. Cent.* 1. 154:

*Bupthalmum humile*, *Cotulæ folio Lusitanicum*.

*Bupthalmum Alpinum*, Absinthii odore, & sapore, *Cotulæ foliis rigidioribus*. Absinthium montanum, *Chamæmeli flore magno. C B P.* 140. Absinthium montanum, Abrotani fœminæ flore, *Column. Phytobas.* 23. Absinthium montanum, flore *Chamæmeli. J B. T.* 3. *lib.* 26. 184.

*Bupthalmum amarum*, Absinthii Umbelliferi ferè foliis, inodorum. *Chamæmelum Alpinum inodorum. C B P.* 136. *Leucanthemum Alpinum, Clusii Hist.* 1. 335.

*Bupthalmum Leucanthemum*, *Cotulæ fœtidæ foliis*. Fortè *Bupthalmum peregrinum, Pr. Alpin. exot.* cap. 49. fol. 321.

*Bupthalmum Canariense Leucanthemum. Cotulæ fœtidæ crassioribus foliis*, radice, acrisapore, & fervido. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 5. *Pyrethrum (fortè) flore Bellidis. C B P.* *Magala ab Insulanis nuncupatur.*

BUPL EURUM folio rigido. *CBP.* 278. *Bupleurum perenne latifolium, Moris. Umbellif.* 26. *Auricula leporis altera, s. rigidior. J B. Tom.* 3. *lib.* 27. fol. 200.

*Bupleurum folio subrotundo, s. vulgatissimum. C B P.* 278. *Bupleurum perenne angustifol. Moris. Umbel.* 26. *Auricula leporis Umbellâ luteâ. J B. T.* 3. *lib.* 27. 200.

*Bupleurum minus angustifolium, Raii Hist. Pl. lib.* 9. fol. 474. *Bupleurum annuum angustifolium. Botan. Monsp.* 42.

*Bupleurum angustissimo folio. C B P.* *Bupleurum minimum, Column. ecphr.* 247. *Auricula leporis minima. J B. Tom.* 3. *lib.* 27. 201.

*Bupleuri similis Planta umbellata, Æthiopica*, ad caulium nodos tomentosa. *Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 5. àn *Perfoliato angustifolio montano Columnæ similis, Planta umbellifera nova, fructu triplici membranaceo, Cap. Bon. Spei, Breyn. Fascic.* p. 25.

*Bupleuri folia femine papposo, Valerianoides, Umbellata, cauliculo scabro, ex Promontor Bon. Spei. Hanc prorsus novam Plantam, cujus semina cinerea, parva, striata, pappo plumato candidissimo involuta, D<sup>no</sup> Alexand. Brown, Chirurgo peritissimo nos debemus; qui alias quoque plurimas Plantas, & eas quidem rarissimas, secum deferbat, ex India Orientali, & Promontorio Bon. Spei, atque nobis communicavit. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab.* 272. *fig.* 6.



- BUXUS arborescens. *CBP.* 471. Buxus. *J B. T.* 1. lib. 4. 496.  
 Buxus foliis rotundioribus. *CBP.* 471. Chamæbuxus minor, *Park. Theatr.*  
 Buxus foliis, ex luteo-variegatis. *HRP.* 34. Buxus aurata. *Park.*  
 Buxus major foliis per limbum aureis. *HRP.* 34.  
 Buxus tenuifolia apicibus pictis. Buxus longioribus foliis, in acumen luteum desinentibus. *HRP.* 34.  
 Buxus *Africana* rotundifolia ferrata. *PBP. Phytogr. Tab.* 80. fig. 5. in *HRH.* collegimus.  
 Buxus *Lauri Alexandrinæ* foliis accedens *Americana.* *Phytogr. Tab.* 80. fig. 6. ex *Insulâ Barbadosi* nobis primùm advecta est.

## C.



- CACALIA** Alpina Petasitidis foliis, subtus lanuginosis. *Cacalia* quibusdam. *J B. Tom.* 3. lib. 32. 569. *Cacalia* tomentosa. *CBP.* 198. *Cacalia* incano, rotundo folio, *Park. Theatr.* 1221. *Cacalia* incano folio, *Clus. Hist.* 2. 115.  
*Cacaliæ* genus alterum, foliis acutioribus, utrinque viridantibus. *J B. T.* 3. l. 32. 569.  
*Cacalia* glabro folio acuminato, *Park.* 1221. *Cacalia* foliis cutaneis, acutioribus, & glabris. *CBP.* 198.  
*Cacalia* Alpina foliis angulosis, & acutioribus, subtus tomentosis, *Schol. Botan.* 10.  
*Cacalia* Alpina, Tussilaginis mucronato folio crasso, lanugine obducto. àn *Cacalia* Alpina foliis araneosâ lanugine obductis, *Schol. Botan.* 10? Fortè *Cacalia*, foliis crassis hirsutis. *CBP.*  
*Cacalia Pyrenaica* Alliariæ foliis, *Schol. Botan.* 10.  
*Cacalia Americana*, Urticæ folia glabra, flore purpurascente. àn *Yztaçtexcaltlacotli Mexicensibus*, s. Virga nigra Saxorum, *Hernand.* apud *Reccum*, fol. 167. nostra tamèn, flores habet senescentes. Ab amicissimo Viro, *D. Doody*, communicata. Hujus Iconem in *Phytogr. Tab.* 153. fig. 1. Sub titulo *Cacaliæ Africanæ*, *Prom. Bon. Spei*, per errorem exhibitam invenies.  
**CACHRYS**, s. Libanotis *Cachryophoros*, semine fungoso, lævi, *Morif. Umbel.* 1. Libanotis *Ferulæ* folio, semine anguloso. *CBP.* 150. Libanotis *Cachryophoros* quibusdam, floribus luteis. *J B. Tom.* 3. lib. 27. 40.  
Eadem semine fungoso fulcato aspero, *Morif. Umbel.* 2. *Hippomarathrum Creticum*. *CBP. Park.* ex sententiâ, *Paul. Boccone.* & *Raii nostri*, *Hist. Pl.* lib. 9. 424. àn *Foeniculum magnum*, s. *Hippomarathrum*. *J B. Tom.* 3. lib. 27. 5? *Hippomarathrum Siculum* *Boccon. de Pl. Siculis*, fol. 36. Huc fortè pertinet *Ycel-Acocotli Chullulensis*. *Rosmarinum ferulaceum*, *Hernand.* apud *Recc.* lib. 7. 232.  
*Cachrys Sicula*, semine fungoso striato, lanuginoso, exteriùs candido, foliis *Pastinacæ* latifoliæ. *Morif. Umbell.* *Panax Siculum*, semine hirsuto, foliis *Pastinacæ* latifoliæ fativæ, *Boccon. de Pl. Sicul.* 1.



- CALABURA** alba. P B P. 319. Fortè Sebestenæ similis *Americana* ejusd. PBP. 374. Ramuli hujus arboris pictura exhibetur in *Phytogr. Tab. 152. fig. 4. ut & Tab. 326 f.*
- Calabura** rubra, foliis Laurinis. P B P. 319. àn Coubarilla *Caribæis* dicta. Courbury *Ogilveii Americ.* 347. Cujus fructus cortice ligneo, obductus est; àn fortè *Samaca*. *J. B. Tom. 1. l. 1. cap. 44. fol. 111.* Fortè etiàm Arbor *Americana* Limonii magnitudine fructum ferens, *Jamaicensibus* Pinguin dicta. Hujusmodi classis sunt Mameii *Nierembergio*, Arbor Cuciophora, *Sura* quibusdam, & *Sura-Boom Belgarum*. Cujus succo pro Vino *Indigenæ* usurpant, linguâ vernaculâ *Suram*, aut *Toddy* vocantes, itèm Baobab *Alpini*, fructu magnitudine Citri; (i. e.) *Guanabanus Scaligeri*, qui *Cardanum* reprehendit, quòd non in *Librum XII. cum Mammei fructu retulerit: Item quod ejus pulpam, liquorem appellarit, fædo errore* *Tab. 32*
- CALAMINTHA** Clinopodii *Austriaci* foliis, odore Pulegii. Clinopodium Pulegii odore, ex *Horto Patavino*, *Schol. Botan. 54.* sub quo titulo, nobis communicavit D. Sherard. qui in *Horto D. Triumphetti*, apud *Bononienses* collegit. Hujus Iconem videsis in *Phytogr. Tab. 163. fig. 4.* àn Calamintha Cattaria humilis, Polii folio, Pulegii odore. P B P. *append?* Fortè etiàm Calamintha montana Acini aut Serpylli foliis, *Raii Catalog. Stirp. Exterar, p 81.*
- Calamintha** montana longiori folio glabra, floribus violaceis. *Phytogr. Tab. 153.* Mentastrum glabrum floribus violaceis, *Hort. Bles. 134.* àn *Mentha sylvestris*, longioribus, nigrioribus, & minùs incanis foliis. C B P. 227.
- CALENDULA** minor arvensis, *Hort. Leyd. 103.* Caltha arvensis. C B P. 276. Caltha minima, *J. B. Tom. 3. l. 26. 103.*
- Eadem *Hispanica*, *Hort. Leyd. 103.* Calendula minima *Hispanica Mentzel. pugil. Rariorum. Huic sunt folia hirsutie pubescentia.*
- Calendula** humilis, *Africana*, flore intùs albo, foris violaceo, simplici, *Hort. Leydens. 104.* Calendula, Bellidis Leucanthemæ flore, & facie, fructu compresso, foliaceo, cordiformi, s. Tordylly, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. 24.*
- Calendula** Chrysanthemoides, semine, seu fructu rotundo lanuginoso, Stœbes folio. *Breynii, vid. Jacobæa.*
- CAMARA** ejusque species, *Marcgr. & Camara-tinga Pisonis, vid. Viburnum.*
- CAMPANULA** hirsuta, s. Trachelium Giganteum. Campanula maxima foliis latissimis. C B P. 94. *Morif. Hist. 2. 459.* Campanula pulchra, à *Tossano Carolo* missa. *J. B. Tom. 2. lib. 20. 807.* Itèm Trachelium candidum *Anglicum* majus, foliis ferè Digitalis, vel Campanulæ, ejusd. *J. B. ibid.* Trachelium majus *Belgarum. Lobel. Clus. Park* flore albo etiàm in *Horto* satum variat. *Cl. noster Ratus (Hist. Pl. lib. 15. 752)* rectè taxat *Lobelium* quia hanc plantam, bis exhibuit eodem in loco, nimirum in *Obs. p. 177.* sub titulis 1<sup>o</sup>. Trachelii majoris *Belgarum.* Et 2<sup>o</sup>. *Anglici* Septentrionalis, majoris Trachelii candidi; ut facilè esset probare, si operæ pretium foret.
- Campanula** vulgatior, foliis Urticæ, vel major, & asperior. C B P. 94. *J. B. T. 2. l. 20. 805.* Variat flore purpurascente, albo, cæruleo, itèm flore simplici, duplici, triplici, aut quadruplici.



Campanula Urticæ foliis oblongis, minus asperis. *C B P.* 94. Campanula Alpina glabra, flore dilutissimo cæruleo. *J B. T.* 2. l. 20. 806.

Campanula hirsuta, folio angusto, tenuiter serrato, floribus parvis spicatis. *Phytogr. Tab.* 153. fig. 3.

Campanula Alpina asperior, foliis Echii, flore magno villoso. *Phytogr. Tab.* 153. fig. 3. Rapunculus fortè montanus, foliis Anchusæ, *Moris. Hist.* 2. Rapunculus montanus, s. Trachelium montanum, *J B. Tom.* 2. Fortè etiàm Campanula minor, foliis succisæ, flore magno, *Raii Hist. Pl.* 735. àn Campanula humilior, Alpina, foliis Echii, *Schol. Botan.* 77. Campanula (fortè) foliis Echii, floribus villosis. *C B P.*

Campanula minor hirsuta, Drabæ folio, *Phytogr. Tab.* 153. fig. 4. àn Campanula Drabæ minoris folio. *C B P.*

Campanula hirsuta Bellidis folio, *Phytogr. Tab.* 153. fig. 5. Fortè Trachelium parvum, folio Bellidis subrotundo, *Raii Cat. Stirp. exterar.*

Campanula hirsuta, Ocimi folio, caulem ambiente, flore pendulo, *Boccon. de Pl. Sicul.* 1. àn Campanula, foliis subrotundis, pro Campanula, hirsuta 1<sup>a</sup> in *Prodr. descript.* *C B P.* 94.

Campanula Echioides Alpina, maxima, lutea. Campanula foliis Echii. *C B P.* 94. Itèm Echium Alpinum luteum, *ejusd.* *C B P.* 254. Trachelium *δύσκολος* *Clus. Hist.* 2. 172. Alopecuros Alpinus quibusdam; Echium montanum *Dalechampii.* *J B. Tom.* 2. lib. 20. 809.

Campanula, s. Trachelium capitatum hirsutum, foliis gramineis, *Boccon. de Pl. Siculis, Tab.* 42. fol. 79. Trachelium fortè altissimum hirsutum, asperius, foliis angustis, floribus parvis. *J B. Tom.* 2. lib. 20. 801. Fortè etiàm Campanula foliis Echii. *C B. Prodr.* 36. Cervicaria major tenuifolia *Thalii Harcyn. Saxonothing.* p. 32.

Campanula pratensis, flore conglomerato. *C B P.* Trachelium minus multis. *J B. Tom.* 2. lib. 20. 800. variat flore albo. Fortè Trachelium minus album, *J B. Tom.* 2. 801.

Campanula pratensis, flore conglomerato Asarinæ foliis, *Schol. Botan.* 76.

Campanula pratensis, flore per caulem sparso. *C B P.*

Campanula hortensis Rapunculi radice, *C B P.* 94. Trachelii genus mollioribus foliis, *Clusii Hist.* Trachelium in maritimis, *Lobel. Adversar.* Campanula hortensis Rapunculi radice repente, *Moris. Hist.* 2. 460. Campanula repens, flore minore cæruleo, *J B. Tom.* 2. l. 20. 806.

Campanula hortensis, folio, & flore oblongo. *C B P.* 94. Viola Mariana *Dodonei*; *Quibusdam* Medium, *J B. Tom.* 2. l. 20. 804. variat flore albido.

Campanula, s. Viola Mariana laciniatis foliis, peregrina. Medium *Dioscoridis*, vel Mindium, *Rhasis Rauwolf Itinerar.* Hanc tantùm semèl vidimus intèr *Exsiccatas Rauwolfianas* apud Reverendiss. D. D. *Vossium* dùm viveret, *Windsorise* Prebendarium dignissimum.

Campanula *Canariensis* Regia, s. Medium radice tuberosâ, foliis sinuatis, cœsiis, Atriplicis æmulis, ternis circa caulem ambientibus, flore amplo pendulo, coloris flammeo rutilante, *Phytogr. Tab.* 276. fig. 1. inter *Convolvularum species per insuriam posita*, in Hort. Regio Hampton. nunc viget, ubi mense Januario, flores edidit.



edidit. Huc fortè spectat *Cachruiaqua*, *Nov. Hist. Terent.* apud *Reccum*, 359. (*i. e.*) *Medium Americanum*, flore rubro surrecto. Itèm *Totoncaxoxos Coyollin*, *s. Rivorum Medicina*, *Hernand.* 195. de hujus enim genere nobis esse videtur, & quiddam tale nomen mereatur, *viz.* *Medium Mexicanum*, flore rubeo pendulo, vasculis feminiferis triquetris.

*Campanula*, *s. Medium Hispanicum* *Lychnidis sylvestris* foliis, villosis. *Campanula Lychnidea*, *J. B. T.* 2. l. 20. 803. *Convolvulus minor rectus Hispanicus villosus*, *Breyn. Prodr.* 2. 35. *Lychnis sylvestris Campanulæ flore*, *C B P.* 206. *Lychnidis sylvestris species*, *Myconi Hist. Lugd.* lib. 7. 817.

*Campanula Alpina*, *Sphærocephalos*, *C B P.* 94: *Trachelio majori petræo Pona* simile, *s. non idem.* *J. B. T.* 2. l. 20. 802. *Trachelium majus petræum Pona.* *Descript. Mont. Bald.* apud *Clus.* 333. Icon exhibetur, *Phytogr. Tab.* 152.

*Campanula Sphærocephalos pervenuſta*, foliorum od oras insignitèr denticulata, *Phytogr. Tab.* 152. fig. 6. Fortè *Campanula Alpina*, *Sphærocephalos cærulea*, magno flore, *Schol. Botan.* 76. Itèm *Campanula*, *s. Medium*, foliis minoribus crispis, flore tubuloso, *ejusd. Schol. Botan.* fol. 77. àn *Rapunculus Alpinus*, corniculatus, *Ger. emac.* f. 454. *Rapunculus Alpinus corniculatus*, *C B. Prodr.* *Trachelium Alpinum minus*, *Pona Descript. Mont. Bald.* *Rapunculo comoso, spicato, aliqua-* *tenus affinis*, ex *Baldo*, *J. B. T.* 2. l. 20. 811.

*Campanula umbellata*, foliis longioribus inæqualitèr dentatis, glabra. àn *Rapunculus umbellatus*, *Sonchi*, fol. *C B P.* 92?

Eadem minor.

*Campanula glabra*, graminifolia, floribus in Umbellam positis. *Rapunculus umbellatus*, folio gramineo. *C B P.* 92. *Rapunculum* alterum angustifolium *Alpin.* *Fab. Col.* *Rapunculus sylvestris umbellatus.* 3. *Camerar.* Icon, ad *Thalium.* *Rapunculus minimus*, folio tenui gramineo, *J. B. Tom.* 2. l. 20. 810.

*Campanula major lactescens Lobelii*, *Morif. Hist.* 2. 452. *Campanula lactescens scetidior*, *Clus. Hist.* *Rapunculus hortensis latiore folio*, *s. Pyramidalis.* *C B P.* 93: *Pyramidalis lævis.* *J. B. T.* 2. l. 20. 808. *Campanula major*, *s. Pyramidalis*, *Park. Paradis.*

*Campanula glabra*, *s. Pyramidalis minor.* *Rapunculus Alpinus*, seu *Pyramidalis minor.* Qui 1a. in *Prodrom.* *C B P.* 93. *Campanula Pyramidalis minor*, *Pr. Alpin. exot. lib.* 2. 341.

*Campanula lævis*, *s. Rapunculus Africanus*, angustifolius, copioso majore flore, è dictariis, *D. D. Magnol.* apud *Cortenianas.*

*Campanula Stiriaca*, nonnihil hirsuta, imis foliis rotundioribus, per ambitum profundè crenatis. *Rapunculi* genus folio ferrato, rotundiore. *J. B. Tom.* 2. lib. 20. 798. *Campanula foliis subrotundis*, *C B. Prodr.* 35.

*Campanula lævior*, foliis angustioribus, tenuitèr ferratis, longo pediculo appensis.

*Campanula angustifolia cærulea & alba.* *J. B. Tom.* 2. l. 20. 803. *Campanula Persicifolia Lobelii*, flore cæruleo, *Morif. Hist.* 2. 452. *Rapunculus*, *D. Banist.* *Persicifolius magno flore.* *C B P.* 93. variat flore albo, itèm flore cæruleo, & albo pleno.

*Campanula Persicifolii latioribus foliis*, flore minori, apud *Cortenianas.* àn *Rapunculus Campanulatus* aut *Neriifolius minor*, *s. 6<sup>m</sup>. Thalii Harcyn.* p. 95?

*Campanula Persicæ folio Virginiana Borraginis flore*, *Cat. D. Banist. Mss.*

*Campanu-*



- Campanula minor *Americana*, foliis rigidis, flore cæruleo patulo, *Hort. Leyd.* 107.  
 Trachelium minus *Americanum*, flore cæruleo patulo, *Dodart. Memoir.* 119.
- Campanula vulgaris minor, foliis imis rotundioribus, sinuatis, non serratis, floribus cæruleis, *Morif. Hist.* 2. 456. Campanula minor rotundifolia, vulgaris. *CBP.* 93. Campanula parva, *Anguillare Cantabrica.* *J. B. T.* 2. l. 20. 796. variat etiam floribus albis.
- Campanula minor, rotundifolia Alpina. *CBP.* 93. & *Prodr.* 34. ubi depingitur.  
 Campanula minor Alpina, *Clus. Hist.* 2. 173. Rapunculus Alpinus minor rotundifolius, *Morif. Hist.* 2. 456. *Angliæ nostræ Indigena est, quantumvis in Nostratium Catalogis nuspiam memoratur.* Hujus Icon (meo quidem Arbitratu) sub alieno Titulo adponitur in *J. Bauhini, Hist. Pl. Tom.* 2. lib. 20. 810. Fortè etiam Campanula Alpina Linifolia cærulea, *CB. Prodr.* 34. Campanula Linifolia cærulea, vel Rapunculus Campanulatus Linifolius. *J. B. T.* 2. 797. quam *D. Magnol. in App. ad Botan. Monsp.* à Campan. minori Alpina, *Clus.* non esse distinctam arbitratur.
- Campanula Cymbalariae folio, *Park. Theatr.* Campanula Cymbalariae folio, vel folio hederaceo. *CBP.* 93. Campanula folio hederaceo, species *Cantabricæ Anguillare.* *J. B. Tom.* 2. lib. 20. 797.
- Campanula flore minore albicante, ramosior, *Morif. Hist.* 2. 456. Erinos Nicandri, & Dioscoridis, *Column. Phytobasan.* 101. Erinus major, *Fab. Column.* Rapunculo affinis. *J. B. Tom.* 2 lib. 20. 799.
- Campanula minor annua, foliis incis, *Morif. Hist.* 2. 458. Rapunculus minor, foliis incis. *CBP.* 92. Erini, s. Rapunculi minimum genus, *Column. Phytobas.* Erinos, *Fab. Columnæ* minor. *J. B. Tom.* 2. lib. 20. 799. qui, & hanc plantam iterum describit, *Tom.* 3. lib. 29. 367. Sub titulo Alsine oblongo folio, serrato, flore cæruleo: ut optime animadvertit Eruditiss. *Raius Hist. Pl.* 743.
- Campanula minor, *Africana*, Erini facie, flore violaceo, cauliculis erectis, *Hort. Leyd.* 110.
- Eadem cauliculis procumbentibus, *ejusd. Hort. Leyd.* 108. Rapunculus galeatus minimus, flore violaceo, foliolis dentatis brevioribus, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr.* 2. 87. Sed malè dicitur galeatus.
- Campanula arvensis, minima, *Dodonæi, Morif. Hist.* 2. 457. Campanula vasculo oblongo, in filiquam producto, speculum Veneris dicta, *Raii Hist. Pl.* 742. Onobrychis arvensis, vel Campanula arvensis erecta, *CBP.* 215. Avicularia Sylvii, Quibusdam. *J. B. Tom.* 2. l. 20. 800. Speculum Veneris majus, *Park.*
- Campanula, s. Speculum veneris, minus, *Park. Raii Hist. Pl.* 743. Campanula arvensis, minima, erecta, *Morison. Hist.* 2. 457. variat flore albo.
- Campanula pentagonia, perfoliata, *Morif. ibid.* Speculum Veneris perfoliatum, s. Viola pentagonia, perfoliata, *Raii Hist. Pl.* 743.
- Campanula radice esculentâ, flore cæruleo, *Hort. Leyd.* 107. Rapunculus esculentus. *CBP.* 92. *Raii Hist.* 739. *Morif. Hist.* 455. Rapunculus vulgaris, Campanulatus, *J. B. T.* 2. lib. 20. 795.
- Campanula tuberosa *Indica*, Convolvuli cordatis foliis, densioribus, radice esculentâ. Rapunculus *Brasilensis* tuberosus, s. Battata Tajaoba 1<sup>a</sup> Pisonis, *Raii Hist. Pl.* 1334. àn Cacavaxochitl, s. Flos Cacavatl, *Hernandez. apud Reccum.* 226. Ricophora (fortè) s. Inhame *Curassavica*, folio subrotundo, rigido splendente. *PBP.* 371. Eadem,



Eadem, foliis angustioribus, Tajaoba 3<sup>a</sup> vel Mangara-miri *Brasilensium* Pison. 236. àn Ricophora, s. Inhame *Sirinamensis*, folio auriculato. P B P. 371 ?

CAMPHORATA hirsuta. C B P. 486. Camphorata *Monspeliensium*. J B. T. 3. lib. 29. 379. Camphorata *Monspeliensium*. àn Chamæpeuce *Plinii Lobel.* in *Adversar.*

Camphoratae congener. C B P. 486. Camphoratae congener, s. Anthyllis altera *Italorum*, Park. *Theatr.*

Camphoratae hirsutae similis, Fruticulus *Aethiopicus*, foliolis ex uno puncto confertissimis, flore parvo, tubuloso, niveo, pentapetaloide, *Phytogr. Tab.* 272. fig. 7. àn Camphoratae similis altera, magis hirsuta, *Breyn. Fascic. Rarior.* 19.

Camphoratae effigie, Planta *Africana*, *Phytogr. Tab.* 273. fig. 1. àn Camphoratae similis, longius radicata, *Breyn. Fascic. Rarior.* 19.

Camphoratae congener, s. Anthyllis altera *Aethiopica*, summis Virgulis tomentosa, *Phytogr. Tab.* 273. fig. 2. àn Planta Corios folio *Africana*, *Breyn. Fascic. Rarior. Plantar.* 25. in Promontorio Bon. Spei collegit Ornatissimus Vir, & Chirurgus peritiss. D. *Alexander Brown*, & nobis communicavit. *vid. Supp. pa.* 399

Camphorifera arbor, ex qua Camphora, Officinarum, *H. Leyd.* 111. Arbor Camphorifera *Japonica*, *Breyn. Cent.* 1. 11. *Prodr.* 1. 4. Camphora Officinar. C B P. 500. Camphura; quæ Salicis folio, dicitur. J B. T. 1. lib. 9. 338. Arbor Camphorifera, *Japonica*, foliis Laurinis, fructu parvo, globofo, calyce brevissimo, *Breyn. Prodr.* 2. 16.

CANELLA C B P. vid. *Cassia Cinamomea*.

CANIRAM ejusque species, vid. *Malus Malabarica*. aut *Cucurbitifera*

CANNA Indica latifolia, maxima, *Hort. Leyd.* 111. Arundo Indica latissimo folio, flore rutilo *H R P.* 25. facit hujus seminum non inepta cum glandulis plumbeis similitudo, ut apud *Nostrates*, *Indian Gunshot*, nomen meruerint.

Canna Indica latifolia, humilior, flore saturatius rubente, *Hort. Leyd.* 114. Arundo Indica latifolia. C B P. 19. J B. Tom. 2. lib. 18. 489. Langoas *Bod. à Stapel. Not. in Theophr. lib.* 4. 334. variat interdum flore fulgenti, cocco splendente, *Katubala Malabarens.* *H M. Part.* 11. *Tab.* 43.

Canna Indica, flore luteo punctato. Arundo Indica latifolia, flore luteo punctato. C B P. 19. J B. Tom. 2. l. 18. 490. Mearu *Brasilensibus*, *Pison. lib.* 4. 212. Tozcuitlapilxochitl *Mexicensium*, s. *Lithospermum arundinaceum*, *Hernand.* apud *Reccum*, lib. 8. 282. At hanc Plantam, *Cl. Hermannus* in *Cat. append.* 690. *Milio Indico* proposuit, & eandem *Milio Solis Bontii*, perperam putavit, eodem errore, errat, & *Eruditiss. Raius*, cum in *Historiæ suæ Plantarum Universalis* *append.* 1908. Hanc cum *Milio Solis Bontii*, eandem proposuit.

Canna Indica venenata, Ourari fortè, *Part.* 8. *Ind. Occid.* C B P. 184. The Dumb Cane & *Doyson Cane*; *Nostratibus dictum*, *Ligon. Hist. Insul. Barbados.* qui hujus mentionem facit, fol. 69.

Canna Indica angustifolia, pediculis longis, ad imum folium, nodo singulari, geniculatis. àn *Agutiguepo obi*, *Marcgr. lib.* 1. cap. 25. fol. 53. Canna Indica antivenenata; *Turara*, *Part.* 8. *Ind. Occid.* C B P. 184. Fortè *L'Herbe aux Fleches*,



*ches*, D. Rochfort. p. 114. Arrow Root, & Dart Herb, Nostratibus dicta? Fortè etiam Radix contra venenatas sagittas. C B P. 14. Tarupara radix in Guianâ, cujus succo vulnerati sanantur, Part. 8. Ind. Occid.

*Canna Indica* angustifolia, flore flavo, Hort. Leyd. 114. Albara Pisonis. 213. Lithospermum Arundinaceum aliud, Hernandez. apud Reccum. 282.

*Canna Indica*, angustifolia, flore flavo, foliis sine pediculis, Acacoyotl, s. Arundo Vulpina, altera, Hernandez. apud Reccum. 262. Lithospermum, majus Arundinaceum, Indicum Joan. Terrent. Not. in Hernand. ubi suprâ. Lachrymæ Moysi vulgò.

*Canna Indica*, ad imum caulem racemifera, Pacozeroca Brasiliensibus dicta. Pisonis 213.

*Canna Indica* sylvestris fructu Saxæ duritie, & gypsi adinstar, mansu sub dentibus scruposo, Wild Plantine, Barbadosibus dicta.

*Canna ingens*, Mambu, vel Bambu, dicta, Park. vid. Arundo.

*Cannabis Indica* trifoliata, s. Bangue Indorum. Cannabi similis exotica. C B P. 20. Bangue; Cannabi simile. J B. Tom. 3. lib. 30. 449. Tsjadi Bangi, Bramannis dicta: Bangue foemina & Tsjeru Cansjava, H M. Part. 10. Tab. 61. Bangue, Garcia & Acoſtæ. Bangue, The Indian-Dreamer, Park. Theatr. 1624. Cl. Hermannus in Cat. suo Horti Leydens. minus consideratè, hanc plantam, Altheæ Indicæ speciem esse pronuntiavit; cum re verà Cannabis est: à nostrâ tamèn Europeâ, specie distinctam, esse habemus; at illum optimum virum, & in Simplicium Medicamentorum cognitione (dùm viveret) maximè eruditum, à Demonstratore quodam malefico, apud Nostrates, in hunc errorem, ductum fuisse suspicamur.

*Cannabis lutea* sterilis, & fertilis, Pr. Alpini, vid. Resedæ affinis.

C A P P A R I S rotundifolia non spinosa. H R P. colitur nunc in H R H.

*Capparis spinosa* fructu minore, folio rotundo. C B P. 480. Moris. Hist. 2. 284.

*Capparis spinosa*. J B. Tom. 2. lib. 14. 63.

*Capparis spinosa*, folio acuto. C B P. Park. Theatr. *Capparis Sricula* duplicatâ spinâ, folio acuto, Boccon. 79.

*Capparis forma*, Frutex spinosus Malabaricus. Cara-Schulli, H M. P. 2. fig. 47.

*Capparis* (fortè) *Maderaspatensis*, Euonymi pallentibus foliis, spinis brevibus duplicatis, sub titulo Rhamni talis Icon exhibetur, Phytogr. Tab. 107. fig. 3. àn *Capparis* arborescens fructu Juglandis magnitudine. C B P. *Capparis Arabica*, fructu Ovi magnitudine, semine Piperis instar acri, Bellonii Obs. lib. 2. cap. 60. Hæc autèm omni spina destituitur, nostra tamèn spinosa est.

*Capparis arborescens Indica*, flore pentapetalo, Solda dicta, Raii Hist. Pl. 1630. Solda, H M. Part. 6. Tab. 58. 103.

C A R A P P A arbor, ex Curassaviâ. P B P. Phytogr. Tab. 153. fig. 7. Huic sunt folia Laurina, solida, & splendentia, ex adverso bina, nullo (frequentius) singulari caulem terminante. Inter Exsiccatas Rariores in Americâ collectas, Inscriptione Iron Wood (i. e.) Sideroxyli aliquando conspeximus. Fortè Maga-lignum durissimum, in Insula S. Joannis de Portu Rico, ex quo fabrilis opera parantur, Jonston. Dendrogr. 425. àn Mala Elengi, Hort. Malab. Part. 5. Tab. 55. 109.

C A R C A-



**CARCAPULI** *Acostæ*, fructu Malo aureo simili, D. Syen. Not. in *Hort. Malab.* P. 1. Carcapuli, *Park. Theatr.* f. B. C B P. Coddam-pulli, *Hort. Malab.* P. 1. fig. 24. pag. 41.

**CARDAMOMUM** *Indianum*, fructu rotundo minore. Cardamomum Simpli-  
citer in Officinis dictum. C B P. 414. Cardamomum minus, & vulgare, *Park.*  
*Theatr.* 1576. Elettari, *Hort. Malabar. Part.* 11. Tab. 4, 5, 6. Cardamomum minus,  
*Bontii Hist. lib. 6. cap. 37. fol. 126. Qui gloriatur se primum esse, qui hanc nobi-*  
*lissimam plantam exactè descripsit.*

Cardamomum *Indianum* majus, fructu longiore. Cardamomum majus Officina-  
rum. C B P. 413. Cardamomum majus vulgare, *Park. ibidem.* Cardamomum  
majus, *Bontii.* 127. Elettari secunda species oblongior, sed vilior, *Hort. Mala-*  
*bar. Part.* 11<sup>a</sup>. fol. 11.

**CARDIACA** barbata, s. Marrubium, àn potiùs Cardiacæ, foliorum apicibus,  
in prælongam barbulam extenuatis, verticillis florum, petiolis innitentibus, *Phy-*  
*togr. Tab. 45. fig. 1.* àn Marrubium ex *Aleppo*, verticillis longis pediculis, infi-  
dentibus, *Cat. Hort. Edinburg.*

Cardiacæ *Africana*, foliis Sideritidis, floribus longissimis phœniceis villosis, *H. Leyd.*  
115. Sideritis *Africana*, flore aureo, oblongo, *Thom. Barthol. Act Med.* Leo-  
nurus perennis, *Africanus*, vulgò. Leonurus, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Cent. 1.*  
& *Prodr. 1.* Leonurus perennis, *Africanus*, frutescens, Sideritidis folio, flore  
phœniceo majore. *Breyn. Prodr. 2. 63. Vide Supp. pa. 399.*

Cardiacæ *Americana* annua, Nepetæ folio, floribus brevibus, phœniceis, villosis,  
*Hort. Leyd.* 115. Leonurus annuus, *Americanus*, Nepetæ folio, flore phœniceo,  
minore, *Breyn. Prodr. 2. 62.*

Cardiacæ *Asiatica*, Nepetæ folio, floribus brevibus, pallidè purpureis, *Commel. Not.*  
in *H M. Part. 10. Tab. 88.* Tsjadaen, *Hort. Malabaric. ibidem.* mihi fuit, ex se-  
minibus nata, in *Hort. Reg. Hampton.*

Cardiacæ aquatica, prælongis, & perangustis foliis, *Maderaspatana.* Sub Marru-  
bii aquatici talis nomine, exhibetur pictura, in *Phytogr. Tab. 99. fig. 1.* Huic pro-  
ximè accedit, Tumba, *Hort. Malabar. Part. 10. Tab. 91.*

Cardiacæ minor annua, *Americana*, flore argenteo, s. Leonuros, *Americana* alba,  
folio Sideritidis longiore, *Phytogr. Tab. 80. fig. 7.* Tumba fortè, *Hort. Malab.*  
*Part. 10. fol. 181.* Nepeta *Indica*, Sideritis folio, floribus spicatis, *Commel.*  
*Not. suprà locum.*

Cardiacæ, s. Leonuros, Hyssopi hirsutis foliis, *Maderaspatana*, floribus dilutè rubris,  
unico tantùm verticillo, in ramulorum cymis, *Phytogr. Tab. 118. fig. 4.* Leonu-  
ros minor, *Indica*, coronata.

**CARDUUS** Scolymus, *Pyrenæus*, folio molli. Cinara sylvestris, *Pyrenæa*,  
*Raii Hist. Pl. 301.* Centaurium foliis Cinaræ, *Cornuti. de Pl. Canad. c. 30. fol.*  
72. Centaurium majus, *Pyrenæum*, *Park. Theatr.*

Planta hæc ( ut Cl. Raio nostro perhibetur, ) & colore, capitulorumque magnitudi-  
ne, Cinaræ se prodit esse genuinam; & fortè ( inquit ) ab hæc specie, semine sat,



& in hortis cultâ, ortæ sunt omnes Cinararum hortensium varietatēs. Ast ego à specie sylvestri aculeatâ, Ipsarum ortum malletm deducere.

Carduus Chrysanthemus *Africanus*, Hort. Leyd. 120. Scolymus Chrysanthemus annuus, Dodart. Memoir. 111. Scolymus Chrysanthemos, *Africanus*, procerior, H R P. àn Carduus Chrysanthemos, procerus, *Siculus*, caule eduli, Raii Cat. Ex-  
terar. 84.

Carduus fativus, Cnicus, s. Carthamus dictus. Cnicus fativus, s. Carthamus Officinar. C B P. 378. Carthamus, s. Cnicus. J B. T. 3. l. 25. 79.

Carduo-Cnicus *Virginianus*, flore ex albo & croceo versicolore.

Carduus, s. Cnicus cæruleus, asperior. C B P. 378. Cnicus, s. Carthamus, flore cæruleo. J B. T. 3. l. 25. 80. Cnicus alter, perennis, *Clusii Park. Theatr.*

Carduo-Cnicus perennis, cæruleus, *Tingitanus*, Hort. Leyd. 162.

Carduo-Cnicus *Hispanicus*, Serratulæ foliis, glabris, flore albo cum staminibus cæruleis, Schol. Botan. 217.

Carduo-Cnicus, montanus, humilis, capite magno, cæruleo. Cnicus cæruleus, humilis, *Montis Lupi*, Hort. Leyd. 164. Eryngium montanum, minimum, capitulo magno. C B P. 386. Carduncellus, *Montis Lupi*, J B. T. 3. l. 25. 92.

Carduo-Cnicus (fortè) s. Carduus parvus. J B. Tom. 3. lib. 25. 93.

Carduo-Cnicus sylvestris, hirsutior. Carduus Benedictus. J B. T. 3. l. 25. 75. Cnicus sylvestris, hirsutior; s. Carduus Benedictus. C B P. 378.

Carduo-Cnicus Attractylis dicta. Attractylis lutea. C B P. 379. Attractylis vera, flore luteo. J B. T. 3. lib. 25. 83. Attractylis *Theophrasti*, & *Dioscoridis*, sanguineo succo, *Column. ecphras.* 19.

Carduo-Cnicus, *Creticus* monoclonos, flore croceo. Cnicus singularis, *Prosp. Alpin. exot.* 175.

Carduo-Cnicus, tomentosus *Creticus*. Carduus spinosissimus *Creticus*, Cat. Hort. Patav. à Turre. Attractylis (fortè) purpurea *Cretica* lanuginosa. C B P. 379.

Carduus palustris, mitior, Bardanæ capitulo, summo caule singulari, in *Eliensibus* palustribus inveni. àn Carduus mollis latifolius, Lappæ capitulis. C B P. 377. & in Prodr. 155. Park. Theatr.

Carduus latifolius, pratensis, mitioribus spinis. Carduus pratensis Tragi. J B. T. 3. lib. 24. 42. Carduus pratensis latifolius. C B P. 376.

Carduc-Cirsium magnum, carnosofolio, virente; in Hort. Med. Chelseiano, nupèc observavimus. àn Cirsium maximum, foliis carnosis, bulbosâ radice, fortè *Lutetianum*. J B. Tom. 3. lib. 25. 44.

Carduo-Cirsium Alpinum, Carlinæ vulgaris folio, & caule alato, spinis rigidioribus, armatis, *Phytogr. Tab.* 154. 1. àn Carduus dictus Cirsium, folio laciniato, nigrius; & idem cum Asphodeli radicibus, bulbosis. J B. T. 3. lib. 25. 43. Carduus pratensis, Asphodeli radicibus, Park. Theatr. 959. Carduus pratensis, Asphodeli radice, foliis profundè & tenuitèr laciniatis. C B P. 377. Hujus Exemplari nos ditavit, D. Sherard. àn Cirsium majus, caule alato polycephalon, capitulis majoribus, Personatæ æmulis, ejusd. apud Raii Catalog. Stirpium Exterar. 399.

Carduus bulbosus, *Monspeliens.* s. Acanthus sylvestris, Quibusd. foliis laciniatis. J B. T. 3. lib. 25. 43.

Carduus.



- Carduo-Cirsium maximum**, profundè laciniatum, in foliorum ambitu, spinis molli-  
libus hirtum, *Phytogr. Tab. 154. fig. 2.*
- Carduo-Cirsium Alpinum**, Polypodii instar, profundè laciniatum, & aliquando Den-  
tis Leonis laciniis, flore luteo polyanthemum. *Erysathales, Plinii Hist. Lugd. 2.*
- Carduo-Cirsium** foliis cœsis, laciniatum, capite singulari. *Carduus mollis*, folio la-  
ciniato. *J. B. Tom. 3. lib. 25. 47.* àn *Jacea folio Cerinthes*, purpurascens flore,  
è *Rupe Victoria, Schol. Botan. 208.*
- Carduo-Cirsium montanum**, maximum, incano folio. *Cirsium maximum* Aspho-  
deli radice. *C B P. 377.* *Cirsium tomentosum*, radice bulbosâ, Quibusdam  
*Leucacantha, Anguillare. J. B. Tom. 3. lib. 25.*
- Carduo-Cirsium Anglicum**, radice Hellebori nigri modo, fibrosâ, folio longo. *J. B.*  
*Tom. 3. lib. 25. 45.* *Cirsium Pannonicum* 1<sup>m</sup> pratenſe, *Clus. Hist. 2. 148.* *Cir-*  
*sium Anglicum* 1<sup>m</sup> *Park. Theatr. 960.* *Cirsium* singulari capitulo squammato, vel  
incanum alterum. *C B P. 377.* ubi Synonyma, nescio quo casu, malè transpo-  
ſita eſſe videntur.
- Carduo-Cirsium Britannicum.** *Cirsium Britannicum, Clus. repens. J. B. Tom. 3. l. 25.*  
*46.* *Cirsium aliud Anglicum, Park. Theatr. 962.* *Cirsium majus*, singulari capi-  
tulo magno. *C B P. 377.* *Cirsium majus, Lob. Icon. 582.* àn *Carduus mollis* He-  
lenii folio non spinosus *Camerar.* quærit & ipſe *Raius Hist. Pl. 307.*
- Carduo-Cirsium majus**, singulari capitulo magno, vel incanum, varie dissectum.  
*C B P.* eſt præcedentis tantum varietas; *hanc æquidem varietatem, in unâ eâdem-*  
*que plantâ, hæud raro observavimus.*
- Carduo-Cirsium**, foliis non hirsutis, floribus compactis. *C B P. 377.* *Cirsium*  
*Monſpelianum*, folio longo, glabro, *Matthioli. J. B. T. 3. lib. 25. 44.*
- Carduo-Cirsium**, singularibus capitulis parvis. *C B P. 377.* *Cirsium aliud monta-*  
*num, Park. Theatr. 960.* *Cirsium* 3<sup>m</sup> & montanum 1<sup>m</sup>. *Clus. Hist. lib. 5. 149.*  
*Cirsium*, foliis non laciniatis, virore Brassicæ, & macrocaulon. *J. B. Tom. 3. lib.*  
*25. 45.* *Sub Cirsii Baſanensis nomine, in Herbario vivo, Cl. D. D. More, ad Pata-*  
*vinos compilato nupèr observavimus.*
- Carduo-Cirsium minus**, *Cambrobritannicum*, floribus plurimis, summo caule coag-  
gestis, *Phytogr. Tab. 154. fig. 3.* *Cirsium humile*, montanum *Cynoglossi* folio, po-  
lyanthemum, *Raii Synopf. Pl. Britan. 53.* *Carduus mollis*, *Lapathi* folio. *J. B.*  
*Tom. 3. lib. 25. 46.* *Carduus mollior* 2<sup>m</sup>. *Clus. Hist. 2. 151.* In summis rupibus  
*Arvonie*, à D<sup>no</sup> *Lloyd*, invenitur.
- Carduo-Cirsium minus**, angustifolium, capitulis plurimis, amplioribus, sparsis, è  
*Maderaspatan. Phytogr. Tab. 154. fig. 4.*
- Carduus Moschatus**, flore amplo, capite deflexo. **Carduus Avenarius**, s. *Moscha-*  
*tus, Park. Theatr. 958.* *Carduus* in Avenâ proveniens. *C B P. 377.* itè *Car-*  
*duus spinosiss.* fegetibus frequens. *ejusd. 385.* *Carduus nutans. J. B. T. 3. l. 25.*  
*56.* *Drypis, Hist. Lugd. 1479. variat flore albo, & carneo.*
- Carduus spinosissimus**, latifolius, sphærocephalus, vulgaris. *C B P. 385.* itè *Car-*  
*duus spinosissimus*, angustifolius, vulgaris. *ejusd. ibidem.* *Carduus spinosissimus,*  
*Lob. Icon. Tom. 2. 21.* *Carduus Polyacanthus, Park. Theatr. 982.* *Carduus poly-*  
*acanthus* 1<sup>m</sup>. *Ger. emac. Onopyxus, Dodonæi Hist. Lugd. 1471.* itè *Drypis Loni-*  
*ceri*



*ceri ejusd.* 1480. *Carduus sylvestr.* 1<sup>us</sup> *Dod. Pempt.* 5. lib. 5. 739. Fortè & *Cir-  
fion* 3<sup>m</sup>. totâ suâ stirpe magis spinosum, *ejusd.* *Dod.* 737. *Carduus caule crispo.* *JB.*  
*Tom.* 3. lib. 25. *Aculeosa Gazæ Adversar.*

*Carduus angustifolius, palustris, caule crispo, spinosissimus, capite nutante. Carduus pa-  
lustris.* *CBP.* 377. & in *Pr.* 156. *Carduus polyacanthus* 3<sup>us</sup>. *Ger. emac. variat flore  
albo.*

*Carduus vulgatissimus, incanus, alato caule, confertis capitulis parvis. Carduus  
Acanthoides.* *JB. Tom.* 3. lib. 25. 56. *Carduus polyacanthos* 2<sup>us</sup>. *Ger. emac.*  
*Polyacanthus Theophrasti Historiæ Lugdunens.* ex sententiâ, *Raii Hist. Pl.* 309.  
*Carduus spinosissimus, capitulis minoribus, Phytolog, Britannic.* ad hujus speciem,  
accedit *Carduus Pycnopolycephalos, sylvestris, Triumphetti, Observat. fol.* 103:

*Carduus Vinearum repens, folio Sonchi.* *CBP.* 377. *Ceanothos Column. Esphras.*  
*Part.* 1. 45. *Carduus serpens, lævicaulis.* *JB. T.* 3. l. 25. 59. *Carduus Ceano-  
thos, s. Viarum, & Vinearum repens, Park. Theatr.* 959. variat floribus albis;  
& caule tuberoso, qui *Hæmorrhoidalis Parisiensium.* *HRP.* 37.

*Carduus elatior, Ceanothi æmulus, lævicaulis, ex atro-virole in totum splendens.  
àn Onopyxus alter angustifolius, Park. Theatr.* 981.

*Carduus repens sterilis, spinis mollioribus, Virginianus.*

*Carduus lanceatus, latifolius. CBP.* *Carduus lanceolatus, s. sylvestris, Dodonæi.*  
*JB. Tom.* 3. lib. 25. 58. variat flore albo.

*Carduus lanceolatus ferocior.* *JB. T.* 3. l. 25. 58.

s/ *Carduus tomentosus, Corona fratrum dictum, Park. ejusdemque. Carduus tomen-  
tosus, Anglicus, Raii Hist. Pl.* 311. *Carduus capite tomentoso.* *JB. Tom.* 3.  
lib. 25. *Carduus capite rotundo, tomentoso. CBP.* itèmq, *Carduus tomen-  
tosus, capitulo majore ejusd.*

*Carduus albis maculis notatus, vulgaris. CBP.* 381. *Carduus Marianus, s. lacteis  
maculis notatus.* *JB. Tom.* 3. l. 25. 52.

*Carduus Mariæ, non maculatus, Moris. Præhud.* 245. *Raii Hist. Pl.* 312. *Car-  
duo vulgari Mariæ in omnibus accedit, nisi quod folia edit maculis, s. lineis desti-  
tuta.*

*Carduus leucographis, s. Mariæ hirsutus, capitulo minore, Moris. Præhud. Bot.* 244.

*Carduus lacteus, peregrinus, major, semine fusco, Raii Hist. Pl.* 312. *Silybum ma-  
jus, annuum, Park. Theatr.* 975. variat flore albo, & purpureo.

*Carduus lacteus, peregrinus, Camerarii.* *JB. Tom.* 3. l. 25. 53. *Carduus albis ma-  
culis notatus, exoticus. CBP.* 381. *Silybum minus, Beticum, Park. Theatr.* 976.  
*Aga Cretensium, nomine accepit Caspar. Bauhinus, qui apud Matthiolum dubitat;  
àn hæc Planta, sit Honorii Belli, Agavanus Creticus Stirps spinosa; quam Aca-  
nor, Veteribus dictam fuisse arbitratur, ac à quâ, reliqua spinarum genera, A-  
canacea nuncupata fuere.*

*Carduus albis maculis notatus, exoticus, minor, Moris. HRP.* 39. *Carduus Ga-  
lactites.* *JB. T.* 3. l. 25. 45. *Spina alba, altera, Matthioli, Hist. Lugd.* 1463. itèmq,  
que *Leucacantha Monspeliensium Dalechampii, Hist. Lugd.* 1465. ex sententiâ  
*ejusd. Joannis Bauhini, ibid.* *Carduus maculatus, capitulis Cusii, Quibusdam.*

*Carduus tomentosus, latifolius, sylvestris, Spina alba, vel Acanthium dictus, H.  
Leyd.* 119. *Acanthium vulgare, Park. Theatr.* 979. *Spina alba sylvestr. Fuchsio.*  
*JB. Tom.* 3. lib. 25. 54. *Spina alba tomentosa, latifolia, sylvestr. CBP.* 382. va-  
riat flore albo.

Car.



- Carduus** quibusdam dictus *Acanthium Illyricum*, aliis verò *Onopordon*. J B. *Tom.* 3. *lib.* 25. 55. *Acanthium Illyricum*, Obs. Lob. *HR B.* 3. Spina tomentosa, altera, spinosior. *C B P.*
- Carduus** tomentosus, s. *Acanthium Lusitanicum*. *HR B.* 3. *Acanthium Lusitanicum* altissimum. *HR P.*
- Carduus** tomentosus, *Acanthium* dictus *Arabicus*, *Hort. Oxon. Phytogr. Tab.* 154. *fig.* 5.
- Carduus** tomentosus, s. *Acanthium Illyrico* accedens, capitulis minoribus. *HR B.* 3.
- Carduus** tomentosus, s. *Acanthium Pyrenaicum* angustifolium, magno capite, *Schol. Botan* 213.
- Carduus** *Tingitanus*, flore magno cæruleo, folio *Attractylidis* divisurâ, subtùs incano, spinis durioribus horrida, *Phytogr. Tab.* 81. *fig.* 2. Fortè *Calochierni Cretensum* *Honorio Bello*. *Epist. ad Clusium*. *Calochierni, Carduus Cretensis*. J B. *Tom.* 3. *lib.* 25. 85.
- Carduus** *Andelusiacus*, spinosissimus, echino grandi, aculeis rigidis, armato, noster, *Raii Hist. Pl. append. Phytogr. Tab.* 19. è Regno *Andelusæ* (ubi & ipse collegit) hanc elegantissimam *Cardui* speciem, mittebat ad nos, Ornatissimus Vir, & nobis amicissimus, *D. Joan. Fishwick*.
- Carduus** *Acanthoides*, s. *incanus minor*, elegans, ex *Insulâ Maderensi*, *Phytogr. Tab.* 274. *fig.* 1.
- Carduus** *Chamæleon niger*, dictus, s. *Crocodilion*, *Tabern. Icon.* 690. *Chamæleon niger, Dioscoridis Marantha*. J B. *Tom.* 3. *lib.* 25. *Chamæleon niger Umbellatus*, flore cæruleo hyacinthino. *C B P.* 380.
- Carduus** *Chamæleon albus*, vulgaris, s. *Carlina elatior*, *Clusii Hist.* 2. 155. *Carlina caulescens*, magno flore. *C B P.* 380. àn *Carlina Hispanica* acaulos, flore majore, purpureo, *Schol. Botan.* 218. *Nostra quidem, caulem profert, alioquin ab hac, nihil diversam putamus, nam plerumque, si eo anno floruerit, quo in Hortum transfertur, sine caule permanet, sin minus, multo latior altero anno assurgit, & non tantum cauligera, sed etiam polycephalos, & prolifera fit.*
- Carduus** *humilis*, minore flore, *Carlinae* foliis, *Hort. Lugd.* 120. *Chamæleon exiguus Tragi*. J B. *Tom.* 3. *lib.* 25. 63. *Carlina acaulos*, flore minori, purpureo. *C B P.*
- Carduus** *Salmanticensis*, *Acarnæ* foliis incanis, *Hort. Leyd.* 120. *Acarna major*, caule folioso. *C B P.* 379. *Acarnæ similis*, flore purpureo, *Chamæleon Salmanticensis*, *Clusio*. J B. *T.* 3. l. 25. 91.
- Carduus** *polyacanthus*, caule non folioso, *Acarna major* dictus. *Polyacanthus Casabone*, *Acarnæ similis*. J B. *Tom.* 3. l. 25. 92. *Acarna major*, caule non folioso. *C B P.* 379. *Park. Theatr.* 966. *Acarna Theophrasti*, vulgò.
- Carduus** *Acarna*, dictus, flore purpureo-rubente, patulo. *C B P.* 379. *Acanthioides parva*, *Apula Column. ecphras.*
- Carduus** *Leucoij* foliis, subtùs incanis. *HR B.* 40. & *Prelud. Botan.* 245. *Carduus stellatus*, *Leucoij lutei* foliis, flore purpureo, *Dodart. Memoir.* 69. *Ubi totius Plantæ, Iconem fastuosè admodum depictam videsis.* *Carduus humilis*, aculeatus, *Parmicæ Austriacæ*, foliis *Triumfetti* *Observ.* 96. *Ubi itidem satis curiose depingitur.* *Carduus stellatus*, *Leucoij folio*, *Morini; Florent. Schuyt. Cat. Hort. Leyd.* fol. 19.



*Carduus stellatus*, *Leucoij lutei folio*, totus viridis, capitulo purpureo, summo caulifido infidente.

*Carduus stellatus*, s. *Calcitrapa*. *J. B. Tom. 3. l. 25. 89*: *Carduus stellatus foliis Papaveris erratici*. *C B P. 387*. *Hippophæstum*, vel *Hippophaes Dioscoridis*, *Column. Phytobasan. 105*.

*Carduus stellatus*, foliis integris, serratis, *Botan. Monsp. app. 292*: an *Carduus stellatus*, latifolius, caulescens. *C B P. 386*. *Carduus stellatus Dalechampii*, *Hist. Lugd. 1470*. *Cujus nec figura, nec descriptio placet*. *Carduus stellatus*, latifolius, *Park. Theatr. 989*. *Ubi pictura pro Calcitrapâ vulgari, posita, huic nostro magis arridere videtur*.

*Carduus Solstitialis*, s. *Spina Solstitialis*, quam *Allobroges* nominant *Aureoles*. *Camerar. Phytogr. Tab. 241. fig. 6*. *Carduus stellatus luteus*, foliis Cyani. *C B P. 387*. *Spina Solstitialis*. *J. B. T. 3. lib. 25. Raii Hist. Pl. 317*. *Carduus Solstitialis*, *Dodonæo*, *Park. Theatr. 989*.

*Carduus Solstitialis*, capitulis minus spinosis. *H R B. 40*. *Carduus Solstitialis minor* *Apula Column. ecphraf. 31*. *Jacea lutea*, capite spinoso, minore, *Hort. Leyd. 332*. *Plurimi Botanici Casparum Bauhinum insectantes, hanc, præcedenti eandem perperam faciunt*.

*Carduus stellatus luteus*, capitulis minimis, procumbens, foliis indivisis, *de hac Plantâ, in Horto sibi cultâ, monuit nos Botanicus ille exercitatissimus, D. Samuel Doody*.

*Carduus Æthiopicus*, perpusillus hirsutus, *Pilosellæ foliis incanis, hispidis, Personatæ capitulis, parvis*, *Phytogr. Tab. 273. fig. 6*.

*Carduus Chrysanthemus*, *Narbonensis Ger. & Hispanicus annuus*, vid. *Cichorio affinis*.

*Carduus Sphærocephalus*, latifolius, major. Et minor. *C B P. vid. Scabiosa*.

*Carduus Brasiliæ*, foliis Aloës. *C B P. vid. Ananas*.

**C A R L I N A** acaulos, magno flore. *C B P. 380*. *Carlina caulifera*, vel acaulos. *J. B. Tom. 3. l. 25. 64*. *Carlina humilis*, *Park. Theatr.* *Carlina sessili flore*, *Camerar. Hort. Medic.*

*Carlina sylvestris*, quibusdam, aliis *Attractylis*. *J. B. T. 3. lib. 25. 81*. *Cnicus sylvestris*, spinosior. *C B P. 378*. *Vide Suppl. p. 399* † \*

Eadem flore aureo, perennis, *Hort. Leyd. 121*. *Cnicus sylvestris*, spinosior. *H R P. 54*. ^

*Carlina minor*, sylvestris, *Clus. flore luteo* *J. B. T. 3. l. 25. 84*. *Acarnâ flore luteo*, patulo. *C B P.* Φ

*Carlina Chrysanthemos*, *Africana*, humilis; ex *Codice Comptoniano*. ^ Fortè *Carlina Chrysanthemoides*, flore luteo, *Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2*.

*Carlina peregrina*, pumila foliis rigidis, tenuissimè divisis, flore luteo.

*Carlina polycephalos*, *Polyacantho vulgari similis*, *Æthiopica*, *Phytogr. Tab. 273. fig. 4*.

*Carlina* (fortè) *Africana* foliis integris, tomentosis & in ambitu, spinulis aureis asperata. *Crocodyliades Æthiopica. Nobis. Phytogr. Tab. 273. fig. 5*.

*Carlina caulescens*, magno flore. *C B P. vid. Carduus*.

*Carlina acaulos*, flore minori, purpureo. *C B P. vid. Carduus*.



CARPINUS Matthioli. vid. *Aceris cognata*.

CARTHAMUS ejusque, species. *J. B.* vid. *Carduus*.

CARYOPHYLLATA vulgaris. *C. B. P.* 321. Caryophyllata vulgaris, flore parvo luteo. *J. B. T. 2. l. 17.* 398.

Caryophyllata vulgaris majore flore. *C. B. P.* 321. *Raii Hist. Pl.* 606.

Caryophyllata *Virginiana*, albo flore, minore, radice inodora; *Hort. Leyd.* 121.

Caryophyllata montana *Virginienfis* Parkinsono, ut videtur, *Raii Hist. Pl. append.* 1873.

Caryophyllata campestris, elatior, *Brasiliana*, foliis acuminatis. Cuambu *Brasilienfis* Pison. lib. 4. 208.

Caryophyllata aquatica, nutante flore. *C. B. P.* 321. Caryophyllata aquatica, flore rubro, striato. *J. B. T. 2. lib. 17.* 398. Caryophyllata montana, s. palustris, purpurea, *Park. Th.* Caryophyllata aquatica, nutante flore purpureo, calathi effigie; *Morif. Hist.* 2. 608.

Caryophyllata montana, s. palustris, flore leucophæo, multiplici petalorum serie donato.

Caryophyllata montana, flore luteo, nutante, *Schol. Botan.* 223.

Caryophyllata montana flore magno luteo. *J. B. Tom. 2. lib. 17.* Caryophyllata Alpina, lutea. *C. B. P.* 322.

Caryophyllata *Pyrænaica*, rotundiore, & ampliore folio, *Schol. Botan.* 223.

Caryophyllata Alpina, lucida, magno capite, *Schol. Botan.* Caryophyllata Alpina, minor. *C. B. P.* ?

Caryophyllata Alpina, Apii folio. *C. B. P.* 322. Caryophyllata Alpina, minima, altera; *Ponæ. Descript. Mont. Bald.* *Hujus folia Pimpinellæ Saxifragæ, foliis aliquatenus accedunt.*

Caryophyllata Alpina, Chamædryos folio, *Morifono Raii Hist. Pl.* 608. Chamædryos Alpina, Cisti flore. *C. B. P.* 248. Chamædryos Alpina, flore Fragariæ albo. *J. B. Tom. 3. lib. 28.* 290. *Ubi sub hujus Titulo, Hormini cujusdam appingitur figura.* Chamædryos spuria, montana, Cisti flore, *Park. Theatr.*

Caryophylleus *Monomotapensis* nervosis Bupleuri foliis, intus cavis, flore cæruleo, cauliculis secundum longitudinem alatis, *Phytogr. Tab.* 275. fig. i. àn Tsjerou-Mâu-Maravara, *H. Malabar. Part.* 12. *Tab.* 5. fol. 11. Quæ per incuriam inter pag. 31. & 32. affigitur.

Caryophylleus flos aphyllocaulos, vel juncus, ejusque species. *J. B.* vid. *Scabiosa*.

Caryophyllus arborescens, *Creticus*. *C. B. P.* 208. Qui 1<sup>us</sup> in *Pradromo* descriptus, fol. 104. Caryophyllus sylvestris, arboreus, *Pr. Alpin. exot.* fol. 38. *Betonica coronaria*, arborea, *Cretica*. *J. B. Tom. 3. l. 29.*

Caryophyllus sylvestris, Alfinis, holosteæ arvensis glabræ foliis, flore unico, calyce barbato, *Phytogr. Tab.* 81. fig. 3. *Armeriæ* species, flore summo caule singulari, nostra, *Raii, Synops. Stirp. Britan. append.* Fortè *Lychnis parva*, flore rubello, è calice oblongo, angusto, *Messanensis*, ejusd. *Raii Catal. Stirp. Exterar.* 174. Fortè etiàm Caryophyllus sylvestr. humilis, flore unico. *C. B. P.* 209. *Hic, Partibus Borealis Angliæ, à D. du Bois, nuper inventus est.*

Caryophyllus cæruleus, *Monspeliensium*. *C. B. P.* 209. Caryophyllus sylvestris, juncifolius, cæruleus, *Monspeliens.* *Morif. Hist.* 2. 562. *Aphyllantes Monspeliensibus.* *J. B. Tom. 3. lib. 29.* 335. Caryo-



Caryophyllus Saxatilis, Ericæfolius, umbellatis corymbis. *CB P.* 211. est 12. in *Prodromo.* 105. *Botan. Monspel. D. Magnol.* 53. *Ubi Icon. appingitur, inter fol* 16. & 17. *transposita.*

Caryophyllus Saxatilis, Ericæfolius, ramosus repens. *CB P.* 211. & 13. in *Prodromo.* fol. 105. à *Caryophyllo muscoso, s. Musco florido diversus est.*

Caryophyllus aromaticus, *Ind. Orient.* fructu clavato, monoppyrene, *Phytogr. Tab.* 155. fig. 1. Caryophyllus aromaticus, fructu oblongo. *CB P.* 410. Caryophylli *Indici.* *J B. Tom.* 1. lib. 4. 423. Chamke in *Maluco Insulis*, in quibus folis, nascuntur, *Linschot.* 4. Part. *Ind. Orient.* cap. 12. *Tshjinka Molucensium.* *Pison.* *Mantiss. Aromat.* cap. 4. 177. *Hujus fructus maturus, & tumidus, Medicis, & Pharmacopolis, Antophyllus nuncupatur; qui in Arbore remanens, in sequente Anno, sponte cadit, isque languescere licet vi aromaticâ, in pretio habetur, & loco seminis Plantationi dicatur, & tunc Matrem fructuum, vulgo appellant.*

Caryophyllus Regius, aromaticus, *Phytogr. Tab.* 155. fig. 5.

Caryophyllus languescere vi aromaticus, *Malabariensis*, folio, & fructu maximo, *Phytogr. Tab.* 274. fig. 2.

Caryophyllus aromaticus, *Americanus*, folio, & fructu oblongo, polypyrene, acinis angulosis, Uvarum vinaceis similibus, *Phytogr. Tab.* 155. fig. 2. Fortè *Anhuiba-miri, Brasiliensium, Pisonis* 146. *Laurus odorata, Ligonis, Hist. Barbado. Sweet-Bay, Barbadosibus dicta. àn Ytziperequa, s. Laurus Michuacanensis. Fr. Hernandez. apud Reccum.* 98.

Caryophyllus aromaticus, *Ind. Occident.* foliis, & fructu rotundis, dippyrene, feminibus ferè orbiculatis, planis, *Phytogr. Tab.* 155. fig. 3. Caryophyllon, *Plinii CB P.* 411. *Amomum Quorundam*, odore Caryophylli. *J B. Tom.* 2. *Amomum aliud Quorundam, & Caryophyllon Plinii, Clusio suspicatum, Park. Theatr. Xocoxochitl, s. Piper Tavaſci, Hernand.* 30. Caryophyllus folio, & fructu rotundo *Breyn. Prodr.* 2. *Piper odoratum, Jamaicense Nostratibus, Raii Hist. Plant.* 1507.

*Pimento de Chapa Hispanis Fr. Redi, Experiment. Nat.* 168. *Alspice (i. e.) Panaroma nostratibus vulgò. àn Du Bois d' Inde, D. Rochfort, des Iles Antilles.* 71.

Caryophyllus aromaticus, *Americanus*, Lauri acuminatis foliis, fructu orbiculari, *Phytogr. Tab.* 155. fig. 4. *Myrtus arborea, foliis Laurinis, aromatica, D. Sloane. Pimenta & Jamaica-Pepper Nostratibus nuncupata. Ad hoc genus Plantarum Ibira fortè, Marcgravii accenseri debet, eò quòd, alternis foliis quoque figuratur. Hanc autem ab Icone Sloanianâ, apud Transactiones Philosophic. exhibita, depingi nos curavimus, ut ob oculos exposita, diversitas facilius dilucescat.*

CASSIA Cinamomea, *Herman. Hort. Leyd.* Cinamomum, s. Canella *Zeylanica: CB P.* 408. Canella, s. Cinamomum vulgare. *J B. Tom.* 1. l. 4. 440. Canella, quæ Cuurdo. *Pisonis. Mantiss. Arom.* 165. *Kurundu Zeylanensibus. Arbor Canelifera, Zeylanica, cortice acerrimo, s. præstantissimo, qui Cinamomum Officinarum, Breyn. Prodr.* 2. 17.

Cassia Cinamomea, sylvestris, pigrior, *Malavarica. Carua, Hort. Malab. Part.* 1. 107. *Arbor Canellifera, Malabarica cortice ignobiliore, cujus folium Malabathrum Officinarum, Breyn. Prodr.* 2. 18.



**Cassia Cinamomea**, strictiori folio, ignobilior, cujus folium est Malabathrum, s. Tamalapatrum angustifolium, in *Officinis* frequens occurrit.

**Cassia Cinamomea** Myrrhæ odore, folio trinervi subtus cœsio, *Nicadawula Cingalensis* dicta. Canella fortè ex *Mindanao Insulâ Philippicâ*, *Jonst. Dendrolog. Tab. 53. Hernand. apud Reccum. lib. 2. 35.*

**Cassia Cinamomea**, s. *Cinamomum sylvestre Barbadosum* Arbor baccifera fructu calyculato tetrapyreno, folio enervi, *Phytogr. Tab. 160. fig. 7.* Pseudo-Cassia *Cinamomea Americana.* an *Cinamomum*, s. *Canella Peruana.* *CBP. 409.* *Canella Peruana*, quam *Gomara, August. Cararate. Petrus Cieca*, & ex his *Clusius* Notis in *Garciam* proponit. *vid. Suppl. p. 399*

**Cassia Cinamomea sylvestris**, *Javanica*, rhomboide folio parvo, fructu calyculato. Arbor baccifera, *Orientalis*, folio rhomboide, fructu calyculato, *Phytogr. Tab. 13. fig. 3.* **Cassia Cinamomea**, s. *Canella do mato*, *Linschoten. Part. 4. Ind. Orient. fig. 17.* an *Cinamomum*, s. *Canella Malabarica*, & *Javanensis.* *CBP. 409.* Arbor *Canellifera*, sylvestris *Japonica* folio minimo, *Breyn. Prodr. 2. 18.* *Canella* (fortè) folio mali *Punica.* *J. B. Tom. 1. lib. 4. 455.* *Canellæ* similis arbor, *Fumei, Hist. General. Ind. Occid. Gallicè.* *Canellæ* arbor, *Granato* valdè similis, in *Moluccarum Insulâ*, *Gomara, Fr. Lopez. de Gomara, Hist. General. Indiæ, cap. 92.* Fortè etiâ *Jucaia* arbor *Nieremberg, Hist. Exot. lib. 14. fol. 294.*

**Cassia lignea Jamaicensis**, *Laureolæ* foliis subcinereis, cortice *Piperis* modo acri. *Laurifolia Magellanica*, cortice acri. *CBP. 461.* *Cortex Winteranus* acris, s. *Canella alba.* *J. B. Tom. 1. l. 4. 460.* *Winteranus Cortex*, *Clus. exot. lib. 4. cap. 1.* *Hujus enim Corticis notitiam Europæ primus intulit Winterus noster, ideo Winteranum, ab ipso cognominabat Clusius, & Corticis Winterani titulo, vel in nostris diebus, vulgò innotescit. Hujus arboris ramuli pictura, in Phytogr. nost. Tab. 81. fig. 1. exhibetur.*

**Cassia lignea Laurifolia**, *Americana*, cortice albo, valdè acri, & aromatico. *Canella alba*, *Clusii. exot. lib. 4. cap. 3.* Itè *Lignum*, seu potiùs *Cortex aromaticus*, ejusd. in *Scholio ad cap. de Lign. aromatic. Monard. fol. 324.* Et fortè Arbor aromatica, *Magellanica*, ejusd. *Clusii. exot. lib. 4. cap. 1.* *Caninga* arbor, ex *Insulâ Cubæ*, *Hernand. lib. 2. 43.* *Lignum Aromaticum* in *Haoana* portu *Cubæ* inventum *Monard. & quod depinxit, & descripsit Clusius in Not. ad Monardem.*

**CASSIA lignea**, *Monspeliensium.* *J. B. Tom. 1. lib. 4. 458.* *Cassia Latinorum Prosp. Alpini. exot. lib. 1. 41.* *Cassia Poetica Monspeliensium*, *Park. Theatr. Olyris frutescens*, baccifera. *CBP. 212.* *Olyris Plinio, Raii Hist. Pl. 1489.*

*Cassia Latinorum* similis *Frutex*, si non idem, ex *Oris Cormandel.*

*Cassia Poetarum* similis *Frutex*, *Æthiopicus* majoribus foliis, à D<sup>no</sup>. *A. Brown* accepimus.

**Cassia Fistula**, *Lauri* splendentibus, alatis foliis, acumine productis, flore luteo. *vid. Suppl.*

**Cassia Fistula**, *Alexandrina.* *CBP. 403.* *Cassia purgatrix.* *J. B. T. 1. l. 12. 416.*

**Cassia Fistula vulgaris**, flore luteo, *Breyn. Prodr. 2. 26.* *Quauhayohuatlis* 2a, *Mexicenf. Hernand. apud Recc. lib. 3. cap. 55.* *Cassia Fistula* les *Antilles*, *D. Rochfort. Histoir. fol. 77.* *Conna Hort. Malab. Tom. 1. 37.* Arbor *Cassiam Solutivam* ferens, *Bontii Hist. 101.*



*Cassia Fistula Jamaicensis*, *Acaciæ tinctoriæ*, s. *Tamarindi ovatis foliis*, densioribus, glabris. àn *Cassia Fistula non purgans*, *Insulæ Tabago Laetii*, *Ind. Occid.* lib. 17. cap. 28. *Jonst. Dendrol.* 384. cui folia *Tamarisci* (fortè *Tamarindi*) instar, &c ?

*Cassia Fistula, Brasiliana*, cujus folia ovata, fulvâ lanugine, sunt obtecta. *Cassia Fistula, Brasiliana.* *C B P.* 403. *Cassia solutiva, Brasiliana, Park. Theatr.* 234. *Cassia filiqua, Brasiliana*, purgatrix, compressa, *Lobel. in Pharmacop. Rondelet.* *Cassia Fistula, Brasiliana*, flore incarnato, *Breyn. Cent.* 1. 58. *Tapyracoaynana Brasiliensum Pisonis.* lib. 4. 157.

*Cassia Jamaicensis, Fistularis*, senis solummodo foliis âlatis, unico in summo, obscure virentibus, *Musæi Cortenian.* *Cassia Fistula, heptaphyllos, villosa, floribus luteis, Americana.* Fortè *Chatalhuic Mexicensibus*, s. *Cassia sylvestris, Hernand.* apud *Recc.* fol. 70. & *Fab. Column.* in *Recc. Annot. & Addit.* 869. Hujus meminit *Monardes.* cap. 44.

**C A S T A N E A** sativa. *C B P.* 419. Itèm *Castanea sylvestris*, quæ peculiaritèr *Castanea.* *C B P.* *ibid.* *Castanea.* *J B. T.* 1. l. 7. 121.

*Castanea pumilis, Virginiana*, racemoso fructu parvo, in singulis capsulis echinatis, unico, *D. Banist. The Chinquapin-Bush*, nostratibus vulgò *Chechinquamins Ogilv.* ex *Laetio. Descript. Ind. Occid.* lib. 3. cap. 12. f. 81. *Castanea Nova Angliæ. Mus. Soc. Reg.* Fortè *Castanea humilis, racemosa.* *C B P.* 419. *Castanea humilis, Joh. de Choul. in Hist. Montis Pilati. Hist. Lugd.* lib. 1. 33.

*Castanea Americana* foliis aversâ parte, argenteâ lanugine villosis, *Phytogr. Tab.* 156. fig. 2. àn *Leucoma, Park. Theatr.* 1638 ?

*Castanea, leporino reni similis.* *C B P.* 419. *Castanea Peruana, Clus. Hist.*

*Castanella peregrina*, àn *Gor arbor*, *Castaneæ* fructu, amaro ? *J B. T.* 1. l. 7. 127.

*Castanea rosea, Indica, Beluttâ Tsjampacam, Hort. Malab. Part.* 3. *Tab.* 53.

*Castanea folio multifido.* *C B P.* 419. *Castanea equina, folio multifido.* *J B. Tom.* 1. lib. 7. 128.

**C A T S J A N**-Panel, *Hort. Malab. Part.* 5. *Tab.* 18. *Panella sylvestris*, s. *Frutex Indicus*, baccifer, hexapetalos, minor, fructu rotundo, monopyreno, nigro, *Raii Hist. Pl.* 1594.

**C A T T U**-Gasturi, *Hort. Malab.* vid. *Alcea Indica.*

**C A T U**-Pitsjegam-mulla, *Hort. Malab.* vid. *Jasminum Indicum.*

**C A U C A L I S** arvensis, echinata, latifolia. *C B P.* 152. *Echinophora major, platyphyllos, purpurea, Column. ecphr.* 97. *Caucalis arvensis, latifolia, purpurea, Park. Th.* 920. Itèm *Caucalis major, flore saturo-rubente, ejusd.* 919. *Lappula Canaria, latifolia, s. Caucalis.* *J B. Tom.* 3. lib. 27. 80. *Qui Lappam Boariam Plinio, Lugd. hujus Synonymam facit.* *Casp. Bauhinus, ex hac specie, duas facere videtur, nimirum Caucalin arvensem, echinatam, latifoliam ; & Caucalin lato Apii folio, ut recte monet Cl. Raius Hist. Pl.* 468.



*Caucalis echinata*, latifolia, lucida, strumosâ radice. *Echinophora Asphodeli nigricante radice*, & angustiore, lucido, *Angelicæ folio*, *Lælii Trionfetti* in *Catalog. apud Fratr.* p. 65.

*Caucalis arvensis*, echinata, magno flore. *C B P.* *Echinophora πυκνόκαρπῳ* àn *Gingidium Dioscoridis. Column.* *Caucalis coronatâ umbellâ, Camerar. Hort. Medic.*

*Caucalis arvensis*, echinata, parvo flore, & fructu. *C B P.* *Lappula Canaria*, flore minore, s. tenuifolia. *J B. Tom. 3. lib. 27. 80.* *Echinophora leptophyllos*, purpurea, *Column. ecphr.* *Caucalis tenuifolia*, flosculis subrubentibus, *Raii Hist.* 467.

*Caucalis Monspeliaca*, echinato magno fructu. *C B P.* 153. *Echinophora altera*, asperior, *πλατύκαρπῳ* *Column.* *Lappa boaria, Plinii Hist. Lugd.*

*Caucalis semine aspero*, flosculis rubentibus. *C B P.* 152. *Anthriscus quorund. semine aspero*, hispido. *J B. Tom. 3. lib. 27. 83.* *Caucalis minor*, flore rubente, *Park. Theatr.*

*Caucalis segetum minor*, *Anthriscus hispido similis*, *Raii Hist. Pl.* 468. *Caucalis pumila Segetum*, *Goodyero.*

*Caucalis minor Æthiopica* vulgari haud multum impar.

*Caucalis pumila maritima.* *C B P.* 153. *Caucalis pumila*, *Hispanica Boelii, Park. Theatr.* *Lappula Canaria*, s. *Caucalis maritima.* *J B. T. 3. l. 27. 81.* *Caucalis maritima*, supina, echinata, magno fructu, *Raii Cat. Exterar.* 26.

*Caucalis nodoso*, echinato semine. *C B P.* 153. *Caucalis nodoso*, echinato semine, *Anthriscus hispido affinis*, si non ejus varietas. *J B. T. 3. l. 27. 83.*

*Caucalis Daucoides, Tingitana, Moris. Umbel.* 33. *Schol. Botan.* 158.

*Caucalis Peucedani folio.* *C B P.* vid. *Saxifragiæ affinis.*

*Caucalis maxima*, *Sphondylii aculeato semine.* *C B P.* vid. *Tordylium.*

**CEDRUS Libani**, & *Palestinæ*, præcelsa, *Adversar. Lob.* *Cedrus conifera*, foliis *Laricis.* *C B P.* 490. *Cedrus magna*, s. *Libani conifera.* *J B. Tom. 1. lib. 9. 277.*

*Cedrus conifera*, *Juniperinis foliis*, racemosa, conis candicantibus, parvis, ex *Prom. Bon. Spei*, s. *Oxycedrus Africana*, conophoros, *Phytogr. Tab.* 275. fig. 2.

*Cedrus* (fortè) *Æthiopica*, s. *Montis Atlantis*, *Plinii lib.* 13. cap. 15. *Citrus arbor Antiquorum*, ex quâ *Mensæ pretiosissimæ* fiebant. *Citra Indis*, lignum *J B. T. 1. lib. 1. 106.*

*Hujus frustulum ad Joan. Bauhinum misit Coldenbergius cui disquirendum proposuit, nùm esset Veterum Citrus.* *Inter pauca nitidioris vitæ instrumenta hæc arbor fuit*, *Plin. lib.* 13. cap. 16. Fortè etiâ *Thuya Theophrasti*, *Hist. Pl. lib.* 5. cap. 5. *cujus arboris radice nihil crispius, nec aliunde pretiosiora opera.* *Thuya & Cedrus Montis Atlantis.* *J B. Hist. Tom. 4. lib. 9. 283.* àn *Conifera nux minima. ejusd.* *J B. Tom. 1. lib. 9. 273.* Fortè etiâ, Eadem quam pro *Echinopo Plutarchi* accepit idem *J. Bauhinus*, *Tom. 1. lib. 11. 411.* nèc novit undè.

*Et re verâ nil aliud est quàm Larix conifera*, *Pr. Bon. Sp. in Phytogr. Tab.* 245. *ibi satis jejune depicta, tunc equidèm minùs cognita, ideoque à nobis malè nominata,*

*Larix enim non proprie dicitur, eo quod perpetuo viret, & immortali comâ, argentissimis tempestatibus, ornatur, nec unquam frondem amittit.*



*Cedrus Barbadiensis*, alatis Fraxini foliis, non crenatis, fructu singulari, quinis involucris, crassis, validis, cochleato-cavis, totidem semina membranis adaucta, & columnæ canaliculatæ, pentagonæ, prægrandi adnata, occludentibus, ornato, *Phytogr. Tab. 157. fig. 1.* de hac Arbore, vid. *Ligon nostr.* fol. 73.

*Cedrus conifera, Goensis, Sabinam spirans*, vid. *Sabina*.

*Cedrorum varia genera*, tam *Europæa* quàm *Asiatica*, & *Americana*, vid. *Juniperi*.

**CENCHRAMIDEA** arbor, Saxi adnascens, obrotundo, pingui folio, fructu pomiformi, in plurimas capsulas granula Ficulnea (Stylo Columnari hexagono, præduro) adhærentia continentes, diviso, Balsamum fundens, *Phytogr. Tab. 157. fig. 2.* àn Pithahaya quæ Saxorum scissuris nascitur, *Nieremberg. exot. 326.* Fortè Amacoztic, s. Papyrus lutea, s. Tepeamatl, Sycomorus saxatilis, *Mexicensesium, Hernand. apud Recc. 81.* Quæ adhæret Saxi, non mediocriter spectando miraculo, ut ipse loquitur. àn Hujus sit Bdellii fructus, apud *Lobel. Icon. Part. 2. Balsom Apple (i. e.) Melobalsamum Barbadiensibus* vulgò, in *Hort. Regium Hampt. Curâ & industriâ Jacobi Reede, hujus Arbor bipedalis cum frustulo petrae, cui adnascitur à Barbadiensi Insulâ nupèr inventa est.*

*Cenchramidea Jamaicensis*, Morifolia, fructu ovali, integro, verrucoso, intus in quinque cellulas, granula Ficulneis similia, includentes, dispartito, Balsamum olente. àn Fructus *Indicus* Sphæricus, granulatus. *J. B. Tom. 1. lib. 3. 312?* Fructus rotundus, tuberculofus, lineâ eminentiore transversâ, *Clus. exot. & Jonst. Dendrolog. Tab. 35.* Fortè Ytzamatl, s. Papyri novacularis, altera species, *Nieremberg. lib. 15. 360.* Fortè etiàm Antinuba *Brasilensium*, s. *Cedrus alba*, *Pison. Hist. lib. 1. fol. 10.* *Cedrus spuria (i. e.) Bastard Cedar Jamaicensibus, Nostratibus dicta.* Hujus Icon habetur, in *Phytogr. Tab. 77. fig. 2.*

*Cenchramidea Loti* arboris folio, capsulari fructu, erinaceo, parvo, orbiculari, compresso, quinquefariàm diviso, granulis Ficuum similibus, referto, *Phytogr. Tab. 156. fig. 4.* àn Amatzquitl, s. Unedo papyracea, *Nieremberg. lib. 15. 360?* Fructus *Indicus* (fortè) granulofus, vel tuberosus, minor. *J. B. Tom. 1. lib. 3. 316.* Fortè etiàm Ibixuma *Brasilensibus Marcgr. lib. 3. cap. 17.* Ibixuma, Arbor Saponaria, *Pison. lib. 4. cap. 24.* *Angolensibus* Motamba, fortè *Sindophoros* altera species?

*Cenchramidea* arbor pilulifera, fructu tuberculis inæquali, ex granulis coniformibus in orbem glomerato, non capsularis, *Phytogr. Tab. 156. fig. 3.* àn Ytzamatl, s. Papyrus novacularis, *Nierembergii 360.* àn fortè Gacirma arbor. *ejusd. 295?* Quæ habet hoc peculiare quod Ignis velut à Silice percusso, ex ramis exsiccatis elicitur. Fortè etiàm Fructus peregrinus, orbiculatus, cuspidatus. *J. B. Tom. 1. lib. 3. 312.* àn Fructus peregrinus 5<sup>m</sup>. *Clusii. exot. lib. 2. cap. 30.*

**CENTAURIUM** majus, Iuglandis folio. *J. B. Tom. 3. lib. 25. 38.* Centaurium majus, folio in lacinias plures diviso. *C. B. P. 117.* Serratula latifolia, Centauroides, *Bellucii Ind. Hort. Pisan. 50.*

*Centaurium Alpinum*, luteum. *C. B. P. 117.* Centaurioides folio glabro, flore flavescente. *J. B. T. 3. l. 25. 40.* *Centaurium majus, luteum, Cornuti Hist. Plant. Canadens. cap. 29.*

Centaurium



*Centaurium majus, Africanum, laciniatum. HR P. append. Centaurium majus, Africanum, flore aureo, odorato, Breyn. Cent. 1.*

*Centaurium majus, folio non dissecto. C B P. 117. Centaurium majus, alterum, Lusitanicum Park. Theatr. Centaurium majus, alterum, folio integro. J B. Tom. 3. lib. 25. 41.*

*Centaurium majus, Rha capitatum, folio Enulæ, subtus hirsuto, & incano. J B. Tom. 3. Rha-ponticum, folio Helenii incano. C B P. Rha capitatum, folio Enulæ, Centaurii majoris facie. Adversf. Lobel.*

*Centaurium foliis Cinaræ, Cornuti, vid. Carduus.*

*Centaurii majoris species, tenuifol. J B. vid. Stabe.*

*Centaurium medium, laciniatum, flore purpureo. Serratula. C B P. 235. J B. Tom. 3. lib. 25. 23. Solidago Saracenica 4<sup>a</sup>. Lonicer. Icon. Centauroides, vel Centaurium majus, sylvestre, Germanicum. Thal. Harcyn. variat interdum flore albo.*

*Centaurium medium, foliis integris, purpureum.*

*Centaurium medium, Noveboracense, luteum, Solidaginis folio integro, tenuiter crenato. Serratula maxima, foliis Doricæ, leviter ferratis. P B P. inter Addend. ad calcem. Serratula Virginiana minor, angustifolia, mollis, Breyn. Prodr. 2. Fortè Atzoyatl-Coztic-Yni-Roderilyo Novæ Hispan. Recc. 355. Huic congener est, Thalli-Yetl Novæ Hispania ejusd. p. 423. nec non, Civapatli Yaca-pichtlensis, Conyza Mexicana, Hernand. apud Reccum. 157. Hujus Icon habetur, in Phytogr. Tab. 109. fig. 3.*

*Centaurium capitatum, ciliare, annuum, foliis laciniatis, ferratis, Morisf. HR B. 362. Chondrilla foliis laciniatis, ferratis, purpurascente flore. C B P. 130. Cyanus pulchro semine, Centaurii majoris. J B. T. 3. l. 25. 24. Senecio-Carduus Apulus Column. Ecphraf. 34. Chondrilla rara, purpurante flore, semine nitido, deciduo, Lob. Icon. 231. Crupina Belgarum vulgò.*

*Centaurium ciliare, minus, Bisnagaricum; Origani foliis amplioribus, floribus in umbellis, Phytogr. Tab. 81. fig. 4. Huc fortè spectat Tlanaotoahuizpatli, Novæ Hispan. Hernand. apud Reccum. 424.*

*Centaurium ciliare, minus, Circææ foliis firmioribus, spicatis floribus, è Madera-spatan. Phytogr. Tab. 82. fig. 2.*

*Centaurium minus. C B P. 278. Centaurium minus, flore purpureo. J. B. Tom. 3. lib. 29. 353. Centaurium minus, rubrum, Morisf. Hist. 2. 566. variat flore albo.*

*Centaurium minus, spicatum, album. C B P. Roberti Icon. variat etiã flore purpureo.*

*Centaurium caryophylloides, Africanum, sempervirens. P B P. 321. Rapuntio affinis, Lini faciè, Pr. Bon. Spei, Breyn. Cent. 1. 175 Centaurium Lini foliis, & facie, flore amplo, suave-rubente, Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2.*

*Centaurium minus, Virginianum, caule quadrato, D. Banister. Essentialiter, non per accidens, à Centaurio minore nostrati differt, caule quadrato, alato, flore carneo, pentagono, luteo ad fundum notato.*



- Centaurium luteum*, novum, *Column. ecphr. Part. 2. 77.* *Centaurium luteum*, pusillum. *C B P. 278.* *Centaurium minimum*, luteum, *Park. Theatr. non solum floris colore, sed & specificè à purpureo, differre videtur.*
- Centaurium palustre*, luteum, minimum, *Raii Hist. Pl. 1092.*
- Centaurium minus aureum*, flosculis numerosis, *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab. 275. fig. 3. variat etià flore albo.*
- Centaurium luteum*, perfoliatum: *C B P. Raii Hist. Pl. 1093. Meris. Hist. 2. 565.* Perfoliatum *Centaurium luteum.* *J B. T. 3. lib. 29. 355.*
- Centaurium Perfoliatum*, *Æthiopicum*, flosculis exiguis, flavescentibus, ex caliculis magnis, quadripinnatis, erumpentibus, *Phytogr. Tab. 275. fig. 4.*
- Centaurium minus*, adulterinum, quibusdam. *J B. vid. Lychnis.*
- C E R A S O** affinis, Baccifera, *Indica* trifolia, fructu rotundo, monopireno, pediculo longo, *Raii Hist. Pl. 1593.* Malago-maram, *Hort. Mal. Part. 5. Tab. 25.*
- Ceraso* affinis. *C B P. 451.* Macalep *Arabicum*, *Cerasi sylvestre* genus, *Bellon. cult. Mahaleb Matthiol. Hist. Lugd. & aliorum, Phytogr. Tab. 157. fig. 6.* *Cerasus sylvestris amara Mahaleb* putata. *J B. Tom. 1.*
- Cerasus pumila.* *C B P. 450. J B. Tom. 1. lib. 2. 222.*
- Cerasus sylvestris*, *Anglica*, foliis minoribus, fructu rubro parvo, serotino, pyramidalis. An *Cerasus sylvestris*, fructu minimo, cordiformi, *Phyt. Britan?*
- Cerasa dulcia*, minora, rubra. *Cerasus sylvestris*, fructu rubro. *C B P. 450. J B.*
- Cerasus major*, ac *sylvestris*, fructu subdulci, nigro colore inficiente. *C B P. Cerasus sylvestris* fructu nigro. *J B. T. 1. l. 2. 208.*
- Cerasa Hottentottorum*, *Lycium Africanum* fructu *Cerasi* rubro. *P B P. 349.* Item *Rhamnus Africana*, *Cerasi* fructu, ejusd. *P B P. 369.* Hujus Icon exhibetur, in *Phytogr. Tab. 82. fig. 5.*
- Cerasus Sebestenæ domesticæ* foliis, aliquatenus accedens, *Prom. Bon. Spei, Phytogr. Tab. 97. fig. 8.* *Lycium Africanum*, *Betulæ* folio. *P B P. 349.* *Capsi-Carsi* *Boem Belgarum* vulgò. an *Lycium* non spinosum, crassis, & incanis foliis. ejusd. *P B P. ibidem?* \* an *Frutex Æthiopicus*, foliis *Alaterni*, *Breynii* quæritur ab Autore *Horti Beaumontian.*
- Cerasus Americana*, rugosis foliis, fructu viscoso, *Phytogr. Tab. 158. fig. 1.* an *Copalxochitl Tepeacensium* de *Laetio. Ind. Occid. lib. 5.* *Copalxochitl*, s. Arbor gummosa, Pruniformis, *Hernand. lib. 3.* *Barbadensibus Clammy Cherry* vocatur. *Pompoqua* (fortè) *Tarasorum Francif. Ximenes*, apud *Laetium.*
- Cerasus Africana*, foliis plerumque in summo sinuatis, fructu rubro, ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab. 158. fig. 2.* Fortè *Cerasa Americana*, s. de *Baccaleos, Park. Theatr. 1518.*
- Cerasus Africana*, fructu rubro simplici, folio breviori, monococco, ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab. 158. fig. 5.* an *Cerasus Africana*, purgans, *Quorundam?*
- Cerasus Americana*, *Myrti* conjugatis foliis, fructu acerbo, tetrapireno, *Phytogr. Tab. 157. fig. 4.* an *Cerasus Curassavica*, fructu tetrapireno, *Indigenis Simmeroutke, Hort. Beaumont, Some Cherry Barbadensibus*, dicta?
- Cerasus Barbadosis pumila*, in *Ericetis arenariis* proveniens, *The Sandy Heath-Cherry* dicta.



- Cerasus Africana*, fructu rubro, multiplici, folio longiori, angusto, *Phytogr. Tab. 158. fig. 3.* Fortè *Cambui Parnambucensis*, fruticescens, *Jonst. Dendrolog. 243.* Itèm *Capolin Mexicensibus*, s. *Cerasus dulcis*, *Indica Nierembergii quoad Iconem. 344.* *Cambui s. Myrtus Americana*, sylvestris altera, *Pison. lib. 4. cap. 30.*
- Cerasus Africana*, racemoso fructu, rubro, absque pediculis, folio longiori, & latiori, ex *Codice Comptonian. Phytogr. Tab. 157. fig. 3.*
- Cerasus Africana*, fructu cæruleo, ex *Cod. Compt. Phytogr. Tab. 157. fig. 5.* Fortè *Cambui Brasiliensium*, s. *Myrtus Americana*, sylvestr. 1<sup>a</sup> *Pisonis*, lib. 4. c. 30: *Cambui Parnambucensis*, arborescens, *Jonston. Dendrogr. 243.* *Black Cherry*, (i. e.) *Cerasus nigra*, *Barbadiensibus* dicta.
- Cerasus racemosa*, sylvestris, fructu non eduli. *CBP. 451.* Itèm *Alnus nigra*, polycarpus. *ejusd. CBP. 428.* *Cerasus racemosa*, quibusdam; aliis, *Padus*. *J. B. T. 1. l. 2. 228.*
- Cerasus racemosa*, foliis Amygdalinis, *Americana*, *Phytograph. Tab. 158. fig. 4.* *Capolin. Nierembergii quoad descriptionem. 344.* *Copalin*, s. *Cerasus dulcis*, *Indica. Hernand. p. 95.* *Cluster Cherry*, *Barbadiensibus nostratibus* dicta. Fortè *Pacocatinga Brasiliensibus*, *Marcgr. lib. 3. cap. 5.*
- Cerasus*, folio Laurino. *CBP. 450.* *Lauro-cerasus*. *J. B. Tom. 1. lib. 4. 420.* *Cerasus Trapezuntina*, s. *Laurocerasus*, *Park. Theatr.*
- Cerasus* folio Laurino, lituris argenteis picto. *Cerasus* folio Laurino, variegato, *Hort. Leyd. append. 657.*
- Cerasus Canariensis*, mucronato Lauri angustiore folio, fructu Fragiformi, monopyreno; Fortè *Morococks Virginienisium Ogilv. vid. Arbutus.*
- CERATIA** agrestis, rotundifolia, floribus elegantèr purpureis. Siliqua sylvestris, rotundifolia. *CBP. 402.* *Arbor Indæ*, *Park. Theatr.* *Judaica arbor*. *J. B. Tom. 1. lib. 12. 433.* *variat interdum flore albo, & cortice candicante.*
- Ceratia agrestis*, *Virginiana*, folio rotundo, minori. Fortè Siliqua sylvestris, rotundifolia, *Canadensis. HRP. Schol. Botan. 276.*
- Ceratia agrestis*, mucronato folio, floribus parvis, *Caroliniana. Arbor Indæ Americana, Raii Hist. Pl. 1718.* *Judaica arbor Virginiana*, folio cordato, *PBP. 343.* *Judaica arbor, Virginiana*, folio cordiformi, *Hort. Beaum. 24.*
- Ceratia*, s. Siliqua dulcis, & edulis. *Ceratonia, Hort. Leyd. 135.* Siliqua edulis. *CBP. 402.* Siliqua arbor, s. *Ceratia. J. B. Tom. 1. lib. 12. 413.* *Caroba Officin. Panis S. Johannis, Germanis & Belgis. Locust-Tree nostratibus* vulgò.
- Ceratia minor*, è *Sanctâ Cruce*. Siliqua *Africana*, fructu minore, *Raii Hist. Plant. 1719.* Hujus siliquas, vidit Autor, apud Ornatissimum virum *D. Cortene*; cujus munere & nostram accepimus. *vid. Suppl. p. 399*
- Ceratiæ* quodammodò affinis, *Benghalensis*, foliis bigemellis subrotundis, filiquis admodum intortis; & in orbes circumflexis, ex minio nigricantibus, fructu rubro, maculâ nigrâ insignito, *Phytogr. Tab. 82. fig. 4.* àn *Avaramo-Temo, Brasiliensibus Pisonis. 168.* in *Hort. Comptoniano* enutritam vidimus.
- Ceratiæ* quodammodò affinis majoribus, & longioribus foliis, ex *Indiâ Orientali*, fabis atro-nitentibus. àn *Katou Conna, Hort. Malab. Part. 6. Tab. 12.*
- Ceratiæ & Acaciæ media*, *Jamaicensis*, spinosa, bigeminatis foliis, flosculis stamineis, atro-nitente fructu, filiquis intortis, *Phytogr. Tab. 1. fig. 6.* *Acaciæ* quodammodò



modò accedens, Myrobalano Chebulo *Veslingii* similis, Arbor *Americana*, spinosa, foliis *Ceratoniae*, in pediculo geminatis, siliquâ bivalvi, compressâ, corniculata, seu cochlearum, vel arietinorum cornuum in modum incurvatâ; s. Unguis Cati, *Breyn. Prodr. 2. fol. 7.* Ungue de Gato *Hispanis, D. Kegeleri.* Unguis Cati Arbor *Americana*, spinosa, siliquosa. *PBP. 385.* Moebi *Barbadiensibus* dicta. Huic congener est *Guabipocacabiba Brasiliensium Pison. 170.* Cassiae Fistulae non purganti, *Brasiliens. affinis, Jonst. Dendr. 384.* Quam *Cl. Breyn. eandem facit cum Arbore suâ siliquosâ, Brasilianâ, siliquâ tortuosâ putrescente, Fraxinella foliis, Cent. 1. vid. sub Acaciae Titulo, hujus Almagest. p. 4.*

Ceratia cariosa, s. Saprolobus *Americanus, Barbadiensibus* nostratibus, Rot-Bean nuncupata. an Quendam *Nigritarum*, viz. Arboris sinus *S. Augustini*, Fagi specie, quæ fructum Fabis similem fert; tertium genus, *Purches. Navigat. Tom. 1. fol. 415.* Mamanga fortè Frutex, *Pison. 183.* Frutex est in *Brasiliâ* arborescens, ubique obviûs, *Lusitanorum* vulgò *Lavapratas* dictus. Flores fert multos, pendulos, & luteos, & post hos, siliquas plurimas, oblongas, copulatas, primùm quidem virides, sed mox nigras, & putridas, & frequens semen in illis contentum. Folia habet *Citriis* haud dissimilia, paulo tamen longiora, & molliora, &c. Huc fortè spectat Arbor siliquosa *Brasiliana* siliquâ tortuosâ putrescens, *Breyn. ut ante.*

Ceratia diphyllus, *Antegoana*, Ricini majoris fructu nigro, siliquâ grandi, incluso, *Phytogr. Tab. 82. fig. 3.* an Phaseolus *Brasilianus*, siliquâ obsitâ molli lanugine ferrugineâ, Ricini fructu, *D. Chandelier Jonquet.* Arbor est procera, cujus folia bina, ita inter se mutuo adaptantur, ut Ungulam bisulcam, apprimè assimulant, materiem vero mollem, sive pulpam villosam, ferrugineam, quam Lobus in se continet, (extrâ enim nulla datur lanugo) & quâ ossicula sunt involuta, ob pungentem, & jucundam ejus aciditatem in plurimis eduliis expetitam venit; idcirco ab *Anglis* illic habitantibus, nostræ *Europææ Ceratoniae* nomine communi, hæc arbor, The Locust-Tree nuncupatur. Locusta arbor nostratibus dicta. Acaciae quodammodò accedens, Arbor Anime gummi fundens, *Americana*, foliis magnis, acuminatis, in pediculo binis, Lobo magno, crassissimo, eduli, *Breyn. Prodr. 2. p. 8.* Cujus siliqua, est Lobus ex *Wingandecaonw, Clusio. 7 B. Tom. 1. l. 12. 436.* Arbor siliquosa, ex *Virginiâ*, Lobo fusco, scabro. *CBP. 404.* Itèm Arbor siliquosa, ex quâ gummi Anime elicitur. ejusd. *CBP. ibidem.* Jetaiba *Brasiliensibus Pisonis & Marcgr.* Arbor *Brasiliensis* siliquosa, & gummiifera, gummi Anime simili, *Raii Hist. Pl. 1760.* Lobus ex *Wigandecou, & Anime gummi fructus, Clas. exot. lib. 3. c. 3.* Animifera arbor *Brasiliana.* *PBP. 312.* Fortè etiâ Mizquixochi copalli, s. Xochicopal Quauhitl, *Mexicens. Hernandez. lib. 3. fol. 50.* Quæ dùm hæc scribo vivit, & viget, in Prænobilis, & Reverendiss. *Henrici, Episcopi Londinens.* Botanices præcellentissimi *Mecænatis Viridario*, apud *Fulhamiam*, Stirpium exoticarum instructissimo, ubi foliorum Specimen, ramulo suo adnatum evulsi.

CHAMÆDRYFOLIA scandens, claviculata, & corymbosa *Jamaicensis*, *Phytogr. Tab. 81. fig. 5.* Huc fortè pertinet, Bryonoides, s. Temecatl-Yanc-tepecensis, *Mexicensibus Hernand. fol. 200.*

Chamædryis vulgaris, *Park. Theatr. 104.* Chamædryis <sup>minor</sup> major, repens. *CBP. 249.* Chamædryis vulgò, vera existimata. *J B. T. 3. l. 288.*

Chamædryis



*Chamædrys major*, *Park. Theatr.* 104. *Chamædrys major*, repens. C B P. *Joan. Bauhinus*, *banc à præcedenti non separat*; *Raio tamen videtur specie diversa.*

*Chamædrys Alpina*, hirsuta, *Schol. Botan.* 51.

*Chamædrys Pyrenaica*, repens, flore glomerato, albo, foliis rotundioribus, *Schol. Botan.* 51.

*Chamædryfolia tomentosa*, *Mascatenfis*, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 6. ex *Arabiâ* foelice secum in *Angliam* attulit, *D. Alexand. Brown*, & nobis communicavit. à *Ahuapatlis*, *Mexicensibus*, s. *Chamædrys Mexicana*, *Hernand.* lib. 5. fol. 133?

*Chamædrys laciniatis foliis*, *Park. Th.* *Chamædrys foliis laciniatis*, *Botryos facie*, *Hort. Leyd.* 137. *Botrys Chamædriodes*. C B P. 138. *Botrys verticillata*. *J B. Tom.* 3. lib. 28. 298.

*Chamædryfolia laciniata*, hirsuta, planta fruticescens, *Capit. Bon. Spei*, *Phytogr. Tab.* 275. *fig.* 5. à *Chamædrys arborea*, in *Insulâ Corcyrà*, *Alpin. de Plant. Ægypt.* 136. *Chamædrys arborea*, *Ægyptiaca*. C B P.

*Chamædrys spinosa*. C B P. & *J B. Tom.* 3. lib. 28. 289. *Bellucii Ind. Hort. Pisan.* 16. *Chamædrys spinosa*, *Cretica*, *Park. Th.* 105. *Chamædrys* 4<sup>a</sup> sive *spinosa*, ex *Horto Bembi Mattheoli*, à *Cass. Bauh. Edit.* fol. 598. *Scordium spinosum*, odoratum, *Cornuti.* 123. ut *Cl. Raio Hist. Pl.* 528. & nobis videtur.

CHAMÆJASME inodora, *Alfines facie*, dispermos, tetrapetaloides, quadrato caule, *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 97. *fig.* 9.

*Chamæjasme Alpina*. *J B.* vid. *Sanicula*.

CHAMÆLÆA tricoccus. C B P. 462. *J B. Tom.* 1. lib. 5. 584. *Mezereon Arabum Advers. Lob. Icon.*

*Chamælæa Alpina*, folio infernè incano. C B P. vid. *Thymelæa*.

*Chamælæa Germanica*, *Dod.* vid. *Laureola*.

CHAMÆMELUM vulgare, s. *Leucanthemum Dioscoridis*. C B P. 135. *Chamæmelum vulgare amarum*. *J B. Tom.* 3. l. 26. 116. *Chamæmelum vulgare*, *Park. Theatr.* ubi vulgare cum nobili confundit, ut rectè notat, *Cl. Raius Synops.* 56.

*Chamæmelum Leucanthemum vulgare* flore multiplici, pleno. *Hanc plantam toto habitu suo, & omnino specie, à Chamæmelo inodoro C B P. diversam esse mihi facile persuadeo.*

*Chamæmelum nobile*, s. *Leucanthemum odoratius*. C B P. *Chamæmelum odoratissimum* repens, flore simplici. *J B. Tom.* 3. lib. 26. 118.

*Chamæmelum nobile*, flore multiplici. C B P. *Chamæmel.* repens, odoratiss. perenne, flore multiplici. *J B.*

*Chamæmelum nudum*, *Park. Th. Raii Hist. Pl.* 354. *Chamæmel. luteum*, capitulo aphylo. C B B. *Chamæmelum aureum*, peregrinum, capitulo sine foliis. *J B. Tom.* 2. lib. 26. 119.

*Chamæmelum elatius*, foliis obscurè virentibus, semine nigro. *Chamæmelum inodorum*. C B P. *Chamæmel. inodorum*, s. *Cotula non foetida*. *J B. T.* 3. l. 26. 120.

*Chamæmelum foetidum*. C B P. *Chamæmel. foetidum*, s. *Cotula foetida*. *J B. ibid.*

*Chamæmelum maritimum*, latifolium, procumbens, ramosissimum, flore albo.



- Chamæmelum maritimum, & Cotula marina, quibusdam, *Hist. Lugd.* 1393. Itē Parthenium maritimum, minimum, *ejusd.* 1393. Cotula, s. Parthenium maritimum, minimum, *Lob. Icon.* 774. Matricaria maritim. C B P. Chamæmelum maritimum. J B. T. 3. lib. 26. 122. *Angliæ nostræ alumna est.*
- Chamæmelum maritimum, latifolium, surrectum, s. Cotula marina, flore mixto. an Chamæmelum *Lusitanicum* latifolium, s. Coronopi folio, *Breyn. Cent.* 1. 149. Leucanthemum segetum, folio ferrato. *N D. Viridar. Lusitan.* Magarca *Lusitanis* dictum.
- Chamæmelum *Æthiopicum*, lanuginosum, *Breyn. Cent.* 1. 148.
- Chamæmelum, s. Leucanthemum peregrinum, elatius, cauliculis plurimis, tenuibus, non ramosis, flore minore. *Tab. 274 fig. 3*
- Chamæmelum incanum, *Lusitanicum*, D. *Turneforti.* Chamæmelum (fortè) Leucanthemum, incanum, *Hispanicum* minus. C B P. 136. quod 3<sup>m</sup> in Prodr.
- Chamæmelum *Æthiopicum*, minimum, incanum, *Phytogr. Tab.* 275. fig. 7.

CHELIDONIUM humile, cauliculo nudo, flore albo stellato, D. *Banister. vid. Papaver.*

CHRISTOPHORIANA *Americana*, Malabathri foliis, acuminatis, nervosis, dentata, *Phytogr. Tab.* 159. fig. 1. an Caaghiyayo *Pison.* pag. 217. à *Loti arboris similitudine (ut suspicor)* Nettle Tree, *Barbadensibus nostratibus nuncupatur.*

Christophoriana *Canadensis*, racemosa, & ramosa, *Morif. Hist.* 2: pag. 8. Panaces κάρινον, s. racemosa, *Americana*, *Park. Theatr.* 950. Angelica baccifera vulgò.

Christophoriana *Virginiana*, Zarzæ radicibus furculosis, & fungosis, Sarsaparilla *nostratibus* dicta, *Phytogr. Tab.* 238. fig. 5. Herbatum (fortè) *Canadensium*, s. Panaces moschatum, *Cornuti*, fol. 212.

Christophoriana arbor aculeata, *Virginienfis*; *Phytogr. Tab.* 20. Angelica arborefcens, spinosa; s. Arbor Indica Fraxini foliis, cortice spinoso, *Raii Hist. Pl.* 1798. Arbor spinosa, Fraxini foliis *Virginiana*, D. *Morgani. Vit. Supp. pa.* 399

CHRYSANTHEMUM *Indicum*, flore & semine maximis, annuum, *Hort. Leyd.* 142. Chrysanthemum *Peruvianum.* H R P. 399. Helenium *Indicum*, maximum. C B P. 276. Herba maxima. J B. T. 3. l. 26. 106. Chimalatl *Peruviana*, Flos solis *Hernandez.* 228. Chrysanth. *Peruvianum*, s. Flos solis, *Park. Th.*

Chrysanthemum *Indianum* maximum, ramosum. Helenium *Indicum*, ramosum. C B P. 277. variat interdum flore candicante.

Idem semine cinereo Helenium *Indicum* ramosum, semine albo, cinereo, striato. H R P. 84.

Chrysanthemum *Indicum* maximum, flore minore, melino. Helenium *Indicum* minus. C B P. 277. Herbae maximæ species minor, florum multitudine, parvitatem compensans. J B. T. 3. l. 26. 107.

Chrysanthemum *Indianum*, maximum, perenne, Helenium *Indicum* flore & semine maximis, perenne, *Hort. Leyd.* 142. an Chrysanthemum majus alterum, Sulphureo, magno, flore. H R P. hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab.* 159. fig. 2.

*variet.*



*variat interdum foliis ex adverso binis, item, foliis ternis, caulem ambientibus, inde Chrysanthemum majus Virginianum, foliis tribus, ad genicula apposis, D. Bobart.*

*Chrysanthemum Indicum, radice tuberosâ, Hort. Leyd. Helianthemum Indicum, tuberosum. CBP. 277. Helenium Indicum, tuberosum. HRP. 85. Flos folis Farnesianus, s. Aster Peruanus, tuberosus, Columnæ ecphraf. part. 2. 11. Aldin. Hort. Farnes. append. 191. Chrysanthemum Canadense, strumosum, Florent. Schuil. Cat. Leyd. 22. Flos folis tuberosus, Indicus, s. Adenes Canadensis, Griselei viridar. Lusitan.*

*Chrysanthemum Virginianum, Plantaginis rugosis foliis, radice repente, Aster Virginianus latifolius luteus repens, Park. Theatr. Elenium Indicum Trachelii folio radice repente. HRP.*

*Chrysanthemum Virginianum, angustiori folio repens, flore sulphureo. Sub falso titulo proponitur in Phytogr. Tab. 21. fig. 2. Chrysanthemum foliis rigidis, acuminatis, binatim ad caulem, absque pediculo positis, D. Banister. Cat. Mss.*

*Chrysanthemum Barbadense, Helenii amplioribus foliis scabris, è regione binis, floribus parvis, Phytogr. Tab. 274. fig. 4.*

*Chrysanthemum Helenii folio, umbone floris grandiusculo, prominente, Phytogr. Tab. 242. fig. 2.*

*Chrysanthemum Peruvianum, flore albo, Cat. Hort. Lips. olim Edit. Phytogr. Tab. 22. fig. 3.*

*Chrysanthemum Scrophulariæ foliis, Americanum, Phytogr. Tab. 2. fig. 1. Chrysanthemum Canadense elatius, Virgæ aureæ, vel Scrophulariæ foliis, Schol. Botan. 199. Tzipipatli, Novæ Hispaniæ, Terent. apud Reccum. 435.*

*Chrysanthemum Orellanæ foliis, impensè scabris, Maderaspatanum, florum petalis quinis, tetragonis, ex calice amplo viridi fistulosis, Phytogr. Tab. 83. fig. 2.*

*Chrysanthemum angulosis Platani foliis, Virginianum, Phytogr. Tab. 83. fig. 3. Doronicum maximum, Americanum, latissimis angulosis foliis, radice transparenti, Hort. Leyd. an Chrysanthemum latifolium, Brasilianum. CB. Prodr. Fortè Naviytepuzt Mexicensibus; s. Quadrilatera, Hernandez. 189.*

*Chrysanthemum Americanum, Doronici folio, flore Persici coloris, umbone magno, prominente, ex atro purpureo, viridi & aureo fulgente, Phytogr. Tab. 21. fig. 1. Ptarmica latifolia, flore amplo rubello, D. Banister. Cat. Mss. ubi addit, Folia habet Raphani rustici foliis ferè æmula, semina Chrysanthemi, sed valde calida. Ptarmica Raphani aquatici folio, flore amplo rubello, Hort. Leyd. 695. an Bellis Canadensis purpurea Ciasii Fascic. Herbar. Michael. Nutii, pag. 22.*

*Chrysanthemum Maderaspatanum, latifolium, Scabiosæ capitulis parvis, Phytogr. Tab. 159. fig. 4. à D. du Bois habui. Vellia-Manga-nari, Hort. Malab. Part. 10. Tab. 40. huic proximè accedit.*

*Chrysanthemum Virginianum, elatius, angustifolium, caule hirsuto, viridi, Phytogr. Tab. 159. fig. 5. Wichsacan (fortè) Virginienfibus, nostri Ogilvei. Quæ ad sananda vulnera, est præstantissimum remedium. Vosacan quorundam; s. Helenium Canadense, altissimum. HRP. Chrysanthemum Canadense, Rapunculi radice, strumosum vulgò Hermannii, Hort. Leyd. 143. Chrysanthemum Canadense, latifolium, altissimum, Moris. Præhud. 250. Chrysanthemum Canadense, latifo-*



- lium, elatius, *P. Boccon. de Pl. Siculis, Tab. 27. Chrysanthemum Virginianum*, foliis rigidis, & asperis, majus & elatius. *P B P. 311.*
- Idem caule ferrugineo. Flos Solis minor ferrugineus, *D. Bobart. Chrysanthemum Canadense latifolium, humilium, Moris. Præhud. Botan. Chrysanthemum Canadense, humilium, P. Boccon. Tab. 27. After Virginianus, luteus alter, minor, Park. Th.*
- Chrysanthemum Virginianum*, caule alato ramosius, flore minore, *Phytogr. Tab. 159. fig. 3. Chrysanthemum Canadense bidens, alato caule, Moris. Præhud. Bot. 253. Helenium Canadense, elatius, alato caule. H R P. 85. After Virgineus, luteus, membranaceo caule, Park. Theatr. 130.*
- Chrysanthemum Virginianum villosum*, disco luteo, quinque petalis ornato, *Phytogr. Tab. 242. fig. 3. & Tab. 83. fig. 4. Chrysanthemum pentapetalum, villoso caule, D. Banister. Catal. Niss.*
- Chrysanthemum Americanum*, bidens alatum, flore parvo aurantiaco, *Phytogr. Tab. 84. fig. 3. Chrysanthemum Conyzoides, alato caule, Curassavicum. P B P. 323. Chrysanthemum Curassavicum Conyzoides, Abrotani foeminae, flore aurantio, ejusd. P B P. append. Chrysanthemum Cannabinum, Americanum, alatum, flore aphylo, globoso, aurantio, foliis Baccharidis, Breyn. Prodr. 2.*
- Chrysanthemum Americanum*, frutescens, Balsaminæ luteæ foliis, nigris maculis, punctatis, *Phytogr. Tab. 161. fig. 1.*
- Chrysanthemum Maderaspatanum*, Menthæ arvensis folio, & facie, floribus bigemellis, ad foliorum alas, pediculis curtis, *Phytogr. Tab. 118. fig. 5.*
- Chrysanthemum Americanum*, laciniato folio majus, *Moris. Præhud. 251. Doronicum Americanum, laciniato folio. C B P. append. 516. Aconitum Helianthemum, Canadense, Cornuti. 178.*
- Chrysanthemum Americanum*, laciniato folio, obscurius virente, minus, *Moris. Præhud. Botan. ibid. Hort. Leyd. 152.*
- Chrysanthemum Cannabinum, s. bidens, Utriusque Indiæ, flosculo connivente, Myrrhidis modo laciniatis. Chrysanthemum Chinense foliis plurifariam divisis, Halicacabi peregrini æmulis, Phytogr. Tab. 22. fig. 4. Chrysanthemum foliis multifidis, Cicutæ nonnihil similibus, Virginianum, Hort. Leyd. 146. Chrysanthemum Cannabinum, Americanum, frutescens; Virginianum, Sambuci laciniatæ foliis, & facie, Breyn. Prodr. 2. è Chinâ, ad D. Petever, allata est hæc elegans planta, & ab illo, nobis amicissimè communicata.*
- Chrysanthemum Cannabinum, Virginianum, hirsutum, disco nigro, petalis aureis radiato, Phytogr. Tab. 22. fig. 2. Chrysanthemum, s. Flos Solis laciniatus, annuus, umbone nigricante, D. Bobart. Eupatorium Cannabinum, Americanum, flore aureo. H R B. Eupatorium Americanum, caule incano, flore aureo, umbone nigerrimo, Raii Hist. append. 1866.*
- Chrysanthemum Cannabinum, aquaticum, folio tripartito diviso, Hort. Leyd. 146. Cannabina aquatica, folio tripartito diviso. C B P. 321. Verbesina, five Cannabina aquat. flore minus pulchro, elatior, ac magis frequens. F B. Tom. 2. append. 1073.*
- Chrysanthemum Virginianum, bidens, Cannabinum. Chrysanthemum Cannabinum, Americanum, Moris. Præhud. 254. Eupatorium aquaticum, Virginianum, Park. Theatr.* Chry-



*Chrysanthemum Cannabinum*, aquaticum, folio non diviso, *Hort. Leyd.* 146.  
*Cannabina aquatica*, folio non diviso. *C B P.* 321. *Verbesina pulchriore* flore luteo. *J B. Tom.* 2. *append.* 1074.

*Chrysanthemum Conyzoides*, *Cannabinæ* simile, capitulis deflexis. *Conyza* capite nutante. *J B. T.* 2. *lib.* 24. 1055. *Aster cernuus*, *Fab. Column.*

*Chrysanthemum hirsutum*, *Virginianum*, auriculato *Dulc-amaræ* folio, octopetalon, *Phytogr. Tab.* 242. *fig.* 4. & *Tab.* 83. *fig.* 5.

*Chrysanthemum Maderaspatanum*, *Oxyacanthæ* foliis cœsis, ad marginem spinosis, calyce argenteo, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 6. à *D. du Bois*, communicata.

*Chrysanthemum parvum*, ramosissimum membranaceo caule, *Maderaspatense*, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 5. à *D. du Bois*.

*Chrysanthemum Americanum*, *Ciceris triphylli* folio glabro, flore albo, *Bellidis majoris*, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 3 *P B P.* 323. variat aliquandò & flore purpureo.

*Chrysanthemum minus Alpinum*, elegans, flore magno albicante, foliis crassis, *Saxifragæ Chelidonides* accedentibus, *Phytogr. Tab.* 83. *fig.* 1. *Hæc elegans plantula*,

*Chrysanthemo corymbifero*, *Africano Triumfetti*, quoad folia optimè quadrat. à *D. Parry*, ad exsculpendam accepimus.

*Chrysanthemum exoticum*, perpusillum, nudum, foliis *Coronopi*, in *Hort. Chelsetano*, ex semine natum, nuper observavimus. à *n Bellis Africana*, *Coronopi* folio, flore nudo, *Ciassi*, *Marc. Mappi*, *Cat. Hort. Acad. Argentinens.* p. 63. *Tab.* 274 *fig.* 6

*Chrysanthemum Canadense minus*, caule alato, *Moris. Prælid. Botan.* 252. *Aster luteus alatus*, *Cornuti de Pl. Canad.* 62. à *n Flos Indicus* caule alato *Ciassi*, *Mich. Nutii Fascic. Herbar.*

*Chrysanthemum Africanum*, *Asteris* facie, imo flore non folioso, capitulis duris, *Phytogr. Tab.* 21. *fig.* 3.

*Chrysanthemum Asteris facie*, foliis ad florem rigidis, *Hort. Leyd.* 144. *Aster Atticus luteus*, foliis ad florem rigidis. *C B P.* 266. *Aster Atticus luteus verus*, *Park. Theatr.*

*Chrysanthemum Conyzoides*, *Monspeliensium*, *Moris. Prælid.* 235. *Aster annuus*, *Attico* luteo similis, foliis ad florem mollibus, *Botan. Monspel.* 32. *Chrysanthemum Asteris facie*, foliis circa florem mollibus, *Hort. Leyd.* 144. *Aster Atticus*, foliis circa florem mollibus. *C B P.* 266.

*Chrysanthemum Conyzoides*, *Lusitanicum*, *Breyn. Cent.* 1. 157. *Aster supinus*, *Conyzoides*, *Africanus*, *Park. Th.* *Aster Conyzoides*, odoratus, luteus, *Hort. Eystitens.* *Aster Atticus*, odoratus, *Creticus*, *Zanon.* *Aster Conyzoides*, luteus, odoratus annuus, *Icon. Robert.*

*Chrysanthemum Asteris facie supinum*, majus, *Hort. Leyd.* 144. *Aster luteus supinus.* *C B P.* 266. *Aster supinus* 2<sup>m</sup>. *Clus. Hist.* 2. 13. *Aster Atticus luteus*, supinus, spinosus. *J B. T.* 2. *l.* 24. 1045. Sed perperam spinosum appellat, ut rectè animadvertit, *Raius Cat. Exterar.*

*Chrysanthemum Africanum*, ad radicem, (Umbelliferarum more) comosum, *Phytogr. Tab.* 160. *fig.* 4. Fortè *Atepocapatli*, *Mexicensibus*, *Hernand.* fol. 33. à *n Spicæ Nardi* genus *Africanum*? ex *Codice Comptoniano*, depingitur.



- Chrysanthemum* ex *Insulis Caribeis*, *Leucoii incanis*, & *sericeis foliis, argenteis, crassis*, *Phytogr. Tab. 115. fig. 4.*
- Chrysanthemum Bermudense*, *Leucoii foliis virentibus, crassis.*
- Idem folio longiore, angusto, dentato. *Vide Supp. pa. 299.*
- Chrysanthemum lanatum*, *crenatis foliis, Ethiopicum*, *Phytogr. Tab. 274. fig. 5.*
- Chrysanthemum* (fortè) *arborescens, Ethiopicum*, *foliis Populi albæ, Breyn. Cent. 1. 156.* àn *Chrysanthemum frutescens, Ethiopicum odoratum*, *foliis Thymelææ ferratis, & incanis, ejusd. Breyn. Prodr. 2. 32?*
- Chrysanthemum Alpinum*, *Hesperis angusto folio, caule ramoso.*
- Chrysanthemum Benghalense*, *angustifolium, pusillum, summo caule ramosum, Phytogr. Tab. 21. fig. 4.*
- Chrysanthemum Alpinum*, *Bellidis folio, caule singulari, Phytogr. Tab. 84. fig. 1.*
- Chrysanthemum parvum*, s. *Bellis lutea parva, latifolia; J.B. T. 3. Chrysanthemum Alpestre, Bellidis folio, Cat. H. Patav. à Turre.*
- Chrysanthemum Alpinum*, *Bellidis folio ramosum, Phytogr. Tab. 84. fig. 2.* àn *Chrysanthemum Bellidis folio, serrato, elegans, Grisei, Viridar. Lusit. Chrysanthemum latifolium. J.B. T. 3. l. 26. 105. Chrysanthemum segetum, Beticum, Park. Theatr. 1369.*
- Chrysanthemum Hispanicum*, *rotundioribus foliis, Park. Theatr. 1371. Chrysanthemum Myconi, Hist. Lugd. 873. Bellis lutea, foliis subrotundis. C.B.P. 262.*
- Chrysanthemum segetum nostras, Calendulæ folio glauco, neque secto, neque serrato.*
- Chrysanthemum folio minùs secto, glauco. J.B. T. 3. l. 26. 113. Chrysanthemum segetum nostras, Park. Theatr. Chrysanthemum segetum, Clus. Hist. 334.*
- Chrysanthemum segetum nostras, folio glauco, multiscisso, majus, flore minori. àn Bellis lutea, foliis profundè incisis, major. C.B.P. 262. Fortè etiàm, Chrysanthemum foliis Matricariæ, ejusd. C.B.P. 134? Chrysanthemum & Chalcitis, Tabern. Icon. 125. Chrysanthemum majus, folio valdè laciniato, flore croceo. J.B. T. 3. l. 26. 104. Chrysanthemum, Matth. Icon. magn. 1048. àn Chrysanthemum latifolium, Tingitanum; Hort. Edinburg?*
- Chrysanthemum majus, folio profundius laciniato, flore magno. C.B.P. 134. Chrysanthemum Creticum 1<sup>m</sup>. Clusii Hist. lib. 3. 334. J.B. ut supra. Chrysanthemum majus, folio in minores lacinias diviso. C.B.P. ibid.*
- Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo. C.B.P. Chrysanthemum Creticum mixtum, Hort. Eyst.*
- Chrysanthemum Creticum minus, flore melino. Chrysanthemum minus Creticum, Hort. Patav. à Turre. 28. Chrysanthemum Creticum, flore luteo, minore, Hort. Groningens. àn Chrysanthemum minus, Camerarii in Epitom. Matthiol.*
- Chrysanthemum Tanacetii minoris folio, Hort. Leyd. 145. Bupthalmum Dioscoridis. C.B.P. 134. Chamæmelum Chrysanthemum, quorundam. J.B. T. 3. l. 26. 122.*
- Chrysanthemum Creticum, Cotulæ facie, Hort. Leyd. 145. Fortè Bupthalmum Africum, tenuifolium, Bælii, Park. Theatr. 1372. Bupthalmum Creticum Cotulæ facie, flore luteo, Breyn. Cent. 1. 154.*
- Chrysanthemum alterum, Cotulæ latiori folio. Fortè Bupthalmum peregrinum, Proff. Alpin. exot. Bupthalmum alterum, folio & facie Cotulæ foetidæ, Adv. Løb.*



- Lob. Icon.* Buphthalmum Cotulæ folio. C B P. 134. Buphthalmum alterum, Cotulæ folio, *Park. Theatr.* 1371.
- Chrysanthemum tenuifolium, flore luteo, subtus purpurascens, *Phytogr. Tab.* 21. fig. 6. Buphthalmum tenuifolium, folio Millefolii ferè. *J B.* Buphthalmum verum, *Dalechampii, Hist. Lugd.* 865. Buphthalmum flore luteo, subtus purpurascens. C B P. 134.
- Chrysanthemum Millefolii lutei foliis, tomentosum. Chrysanthemum tenuifolium, *Bæticum, Bælii, Park. Theatr.*
- Chrysanthemum Smyrnæum Cotulæ folio, flore amplo, nudo, feminibus hispidis, ad capitula in Orbium spiras, circumvolutis, *Phytogr. Tab.* 21. fig. 7. àn Chrysanthemum *Valentinum Clusii* (i. c.) Buphthalmum lanuginosum, foliis Millefolii. C B P. 135. *Elegans hæc planta, cujus folia aliquando lanugine obducta invenimus, ex semine in Cabis, s. Corbulis, quibus Ficus & Uvæ passæ, è Smyrnâ, ad nos transportantur, disperso & inde collecto, enata, Angliæ primo, & nostræ dein notitiæ accessit.*
- Chrysanthemum *Æthiopicum*, foliolis brevibus, rigidiusculis, subhirsutum, flore minore, *Phytogr. Tab.* 276. fig. 2.
- Chrysanthemum foliis ferulaceis, *Virginianum, D. Banister. Cat. Mss.*
- Chrysanthemum Alpinum, foliis ferulaceis, rigidioribus, inodorum. Chrysanthemum Alpinum tertium, *Clus. Hist.* 1. lib. 3. fol. 333. Ageratum ferulaceum, *H. Lugd.* 1184. Itèm Achyllæa montana, *Penæ, ejusd. Hist. Lugd.* 772. Achyllæa montana, Artemisiæ tenuifoliæ facie, *Lob. Icon.* 746. Achyllæa Syriaca, *Bellucci Ind. Hort. Pisan.* 6. Itèm Millefolium Syriacum, *ejusd. pag.* 37.
- Chrysanthemum ferulaceum, Eliochryson dictum, foliis mollioribus odoratum, *Phytogr. Tab.* 160. fig. 1. Eliochryson foliis Abrotani. C B P. 264. Heliochryson quorundam, folio Abrotani. *J B. Tom.* 3. lib. 26. 150. Eliochryson, s. Coma aurea, *Gerard. emac.* 645. Fortè Millefolium alterum, Syriacum. *Belluc. Ind. Hort. Pisan.* 37.
- Chrysanthemum *Persicum*, Abrotani fœminæ foliis, umbellatum, *Phytogr. Tab.* 160. fig. 2. Heliochrysum Abrotani fœminæ foliis, *P. Boccon. de Pl. Sicul.* 4. Abrotanum fœmina verum, *Dioscoridis Zanon.*
- Chrysanthemum *Africanum*, Agerati corymbis durioribus. Chrysanthemum corymbiferum *Africanum Triumphet. Obs.* 85. Ageratum *Africanum*, foliis laciniatis, inodorum, *Raii Hist. Pl.* 364. Eliochrysum inodorum glabrum, Coronopi folio annum, *Magnoli, Hort. Leyd.* 228. *Breyn. Prodr.* 2. p. 43. Itèm Ageratum *Persicum*, foliis laciniatis, *ejusd. Breyn. ibid. p. 9. Vid. Supp. p. 399.*
- CICER Astragaloides, (fortè) *Virginianum*, hirsutè pubescens, floribus amplis, subrubentibus, *Phytogr. Tab.* 23. fig. 2. àn Cicer montanum, lanuginosum, erectum. C B P. *Banister. Cat. Stirp. Virgin.* Fortè Chichipiltic, *Mexicensibus, Terentii*, apud *Reccum.* 367.
- Cicer Astragaloides procumbens, circinatis Nummulariæ foliis, pilosis. àn Cicer *The-riacæ* odore, è dictæis, *D. Herman.*
- CICHORIUM spinosum. *J B. Tom.* 2. l. 24. 1013. C B P. 126. Cichori-um:



um spinosum, *Creticum*, *Park. Theatr.* Chondryllæ genus elegans, cæruleo flore, *Clusii*.

Cichorium verrucarium, s. Zacintha, *Park. Theatr.* Cichorium verrucosum, s. Zacintha Hieraciis adnumerandum. *J B. ibid.* Chondrylla verrucaria, foliis Cichorii viridibus. *CBP.* 330. Calendula Hieracii flore, Chondryllæ folio verrucaria, *Hort. Leyd.* 104.

Cichorium falcatum, *Morif. Præhud.* 361. Calendula Hieracii flore, semine falcato, *Hort. Leyd.* Hieracium siliquâ falcatâ. *CBP.* 128. Hieracium stellatum. *J B. Tom. 2. lib. 24.* 1014.

Cichorium minus, folio subrotundo, caule ad florem tumido. Hieracium minimum 9<sup>m</sup>. *Clus. Hist.* 2. 142. Hieracium minus, folio subrotundo. *CBP.* 127. Hieracium minimum *Clusii*, *Hyoseris Tabern. & Gerardo, Park. Theatr.* 792. *Non parùm hallucinatur Excellentiss. Clusius, cùm huic, semina in floccos evanescentia in Historiâ suâ assignaret. Eundem errorem errat Celeberrimus J. Bauhinus, cùm Hieracium florem inclinans, pro hujus Synonymo facit, & in descriptione, flores in pappos, avolare proponit, Tom. 2 lib. 24.* 1032.

Cichorium capitulum inclinans, semine adunco. Hieracium capitulum inclinans, semine adunco. *CBP.* 128. Hieraciis affinis, Ragadiolus edulis. *J B. T. 2. l. 24.* 1014. Itèm Hieracium florem inclinans, *ejusd. T. 2. l. 24.* 1032. quoad Iconem. Calendula procumbens, Hieracii flore, capitulum inclinans, semine adunco, *Hort. Leyd.* 104. Hieracium Calthæ semine, *Jorquet.*

Cichorio affinis, Lamprana domestica, *Morif. Præhud. Bot.* 359. Soncho affinis, Lamprana domestica. *CBP.* 124. Lamprana Dodonæi. *J B. T. 2. l. 24.* 1028. Nostratibus Nipple-Wort, (i. e.) Herba papillaris vulgò. *Wid. Supp. p. 399*

Cichorio affinis, Chrysanthemos, aculeata, Cardui facie, perennis. Scolymus *Theophrasti*, s. Eryngium luteum, *Monspeliensium, Advers. Lob. Park. Theatr.* Eryngium luteum, facie Cardui, *Hort. Leyd.* 238. Spina lutea: *J B. T. 3. l. 25.* 84.

Cichorio affinis, Cardui facie, Chrysanthemos, annua. Scolymus Chrysanthemos, annuus. *HRB.* 186. *HRP.* 163. *Dodart. Memoir.* 111. Carduus Chrysanthemos *Hispanicus*, *Ger. emac.* Chrysanthemos *Hispanicus Clusii*.

CICUTARIA latifolia, foetida. *CBP.* 160. Cicutaria latifolia, foetidissima, perperam Sefeli *Peloponense*, quorundam, *Lob. Icon.* 733. Sefeli *Peloponensiacum* Recentiorum, *Park. Th.* 907. Sefeli *Peloponense*, *Matthioli*, s. Cicutaria quorundam. *J B. T. 3. l. 27.* 184.

Cicutaria maxima, foetida, similis Thapsiæ 3æ. *Clusio.* *J B. T. 3. l. 27.* 187. Fortè Sefeli Alpinum, s. montanum 1<sup>m</sup>. *Clusio*; folio splendente, flosculis albis, *ejusd. T. 3. l. 27.* 168. Itèm Ligusticum alterum, *Belgicum*, foliis ferè Absinthii, semine rotundo, *ejusd. J B. T. 3. lib. 27.* 147.

Cicutaria maxima, *Brancionis*, *Lob. Adv. & Icon.* 732. Cicutaria latifolia 3<sup>a</sup> *CBP.* 161. Fortè Sefeli montanum, Cicutæ folio glabrum, *ejusd. ibidem. & Park. Theatr.* 905. Hoc enim in *Pinace Casp.* *Bauhinus* idem facit cum Ligustico *Belgico*, *Lob.* Cicutæ maxima, rigente folio, umbellâ candidâ.

CICUTÆ fatuæ nostrati similis, Planta *Maderensis*.

CINAMO



CINAMOMUM, *Ind. Orient. & Americanum*, vid. *Cassia Cinamomea*.

CISTUS mas, folio oblongo incano. *C B P.* 464. Cistus mas 4<sup>m</sup>. *Monspeliens.* folio oblongo, albido. *J B. T. 2. l. 13. 3.*

Cistus mas, folio brevior. *C B P.* 464. Cistus mas 3<sup>m</sup>. foliis dilutius virentibus; *J B. Tom. 2.*

Cistus mas, angustifolius. *C B P.* Cistus mas 2<sup>m</sup>. folio longiore. *J B. T. 2. l. 13. 2.*

Cistus mas, folio rotundo hirsuto. *C B P.* Cistus mas major, folio rotundior. *J B.*

Cistus mas, foliis *Chamædrys*. *C B P.* Cistus mas 5<sup>m</sup>. foliis crispis, & quodammodò sinuosis. *J B. ibidem.*

Cistus foemina, foliis *Salviæ*. *C B P.* Cistus foemin. *Monspeliæ*, flore albo. *J B. Tom. 2. l. 13. 4.*

Cistus foemina, *Scorodoniæ* rotundiori folio, *Lusitanica*. àn Cisti species quædam, *Hispanica*, flore albo. *J B. ibid?*

Cistus foemina, *Portulacæ marinæ* folio latiore, obtuso. *C B P.* 465. Cistus folio *Halimi* 1<sup>m</sup>. *Clusii Hist. 1. 71:*

Cistus foemina, *Portulacæ marinæ* folio angustiore, mucronato. *C B P.* Cistus folio *Halimi* 2<sup>m</sup>. *Clus. ibid.*

Cistus foemina, folio *Sampfuchi*, *Park. Theatr.* Cistus folio *Sampfuchi* incano. *C B P.* Cistus folio *Sampfuchi*, *Clusio*; cui macula in flore. *J B. T. 2. l. 13. 6.*

Cistus foemina, *Lavendulæ* folio, *Park. Theatr.* Cistus folio spicæ. *C B P.* Cistus folio *Lavendulæ*, *Clusii*. Fortè idem cum *Helianthemo* recto. *J B. Tom. 2. l. 13. 5.*

Cistus folio *Plantaginis*. *C B P.* *Tuberaria* major, *Myconi*. *J B. T. 2. l. 13. 12.*

Idem minor, *Tuberaria* minor, *Myconi*, *Hist. Lugd. 1099.* *J B. T. 2. l. 13. 13.* *Tuberaria* nostras, *ejusd.* *J B. T. 2. l. 13. 12.*

Cistus annuus 1<sup>m</sup>. *Clusio*, folio rotundior. *J B.* Cistus annuus, folio *Salicis*, *Park. Th.* Cistus folio *Salicis*. *C B P.*

Cistus annuus 2<sup>m</sup>. *Clusio*, flore pallido, maculâ punicante insignito. *C B P.*

Cistus *Americanus*, *Chamænerii* foliis lucentibus, ex *Hort. Medic. D. Morgan. Phytogr. Tab. 23. fig. 3.* àn *Tzatzequa Mexicensibus*, *Hernand. 453.*

Cisti facie, *Arbuscula Jamaicensis*, foliis trinerviis, floribus & capsulis sparsim enascentibus, *Phytogr. Tab. 277. fig. 1.*

Cisti genus *Americanum* foliis longis, angustis, hirsutis:

Cistus *Ledon*, foliis *Laurinis*. *C B P.* 467. Cistus *Ledon*, latiori folio. *J B. Tom. 2. l. 13. 8.* *Ledum* 1<sup>m</sup>. latifolium, *Clus. Hist. 1. 77.* Cistus *Ledon* *Laurinis* foliis latioribus, flore albo, unguiculis petalorum luteis.

Cistus *Ledum*, 1<sup>m</sup>. angustifolium, *Clus. ibidem.* Cistus *Ledon*, *Laurinis* foliis angustioribus, flore albo, unguiculis petalorum purpureis. Cistus *Ledon*, flore maculâ nigricante notato. *J B. Tom. 2. lib. 13. 8.* Cistus *Ladanifera*, *Hispanica*, incana. *C B P.* 467.

Cistus *Ledon*, foliis *Populi nigræ*, maj. *C B P.* 467. Cistus *Ledon*, *Populi nigræ* foliis, *Clusii*, major. *J B. T. 3. l. 13. 9.*

Cistus *Ledon*, folio *Populi nigræ*, minor. *C B P.* Cistus *Ledon*, *Populi nigræ* foliis, *Clusii*, minor. *J B. ibid.* Cistus *Populneâ* fronde, minor, *Park. Th.*



- Cistus Ladanifera, *Monspeliensium*. C B P. 467. Itèm Cistus Ledon, foliis Oleæ, sed angustioribus, *ejusd. in Pinac. ibid. secundum mentem Clariss. Raii*. Cistus Ledon, *Narbonense*, cum Hypocistide, *Tabernæmont. Icon. 1071*. Cistus Ladanifera, five Ledon *Monspeliense*, angusto folio, nigricans. *J B. Tom. 2. Ledon 5<sup>m</sup>. Clus. Hist. 1. 79.*
- Cistus Ledon, hirsutum. C B P. Cistus Ledon 4<sup>m</sup>. *Clusii*, flore candido. *J B. T. 2. l. 13. 10.* Fortè Ladanum *Creticum*, *Pr. Alpin. exot. 88.* àn Cistus Ledon, *Cretense*. C B P? *Vide Supp. p. 399*
- Cistus Ledon, foliis Rosmarini, sed non incanis. C B P. 467. Cistus Ledon 9<sup>m</sup>. *Clusio. J B. Tom. 2. lib. 13. 12.*
- Cistus Ledon, foliis Rosmarini subtùs incanis. C B P. Ledon 8<sup>m</sup>. *Clus. Hist. 1. 80.*
- Cistus Ledon, foliis Rosmarini ferrugineis. C B P. Rosmarinus sylvestris quorund. *J B. T. 2. l. 13. 23.* Rosmarinum sylvestre, *Bohemicum, Matthioli, s. Ledum Silesiacum, Clusii Park. Theatr.*
- Cisti *Silesiaci* genus, Rosmarinus sylvestris *ῥοσμάριον Clusii Hist. 1. fol. 84. Huic similem, sub Cisto adulterino, pingit Tabernæmont. in Icon. 1073.*
- Cistus Ledum, Alpinum, *Gerard.* Ledum Alpinum, hirsutum. C B P. Alpigenæ Chamærhododendri varietas, *Lobel.* Nerium Alpinum quibusdam, aliis Ledum hirsutum. *J B. Tom. 2. l. 13. 21.* Balsamum Alpinum, hirsutum, vulgò.
- Cistus pumilus, *Montis Baldi*, fortè *Austriacus* Myrtifolius. *J B. T. 2. l. 13. 19.* Chamæcistus hirsuta. C B P. Chamæcistus 8<sup>m</sup>. *Clusii Hist. 1. 76.* Chamærhododendros Alpina minor; Cisti flore, foliis Myrti *Terentina* hirsutis, *Breyn. Prodr. 2. 30.*
- Cistus pumilus, Alpinus, folio circinata rotunditatis, hirsutissimo.
- Cistus Chamærhododendros, foliis confertis, ferreâ rubigine nitentibus; margine pilosis, *Phytogr. Tab. 23. fig. 4.* Ledum Alpinum, hirsutum, minus, *Raii Cat. Exterar.* àn Balsamum Alpinum; *Tabernæmont. Icon. 1053.*
- Cistus Indicus, Ledi Alpini foliis, & floribus amplis, *Hort. Leyd. 152.* Chamærhododendron exoticum, amplissimis floribus Liliaceis, *Breyn. Prodr. 23.* Cistus *Javanicus*, flore phœniceo.
- Cistus Chamærhododendros, s. Ledum *Orientale*, pentaneuros, foliis brevioribus, ferrugineâ, & molli lanugine villosis, *Phytogr. Tab. 161. fig. 2.* àn Datura Indica, foliis Malabathri, *Breyn. Cent. 1?* Stramonium, s. Datura Cistoides frutescens, hirsuta major Indica, *ejusd. Breyn. Prodr. 2.* Fortè Katou-Kadali, *Hort. Malab. P. 4. Tab. 42.* Kata-pincka, *Zanon. Indic. Stirp. Malabar. Zeylanensibus*, Ki-moy, & interdum Botia-etta, *Cingalensibus* Mahabothya, dicta. à Cl. Viro, D<sup>no</sup>. *Tancredo Robinsono*, habui.
- Cistus sempervirens, Laurifolia, floribus elegantèr bullatis, *Virginiana*, D. Banister. *Phytogr. Tab. 161. fig. 3.*
- Cistus *Virginiana*, flore, & odore Periclymeni, D. Banister. *Phytogr. ibid. fig. 4.* Qui utramque propriâ suâ manu accuratissimè, ad vivum delineavit, & Nobilissimo suo Patrono, Episcopo Londinens. in Angliam transmisit, cujus favore, & nos obtinuimus.
- Cistus Ledon, Alpinum, foliis ad Uvam Ursi accedentibus. Ledum Alpinum, foliis ferreâ rubigine nigricantibus. C B P. 468. Chamærhododendros Alpigena, odorata,



- dora, *Adversar. Lob.* Chamærhododendros *Alpina* latifolia, *Tabernæm. Icon.* 1052. Ubi tubercula, gallarum instar, Insectorum matriculæ, hujus ramulis frequentius adnatæ, satis benè exprimuntur. àn Chamædaphnoides *Cretica*, *Prosp. Alpin. Exot.* 43?
- Cistus Ledon, foliis Salicis angustifoliæ. *C B P.* Chamærhododendros montana *Allobrogum*, Lentisci folia, *Advers. Lob. Icon.* Chamærhododendros *Alpina* angustifolia, *Tabernæm. Icon. ibid.* Nerium *Alpinum* quibusdam, aliis Ledum glabrum. *J B. Tom. 2. l. 13. 21.* Qui nimis confuse de hujus genere scripsit.
- Cistus humilis Serpylli folio, flore carneo. Chamæcistus Serpylli folio, floribus carneis. *C B B.* 466. àn Rosa *Alpina* altera, *Adversar.* Chamæcistus 7<sup>m</sup>. *Clusii Hist.* 1. 75.
- Cistus humilis vulgaris, flore luteo. Helianthemum vulgare flore luteo. *J B. Tom. 2. l. 13. 15.*
- Cistus humilis vulgaris, flore albo, majore. Helianthemum foliis majoribus, flore albo. *J B. T. 2. l. 13. 16.*
- Cisti Helianthemis foliis, Planta *Maderaspatana.* *Phytogr. Tab. 23. fig. 7.*
- Cistus humilis, foliis Sampsuchi, capitulis valdè hirsutis, s. Helianthemum tale. *J B. Tom. 2. lib. 13.*
- Cistus humilis, Nummulariæ foliis, *D. Sherard.* Helianthemum ad Nummulariam accedens. *J B. T. 2.* Cistus humilis, vel Chamæcistus, Nummulariæ folio, *Botan. Monspel. app.* 294.
- Cistus humilis, foliis minoribus, & incanis. *C B P.* Cistus humilis, s. Helianthemum omninò candicans, flore nunc albo, nunc pallido. *J B. Tom. 2.*
- Cistus humilis, foliis Thymi incanis. *C B P.* Helianthemum flore albo, folio angusto, hirsuto. *J B.*
- Cistus humilis, incana, foliis Thymi durioris, per genicula plurimis, longioribus. Helianthemum folio Thymi incano. *J B. Tom. 2. l. 13. 19.*
- Cistus *Alpina* humilis, foliis Thymi minutissimis, *Phytogr. Tab. 84. fig. 5.*
- Cistus humilis, *Alpinus*, durior, Polii nostratis folio candicante, *Phytogr. Tab. 23. fig. 6.* Chamæcistus montanus, Polii folio noster, *D. Raii Synops. Stirp. Britan.* àn Chamæcistus, foliis Myrti *Terentini* canis, & cinereis. *J B. Tom. 2?*
- Cistus Helianthemus, Serpyllifolia lutea. Chamæcistus Serpylli folio, nigricante, & hirsuto, flore aureo odorato. *J B. Tom. 2. l. 13. 17.*
- Cistus Helianthemus argenteus, folio latiori, flore saturatè luteo, *Phytogr. Tab. 23. fig. 5.* Helianthemum *Alpinum*, folio Pilosellæ minoris, *Fuchsii.* *J B.* ex sententiâ, *D. Raii.* Et fortè Cistus Helianthem. folio Polii montani, ejusd. itèm Cistus pusillus folio candido, flore luteo, ejusd. *J B.* Ex mente ipsius, *Raii Hist. Plantar.*
- Cistus humilis, s. Chamæcistus Ericæ folio, luteus, & elatior. *C B P. Phytogr. Tab. 83. fig. 6.* Helianthemum tenuifolium, glabrum, flore luteo. *J B. Hist. Tom. 2.* Chamæcistus Ericæ folio, *Park. Theatr.* Cori simillimus Frutex in maritimis, *Andr. Casalpin. de Plant.*
- Cistus Helianthemus, Ericæ brevioribus foliis, & humilior. *C B P.* 466. *Phyt. Tab. 84. fig. 4*
- Cistus humilis, *Massiolotica*, Camphorata, tenuissimis foliis glabris, *Phytogr. Tab. 84. fig. 6.* Chamæcistus *Massiliensis*, Corrudæ, vel Coridis luteæ folio, *Schol. Botan.*



*Botan. pag. 42. Hanc eandem esse Plantulam, cujus omnia folia tenuissima, Camphorata similia & glabra, quam Celeberrim. noster Raius circa Massiliam invenit, ab Ornatissimo Botanico, D. Sherard., merito censetur.*

*Cistus humilis, Aizoides, maritimus, Africanus, flore rubello, Hort. Leyd. 157.*

*Cistus humilis, palustris, Hederæ folio, perfoliata, nostras. Gramen Parnassi vulgare, Park. Theatr. Gramen Parnassi flore albo, simplici. C B P. Gramen Parnassi Dodonæi, quibusdam Hepaticus flos. J B. Hist. Pl.*

*exylon  
reum*

**CITHAREXYLUM** arbor Laurifolia, *Americana*, foliorum venis latè candicantibus; ex cujus ligno Citharæ, & Panduræ. Nostratibus *Barbadiensibus* *Fiddle-Wood* dicta, *Phytogr. Tab. 162. fig. 1.* Pandura enim ut existimant melioris notæ Etymologistæ, peregrina vox est, nec locum tenet inter Græcorum compositiones, sed à vocibus Arabicis *پنان* panan (in diversas partes seco) & *دارواه* darvah (Laurus) quod sit secta à Lauru. ab iisdem derivatur. Fortè Caaopia, *Bra-*  
*siliensium* *Pisonis. 124. Lusitanis, Pao do Lacra. Hujus enim baccae molli teguntur*  
*cortice, & succi exaresactione, quamplurimum corrugatae, intra quem autem conti-*  
*netur pulpa alba, meris cylindris juxta se positis, qui sibi invicem coherent: est Ar-*  
*bor Gummiifera dispermos; Hujus enim cortex quando florere incipit arbor, Lachri-*  
*mam, ex croceo rubram fundit, quæ primò mollis, post coagulatur, & Gummi*  
*Gotte similis est.*

*Citharexylum Americanum* alterum, foliis ad marginem dentatis, *Phytogr. Tab. 161. fig. 5. Ab honesto viro, Jacobo Reede, ex Insulâ Barbadiensî in Hort. Reg. Hampt. allata est.*

*Citharexylon, s. Luriodendros* *ενυλ* Arbor *Americana* Materialis triphylla, è cujus ligno, Fidiculæ fiunt, *Barbadiensibus* nostratibus *Timber Fiddle-Tree* nuncupata. àn *Tapia, Marcgr. Bituncus (fortè) Nov. Hispan. Recc. lib. 3. c. 67. Hujus picturam videsis in Phytogr. Tab. 162. fig. 2.*

**CITRULLUS** minor, *Indiæ Orientalis, Phytogr. Tab. 164. fig. 1. apud Exsiccatas, du Boisianas invenimus.*

**CLEMATIS** *Daphnoides major, ex argenteo variegata, foliis rotundioribus, crassis. in cultissimo Hort. D. D. Uvedal primò observavimus.*

*Clematis Hederacea Bueananthos, filiquosa, Indica; Clematis Americana Fraxini folio, scandens, flore phœniceo, Breyn. Prodr. 2. 34. Clematis Conterrheni-*  
*Gelseminum hederaceum, Indicum, Cornuti Raii 1768. Gelseminum Indicum,*  
*flore phœniceo, Ferrar. Flor. Cultur. 199. Techomaxochitl ii. Terent. apud*  
*Recc. 409. Jasminum purpureum, prælongis filiquis, Moris. Præhud. 103. Pseu-*  
*do-Apocynum Virginianum, aliis Gelseminum maximum, Americanum, flore*  
*phœniceo, Park.*

*onia  
viana*

*Clematis Peruana, Digitalis flore, folio Fraxini. P B P. 324. Clematis Americana, Fraxini folio, erecta, Breyn. Prodr. 2. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 162. fig. 4.*

*Clematidis triphylla arborefc. è Maderaspatan. Fortè Tsjori-Valli, Hort. Malab. Part. 7. àn Colubrini genus triphyllum, Ind. Orient. inter exsiccatas, D. du Bois, ex Indiâ missas inveni, vid. Phytogr. Tab. 163. fig. 1. Cle-*



Clematis arborea, *Malabarica*, maxima, Juglandis folio, pinnis rotundioribus, flore albicante amplissimo, foetido, filiquâ compressâ, latissimâ, *Breyn. Prodr.* 2. *Pajana-Pajaneli, Hort. Malab. Part. 1. Fig. 43.* Arbor filiquosa, *Malabarica*, cordato folio, fructu maximo, oblongo, plano, semine membranaceo, *D. Syen. Notis in locum.*

Clematis arborea, *Indica*, flore luteo, spicato, minimo, filiquis longis, angustis, quadratis, atque contortis, seminibus substantiâ lignosâ obductis, *Breyn. Prodr. Padri, Hort. Malab. Part. 6. Padri Malabaricæ similis, Arbor è Maderasspatan. Phytogr. Tab. 53. fig. 1.*

Clematis arborea, *Americana*, Laurinis amplissimis foliis, flore Laccæ colore, odoratissimo, *Jamaicensibus, & Barbadosibus* nostratibus *The Jessamy Tree* nuncupata, *Phytogr. Tab. 207. fig. 2.* sub nomine *Nerio affinis* exhibetur Imago? Fortè *Apocynum spurium, Laurifolium, sempervirens, Virginianum*, filiquis compressis, *D. Banister. Cat. Mss.* Fortè etiâ *Tecomaxochitl* *1. Terent. apud. Recc. fol. 408. quoad Descriptionem, Floris quidem Icon minus convenit. Huic nostræ nigrum est Lignum. Vide Supp. pa. 399.*

Clematis filiquosa Lathyroides, Limonii odore, claviculata, flore Digitalis, Intestini coloris. Clematis *Americana*, Digitalis flore tetraphyllos. *P B P. 324.* Clematis *Americana*, tetraphyllos, *Dodart. Mémoire. 71. Breyn. Prodr. 30.* Clematis tetraphylla, *Americana, Zanon. Boccon. Morison. &c.* Hujus picturam videsis apud *Boccon. Zanon. & Icon. Roberti.*

Clematis Myrsinites amplioribus foliis, *Americana*, tetraphyllos. Fortè *Tety-poteiba Brasiliensium*, s. *Vitis arbutina, Pison. p. 250. Phytogr. Tab. 163. fig. 2.* àn *Tepehoila-Capitzxochitl, Mexicenses Saxivolvula, Hernand. 211?* Clematis quadrifolia, flore Digitalis luteo, claviculis aduncis, filiquis longissimis, alato semine, *D. Plumier. Tab. 94. in Insulâ S. Domingo, invenit Frater Religiosus; ubi nuncupatur Fleur de May, ad nos verò absque ullo titulo, ex Barbadosi Insulâ allata est.*

Clematitidis novum genus, Cucumerinis foliis, *Virginianum, Phytogr. Tab. 163. fig. 3.* Planta peculiaris pappescens, non lactescens, *D. Banister.* Fortè etiâ *Valeriana Clematites*, sive scandens, *ejusd. Banister. Cat. Mss.* àn Clematis 2<sup>a</sup> *Peruviana. C B P?* *Bexudo del Peru. J B. Tom. 2. lib. 15. 151.*

Clematitidis sylvestr. latifolia. *C B P. 300.* Clematis latifolia, s. *Atragene quibusc, J B. Tom. 2. l. 15. 125.*

Clematitidis *Americana*, urens, *Cocotemecatl Mexicensium, s. Funis volubilis acris, Hernand. fol. 141.* Fortè etiâ *Collotemecatl, ejusd. fol. 373.*

Clematitidis peregrina, foliis Pyri incis. *C B P.* Clematis *Boetica Clusii. J B. Tom. 2. lib. 15.*

Clematitidis, s. *Flammula repens. C B P.* Clematis, s. *Flammula scandens, tenuifolia, alba. J B. T. 2. l. 15. 127.*

Clematitidis maritima repens, quæ 1a. in *Prodromo. C B P. 300.*

Clematitidis exotica repens minor, foliis fere orbiculatis, uno pediculò ternis, floribus candidiss. odoratis.

Clematitidis Alpina, Geranifolia. *C B P.* Clematis cruciata, Alpina, *Pona Descript. Montis Baldi, apud Clus. 335.* Ubi figura satis infœlicitè sculpta exhibetur. Iconem



nem magis accuratam videsis apud *Phytogr. Tab. 84. fig. 7.*

Clematitis, s. Flammula surrecta, alba. *J. B. Tom. 2. Flammula Jovis surrecta Park. Theatr.*

Clematis Pannonica, flore cæruleo, surrecta. *J. B. Tom. 2. Clematitis cærulea, erecta. C B P. 300. Vide Supp. p. 399.*

Clematitis cærulea, vel purpurea repens. *C B P. Clematis, s. Flammula, flore cæruleo, & purpureo, scandens. J. B. Tom. 2. flore majore, & minore, simplici, variat etiam flore pleno. ad hujus genera (fortè) spectat Itzecunpatli Mexicensibus, Anton. Recc. 380. Vide Supp. p. 399.*

CLINOPODIUM Origano simile. *C B P. 224. Clinopodium quorundam, Origani facie; J. B. Tom. 3. l. 28. 250.*

Clinopodium angustifolium, non ramosum, flore cæruleo, labio trifido, atro-purpureis maculis notato, ex *Virginia, Phytogr. Tab. 164. fig. 3.*

Clinopodium Alpinum hirsutum. *C B P. Item Teucrium Alpinum, comâ purpureo-cæruleâ, ejusd. C B P. Clinopodium Alpinum, Pona. Descript. Mont. Bald. Chamædri vulgari falsæ aliquatenus affinis, & Clinopodium Alpinum Pona. J. B. Tom. 3. Vide Phytogr. Tab. 163 fig. 5*

Clinopodium arvense, Ocymi facie. *C B P. Acinos multis. J. B. T. 3. l. 28. 259.*

Clinopodium montanum. *C B P. Clinopodium Austriacum, Clus. Hist. lib. 3. 359. variat flore albo. Acini pulchra species. J. B. T. 3. l. 28. 260.*

Clinopodium Arabicum, annuum, *Bobarti.*

Clinopodium Thymi majore folio, verticillis lanuginosis, mastichen olens. Clinopodium quibusdam, Mastichina Gallorum. *J. B. T. 3. l. 28. 243. Marum Mastichen redolens. C B P. 224.*

Clinopodium minus exoticum, Thymi folio majore inodorum, *Phytogr. Tab. 84. fig. 8. Clinopodium Creticum, Pr. Alpini, exot. 265. Fortè etiam Saxiphraga, ejusd. p. 144. Thymum exoticum, flosculis nunquam expansis, D. Bobart.*

Clinopodium minus exoticum, Thymi folio minore, inodorum, *Phytogr. Tab. 85. fig. 1. Clinopodium Thymi folio, & facie, Schol. Botan. 54.*

Clinopodium Pulegii Cervini foliis, *Maderaspatanum*, verticillis parvis, caulem per intervalla arctè cinctis, *Phytogr. Tab. 163. fig. 6.*

Clinopodium Hyssopi latioribus foliis, *Maderaspatanum*, *Phytogr. Tab. 164. fig. 2. Huic folia sunt tenuissimè crenata.*

Clinopodium Pulegii angusto, rigidoque folio, *Virginianum* flosculis in cymis; à nostratibus eo in loco degentibus, *Serpentaria* dicitur. Pulegium *Virginianum* nonnullis, aliis *Serpentaria*, aut *Colubrina Virginiana*, *Raii Hist. Pl. Satureia* floribus in summitate dispositis, *Hort. Leyd. 537. Pulegio Cervino* quodammodò accedens, capitata, *Chamæpityos Austriacæ* cæruleæ foliis, & facie, *Breyn. Pr. 2. Hujus Icon* exhibetur in *Phytogr. Tab. 54. fig. 2. Vide Supp. p. 399*

Clinopodium Amaraci folio, floribus albis, *Americanum*, *Phytogr. Tab. 85. fig. 2. Presentaneum est remedium contra morsus Serpentum, ac nobilis Antidotus adversus omnia venena. Ideoque à politioribus nostratibus, dictamni titulo insignitur. Huic fortè spectat Origanum cujus ramorum summitates, floribus dilute, rubris, in verticillos congestis, coronantur, D. Banister. Cat. Virgin. apud Raii Hist. Plant. 1926. Cline-*



*Clinopodium fistulosum*, pumilum, *Ind. Occident* summo caule floridum, *Phytograph. Tab. 164. fig. 4.* Fortè *Tsjeru Tardavel, Hort. Malab. Part. 10. Tab. 94.* *Experientia enim nos docuit, quamplurimas Indiæ Orientalis Plantas, etiã in Americã reperiri.*

*Clinopodium Canadense* fistulosum, foliis lanuginosis proliferum. *Origanum fistulosum, Canadense, Cornuti de Pl. Canad. 14.* *Mentastrium fistulos. Americanum, Park.*

*Clinopodium fistulosum Virginianum*, glabrum, latifolium, & angustifolium.

*Clinopodium fistulosum Canadense* latifolium, floribus exiguis. Fortè *Quaxoxouli-qui, Novæ Hispaniæ Recc. 406.* *Ad horum genera fortè accenseri possit illa Artemisiæ foliis, Novæ Hispaniæ Planta, sub titulo Xoxotlato apud Antonium Reccum, fol. 441.*

*Clinopodium Virginianum*, angustifolium, floribus amplis luteis, purpuro-maculatis, cujus caulis, sub quovis verticillo, decem vel duodecim foliolis rubentibus est circumcinctus, *D. Banister. Phytogr. Tab. 24. fig. 1.* *Clinopodium Virginianum angustifolium, flore luteo, Hort. Leyd. 161.*

**COCHLEARIA** major *Batavica*, subrotundis foliis, *Morif. Cochlearia, fol. subrotund. C B P.*

*Cochlearia minor*, rotundifolia, nostras, *Park. Raii Hist. Pl. 833.* *Cochlearia Danica* procumbens, *Morif. Hist. 2. 309.* *Cochlearia Danica* repens, quæ 2<sup>a</sup> in *Prodr. C B P. 110.* *Simon. Pauli Quadripart. Botan. 269.* *Cochlearia minima. J B. T. 2. l. 22. 942.* *Cochlearia pusilla montana, Grisei Virider. Lusit.*

*Cochlearia Britannica*, folio sinuato, *Morif. Hist. 2. 308.* *Cochlearia folio sinuato. C B P.* àn *Cochlearia marina*, folio anguloso, parvo, *D. Lawson? Raii Synops. Stirp. Britan. 116.*

*Cochlearia major Portlandica*, *Chelidonii minoris folio.* àn *Hederaceum Thlaspi, Lob. Icon. 615?* *Thlaspi hederaceum. J B. T. 2. l. 22. 933.* *Cochlearia Armorica, Thlaspi hederaceums Historiæ Lugdunensis. H R P.* *Thlaspi exoticum 1<sup>m</sup>. s. repens hederæ folio. C B P.*

**COLUTEA** *Vesicaria. C B P. 396. J B. T. 1. l. 11. 380?*

*Colutea Veræ crucis, Vesicaria, P B P. Phytogr. Tab. 165. fig. 3.*

*Colutea Æthiopica*, flore phœniceo, *Barbæ Jovis foliis, Breyn. Cent. 1. 70.*

*Colutea filiquosa*, sive *Scorpioides major, C B P. 397.* *Colutea Scorpioides. J B. T. 1. l. 11. 381.* *Colutea Scorpioides elatior, & major, frutescens, Morif. Hist. 2. 122.*

*Colutea Scorpioid. humilis. J B. T. 1.* *Colutea filiquosa, minor. C B P. 397.* *Colutea Scorpioides humilior, & minor, Morif. Hist. 2. 122.*

*Colutea Scorpioides maritima*, glauco folio. *C B P.*

*Colutea filiquosa minor, coronata. C B P.* *Colutea Scorpioid. quædam, s. Polygalo Cortusi similis planta, sed major. J B. Tom. 1.* *Colutea Scorpioides altera, Clus. Hist. lib. 1. 98.* *Colutea, s. Polygala altera fruticosior, foliis latioribus, Hort. Leyd. 168.*

*Colutea, s. Polygala Valentina 1a. Clus. Hist.* *Coluteæ parva species, Polygala Valentina, Clusio. J B. Tom. 1. l. 11. 383.* Colu-



Colutea caule Genistæ fungoso. *J.B. Tom. 1. Polygala major Massiolotica. C.B.P.*  
ex sententiâ *Raii, Hist. Pl. 925. Polygala Valentina 3a. Clusii.*

Colutea Scorpioides *Cretica*, odorata, *Pr. Alpin. exot. 17.* àn *Coronilla frutescens*,  
coronato, glauco folio, *Cretica*, flore luteo, odorato, *Breyn. Prodr. 2. 36 ?*

Colutea *Zeylanica*, argentea, latifolia. *P.B.P. 325.* Ervum, s. Orobus arborefcens,  
incanus, Glycyrrhizæ folio, *Cretica*, flore luteo, spicato *Zeylanicus, Breyn. Prodr.*  
2. 43. Colutea *Zeylanica* argentea tota, *Hort. Leyd. 169.* Mundu-Murungu,  
*Zeylanensibus.*

Eadem *Curaçavica*, angustifolia. *P.B.P.* àn Ervum, s. Orobus arborefc. minus in-  
canus, Glycyrrhizæ foliis, flore spicato, *Americanus*, pediculo pinnarum ruben-  
te, *Breyn. Prodr. 2.*

Colutea *Indica*, fruticescens, foliis supernè glabris, virentibus, subtùs sericeo ni-  
tore argenteo splendentibus. *Colinil, Hort. Malab. Part. 1. fig. 55.* Nil, s. In-  
digo spuria, *Raii Hist. Pl. 1734.* Polygala *Indica*, minor, filiquis incurvis,  
*D. Seyne Not. in Hort. Malab.*

Colutea *Javanica*, foliis oblongis, *Phytogr. Tab. 165. fig. 1.*

Colutea filiquosa, *Malabariensis, Comelin. Kedangu, Hort. Malab. Part. 6. Tab. 27.*  
*Jent Indorum.* Siliquosa *Malabarica*, filiquis spithamæis, angustiss. contortis,  
*Raii Hist. 1735.*

Colutea exotica, angustifolia, floribus luteis, aversâ parte elegantèr punctatis, ex  
*Codice Beningiano, Phytogr. Tab. 164. fig. 5.*

Colutea *Sesban Ægyptiacæ* foliis accedens, *Maderaspatana, Phytogr. Tab. 165. fig. 2.*

Colutea *Indica*, herbacea, ex quâ Indigo, *Hort. Leyd. 168.* Coluteæ foliis Anil  
nominatum. *J.B.T. 1. l. 11. 384.* Nil, Anil, s. Indigo *Indica, Moris. Hist. 2. 202.*

*Sesban Aniliferum Indicum, Coronillæ foliis, vel Indigo Indica, Breyn. Prodr. 2.*  
*Ameri, Hort. Malab. Part. 1. fig. 54.* Caachira, unde fit Anil 1a. *Pisonis 198.*

*Xihuhquilitl Pitzahac, Mexicensibus, s. Anir tenuifolia, Hernand. quoad Descript.*  
*Hist. Mexic. fol. 108.* Icon fortè eadem *Caachiræ 2æ. Pison. & Mohuitli, ejusd.*

*Hernand. 387. Vide Supp. p. 399*

Colutea *Indica*, s. Indigo sylvestris, polyceratos, filiquis recurvis, *Americanus.*  
Frutex 1<sup>us</sup> innominatus; àn *Glaux*, vel *Anthyllis leguminosa*, vel *securidaca* sit  
dicenda, *Marcgr. lib. 2. cap. 8.*

Colutea herbacea, *Dumetorum maj.* filiquis articulatis, flore vario, *Hort. Leyd. 169.*

*Coronilla, s. Polygala Dumetorum maj.* Siliquis articulatis, flore vario, *Moris. H.*  
2. 119. *Securidaca Dumetorum major*, flore vario, filiquis articulatis. *C.B.P.*

*Securidacæ 2æ* prior species, *Clus. Hist. 2. 237.* *Melilotus 5a. Tragi. J.B. Tom. 2.*  
*lib. 17. 348.*

Colutea herbacea, *Dumetorum minor*, filiquis articulatis, flore albo. *Hedyfarum*  
argenteum, *Pr. Alpini, exot. 315.* *Securidacæ 2æ* altera species, *Clusii ibid.* *Po-*  
*lygala Dumetorum minor*, filiquis articulatis, pallidè-cærulea, *Moris. Hist. 2.*  
120.

Colutea herbacea, *Enneaphyllos, Moris. ibid.* *Polygalon Cortusi. J.B. Tom. 2.*  
*lib. 17. 351.*

Colutea filiquosa *enneaphyllos, India Orient.* filiquis, & foliis, aversâ parte pube-  
scentibus, *Phytogr. Tab. 166. fig. 3.*



*Colutea Orientalis* plerumque heptaphyllos, hirsuta, floribus spicatis, saturatè purpureis, filiquis plurimis quadratis, valdè pilosis, summo furculorum dependentibus. Catu Tagera, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 30.* *Astragalus Indicus*, polylobos; à *Cingalensibus* Pilæghas, D. Herman, quoad *Comelin. in Not. supr. loc.*

*Colutea filiquosa* glabra, ternis, quinisvè foliis, *Maderaspatana*, femine rubello, *Phytogr. Tab. 166. fig. 1.*

*Colutea enneaphyllos* Lotoides, *Ind. Orient.* filiculis conglomeratis, *Phytogr. Tab. 166. fig. 2.*

*Colutea minima* species, dispermos, ex *India Orientali*, *Phytogr. Tab. 165. fig. 4.*

*Conferva reticulata* crispa, D. Doody, *Phytogr. Tab. 24. fig. 2.*

*Conferva geniculata minima*, nostras, *Phytogr. Tab. 84. fig. 9.* *Conferva fluitans*, filamentis geniculatis.

**CONVOLVULUS** vulgaris major, flore amplo, dilutè purpureo.

*Convolvulus Sagittariæ* foliis, flore purpureo, *Wheleri*, *Phytogr. Tab. 85. fig. 3.* ab *Inventore habui.*

*Convolvulus purpureus*, folio subrotundo. *CBP. 295.* *Campanula Indica.* J B. *T. 2. lib. 15. 165.* *Mecatpatlis Mecatlanensis*, *Nov. Hispan. Rec. 304.* Quem vidit in *Hort. D. Corvini Joannes Terentius.* *Campanula exotica Aldini, Hort. Farnes. 89.* idem variat flore albo. *Convolvulus Indicus*, flore albo, *Hort. Pisan. append.*

*Convolvulus cæruleus*, hederaceo, anguloso folio. *CBP. Nil Arabum, s. Convolvulus cæruleus.* J B. *Tom. 2.* è *Zingiâ nobis est allata*, & ab *Indigenis Beedchamerca nuncapatur.* *Hanc etiâ Convolvuli speciem crescentem vidit ille Lynceus Terentius, in Horto Curiosissimi Viri, D. Corvini, ut videsis in Not. ad locum, Rec.*

*Convolvulus Maderaspatanus*, purpureus, *Violæ Martiæ* foliis, floribus plurimis simul junctis, *Phytogr. Tab. 166. fig. 5.*

*Convolvulus arboreus*, rotundifolius, *Ind. Orientalis Kattu-Kelengu, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 51.* *Convolvuli affinis Malabarica*, floribus pilosis, variegatis, *Commel. in Not.*

*Convolvulus maximus Malabariensis* villosis foliis subrotundis, floribus purpureis. *Ex seminibus in H R H. mihi natus est.* *Samudra-Stjogam, H. Malab. Part. 11. Tab. 61.*

*Convolvulo similis villosa*, foliis crassis subrotundis, è *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab. 25. fig. 4.*

*Convolvulus Malabaricus*, folio rotundiore, crasso, flore candido, *Commelin. in Not. ad HM. Bel-adambu-walli, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 58. Vide Phyt. Tab. 324*

*Convolvulus marinus*, Catharticus, folio rotundo, flore purpureo, s. *Patate de Mer. Plumier.* Et *Camoulroulve Caribæorum*, ejusd. *Descript. des Plantes L'Amérique. Tab. 104. Vid. Phyt. Tab. 324 f. 2*

*Convolvulus maritimus*, rotundifolius, *Morif. Hist. 2. 11.* *Soldanella maritima minor.* *CBP. 295.* *Brassica marina, s. Soldanella.* J B. *Tom. 2. lib. 15. 166.*



*Convolvulus maritimus*, s. *Soldanella* è *Maderaspatan*. folio in summitate sinuato, *Phytogr. Tab. 24. fig. 4.* àn *Convolvulus maritimus Zeylanicus*, folio crasso, cordiformi, *Hort. Leyd. Bintamburu Zeylanensibus*. *Soldanella* fortè *maritima*, major. C B P. *Schovanna Adamboë, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 57. Lusitanis* *Pes Capræ* dictus.

*Convolvulus maritimus*, majore folio *Chinensis*, *Phytogr. Tab. 24. fig. 5.* àn *Sarfa litoralis*, s. *Convolvulus maximus, Brasiliensium, Pisonis. 258.*

*Convolvulus coccineus*, folio anguloso, *Americanus, Plumier. Tab. 103. Phyt. Tab. 324 f.*

*Convolvulus Curassavicus*, folio *Bryoniæ albæ* anguloso. P B P. *Mechoacanna Curassavica* vulgò. Fortè *Ieticucu*, *Batata di purga*. *Mechoacanna Brasiliensium Pison.* & *Ieticucu*, s. *Radix Mechoacan, Marcgrav.*

*Convolvulus Indicus*, *Batatas* dictus, *Raii Hist. Pl. 728.* *Batatas Camotes Hispanorum Clusii.* C B P. *Batatas Occidentalis India*, & *Inhame Orientalis Lusitanorum, Park.* *Ietica Brasiliensibus, Marcgr. fol. 16.* *Convolvulus Indic. radic. tuberosâ, eduli, cortice rubro Batatas* dictus. P B P. 326.

*Convolvulus angulosus foliis, Malabaricus*, radice tuberosâ, eduli. *Kappa-Kelengu, Hort. Malab. Part. 7. Tab. 50.*

*Convolvulus Indicus*, alatus, maximus, foliis *Ibisco* nonnihil similibus, angulosus, *Hort. Leyd. Turbith Officinar. & Garcia, atque Acoftæ, Breyn. Prodr. 2. 101.* *Turpethum repens*, folio *Althææ*, vel *Indicum*. C B P. 149. *Tirastawalu Zeylanensibus* dicta.

*Convolvulus Canariensis*, longioribus foliis mollibus, & incanis. *Ahilo-porro Salvages Hispanis* nuncupatur. àn *Convolvulus marinus, Catharticus*, foliis *Acetosæ, Plumier. Tab. 105. Phyt. Tab. 325 f. 1.*

*Convolvulus Althææ folio, Curassavicus*, dispermos, flore cæruleo. P B P. 326. *Convolvulus Americanus*, lanuginosus, *Althææ folio, flore cæruleo, parvo, Breyn. Prodr. 2. 35.*

*Convolvulus peregrinus*, *Althææ folio, omnino viridi, & minus inciso. Convolvulus peregrinus, pulcher, folio Betonicæ. JB. Tom. 2. lib. 15. 159.*

*Convolvulus argenteus*, foliis admodum incanis, & tenuitè incisus. *Convolvulus argenteus Althææ folio. C B P. 295. Convolvulus argenteus, foliis magis incisus, & incanis. HR P.*

*Convolvulus Americanus*, vulgaris folio, capsulis triquetris, numerosis, ex uno puncto, longis petiolis propendentibus, semine lanugine ferrugineâ villosa. ^ Fortè *Fructus 3. Simonis Tavar. Clus. exot. l. 2. c. 18. (i.e.) Buenas Noches Hispanorum ejusd.* Hujus *Convolvuli* species habetur etiâ, fructu majore, *Dock-Climber Barbadosibus* nostratibus dictus.

*Convolvulus Malabariensis* densiore folio, polyanthos, *Phytogr. Tab. 276. fig. 3.* Hujus enim folia, à *Carelou-Vagon, Hort. Malab. Part. 8. (i.e.) Aristolochiæ Clematidis Malabaricæ*, haud multum abludunt.

*Convolvulus luteus*, polyanthos, *Americanus, Plumier, Tab. 102.*

*Convolvulus Americanus*, sub *Jalapix* nomine, receptus, *Phytogr. Tab. 25. fig. 1.* àn *Convolvulus Colubrinus, Pisonis. Caapeba, s. Convolvulus Brasilianus, flore octopetalo, monococcus, Raii Hist. Pl. 1331.*

*Convolvulus monococcus, Virginianus, D. Banister. Phytogr. Tab. 166. fig. 4.*

Con



- Convolvulus*, s. *Volubilis Americanus*, *Bryonia* nigræ nervosis foliis, vasculis feminiferis, triquetris, *Phytogr. Tab. 25. fig. 2.* *Helxine frutescens*, *Bryonia* nigræ foliis, capsulis triquetris, amplis, pergamenis, *D. Banister. Cat. Stirp. Virg.* àn *Capreolata Bryonia* nigræ folio, *Brasiliana*, tricocca, *Marcgr. Vid. Supp. p. 400*
- Convolvulus Americanus*, subrotundis foliis, Viticulis spinosis, *Phytogr. Tab. 276. fig. 4.* àn *Convolvulus Peruvianus*, perpetuus, s. *Hololiuchi*, *Hort. Farnesian. 71.* *Smilax aspera*, *Ind. Occidentalis. C B P.* *Oliliuhqui*, seu *Planta orbiculare foliorum*, *Hernand. 145.* *Quam Coaxihuitl*, seu herbam *Serpentis* alii vocant. *Ab hujus usu, dormientibus & vigilantibus varia objiciuntur phantasmata, quod ei commune est cum Daturâ, Papavere, & Banguæ Indorum. Smilaces læves, phantasmata varia, gignere, etiâ apud Antiquos notum fuit. Indorum Sacrifici, cum videri volebant versari cum Superis, ac Responsa accipere ab iis, hæc vescebantur plantâ ut desiperent, milleque phantasmata, & Daemonum obversantium effigies circumspectarent. De his plura vid. apud Hernandez. ubi supra. Et Tobiam Aldin. Hort. Farnes. fol. 99. Nec non Joseph. Acoft. in Hist. Nat. Indica. lib. 5. cap. 25. Veruntamen adversus Luem veneream nobile exstat Antidotum.*
- Convolvulus Syriacus*, & *Scammonea Syriaca*, *Morif. Hist. 2. 12.* *Scammonea Syriaca. C B P.* *Scammonia Syriaca*, flore majore *Convolvuli. J B. T. 2. l. 15. 163.*
- Convolvulus Indicus Syriaco* similis, sed minor. àn *Convolvulus Syriacus* minor, *Hort. Leyd. append. 660?* *Convolvulus Scammoneæ* foliis, & flore æmulus *Morisono, Raii Hist. Pl. 722.* Foliis ad basim divisis & angulosis à *Scammonea* rotundifolia *Virginiana Parkinson.* præcipuè differt. Fortè *Temecatl expurgans, Hernand. fol. 305.*
- Convolvulus Scammonea* dictus *macrorrhizos*, *Phytogr. Tab. 85. fig. 4.* àn *Scammonea macrorrhizos, Pr. Alpin. exot. Scammonea mocrorrhizos Cretica, Park. Th.*
- Convolvulo Cinamomeo* similis, si non idem ex *Americâ.* *Zazalic Tlacopatlis, s. Sudis glutinosæ medicina, Hernand. fol. 41.* Fortè *Adamboe, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 56.* *Convolvulus Malabaricus*, flore maximo purpurascente, *Commelin. supr. loc.*
- Convolvulus Scammoniatus*, ex *Americâ*, foliorum auriculis magis falcatis. àn *Convolvulus Scammoneæ* folio acuto, flore carneo, *Curassavicus. P B P.* *Ystacololtzin Chullulense, Scammoneum Mexicanum, Hernand. 256.*
- Convolvulus Jamaicensis*, trilobatus, foliis tomentosâ lanugine densiori & lenissimâ, ac *Veluti* adinstar, utrinque obductis, flore peramœnè purpureo, *Phytogr. Tab. 167. fig. 4.*
- Convolvuli* (fortè) species, *Platani Occidentalis* folio, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 167. fig. 3.* à *D. Patricio Adair* communicata.
- Convolvulo* similis, *Bryonia* albæ foliis villosis, ex *Indiâ Oriental. Phytogr. Tab. 25. fig. 3.* àn *Nehoemeka, Hort. Malab. Part. 8. Tab. 19?* *Hæc autem pro Synonymo Bryonia Zeylanicæ, foliis profunde laciniatis, Hort. Leyd. à Cl. Commelino, male ponitur. Annot. in loc. Est enim re verâ, ab ipsâ plurimum diversâ, & ad Momordicarum genus ablegari debet.*
- Convolvulus Maderaspatanus*, villosus, quinquifidis foliis, capitulis *Scabiosæ* quodammodò mentientibus, *Phytogr. Tab. 166. fig. 6.* àn *Convolvulus Zeylanicus*, villosus, pentaphyllus, & heptaphyll. minor, *Hort. Leyd. 187?* *Pes Tigrinus, s.*



- Supp.*  
400. Diwipahuru *Zeylanensibus* dictus. Pulli Schovadi, *Hort. Malab. Part. 11. Tab. 59.* *Convolvulus Americanus*, Mandiocæ multifido folio, heptaphyllos, flore albo, fundo purpureo, radice tuberosâ, cortice albo, *Phytogr. Tab. 276. fig. 5.* àn Totoyoxitl *Mexicensibus*, s. Pes Passerinus, *Hernand. apud Reccum, fol. 256.* Semina habet in singulis capsulis terna, molli laevagine fimbriata; quorum bina, ab altero, pelliculo membranaceo sunt divisa. *Vide Supp. pa. 400*
- Convolvulus Americanus*, villosus, pentaphyllus, & heptaphyllos major, *Hort. Leyd. 185.* *Convolvulus Ægyptius Vestling. in Not. ad Alpinum, 73.* Herba non nominata, *Marcgr. lib. 1. cap. 25. fol. 54.* Dog-Weed *Barbadensibus* nostris. Annon hujus grana sint Frisoles, & Palaris, peculiare herbarum genus, quas eo ferè loco habent, quo nos Pisa, Lentesc, & Fabas, *Joseph. Acost. lib. 4. cap. 19.*
- Convolvulus quinquefolius*, glaber, *Americanus*, in *Hort. Comptoniano*, ex femine natus, *Phytogr. Tab. 167. fig. 6.* àn *Convolvulus Arabicus Prosp. Alpini, exot. lib. 2. 186.*
- Convolvulus angustissimo folio*, nostras, cum auriculis, *Phytogr. Tab. 24. fig. 3.*
- Convolvulus peregrinus cæruleus*, folio oblongo, flore peramæno, triplici colore insignito, *Morif. Hist. 2. 17.* *Convolvulus peregrinus, cæruleus, folio oblongo, utriusque Bauhini.* *Convolvulus peramænus Aldini Belluc. Hort. Pisan. 60.*
- Convolvulus minor cæruleus, Hispanicus, Park. Paradis. variat etiâ flore immaculati candoris.*
- Convolvulus minor, Americanus*, flore albo, magno, quinquangulâri. *Convolvulus Brasiliens. Marcgrav. 19.* foliis Smilacis, in longis pediculis, *Raii Hist. Pl. 731.*
- Convolvulus Siculus annuus cæruleus*, minimus, capsulâ floris, binis foliolis cinctâ, *Morif. Hist. 2. 36.* quoad *Descriptionem*, apud enim Tabulas, alterius Icon hujus titulo subponitur. *Convolvulus Siculus minor*, flore parvo, auriculato, *Boccon. 89.* *Convolvulus Siculus*, flore cæruleo, minimo, *Icon. Roberti.* *Convolvulus minimus, Africanus, Park. Theatr. Vid. Supp. pa. 400*
- Convolvulus Spicæfolius*, major. *Volvulus terrestris, Dalechampii, Hist. Lugd. 1415.*
- Convolvulus minimus, Spicæfolius, Lobelii, Morif. Hist. 2. 17.* *Convolvulus Linariæ folio. C B P. Cantabrica Plinii quorundam, Clusii.*
- Convolvulus Spicæfolius*, argenteus, radice repente, *Botan. Monsp. 74.* *Convolvulus minor, argenteus repens, acaulis ferè. HRP. 57.* *Convolvulus minor, argenteus repens, Rupellensis, flore rubro, Morif. ibid.* *Convolvulus serpens maritimus, Spicæfolius, Triumfetti Obs. 91.*
- Convolvulus ramosus incanus*, foliis Pilosellæ. *C B P. Helxine Cissampelos ramosa, Cretica, Ponæ. Italicè.* Elegantissimè intèr *Icones Robertinas* exhibetur. *Convolvulus Spicæfolius ramosissimus.*
- Convolvuli minimi species, Bisnagarica*, hirsuto Alsines folio, *Phytogr. Tab. 9. fig. 1.* Ubi malè collocatur sub nomine *Alsines facie Myosotis*, &c. Huc spectat *Vistnu-Ilandi, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 64.* *Convolvulus Indica minor, Alsine folio, flore rubicundo purpureo, Commelin. in Not.*
- Convolvulus cæruleus Myosotis, Indicus erectus, Passerinae minoris folio, ramosissimus, Phytogr. Tab. 167. fig. 2.* àn *Convolvulus minor Americanus, Elatines folio & facie, flore cæruleo minimo, Breyn. Prod. 2.* *Con-*



- Convolvulus Indicus* barbatus minor, foliorum apicibus lunulatis, *Phytogr. Tab.* 276. fig. 6. Huc fortè spectat *Sandera-Clandi*, *Hort. Malab. Part. 11. Tab. 65.*
- Convolvulus Indicus* minor, folio anguloso, flore ex albo flavescente, *Commelin. in Not. supr. loc.*
- Convolvulus minimus*, procumbens, *Acetofellæ* foliolis, barbulis ad imum quaternis, summo apice tricuspidatis, *Phytogr. Tab. 167. fig. 5.* *Convolvulus* (fortè) *Africanus*, s. *Guiniensis* pumilis *Sagittæ* foliis, flore campanulato, obsoletè luteo; fundo purpurascente, *Hort. Beaumont. pag. 13.*
- Convolvulus exoticus*, annuus, foliis *Myriophylli*, s. *Millefolii* aquatici, flore sanguineo, *Morif. Hist. 2. 20.* *Convolvulus pennatus*, exoticus, rarior, *Fab. Column. Obs. 72.* *Quamoclit Camerar. Hort. Medic. J B. Tom. 2. lib. 15. 177.* *Jasminum Millefolii* folio. *C B P. Tsjuria Cranti, Hort. Malab. Part. 11. Tab. 60.* ab *Indis Gentilibus* circa *Maderaspatan.* *Sanga-Langheet* nuncupatur.
- Convolvulus major rectus*, *Creticus*, argenteus, *Morif. Hist. 2. 11.* *Cnecrum album*, folio *Oleæ* argenteo, molli. *C B P. 463.* *Dorychnium Imperati. J B. T. 1. lib. 5. 598.* *Convolvulus rectus*, odoratus *Ponæ*, *Dorychnium*, *Pr. Alpin. exot. 74. variat interdum angustioribus foliis.*
- Convolvulus minor*, rectus, *Hispanicus*, villosus, *Breyn. Prodr. 2. 35.* *Companula Lychnidea. J B. Tom. 2.* *Lychnis sylvestris*, *Campanulæ* flore. *C B P. & inter Campanularum species, hanc plantam recensere, rationi magis consentaneum videtur; haud secus ac ipse feci in præcedentibus.*
- CONYZA** major, *Monspeliensis*, odorata. *J B. Tom. 2. lib. 24. 1054.* *Conyzamas Theophrasti*, major *Dioscoridis. C B P. 265.*
- Conyza minor*, vera. *J B. ibid.* *Conyza foemin. Theophr. minor Dioscoridis. C B P.*
- Conyza Africana*, grave-olens, capitulis argenteis, *Phytogr. Tab. 243. fig. 1.*
- Conyza latifolia*, viscosa, suave-olens, flore aureo, è *Gallo-provinciâ*, *Schol. Bot. 199.* Fortè *Asteris* altera species, *Apula: àn Baccharis, Column. ephras. 251?* *Aster luteus*, radice odorâ. *C B P. 266.*
- Conyza marina*, *Hist. Lugd. 1366.* *Conyza tuberosa*, lutea, foliis angustis, & rigidis, *Botan. Monspel. 77.* *Chondrylla bulbosa*, *Conyzæ* facie, foliis angustioribus. *C B P. 130.* Qui rectè hanc *Conyzam*, & *Asterem Conyzoidem Gesneri*, contrà sententiam *Fratri*, pro diversis proponit Plantis; at istius Synonymo, viz. *Chondryllæ* alteri *Dioscoridis Rawolfio*, nequaquàm assentire possum; quanquàm in hac re, ambo Fratres convenire videantur.
- Conyza major capitata*, s. globosa, *Boccon. Phytogr. Tab. 168. fig. 1.* àn *Conyza aquatica*, *Asteris* flore aureo, quæ 3. in *Prodr. C B P. 266.*
- Conyza Sicula* annua, lutea, foliis atro-viridibus, caule rubente, *Boccon. Phytogr. Tab. 168. fig. 2.* *Conyza caulibus rubentibus*, tenuioribus, flore luteo, nudo, *Botan. Monsp. 77.* *Conyza* (fortè) *viminosa*, *Lusitana*, *Grisleii*, *Viridar. Lusit. Vids Supp.*
- Conyza cærulea*, acris, *Americana.* Fortè *Zazachichit Mexicensibus*, seu *Herba amara*, *Hernandez. apud. Recc. fol. 198.*
- Conyza alba acris*, annua, hirsuta, major. *Conyza Canadensis*, annua, acris, alba, *Linariæ* foliis, *Boccon. Pl. Sicul. 86.* *Aster Canadensis*, annuus, flore papposo. *HRP. 27.* *Virga aurea Virgin. hirsuta annua, Zanoni. 204.* Hanc plantam esse eandem



dem existimare Cl. Raius profitetur, quam Parkinsonus, sub *Eupatorii Cannabini angustifolii* Americani, titulo proponit, & describit: Qui folia ad margines interdum dentata, esse ait, alias æqualia, vid. *Raii Histor. Pl. fol. 271. apud nostrates.*

*Conyza alba*, acris, annua, foliis splendentibus, glabra, minor, à D. Doodÿ primo observata *Virga aurea Virginia minor*, *Zanon. 206. apud nostratos.*

CORAL arbor siliquosa. J B. vid. *Phaseolo affinis.*

CORALLINA cortice reticulato, maculoso, purpurascente. C B P. 366. Frutex marinus elegantiss. albus, *Corallium Nautis.* J B. *Tom. 3. lib. 39. 807.* *Corallina reticulata*, s. *Flabellum marinum*, nostratibus dictum, *Raii Hist. Pl. 67.*

*Corallina retiformis*, purpurea, ramosa, nervis tenuissimis.

*Corallina marina*, Piniformis, *Corteniana*, *Raii Hist. app. 1849.* *Corallium foliatum*, *Antipathes* facie, nigrum. àn *Corallina nigra setacea.* C B P. 366?

*Corallina nigra*, Setacea, hirsuta. C B P. *Coralloides fruticosa*, recta, ligno intus lapidoso, nigro, lanugine cremesynø incrustata.

Eadem ligno suo crustâ lanuginosâ albâ obducto.

*Corallina maritima pennata* subhirsuta. *Abies maritima*, *Coralloides*, pennata, subhirsuta, *Breyn. Prodr. 2.*

*Corallina pulcherrima*, *Corteniana*, s. *Arbuscula marina Coralloides*, ramosissima, foliis teretibus, *Abrotani* fœmin. adinstar verrucosis. *Abrotanoides planta Saxea.* J B. *Abrotano* similis *Saxea.* C B P. 365. àn *Corallina tuberosa*, major, lævis, *Mus. Cortenian. D. Raii app. 1850.*

*Corallina.* J B. *T. 3. l. 39. 810.* *Muscus maritimus*, s. *Corallina Officinarum.* C B P. 363.

*Corallina magis erecta*, pennata, eburneo nitore candicans. *Muscus marinus geniculatus*, eburneo nitore candicans erectus, cauliculis pennatis, *Phytogr. Tab. 48. fig. 4.* *Muscus marinus candidus*, *Coralloides*, *Hist. Lugd. 1368.* *Corallina altera*, *Tabern. Icon. 813.* *Muscus Coralloides*, squammulis loricatus. C B P. 364. *Icon. Lobel. Part. 2. 249.*

*Corallina latifolia*, & *opuntia marina*, *Cortusi*, *Phytogr. Tab. 26. fig. 1.* *Lichen marinus*, *Clus. Hist. 2. 250.* *Fucus folio rotundo.* C B P. *Sertolaria*, *Imperati, lib. 27. 651.* *Scutellaria*, s. *Opuntia marina.* J B. *Tom. 3. l. 39. 802.*

*Corallina Scutellaris alba*, *Rosarii* instar perforata. Ex Insulâ *Jamaicensi.*

*Corallina & Opuntia Jamaicensis*, cum orbiculis plurimis, quasi filo pendulis, per siccitatem nigris.

*Corallina fistulosa fragilis*, internodiis prælongis, lævibus, albis, Farciminum modo catenatis, *Phytogr. Tab. 26. fig. 2.* *Corallina fistulosa*, fragilis. J B. *Tom. 3. lib. 39. 811.*

*Corallina fistulosa Jamaicensis*, candida, cum internodiis brevissimis, & quasi filo trajectis, *Nostratibus White Bead Bandstring*, dicta.

*Corallina fistulosa flexilis*, s. *Corallina geniculata mollis*, *Americana*, segmentis latis, & compressis, *Phytogr. Tab. 168. fig. 4.*

Corallina



Corallina aut potius Alga nodosa, Vitriariorum æmula, segmentis tubulosis, *The Manttee Grass, Jamaicensibus* dicta.

Corallinae affinis platyphyllos, telam sericeam texturâ simulans. Alga marina platyceros, porosa. J.B.T. 3. l. 39. Porus Cervinus *Imperati*, lib. 27. cap. 3. C B P. 367. Fucus telam lineam, Sericeamve, texturâ suâ, æmulans, *Raii Synops. Stirp. Britan. Vide Supp. p. 400*

Corallinae affinis candida, multifido capillaceo folio, Palmites. Corallinae affinis, s. Muscus marinus, tenui capillo. J.B. Tom. 3. l. 39. 811. Muscus capillaceus, multifido folio, albidus. C B P. 363. Hujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab. 47. fig. 10.* ad literam a. Setaria fortè pennata flabelliformis, cum ramulis compressis prostratis, D. Lloyd.

Corallinae affinis, s. Muscus Coralloides, multifido, capillaceo folio, Palmites pelagica, nigra, *Phytogr. Tab. 47. fig. 10.*

Corallina muscosa, s. Muscus marinus, tenui capillo, spermophoros, *Phytogr. Tab. 168. fig. 3.* Ad maritimas nostras invenit, D. Petever, & nobis communicavit.

Corallinae affinis, Abies marina dicta. Muscus marinus major, argutè denticulatus, *Raii Hist. Pl. 78.* Muscus Coralloides, alter, albus, *Lobel. Icon. Part. 2.* Abies marina, *Belgica, Clus. Hist. 35.* Abieti similis, maritima. C B P. Muscus Coralloides marinus, denticulatus, major, *Synops. Stirp. Brit. 5.* Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab. 48. fig. 5.*

Corallina Muscosa, alterna vice denticulata, ramulis in creberrima capillamenta, sparsis. Muscus marinus, denticulatus, minor, denticulis alternis, *Raii Hist. Pl. & Synops. Stirp. Brit. 5.* Hujus picturam videsis in *Phytogr. Tab. 48. fig. 3.* àn Myriophyllum Pelagium *Cortusi. Clusio. J.B. Tom. 3. l. 39. 802.* Muscus maritimus, 6. s. Filicis folio. C B P. à Piscatoribus *Italicis, Pennachio delle Nymfe, & Palmi di Nettuno* nuncupatur.

Corallina Muscosa erectior, ramulis innumera, & tenuissima capillamenta, divisis. àn Muscus marinus talis, *Synops. Stirp. Brit. 6?* Setaria (fortè) Cupressiformis minor, crebrius ramulosa, D. Lloyd.

Corallina muscosa, denticulata, procumbens, caule tenuissimo, denticellis ex adverso fitis. Muscus marinus, denticulatus, procumbens, caule tenuissimo, denticulis bijugis, *Raii Hist. & Synops. vid. Phytogr. Tab. 47. fig. 11.*

Corallina muscosa, denticulis bijugis, unum latus spectantibus. Muscus marinus denticulatus talis. *Raii Hist. Pl. 79. Synops. Stirp. Brit. 6.*

Corallina muscosa, pennata, ramulis & capillamentis falcatis. Hujus notitiam planè inficiatus est, *Cl. Raius.* Ideoque delenda quotatio in *Phytogr. nostrâ, Tab. 47. fig. 12.* & lege Muscus pennatus, ramulis, & capillamentis falcatis, *Phytogr.*

Corallina scruposa, pennata, cauliculis crassiusculis, rigidis. Fruticulus marinus, cauliculis crassiusculis, teretibus, rigidis, pennatus, *Raii Hist. Pl. 69.* Fucus radicibus arborum fibrosis, similis, D. Lloyd. *Raii Fascic. 7.*

Corallinae affinis, non ramosa, arenacei coloris, Astacorum corniculi instar, geniculatus. Muscus marinus, s. Coralloides, non ramosus, erectus, arenacei coloris, Astacorum corniculi adinstar, geniculatus, *Phytogr. Tab. 48. fig. 6.* Muscus marinus Equiseti-formis, non ramosus, *Raii Hist. Pl. Et Synops. Britanicar. Plurimi ab eadem radice exeunt scapi, Setâ. equina crassiores, intus concavi, creberrimis*



*berrimis geniculis, & ad singula, brevissimis, setarum velut rudimentis, in ambitu quinis, obsiti.* à D<sup>no</sup> Newtono, *Neptunes Beard* (i. e.) *Barba Neptuni* dicitur.

**CORALLINUM** lignum. *PBP. Phytogr. Tab. 169. fig. 1.* *Glycyrrhyza*, vel *Glycyrrhizæ* affinis, arborescens, *Americana*, floribus ex luteo & rubro variegatis, folio acuminato, siliquâ latissimâ, *Breyn. Prodr. 2. 53.* *Corollen hout Belgarum* vulgò. Cum *Noel-valli, H. M.* nullam similitudinem habet; sicut putavit idem, *Cl. Breyn. Coral de Bois Rochfort.* Fortè *Arbor Brasilia* ab *Americæ* Incolis *Oroboutan* dicta, *Hist. Lugd. 1846.*

**COR Indum**, s. *Halicacabum peregrinum*, multis. *J B. T. 2. l. 15. 173.* *Pisum vesicarium*, fructu nigro, albâ maculâ notato. *C B P. 343.* *Halicacabum Indicum* tricoccon, fructu nigro, minore *Lunula alba* signato.

Idem fructu majore. *Ulinja, Hort. Malab. P. 8. T. 28. fol. 53.*

**Cordis Indi** folio, & facie, frutescens, *Portoricensis. P B P. Phytogr. Tab. 168: fig. 5.* àn *Taliëtri folio, Portoricensis*, *Planta scandens capreolis, Hort. Beaum. 38.* Huic congener (fortè) *Quauhmeatl, Zarzaparilla 2<sup>a</sup> & 3<sup>a</sup> Novæ Hispan. Terent. apud Reccum, lib. 8. 289.*

**Cordis Indi** folio, & facie, frutescens, *Curassavica latifolia. P B P. Phytogr. Tab. 168. fig. 6.* Huic etiâ congener (fortè) *Aquitztli, Nov. Hispaniæ, ejusd. Terent. apud Reccum, 354.* Est de *Siliquosarum* genere, ut audio. àn *Cururuape, Brasiliensibus Pison. lib. 4. 250.* *Leguminosa Brasiliensis* fructu ovato, Costâ foliî appendicibus aucta, *Raii Plant. 347.* *Clematis* (fortè) *pentaphylla*, pediculis alatis, fructu racemoso tricocco, & coccineo, *Fratr. Plumier. Tab. 91.*

**CORIANDRUM** minus, testiculatum. *C B P. 158.* *Coriandrum minus*, odorum. *J B. Tom. 3. lib. 27. 91. Phytogr. Tab. 169. fig. 2.*

*Coriandrum minus*, testiculatum, seminibus verrucarum instâr, asperatis, & veluti *Saccharo* incrustatis, *Phytogr. Tab. 170. fig. 1.* *Coriandrum sylvestre, utriusque Bauh.*

**CORINTI** Panel, *Hort. Malab. Part. 5. fol. 27.* *Frutex Malabaricus* baccifer, floribus hexapetalis, racematim dispositis, fructu rubro, monopolyreno.

**CORIS** cærulea, maritima. *C B P. Coris Monspeffulana* purpurea. *J B. Tom. 3: lib. 30. 434.*

**CORNUS** hortensis, mas. *C B P. 447.* *Cornus fativa*, s. domestica. *J B. Tom. 1. lib. 2. 202.*

*Cornus mas Virginiana*, flosculis in corymbo digestis, à perianthio tetrapetalo, albo, radiatim cinctis.

*Cornus mas Virginiana*, flosculis plurimis albidis, ex involucri tetrapetalo, rubro, irrumpentibus, *D. Banister. Phytogr. Tab. 26. fig. 3.*

*Cornus mas odorata*, folio trifido, margine plano *Sassafras* dicta. *Sassafras arbor Monardi, Phytogr. Tab. 222. fig. 6.* *Anhuiba*, s. *Sassafras Brasiliensium, Pison. 145.* *Sassafras*, s. *Lignum Pavanum. J B. T. 1. lib. 4. 483.* *Arbor ex Florida, Ficulneo folio. C B P. 431.* *Lignum Anisi*, ex *Orbe Atlantico* advectum, *Goropii Hispan. lib. 7. Arbor*



[ *Arbor à quibusdam Sassafras vocata, Fr. Hernand.. quæ perinde nascitur in Provinciâ Floridâ, cujus folia sunt crenata, à nostrâ est diversa, & magis convenire videtur arbori Sassafras folio crenato, quam depingit, & describit Abrahamus. Muntingius in Herbario Belgicè scripto. Quem adeat Lector, si placet*

Cornus foemina. C B P. 447. Cornus foemina putata, Virga Sanguinea. J B. T. 1. lib. 2. 214.

Cornus foemina, Laurifolia, fructu nigro, cæruleo, officulo compresso, *Virginiana*. Cornus *Americana* sylv. *Domestica* similis, baccâ cærulei coloris, elegantissimâ, *Phytogr. Tab. 169. fig. 3.* Cornus foemina Laurifolia *Americana* baccâ cæruleâ nigricante, apicibus elegantè coronatis. Amomum *Novæ Angliæ* quorundam.

Cornus foemina, candidissimis foliis *Americana*.

Cornus foemina *Jamaicensis*, Canellæ foliis candidissima. àn Cornus *Virginiana* trinervia. P B P. 328.

Cornus *Americana*, floribus inter folia sparsis. Amomum *Virginianum* Euonymo *Virginiano* simile, floribus & fructu sparsim erumpentibus. *Phytogr. Tab. 11. fig. 2.* Amomum *Virginian*. Corni foeminæ facie, *Raii Hist. Plantar.*

CORYLUS *Hispanica*, fructu majore anguloso. àn *Avellanæ Indicæ* species *Grevio, D. Raii Hist. Pl. 1837.*

Corylus *Americana*, fructu compresso brevi, cujus rugosa basis maximè dilatatur. *Avellana, Novæ Angliæ, Grevio, Raii, ibid.*

Coryli, s. *Avellanæ* folio, oblongo, & acuminato, Frutex *Convolvulaceus*, caprolatus, *Americanus*. P B P. *Phytogr. Tab. 162. fig. 3.* àn *Tlacamazarcasqui y Papan Nov. Hispan. Terent. apud Reccum, 414.* Fortè etiâ Lupulus sylvestris, *Americana*, claviculis donata, *Phytogr. Tab. 201. fig. 4. Pop-wed. & Pop-Seed. Barbadosibus, dicta.*

COTINUS *Matthiolo. CBP. 415.* Coccigria, s. Cotinus putata. J B. T. 1. lib. 4. 494. Cotino affinis, Arbor *Americana*, Tremate *Brasilensibus, Marcgr. lib. 2. fol. 81.*

CRITHMUM, s. Fœniculum maritimum minus; CBP. 281. Crithmum multis, s. Fœniculum marinum. J B. Tom. 3. l. 27. 174.

Crithmum, s. Fœniculum maritimum, *Americanum*. Yceceltic, vel Yceceltzin, *Novæ Hispaniæ, Terent. apud Reccum, 442.*

Crithmum *Apulum*, spinoso seminis involucro, Pastinacæ tenuifoliæ minoribus foliis. Pastinaca echinophora *Apula Fab. Column. ecphras. 98.* Fortè Pastinaca tenuifolia *Sicula*, hirsuta, crispa, *Boccon. 28.*

Crithmum maritimum, spinosum. C B P. 288. Pastinaca marina, quibusdam Secacul, & Crithmum spinosum. J B. T. 3. l. 27. 176.

Crithmum 4<sup>m</sup> *Matthioli*, umbelliferum. J B. T. 3. l. 27. 195. Ammi perenne, *Morif. Umbel. 22.* Eryngium arvense, foliis Serræ similibus. C B P. 386.

Crithmum maritimum, Eryngii capitulis, foliis ex uno pediculo multis, *Phytogr. Tab. 169. fig. 4.* Crithmus sativa, Asparagus Gallicus, *Tabernemont.* Crithmi species 3<sup>a</sup> *Matthioli Hist. Lugd. 1379.* ex Oris *Mediterraneis*, à D<sup>no</sup> *Fishwicke*, ad nos transmissa est. *Vide Supp. pa. 400.*



- CROTALARIA** arbor *Africa*, *Styracis folio molli incano, flore cæruleo*, *A-mann. Charac. Plantar. 241. Genistella arborescens, Styracis folio major, flore cæruleo, Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. 50. Arbor filiquosa Africana, Genistæ semine, Bartholini, Act. Hafn. Anno 1673. Obs. 131. Horti Comptoniani insigne constat Ornamentum. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 185. fig. 2.*
- Crotalaria Asiatica*, folio singulari, verrucoso, floribus cæruleis, *Hort. Leyd. 199. Genistella major, Indica, Alni folio, flore cæruleo, spicato, Breyn. Prodr. 2. 50. Pee-Tandale-Cotti, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 29. Lacheriza Benghalensium vulgò. Fortè huc etiàm spectat Myrto-Genista, Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent. 1. 68.*
- Crotalaria Benghalensis*, foliis *Genistæ subhirsutis. P B P. Phytogr. Tab. 169. fig. 5. Katou-Tandale-Cotti, s. Tandale Cotti sylvestris, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 26. Huc fortè spectat Huapahvizpatli altera, Nov. Hispaniæ, Terent. apud Recum, 379. Genistella Inaica major, Salicis folio, lanuginoso, flore luteo, amplo, Breyn. Prodr. 2. 50.*
- Crotalaria Asiatica*, folio singulari, cordiformi, floribus luteis, *Hort. Leyd. 200. Genistella Indica major, Salicis folio glabro, obtuso, cordiformi, flore luteo, minore; Breyn. Prodr. 2. Tandale-Cotti, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 25. Genista Malabarica, folio singulari, floribus luteis, filiquis bullatis, Commelin. in locum.*
- Crotalaria hirsuta minor, Americana, caule ad summum sagittato, Hort. Leyd. 202. Phytogr. Tab. 169. fig. 6. Sagittaria Cordialis, Marcgr. lib. 1. 55. Genistella minor, hirsuta, Sagittalis, Americana, Breyn. Prodr. 2.*
- Crotalaria Sagittalis glabra, longioribus foliis, Americana, Phytogr. Tab. 277. fig. 2. nondum Edit.*
- Crotalaria Asiatica*, frutescens, trifolia, floribus luteis, amplis, *Hort. Leyd. 196. Crotalaria frutescens, Anagyridis facie, filiquis è longioribus pediculis, floribus amplis. Laburnum Zeylanicum, floribus ex luteo & rubro, variegatis, filiquis bullatis, Breyn. Prodr. 1. 40. Ononis (Natrix dicta) frutescens, Zeylanica, Laburni fol. flore luteo, spicato, amplo, ejusd. Breyn. Prodr. 2. 78. Cytisus Zeylanicus, folio Laburni Amanno, Raii Hist. app. 1893.*
- Crotalaria Asiatica*, trifolia subhirsuta, *H. Leyd. app. 663. Anonis (Natrix dicta) frutescens, annua, Americana, flore luteo, spicato, foliis Meliloti Italica, subhirsuta, major, Breyn. Prodr. 2. 78. Anil Guadelupensium Francorum vulgò. Nellia Tandale-Cotti, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 27.*
- Crotalaria pentaphylloides, Maderaspatana, floribus luteis. Wellia-Tandale-Cotti, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 27.*
- Crotalaria frutescens, Americana, triphylla, foliis firmioribus, glabris, flore purpureo, Phytogr. Tab. 169. fig. 7. an Crotalaria Americana, trifoliata, rotunda, glabra. P B P. 329. Nostræ enim ima folia, sunt exactè rotunda.*

**CRUCIATÆ** marinæ similis, *Planta Indiæ Orientalis, Phytogr. Tab. 277 fig. 3. nondum Edit.*

**CUBEBIFERA** putata, *Arbor Bisnagarica, Phytogr. Tab. 140. fig. 1. Cube-bæ.*



bæ. JB. Cubebæ vulgares, nec *Arabum* Cubebæ, nec *Galenî* Carpesium, *Matthiolo*. CBP.

Cubebis affinis, (Fagara dicta) *Bengalensis*. Cubebis affinis, Fagara major, & minor. CBP. 412. *Vide Fagaras.*

CUCUMIS flexuosus. CBP. 310. Cucumer longissimus. JB. T. 2. l. 16. 247.

Cucumis anguinus, flexuosus, *Park. Th.*

Cucumis *Malabariensis*, fructu longo, gracili. Mullem-belleri, *Hort. Malabar. Part. 8. Tab. 6.*

Cucumis *Malabaricus*, amarus, fructu sine costulis àn Cattu-Picinna, *Hort. Malab. Part. 8. Tab. 8?*

Cucumis peregrinus, major, sativus, Anguriæ foliis, *Hort. Comptoniano*, è semine natus.

Cucumis sylvestris, Anguriæ folio, D. *Fagon. Schol. Botan. 132. inter delineationes nostr. nondum Edit. Phytogr. Tab. 324. fig. 6*

Cucumis sylvestris, *Americanus*, Anguriæ folio, fructu Ovi figurâ, & magnitudine, ad maturitatem pallido, spinosis tuberculis, Momordicæ instar muricato, *Phytogr. Tab. 170. fig. 3.* Guarerva Oba, s. Cucumer Asininus, *Pisonis, 264. in Horto Comptoniano, ex seminibus natum invenimus.*

Cucumis *Maderaspatensis*, fructu minimo, D. *du Bois, Phytogr. Tab. 170. fig. 2.*

Cucumis parva, repens, *Virginiana*, fructu minimo, *Banister. Phytogr. Tab. 85. fig. 5.*

Cucumis fructu minimo, viridi, ad maturitatem producto, nigricante, *eiusd. D. Banister.*

Cucumis sylvestris, *Virginiana*, fructu minimo, spinoso, unicum granum continente.

Cucumis Bryonoides *Bisnagarica*; fructu parvo, florum calyce muricato, *Phytogr. Tab. 26. fig. 4.* àn Mucca-Piri, *Hort. Malab. Part. 8. Tab. 13.*

Cucumis *Indicus*, striatus, operculo donatus, corticoso putamine tectus, *Phytogr. Tab. 172. fig. 1.* àn Picinna, *Hort. Malab. Part. 8. Tab. 7.* Cucumis sylvestris, *Malabaricus* fructu striato, amaro, *Commel. in Not. ex seminibus in Hort. Comptoniano succrevit.*

Cucumis puniceus, *Cordi Moris. Hist. 2. 33.* Balsamina rotundifolia repens, s. mas. CBP. 306. Balsamina Cucumeraria. JB. T. 2. l. 16. 251. Momordica vulgò. Tindelica, *HM. Part. 8.*

Cucumis puniceus, *Indicus*, minor. PBP. 329. Cucumis *Zeylanicus*, minor, seminibus nigris, *H. Leyd. app. 664. Pavel, H. Malab. Part. 8. T. 10.* Cucumis *Malabaricus*, fructu ex flavo-rubente, minor, *Commel. in Not.*

Cucumis puniceus, *Indicus*, major. PBP. Cucumis puniceus, *Zeylanicus*, major, seminibus albis, *Hort. Leyd. 204 & app. 663.* Maragosa *Lusitanis, Benghalensibus Poncleii.* Pandi-Pavel, *Hort. Malab. Part. 8. T. 9.* Cucumis puniceus, *Indicus*, fructu majore, ex flavo-rubente, *Commel. in Not.* Balsamina Cucumerina, punicea, *Ceylanica*, major, *H. Amst. 47.* Momordica *Ceylanica*, fructu Pyriformi, majore, ex flavo-rubente, seminibus albis, *H. Beaumont. 30.*

CUCURBITIFERA arbor, *Americana*, folio longo, mucronato, fructu orbiculari



biculiari granis cordiformibus, pulpâ nigrâ involutis, *Phytogr. Tab. 171. fig. 1.* Arbor Cucurbitifera, folio longo, mucronato. s. Laurino, *Raii Hist. Pl. Laurifolia Guinensis. C B P. 461.* Arbor folio Lauri, fructu Cucurbitæ, ex *Guineâ. J B. Tom. 1.* Arbor peregrina, ex *Guineâ, Clus. Exot.* Item Macoquer *Virginienſium, ejusd. Clusii.* Fructus orbicularis, granis Cordis effigie. *C B P. 434.* Huc etiâ spectat Pomo similis *Brasiliana ejusd. C B P. 433.* Junipappeeywa *Brasilianorum Clus. Janipa, D. Rochfort. des Antilles, & Genipat Theveti, Hist. Lugdunens.*

*centia* *te* *lar. d.* Cucurbitifera arbor, subrotundis foliis confertis, fructu Ovali, seminibus cordatis, massulâ nigrâ inclusis, *Americana, Phytogr. Tab. 171. fig. 2.* Arbor Cucurbitifera *Americana*, folio subrotundo, *Raii Hist. Pl. Laurifolia Americana* pomis Capitis magnitudinis. *C B P. 461.* Item arbor *Indica*, fructu Cucurbitæ formâ & sapore *ejusd. C B P. 434.* Ficui *Nigritarum* similis, fructu magno, Meloni pari. *C B P. 457.* Cujete *Marcgravii & Pisonis*, vulgò, corruptè Cochine, *lib. 4. Choyne, Americana. J B. Tom. 1.* Cujus Historiam non malè Guanabano quadrare *Clusio* videtur, *Exot. lib. 1. cap. 9.* Higüero *Oviedi ejusd. J B. Cohyner Nierembergii, 310.* Cohyne *Americana, Chz God Cree, (i. e.) Arbor Dei, Park. Theatr. 1666.* Cujus fructum Maraka, & Tamaraka, *Canibales* appellant. Ut *Clusius in Not. ad Garc Arom. Hist. l. 2. c. 11.* ad quam itidem quamproximè accedit (ut ego eandem suspicer) Arbor Cucurbitifera *Tabacensium de Laet. Ind. Occid. lib. 17. c. 28.*

Cucurbitifera *Malabariensis*, Oenopliæ subrotundis foliis, fructu orbiculari, rubro, cuius grana sunt Nuces Vomice *Officinarum.* Malus *Malabarica* folio, & fructu americante, semine plano compresso, *D. Syen. in Not. ad H M. Caniram Hort. Malabar. Part. 1. fig. 37.* Solanum arboreum, *Indicum*, maximum, foliis Oenopliæ, s. Napecæ majoribus, fructu rotundo, duro, rubro, semine orbiculari compresso, maximis, Nuces Vomicas, & lignum colubrinum *Officinarum* ferens, *Breyn. Prodr. 2. 92.* Nux Vomica vulgò *Officinar.* compressa hirsuta. *J B. T. 1. l. 3. 339.* Nux Vomica in *Officinis. C B P. 511.* Colubriini ligni 3<sup>m</sup> genus, in *Malabar.* vastæ arboris magnitudine, *Acosta. C B P.*

Cucurbitifera *Malabariensis*, Loti arboris folio, mucronato, spadiceo-nigrescente, fructu orbiculari, granis Nucis Vomice similibus, ex quâ Lignum Colubrinum *Officinarum.* Modira Caniram, *H. Malab. Part. 8. Tab. 24.* Solanum arboreſcens, *Indicum*, foliis Napecæ majoribus, magis mucronatis, fructu rotundo, duro, spadiceo-nigrescente, semine orbiculari, compresso, maximis, *Breyn. Prodr. 2.* Orbiculatus fructus peregrinus, primus, *Clus. exot. lib. 2. cap. 9.* Fructus orbicularis peregrinus, cum granis Nucis Vomice similibus. *J B. Tom. 1. l. 3. 341.* Fructus orbicularis, major, fuscus, striatus. *C B P.*

Cucurbitifera arbor frondosa; Caniram fortè genus alterum, è *Maderaspatan. Phytogr. nondum Edit. Tab. 324. fig. 5.*

Cucurbitifera arbor spinosa, fructu Mali aurei facie, aromatica, *Phytogr. Tab. 170. fig. 4.* *Barbadensibus* à quâdam similitudine fructus istius, *Ind. Orient.* succissimi, Mangostins dicti, Mango's fortè, & Alspice (i. e.) Panaroma quasi omnia Aromata resipiens, nuncupatur. à Chivef *Theveti. J B. Tom. 1. l. 3. 255.* Fortè etiâ *Auanti* forma.



mâ, coloris cineracei fructus, strepitum edens, *ejusd.* J B. Ex *Clusio exot.* l. 2. c. 20. Itèm Arbor fructum Melonis facie preferens. J B. àn Vengu *Sinensium*. *Martin. Atl. Sinens.* Lusitanis Jamboa, vid. *Jonston. Dendrolog.* fol. 27. *Le Calabassier Histoir. natur. des Antilles.* D. Rochfort. p. 83. The Calabash Tree vulgò.

Cucurbitifera trifolia, spinosa, *Indica*, fructus pulpâ, Cydonii æmulâ, *Phytogr. Tab.* 170. fig. 5. *Raii Hist. Pl. Tom.* 2. 1665. Covalam, *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 37. *Cydonia exotica.* C B P. 435. Malum Cydonium *Indicum*, *Bontii, lib.* 6. 98. Beli, s. Serifole *Benghalensium* *Cydonia* eorundem *Garcia.* J B. àn Mala Coto-nea, s. Marmelacta ex quo fructus, quem Capotes, s. Chico-Capotes nominant, *Part.* 9. *Ind. Occid. lib.* 4. cap. 25. *Cydonia* è *Benghalâ Acoſta.* *Cydonia Malus Indica*, spinosa, trifolia, putamine osseo, durissimo, pulpâ Mespili. *P B P.* 330. Cucurbitifera arbor *Americana*, Calabura dicta, vid. *Calabura rubra.*

CUMBULU, *H. Malab. Part.* 1. Fig. 41. Nux *Malabarica* unctuosâ, flore cucullato, D. Syen. in *Not.* àn Ezquahnitl 2a. *Hernandez. fol.* 59.

CUMINUM semine longiore. C B P. 146. Cyminum fativum. J B. T. 3. lib. 27. 211.

CUPI *Malab. accedens*, Arbor Laurinis foliis, *Maderaspatan. Phytogr. Tab.* 171. fig. 3.

CUPRESSUS fusa, s. mas. Cupressus ramis expansis mas, *H. Leyd.* 107. Cupressus. C B P. 488. J B. T. 1. l. 9. 282.

Cupressus fastigiata foemina. Cupressus ramis in metæ fastigium convolutis, foemina, *H. Leyd. ibid.* Cupressus foem. *Dodon.*

Cupressus nana, *Canariensis*, fructu minore. àn Cupresso similis Arbor in *Syriâ.* C B P. 488? Arbor cujus fructus Abhel, *Guilandino. Clus. Hispan.* Habhel fructus, *Clus. Hist.* Tac arbor Cupresso similis, ex quâ Gummi Taxa *Rawolf.*

Cupressus *Virginiana*, foliis *Acaciæ cornigeræ* paribus, & deciduis, *Phytogr. Tab.* 85. fig. 6. Cupressus *Virginiana*, foliis *Abietis* mollibus, atque deciduis, *Breyn. Prodr.* 2. 40. & rectius, *Abies Virginiana*, foliis mollibus *Mimosæ*, atque deciduis, *ejusd. ibidem.* Cupressus *Virginiana*, foliis *Acaciæ* deciduis, *H. Leyd.* 107. Cupressus *Virginiana* *Tradescanti.* *Catalog. Tlatzcan,* s. Cupressus *Americana*, fusa *Hernandez.* 98. Cupressus *Americana*, àn *Thuia Theophrasti*; Cupresso similis, cujus fructus Habhel, huic assimilatur, *Park. Theatr.* 1477. Hanc autem *Raius noster Terentium* in errore sequutus, eandem cum Arbore Vitæ (i. e.) *Thuiâ Theophrasti* putatâ facit; ut videsis in *Hist. Pl.* fol. 1933. Hanc arborem esse *Abiegnam*, de quâ *Clasius* in *Notis ad Monardem*, cap. 12. Cujus usus est in omnibus, ad quæ Balsamum convenit; nobis consentaneum videtur.

CUPCUMA radice longâ, *H. Leyd.* 208. Cyperi genus ex *Indiâ.* C B P. 37. Curcuma, s. Terra merita, *Officin.* radice croceâ J B. T. 2. l. 19. 746. Crocus *Indicus*, *Arabibus*, Curcum, *Officinis nostri*, radix Cureuma dicta, *Jac. Bont. Hist. Nat.* lib. 6. c. 30. Kana *Z'vanensibus*, (i. e.) Crocus *Indicus* vulgò.

CURIGI-TALI, *Hort. Malab. P.* 7. T. 26. cujus fructus *Epiglottidi* similis.



**CURINI** forte, prima species, s. Carim Curini, *Hort. Malab. Part. 2. fig. 20.* à *Maderaspatan. Phytogr. Tab. 171. fig. 4.* Magnam convenientiam habet cum Manja Kurini ejusd. *H. Malab. P. 9. T. 62.*

Curini species *Maderaspatana*, capsulis in Vesicam; Dictamni Cretici foliis, villosa, utramque nos à D. du Bois impetravimus. Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab. 171. fig. 5.*

**CUSCUTA** ramis arborum innascens, *Caroliniana*, filamentis lanugine tectis, *Mus. Cortenian. Phytogr. Tab. 26. fig. 5.* Nostratibus *Jamaica* Insulam habitantibus, *The Old Man's Beard* nuncupatur. Fortè *Camanbaya Brasiliensibus, Marcgrav. 46.*

*Cuscuta lendiginosa*, tenuissimis cirrhis, è *Terrâ Marianâ, Phytogr. Tab. 26. fig. 6.* *Cuscuta Americana*, super arbores se diffundens, *Raii Hist. Pl. app. 1904.*

*Cuscuta baccifera, Barbadensium*, à Maritimis, *Phytogr. Tab. 172. fig. 2.* Fortè *Acatsja-valli, Hort. Malab. Part. 7.*

**CYANUS** montanus major, flore purpureo, D. Sherard.

*Cyanus montanus*, angustiore folio, & longiore, *Belgicus. HRP. 161.* *Cyanus montanus angustifolius, H. Leyd. 212.* àn *Cyanus Hispanicus, Raii Hist. Pl. 323.*

*Cyanus Orientalis*, flore luteo, fistuloso, *Dodart. Memoir. 75. Vide Supp. p. 400*

**CYNOGLOSSUM** Sylvaticum, rubente caule. *CBP. 257.* *Cynoglossa montana*, maxima, frigidarum Regionum, *Column.*

*Cynoglossum folio molli, incano, flore cæruleo, striis rubris variegato, Moris. Præ-lud. 258.* Hoc nimis inadvertenter, pro *Buglossi specie*, à Cl. Hermanno proponitur, in *Cat. H. Leyd. 216.*

*Cynoglossum Creticum latifolium foetidum. CBP. 257.* *Cynoglossum Creticum secundum Clusii, J. B. T. 3. l. 33. 601.*

*Cynoglossum Creticum*, argenteo angusto folio. *CBP. 257.* *Cynoglossum Creticum primum Clusii, J. B. Tom. 3. l. 33. 600.*

*Cynoglossum procombens, glaucophyllon, maritimum, nostras, floribus purpureo-cæruleis, femine lævi, Phytogr. Tab. 172. fig. 3.* *Echium marinum, Phytolog. Britan. Raii Hist. Pl.* *Buglossum dulce, ex Insulis Lancastriæ, Park. Theatr.* *Buglossum* (fortè) *marinum, flore cæruleo, pulcherrimo, Griseii Viridar. Lusit.* àn *Cynoglossum Africanum, Myrtifolium, Breyn. Fascic.* Fortè etiàm *Cynoglossum marinum, H. Patav. à Turre.*

*Cynoglossum cæruleum, Buglossi foliis asperis, Virginianum, D. Banister.*

*Cynoglossum Virginianum, flore minimo, albo, Banisteri.* *Cynoglossum Virginianum fructu, & flore minimo, D. Sherard.*

*Cynoglossæ affinis, Linifolia, femine umbilicato; H. Leyd. 216.* *Buglossæ affinis, femine Cotylode, s. umbilicato, Raii Hist. Pl. 496.* *Linum umbilicatum, Park. Theatr. append. 1687.*

**CYNOPHALLOPHOROS**, s. Penis caninus *Caribearum*, Arbor foliis subrotundis, rugosis, clavos pulpiferos, phalloses, pro filiquis gerens, *Phytogr. Tab. 172. fig. 4.* *Dog-Duck Barbadensibus, dicta.* *Cynophal-*



*Cynophallophoros mucronatis foliis, folliculis clavatis, ex uno pediculo binis, Phytogr. Tab. 172. fig. 5.*

**CYNOXYLUM** *Americanum*, folio crassiusculo, molli, & tenaci, *Phytogr. Tab. 172. fig. 6.* Fortè Mangaibæ genus *Americanum*; àn Kada-Kandel, *H. Malab. Part. 6?* *Cynoxylum nigrum, Americanum*, nostratibus *Black Dog-wood*, vocatum.

**CYPERUS** *gramineus*. *J. B. T. 2. l. 18. 504.* Pseudo-Cyperus miliaceus, *Park. Theatr. Gramen Cyperoides, miliaceum. C B P.*

*Cyperus gramineus*, paniculâ sparsâ, nigricante. Gramen parvum, pulchrum, paniculâ compressâ, nigricante. *J. B. T. 2. l. 18. 471.* Gramen *Cyperoides minus*, paniculâ sparsâ, nigricante. *C B P.*

*Cyperus gramineus*, paniculâ sparsâ, subflavescente. Gramen pulchrum parvum, paniculâ latâ, compressâ. *J. B. T. 2. l. 18. 471.* Gramen *Cyperoides minus*, paniculâ sparsâ, subflavescente. *C B P.*

*Cyperus gramineus Americanus*, spicis singularibus, plurimis, ad summitatem sessilibus. Gramen *Cyperoides Americanum*, spicis speciosis, plurimis, compressis, summo caule, absque pediculis adnatis, *Phytogr. Tab. 91. fig. 3.* àn Gramen ma itimum, *Cyperoides, Curassavicum*, paniculâ punicante. *P B P.* Gramen *Cyperoides minus*, paniculâ sparsâ, spadiceâ; Fortè Jecape *Brasilien. Pison. lib. 4. 237.*

*Cyperus elegans*, paniculâ sparsâ, *Barbadensis*. Fortè Apoyomatli, s. Phatzisiranda *Mexicensibus*; & *Cyperus Americanus, Hernandez. l. 2. c. 8.* Galangæ titulo accepta. Fortè Radix *S. Helena. Galangæ species. J. B.* *Cyperus rotundus inodorus*, ex *Floridâ. C B P.* àn Drakenæ radix, *Clusii exot. lib. 4. cap. 10.*

*Cyperus paniculâ crassiore, minus sparsâ. J. B. T. 2. l. 18. 501.* àn *Cyperus rotundus, inodorus, Germanicus. C B P.* quærit *Cl. Raius, Hist. Pl. 1299.* *Cyperus rotundus, littoreus, inodorus, Anglicus alter. Parkin. ex Sententiâ, Raii ibid.*

*Cyperus rotundus, littoreus, inodorus, J. B. T. 2. l. 18. 503.* *Cyperus rotundus, inodorus, Anglicus. C B P. 14.* *Park. Th. in Thamesis littoreis, non procùl à Londino invenit D. Doody, & nobis Gramini Cyperoidi palustri, paniculâ sparsâ Parkinsono, idem esse videtur.*

*Cyperus rotundus, Orientalis, major. C B P.* *Cyperus Syriaca, & Cretica, rotundior. J. B. T. 2. l. 18. 502.*

*Cyperus rotundus minimus, Hispanicus. C B P.* *Cyperus rotundus, odoratus, alter humilis, Hispanicus, Park. Th.* *Cyperus rotundus, pumilus, elegantissimus, pede humilior; quem in sportulis Gulielmi Boelii vidit Clusius. Cur. pesterior.*

*Cyperus rotundus esculentus, angustifolius. C B P. Trasi. J. B.* *Cyperus dulcis, rotundus, esculentus, Trasi dulce vocatus, Park. Theatr. Malinathalla (quasi valdè regerminans) Theophrasti Ægyptiorum; & Anthaliûm Plinii Dalechamp. in Plin. Cæs. alpin. Column. Phytob. pag. 6.*

*Cyperus longus inodorus, vulgaris, Park. Th.* *Cyperus longus inodorus, sylvestris. L. l. 18. 503.* *Cyperus longus, inodorus, Germanicus. C B P. 14.* Gramen *Cyperoides altissimum, foliis, & carina ferratis, P. Bocconi, ex sententiâ Raii, & nostrâ.*



*Cyperus longus*, inodorus, *Americanus*, àn Tequa-Niytzoncal *Novæ Hispaniæ*; *Terentii* apud *Recc.* 411.

*Cyperus odoratus*, radice longâ; s. *Cyperus Officinar.* C B P. *Cyperus paniculâ* sparsâ, speciosâ. *J. B. T.* 2. *Cyperus longus*, odoratus, *Park. Theatr.* in Insulâ *Purbeck Angliæ* nostræ, D. *Jacobus Newton.* Plantarum Indigenarum diligentissimus Indagator, nuperrimè offendit.

**CYTISUS** hirsutus. *J. B. T.* 1. l. 11. 372. *Cytisus* foliis subruffâ lanugine hirsutis. C B P. 390. *Cytisus Hispanicus*, arboreus, *Park. Theatr.*

*Cytisus arboreus*, *Canariensis*, oblongo folio, argenteâ & holosericeâ lanugine subtus villosus, flore pallidiori, *Phytogr. Tab.* 277. fig. 4. nond. edit. àn *Cytisus albus*, sylvestris, *Cordi. Histor.* *Cytisus albicans*, folio trifolii vulgaris. C B P. *Cytisus Alpinus*, *Dalechamp. Hist. Lugd.* 260. Texo *Insulanis* nuncupatur.

*Cytisus incanus*, folio oblongo *Austriacus*. C B P. *Cytisus Clusii*. *Pannonicus* alter foliis omninò incanis. *J. B. T.* 1. l. 11. 369.

*Cytisus hirsutus major*, foliis pinnatis. C B P. *Cytisus incanus major*, foliis pinnatis, s. quinti species altera, *Clusii*, *Park. Theatr.* *Cytisi* secundæ, species altera *Pannonica*, *Clusio*: hirsuta valdè. *J. B. T.* 1. l. 11. 369.

*Cytisus incanus*, folio medio longiore. C B P. 389. *Cytisus* 3<sup>m</sup>. *Hispanicus*, cum brevi pediculo. *J. B. T.* 1. l. 11. 372. *Cytisus Hispanicus*, incanus, s. 6<sup>m</sup>. *Clusii* *Parkinsono*.

*Cytisus supinus*, foliis incanâ lanugine, infernè pubescentibus <sup>et</sup> C B P. *Cytisus Austriacus*, s. 7<sup>m</sup>. *Clusii*, *Hist.* 1. 96. *Cytisus* 3<sup>a</sup>. *Clusii* *Pannonica*, sparsis ramis. *J. B. T.* 1. l. 11. 373.

*Cytisus supinus*, foliis infernè, & filiquis molli hirsutie pubescentibus. C B P. *Cytisus Pannonicus*, s. *Septimi*, species altera, *Clusii* *Park.* *Cytisi* 3<sup>i</sup>. *Pannonici* 2<sup>a</sup> species, *Clusio*, supinis ramis. *J. B. Tom.* 1.

*Cytisus major Americanus*, flore luteo, spicato, foliis suprâ virentibus, glabris, subtus lanugine argentatis, *Phytogr. Tab.* 26. fig. 7.

*Cytisus Æthiopicus*, subrotundis, incanis minoribus foliis, floribus parvis, luteis, *Phytogr. Tab.* 278. nondum edit.

*Cytisus angustis*, parvis, acutioribus, & incanis foliis, *Æthiopica*, floribus leonatâ, s. fulvâ lanugine hirsutis, *Phytogr. Tab.* ibid.

*Cytisus* foliis viridibus, angustis quasi complicatis, *Monspeliens.* C B P. 391. *Phytogr. Tab.* 86. fig. 1.

*Cytisus* foliis incanis, angustis, quasi complicatis, ex *Hispaniâ*. C B P. ibid. *Cytisus Hispanicus*, *Clusii*, secundus. *J. B. T.* 1. l. 11. 370. Adnotat enim *Caspar. Bauhinus*, Hunc circa *Monspelim*, foliis esse viridibus, qualem & D. *Magnol*, se Copiosum observasse ait, in *Gramuntio* luco Maio mense florentem.

*Cytisus Canariensis*, microphyllus, angustifolius, prorsus incanis, *Phytogr. Tab.* 277. nondum edit. àn *Cytisus* minoribus foliis, ramulis tenellis, villosis. C B P. *Cytisus Hispanicus* primus *Clusii*, folio virescente. *J. B. T.* 1. l. 11. 369. Esta *Insulanis* nuncupatur.

*Cytisus Canariensis*, microphyllus, cauliculis villosis, angustis viridibus foliis, *Phytogr. Tab.* 277. nondum edit. Fortè *Cytisus Montis Calcaris.* *J. B. T.* 1. l. 11. 370. *Myrsalva Insulanis*, dicta.

*Cytisus*



- Cytisus glaber, nigricans.* CBP. *Cytisus Gesneri*, cui flores ferè spicati. *J B.*  
*Pseudo-Cytisus niger, Park.*  
*Cytisus glaber, viridis.* CBP. *Cytisus glaber*, filiquâ angustâ. *J B T. 1. l. 11. 373.*  
*Cytisus glaber*, filiquâ latâ *J B. ibid.* *Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis.* CBP. 390. *Pseudo-Cytisus foliis subrotundis, Park. Theatr.*  
*Cytisus glaber*, filiquâ latâ, floribus glomerosis; luteis.  
*Cytisus procumbens, Americanus*, flore luteo ramosissimus, qui Anil suppeditat, apud *Barbadensium* Colonos. *Phytogr. Tab. 86. fig. 2.* *Chamæ-Indigo sylvestris trifoliata Barbadosibus.* àn *Cytisus humilis procumbens.* PBP. 330. *Trifolium dendroides, foliis subcæruleis, s. Rutaceis: Pseudo-Anil, Virginienf. D. Banister. Cat. Pl. Virgin. ad Reverendis. Episcop. Lond. post obitum transmiss.*  
*Cytiso-Spartium aculeatum, Acacia trifolia dictum. Cytisus spinosus. H. Lexd. 218*  
*Acacia trifolia. CBP. 392. Aspalathus 2<sup>a</sup>. trifolia, quæ Acacia 2<sup>a</sup>. Matthiolo. trifolia, J B. T. 1. l. 11. 375. Acacia secunda. Pr. Alpin exot. pag. 11.*  
*Cytiso quodammodò affinis, Arbor quadrifolia, spinosa, Americana, flore luteo, odorato, filiquâ planâ membranceâ admodum compressâ per medium planitie- rum, secundum longitudinem (Serræ leguminosæ in modum) sese aperiente, Breyn. Prodr. 2. 40. Phaseolo Divi Thomæ quodammodò accedens, Frutex spi- nosus. HRH. Phytogr. Tab. 211. fig. 7. Erythroxylum Curassavicum, pisces fultuarios redolens. Stock-Fish Hout, vulgò. PBP. inter Addenda.*

D.



- AUCUS** 3<sup>m</sup>. *Dioscoridis, Column. Æcphr.* *Apium peregrinum, foliis sub- rotundis. CBP. 153. Visiŋga minor quorundam, Selinum peregrinum Clusio, semine hirsuto. J B. T. 3. l. 27. 94.*  
*Daucus Siculus* *Pastinacæ folio Zanon. 78. Schol. Botan. 163*  
*Daucus Siculus, Pastinacæ sativæ foliis. Panacis Herculei alterum genus, ex Sici- liâ. Cæsalph. lib. 7. cap. 53. Panax Siculum, semine hirsuto, foliis Pastinacæ sa- tivæ. J B. T. 3. l. 27. 158. Bocc. de Pl. Sicul. p. 1.*  
*Daucus Macedonica, quæ Fabio Columnæ 2<sup>a</sup>. Dioscoridis videtur. Apium Macedoni- cum. CBP. 154. Apium semine villoso, s. incano, Macedonicum, Morisf. Umb. 21. Apium, s. Petroselinum Macedonicum. J B. Tom. 3.*  
*Daucus montanus, Pimpinellæ Saxifragæ-hircinæ folio, nostras Dubriensis, Phytogr. Tab. 173. fig. 1. àn Apium petræum, s. montanum, album. J B. Tom. 3. Daucus montanus, Apii folio minor. CBP. & in Prodr. satis infœlicitèr depictus. Itèm Daucus Petroselini, vel Coriandri folio, ejusd. CBP. 150. (i. e.) Bunium Da- lechampii quem multùm convenire ait cum Dauco campestri, Apii folio, (i. e.) Saxifragiâ hircinâ mediâ Fratris. J B. T. 3. l. 27. 111. Fortè etiàm. Pastinaca Oenanthes folio, Boccon. de Pl. Sicul. 75.*  
*Daucus secundus, Siculus, Sophiæ foliis, Zanon. cap. 44. fol. 80.*  
*Daucus Creticus, semine hirsuto. J B. T. 3. l. 27. 57. Daucus Alpinus, multifido, longo-*



longoque folio, s. montanus, umbellâ candidâ. C B P. 150. Myrrhis annua, femine striato, villoso, *Moris. Umbel.* 44. & 67.  
*Daucus Pyrænaicus*, tenuifolius, foliis Citri odore lucidis, Dni. *Fagon. Schol. Bot.* 161. *Phytogr. Tab.* 173. fig. 2.  
*Daucus Melitenfis*, Cumini facie, & odore; feminibus longis hispidis, & villosis. *Cuminum vel Cuminum*, feminibus hirsutis, s. villosis, *Raii Cat. Exterar.* 111.  
*Daucus odoratus*, *Creticus*, Sanguisorbæ capitulis, villosis. *Cuminum sylvestre*, capitulis globosis; C B P. 146. *Cuminum sylvestre primum*, valdè odoratum, globulosum. J B. T. 3. l. 27. 23. Huc fortè spectat *Texcalxihuitl*, *Novæ Hispan. Terent.* apud *Reccum* 412.

DELPHINIUM arvense, *Park. Consolida regalis arvensis.* C B P. 142.  
*Consolida regalis*, flore minore. J B. *Tom.* 3. l. 26. 210.  
*Delphinium Dioscoridis*, *Imperati.* *Consolida regalis latifolia*, parvo flore; C B P. 142. & *Prodr.* 74. ubi Icon adponitur. *Consolida regia*, peregrina, parvo flore, J B. *Flos Capuccio* 2. *Cæsalp.*

DENS Caninus, flore luteo *Virginianus*.

DENS Leonis, angustiori folio. C B P. 126.

Dens Leonis latiore, & rotundiore folio. *Botan. Monspel.* *Hieracium Narbonense*, rotundifolium, caule aphylo. J B.

Dens Leonis minor, foliis radiatis. C B P. 126. & *Prodr.* Cui & *Trinciarella Italicorum*, *Camerar. Hort. Medic.* *Hieracium*, foliis & floribus, *Dentis Leonis bulbosi*, femine curvo, *Moris. Phytogr. Tab.* 37. fig. 2.

Dens Leonis hirsutus, λεπτοκωλῶ, *Hieracium dictus*, *Raii Synops. Stirp. Brit.* 46: *Hieracium*, caule aphylo, hirsutum. J B. *Hieracium asperum*, flore magno, *Dentis Leonis.* C B P. *Hieracium asperum*, foliis & floribus *Dentis Leonis bulbosi*, *Park. Theatr.*

Dens Leonis *Monspessulanus*, s. *Hedypnois Monspessulana.* J B. *Tom.* 2. l. 24. 1036. an *Hieracium magnum*, *Dalechampii*, *Hist. Lugd.* 569? Quod pro Synonymo *Chondrillæ prioris Dioscorid.* à *Casp. Bauhino* ponitur. Ab hac plantâ omnino diversa est, *Dens Leonis Monspeliens.* *Lob.* utcunque J. *Bauhinus* eandem faciat.

Dens Leonis, *Cichorii falcati* foliis, peregrina.

Dens Leonis foliorum lobis, *Sonchi æmulis*, radice fætidâ. *Hieracium foetidum* 3<sup>m</sup>. *Fab. Column. ecphraf. Part.* 2. p. 31.

Dens Leonis minor, *Argemones* folio, hirtum, & incano. *Hieracium parvum hirtum*, caule aphylo, crispum, ubi ficcatur. J B. T. 2. l. 24. 1038.

Dens Leonis, *Asphodeli bulbulis.* C B P. *Dens Leonis Monspeliensium Adv. Lob.* & *Obs.* *Chondrilla altera Dioscoridis* Icon *Lob.* 132. *Cichorium Constantinopolitanum Matthiol.* in *Magn. Fig.* fol. 504.

Dens Leonis maritimus strumosâ radice. *Chondrilla bulbosa*, s. *Chondrilla* 2<sup>a</sup>. *Dioscoridis.* an περδαικίον *Theophrasti* C B P. 130. *Chondrilla altera Dioscoridis* putata *Clus. Hist.* 2. 145. *Cichorium bulbosum.* J B. *Tom.* 2. l. 24. 1038.

DENTARIA Asiatica, *Chelidonii majoris* folio. *Vide Supp. pa.* 400.

Dentaria



*Dentaria baccifera*, *Moschatellina dicta*. *Moschatellina* foliis *Fumariæ* bulbosæ, de quâ *Cordus*. J B. *Ranunculus nemorum Moschatellina dictus*. C B P.

*Dentariæ* affinis polymorphe, *Hydrophyllon Morino dicta*. *Dentariæ* affinis, *Echii* flore, capsulâ *Anagallidis*, *Dodart.* & *Morison*.

**DICTAMNUS** *Creticus*. C B P. 222. *Dictamnus Cretica*, s. vera. J B. T. 3. l. 28. 253.

*Dictamnus Lydius*, imis hirsutis *Origani* foliis, summis subcœruleis, glabris. *Origanum spicatum*, foliis glabris *Montis Sipyli*, *D. Wheeler. Itiner.* *Dictamnus Montis Sipyli*, folio glabro, glauco, *Breyn. Prodr.* 2. 41.

**DIGITALIS** folio aspero, flore albo, maculis latis atropurpureis, intus punctato.

*Digitalis lutea*, flore magno, *Canariensis*. Fortè *Digitalis lutea*, flore majore, folio latiore. J B. Tom. 2. lib. 20. 813. *Digitalis lutea*, magno flore. C B P. 244.

*Digitalis cœrulea*, floribus in fistulam contractis, *Virginiana*. àn *Digitalis Virginiana*, *Lyfimachiæ* facie, foliis subrubentibus, flore violaceo minore, *Morif. Prælud.* 259. *Vide Supp. p. 400.*

**DORONICUM** maximum, foliis caulem amplexantibus. C B P. 185. *Doronicum maxim.* foliis *Hyosciami Peruviani* modo, caulem amplectentibus. J B. T. 3. l. 25. 18.

*Doronicum* foliis subtus lanuginosis, *Morif. Prælud.* 26. *Doronicum Helveticum incanum*. C B P. 185. & in *Prodr.*

*Doronicum Alpinum*, *Pulmonariæ* aureæ angustiori folio, hirsuto, flore singulari, *Phytogr. Tab.* 242. fig. 5. àn *Doronici Stiriaci Clusio*, genus alterum, ex *H. Patavin.* collectum. Fortè, *Doronicum angustis foliis Transtaganum*, *Grisleii Virid. Lust.*

*Doronicum Plantaginis* folio, alterum. C B P. *Alisma Matthioli*, s. *Plantago montana*; J B. T. 3. l. 25. 18. *Doronicum* 5<sup>m</sup>. *Germanicum* & 6<sup>m</sup>. *Panonicum*, *Clus. Hist.* Diuretice *Paul. Renealmi Specim. Hist. Pl.* 118.

*Doronicis* affinis, longifolia, *Raii Phytogr. Tab.* 86. fig. 3. *Tussilago Alpina*, folio longo. J B. T. 3. l. 25. 21. *Tussilago Alpina*, folio oblongo. C B P. 197. in *Phytopinace*, & *Prodr. descript.* Fortè etiâ Virga aurea montana, ferrata, magno flore. C B P. 268. Quam *Plantaginis Alpinae* nomine, in summitate *Montis Calcaris* circa *tuguriola*, collectam habuit Autor. *Doronicum Pyrenaicum*, *Perficæ* foliis, glabrum, *Schol. Bot.* 197. *Ubi pro nondum descript. ponitur.*

*Doronicis* affinis, Alpina, folio rotundo, pronâ parte canescente. *Tussilago Alpina rotundifolia* canescens. C B P. 197. *Tussilago Alpina* 1<sup>a</sup>. flore aperto, *Clus. Hist.*

*Doronicis* affinis Alpina, foliis subrotundo glabro; *Scorpidocorta* vulgò, *D. Wheel.* qui suspicatur, eandem esse cum *Doronicis* specie 2<sup>a</sup>. *Ger.* *Tussilagine Alpina* 2<sup>a</sup>. *Clus. Hist.* lib. 5. 113. *Tussilagine* 2<sup>a</sup>. s. Alpina rotundifoliâ glabrâ. C B P. 197. *Tussilagine Alpina* minore, folio rotundo. J B. T. 3. l. 32. 565. àn *Asarina Matthioli* flore *Anthemidis*, *ejusd.* J B. T. 3. l. 32. 566.



- DRABA Umbellata, vel Draba major, capitulis donata. CB P. 109. Draba multis, flore albo. J B. T. 2. l. 22. 939. Draba filiculosa repens, major, foliis magis incanis, Spanospermos, vulgaris, *Morif. Hist.* 2. 313.
- Draba *Chalepensis* repens, humilior, foliis minus cinereis, quasque viridibus, *Morif. Hist.* 2. 314.
- Draba Alpina minor, capitulo rotundo, *Raii Hist.* 821. Thlaspi petræum Myagryodes *Ponæ*. Thlaspi, foliis Globulariæ affine, s. Alsinifolia, cum Myagri foliis. J B. T. 2. l. 22. 926. Thlaspi Alpinum minus, capitulo rotundo. CB P. 106. & *Prodr.* 48.
- Draba Alpina, major, *Raii Hist.* 822. Thlaspi Alpinum majus, CB P. 106. Thlaspi Alpinum majus, capitulis rotundis, *Park. Theatr.* & CB. *Prodr.* 49. cum *Icone*.
- Draba maxima Glastifolia, *Breyn. Prodr.* 2. 63. Lepidium Glastifolium. CB P. 97. Lepidium non repens. J B. *Tom.* 2. l. 22. 941. Lepidium Glastifolium, perenne. *Morif. Hist.* 2. 312. *aliam plantam, capsulis monospermis, Myagri fortè speciem, sub hujus titulo, describit noster Raius, Hist. Pl.* 840.
- Draba maxima, *Chalepensis*, villosa. Lepidium *Dioscoridis*, *Zanoni. Hist. Botan.* 118. Lepidium maximum *Chalepense*, *Morif. Hist.* 2.

## E.



E B E N U S *Jamaicensis*, Arbuscula Buxi foliis, spinosa, *Phytogr. Tab.* 89. fig. 1. Florem fert pentapetalum, uniformem, & non papilionaceum difformem, ut semel atque iterum nos monuit Dr. Sloan. Ex quo dein apud Indicas Chelſeianas, florentem vidimus, floribus viridi-flavescentibus Bacciferarum more, stipitibus adnatis. an Guira pariba *Brasilienſ.* (i. e.) Ebeni species, *Marcgrav. lib.* 3. cap. 9. 108. Ebenus fortè. J B. T. 1. lib. 3. 394. Ebenus *Theveto* in *Indiæ* Insulâ *Palmobotere* p ætantissima & nigra; & in 9. Part. *Ind. Occid.* lib. 3. cap. 22. in *Hispaniola*.

E C B O L I I *Indici*, s. *Athatodæ* cucullatis floribus æmula, Hyssopifolia, Planta ex *Insulis Fortunatis*, *Phytogr. Tab.* 280. fig. 1. Huic generi plantarum fortè pertinet *Tsjanga-puspam*, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 57.

E C H I N O P H O R A *Maderaspatana* Sideritidis non ferratis, nervosis foliis, fructu capsulari, *Caucalidis* æmulo, *Phytogr. Tab.* 173. fig. 4.

Echinophora latifolia, spicata, major, Nerii floribus *Malabariensis*; Schetti-Codiveli, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 9.

Echinophora latifolia, Nerii floribus, *Malabarica* spicata minor. Tumba-Codiveli, *H. M. P.* 10. *Tab.* 8. ab Oris *Cormandeliens.* aliquando nobis missa.

Echinophoræ *Indicæ* affinis, semine & floribus in capsulis, seu potiùs capitulis lævibus,



bus in caulium cymis prodeuntibus. Ana-Schovadi, *Hort. Malab. Part. 10. Tab. 7.* Pes Elephantis *Malabarorum* vulgò. In *H. Medic. Chelſeiano*, elapſo anno, curâ Sagaciſſimi *Botanici D. Doody*, è ſeminibus ortam obſervavimus.

**ECHIUM** *Creticum*, latifolium, rubrum. *C B P.* 254. àn *Echium Candia* flore pulchre rubente *Joannis Bauhini*, quærit *Cl. Raius*, *Hist. Pl.* 498.

*Echium Creticum* anguſtifolium rubrum. *C B P. ibid.* *Echium Creticum* 2<sup>m</sup>. *Cluſio*. àn *Echium nigrum* flore eleganti, *Proſp. Alpin. exot.* 311?

*Echium* latiſſimo folio, *Lycopſis* dictum, flore dilutè purpureſcente, *H. Leyd.* 225. *C B P.* 255. *Lycopſis Dioſcoridis* quibuſd. *J B. T.* 3. l. 33. 584.

*Echium Lycopſis* facie, *Africanum* perenne, *Hort. Leyd.*

*Echium majus*, & aſperius flore albo. *C B P.* *Echium* flore albo majus. *J B.* Hæc reverà totâ ſpecie diſtincta eſt à vulgari *Echio*, & non floris colore tantum, ut rectè notat *Raius exot.* 42.

*Echium album Maderenſe*, & *Echium Tingitanum* procerius, floribus immaculatis, *Phytogr. Tab.* 278. fig. 5. nond. edit.

*Echium Tingitanum* altiſſimum, flore variegato. Atque *Echium Creticum* floribus variegatis, *D<sup>no</sup>. Morgano*.

*Echium Alpinum* luteum, cui ampliſſima florum ſpica: àn *Echium Alpinum*, luteum. *C B P.*

*Echium Creticum*, Bugloſſoides flore flaveſcente. Fortè *Echium Creticum Pr. Alpin. exot.* 129. àn *Echium pumilum* flore luteo. *C B P.* 254. *Echium flavo* flore; *Cluſ. Cur. poſter.* *Echium Creticum* minus, flore luteo, à *Turre H. Patav.* 44.

*Echium luteum*, minimum. *C B P.* *Echioides* lutea, minima, *Apula* campeſtris, *Column. ecphraſ.* 185. *Echioides* lutea, ſylveſtris minima, *Park. Theatr.*

*Echium*, s. *Lycopſis Monſpeliaca*, floribus albis, & dilutè purpureis, *Botan. Monſpel.* pag. 88.

**ELATINES** folio piloliſſima, papilionaceo flore, *Maderaſpatana*, *Phytogr. Tab.* 86. fig. 4.

**ELEMNIFERA** *Curaffavica* arbor. *C B P.* ex mente, *D. Sherard. Phytogr. Tab.* 173. fig. 5. Fortè *Garab. Maurorum*, *Rawolf. Hiſt. Lugd. append. Garb Arabum Avicen.* *Salix Arabica*, foliis Atriplicis. *C B P.* *H. Reg. Hampton. alumna.* Eſt arbor Pruniſera, ut ſuſpicor. Ex hâc apud *Mauros* *Aphronitrum* optimum fit, ad ignârium pulverem conſciendum; *Rawolfio* monente.

*Garab*  
x Lib. 1  
2<sup>de</sup>  
Supp.

**ELICHRYSON**, s. *Chryſocome Æthiopica*, Plantaginis folio, *Breyn. Cent.* 1. 143.

*Elichryſum Orientale*. *C B P.* 264. *Stæchas citrina*, comis grandioribus, *Camer. Epiſt.* *Stæchas citrina* floris magnitudine, & colore, ſpecioſa. *J B. T.* 3. l. 26. 154. *Chryſocome peregrina*, major, fruteſcens, *Breyn. Cent.* 1. 145. *Gnaphalium Alexandrinum*, s. *Stæchas citrina Orientalis*. *H R P.*

*Elichryſum latifolium*, *Germanicum*, flore aureo, ſquammulis argenteis. *Elichryſon*, s. *Stæchas citrina*, latifolia. *C B P.* 264. *Stæchas citrina*, *Germanica*, latiore folio. *J B. T.* 3. l. 26. 153. *Amaranthus luteus primus*, *Tabern. Icon* 387.

*Elichryſum*



Elichrysum latifolium, *Hispanicum*, Corymborum squammulis, & floribus amplis, Sulphureis. Habuimus etiã ex *Insulis Fortunatis*.

Elichrysum peregrinum, empyrocome; s. Chrysocome vera *Dioscoridis*, *Jacobi Zanon. Istor. Bot.* 69. Chrysocome *Germanica*, flore ignescente, s. ex aureo-rutilante, *Breyn. Cent.* 1. 145.

Elichrysum latifolium, villosum, alato caule, odoratissimum, *Phytogr. Tab.* 173. fig. 6. *Cujas autem est hac elegans Elichrysi species, nobis nondum innotuit, in Hort. Reg. Hampton. præterito anno florentem invenimus.* Fortè Chrysocome, s. Stæchas citrina odoratissima, *Grisleii Virid. Lusit.* an potiùs Chrysocome, s. Stæchas citrina polyclonos, *ejusd. ibidem.*

Elichrysum *Æthiopicum*, s. Stæchas arborea foliis Abrotani, strigosis floribus, umbellam quodammodò mentientibus, fragrantissimum. *Phytogr. nondum edit.*

325 fig. 3) Elichryson, s. Stæchas citrina angustifolia. C B P. Stæchas citrina tenuifolia, *Narbonensis.* J B. *Tom.* 3. Chrysocome, s. Coma aurea, & Stæchas citrina, vulgaris, *Park. Theatr.*

Elichrysum, foliis oblongis, Stæchadi citrinæ similis, *Dod. C B P.* Stæchas citrina, tenuifolia altera, sive *Italica.* J B. *T.* 3. l. 26. 155. *Phyt. Tab.* 328 fig. 1

Elichrysum *Æthiopicum* numerosis, & angustis Stæchadis citrinæ foliis, minus albicantibus, florum squammulis carbunculi in modum scintillantibus, *Phytogr. Tab.* 279. fig. 1. an Stæchas Rorismarini foliis, *Grisleii Viridar. Lusit. Vide Supp. Pa.*

Elichrysum, foliis oblongis, paucis, Stæchadi citrinæ angustioribus. C B P. Stæchas citrina, tenuifolia 3a s. *Neapolitana.* J B. *Tom.* 3.

Elichryso affinis, Herba *Indica*, Polygonoides, foliolis ad genicula binis, flore pentapetaloide, argenteo, apicibus aureis paleaceo, *Phytogr. Tab.* 86. fig. 5.

Elichryso affinis, Herba *Indica*, Polygonoides, ramosior, foliolis caulium nodos radiatim ambientibus, comâ paleaceâ, flore albo, lituris aureis striato, *Phytogr. Tab.* 86. fig. 6. *Sub Polygonorum fortè vexillo, potiori jure, militari debuissent utraque, & nuncupari possint Polygonum sericeum, foliolis ad genicula binis, Orientale, & Polygonum sericeum, ramosius, Indicum, foliolis Gallii instar, caulem cingentibus.*

Elichryso affinis *Africana* arborescens, floribus purpuro-violaceis, *Salviæ* foliis, odore Rorismarini, *H. Leyd. Phytogr. Tab.* 174. fig. 1. *Conyza Africana* arborescens *Salicis capreæ* foliis, odore Rosmarini, *Breyn. Prodr.* 2. Huc fortè spectat *Tremate Brasiliensibus, Marcgrav. lib.* 2. cap. 15. & *Tremae, Pisonis, l.* 4. f. 176.

Elichryso affinis, *Virginiana*, frutescens, foliis *Chenopodii* glaucis, *Phytogr. Tab.* 27. fig. 2. *Senecio frutescens, Virginiana, Atriplicis folio, Raii Hist.* 1799. & append. 1861.

EPHEMERUM *Virginianum* *Joh. Tradescanti Parkinson.* Allium, s. Moly *Virginianum.* C B P. 516. Phalangium *Virginianum*, foliis latioribus, radice repente, flore tripetalo, cæruleo, *Morif. Hist.* 2. 334. *variat flore albo, & purpureo.*

Ephemerum *Virginianum*, ramosum, procumbens, foliis amplis, *Zanon. Hist. Bot.* 90. Ephemerum phalangoides, tripetalon, *Virginianum* majus, ramosum, foliis amplis, acuminatis. De hujus genere videtur *Matlalytztic, s. Triorchis Mexicana Hernandez.* 253. quæ melius nominaretur, Ephemerum phalangoides *Mexicanum, surrectum, radice palmatâ.* Ephemerum



*Ephemerum Benghalense*, serpens, folio subrotundo brevi, phalangoides, *Phytogr. Tab. 27. fig. 3.* à *Ephemerum Africanum* annuum, flore dipetalo, *Hort. Leyd. 231.* Dipetalos *Virginiana*, foliis *Gentianæ* aut *Plantaginis*, *Marcgr. Raii Hist. Pl?* Fortè etià *Gentianella Indica Bontii. 154.*

*Ephemerum phalangoides, Malabariense*, repens, hexapetalon, capsulâ seminali triquetrà, & in longum striatâ. *Veetla-Caitu, H. Malab. P. 7. Tab. 58.*

*Ephemerum phalangoides, Maderaspatense*, minimum, foliis perangustis, perfoliatum; *Phytogr. Tab. 27. fig. 4.* *Acaxaxan, s. Potamogitum Mexican. 1<sup>m</sup>. Hernand. 263.* *Planta palustris, & lenta, quæ statim comprimentibus cedat digitis, hujus esse speciem videtur*; huc etià pertinet *Talu-pullu, H. Malab. P. 9. Tab. 63.* Necnon *Nelam-pullu, ejusd. H. Malab. P. 10. Tab. 19. (i. e.)* *Phalangii affinis Indica*, flore cæruleo, pallido, *Commel. in Locum.*

*Ephemerum phalangoides, Virginianum*, majus, erectum, *Phytogr. Tab. 174. fig. 4.* *Pseudo-Phalangium ramosum, majus erectum, Banist. Cat. Stirp. Virgin.*

*Ephemerum phalangoides erectum, foliis Liliaceis, bulbosum, flore flavescente, Cap. Bon. Spei. ex Codice Comptonian. Phytogr. Tab. 174. fig. 6.* *Ad Sisynrichiorum genera potiori jure ablegari meretur.*

*Ephemerum phalangoides, Maderaspatanum*, minimum, secundùm caulem, quasi ex utriculis, floridum, *Phytogr. Tab. 174 fig. 3.* Huc fortè spectat *Nir-pullu, Hort. Malab. Part. 10. Tab. 13.* & de hujus genere majore (meo quidem arbitrato) videtur *Nir-valli-pullu, ejusd. H. Malab. Part. 10. Tab. 12. (i. e.)* *Potamogeton foliis bullatis Malabaricum Commel. in Not.*

*Ephemerum Zeylanicum* *Alfinæ* mediæ folio, procumbens, *Parad. Batav. Prodr. Vid. Phyt. Tab. 174 f*

*Ephemerum Phalangoides Virginianum*, flosculis arbutis, bullatis aureis, in spicam dispositis, *Phytogr. Tab. 174. fig. 5.* *Phalangium spicatum, flosculo Arbutis, bullato, aureo, D. Banist.*

*Ephemerum Phalangoides spicatum alterum, flosculo argenteo, bullato. Contrayerva Hispanorum, & fortè (ut arbitratur Banisterus) non ineptè putatum.*

**EPIDENDRON**, *Lychnidis flore, Africanum, ex Codice Comptonian. Phytogr. Tab. 174. fig. 7.*

**EPIMEDIUM** *Anguillare (cui & Lunaria quorundam) C B P. 323. Epimedium quorundam. F B. T. 2. l. 17. 391.*

**EQUISETUM** *Junceum, nigrinodum, Capitis Bon. Spei, non ramosum, Phytogr. nondum Edit.*

*Equisetum, s. Hippuris lacustris, foliis mansu arenosis, Gesnero, Phytogr. Tab. 29. fig. 4.* *Hippuris coralloides, Ger. emac. Equiseto foetido sub aquâ repente haud multum abludere videtur.*

*Equisetum, s. Hippuris mucosus, sub aquâ repens, in Hiberniâ, Phytogr. Tab. 193. fig. 6.* Ubi insignis *Botanicus, D. Sherard. invenit, & in Angliam, ad nos transmisit.*

*Equisetum, s. Hippuris exigua, fluviatilis petræa, nuda, Virginienfis, D. Banister. Phytogr. Tab. 193. fig. 7.* à Musco marino Equisetiformi non ramosa, *Raii, haud multum abludit; cujus Icon exhibetur, Phytogr. Part. 1. Tab. 48. fig. 6.*

**ERICA**



- ERICA humilis, Rosmarini foliis, Unedonis flore, capsulâ Cistoide; *Phytogr. Tab. 175. fig. 1.* Ledum palustre nostras Arbuti flore, *Raii Synops. Stirp. Britan.* Rosmarinum sylvestre minus nostras, *Park. Theatr. Viti Idææ affinis, Polifolia montana. J. B. T. 1. l. 5. cap. 10.* Myrtus tenuifolia, *Thalii Harcyn.*
- Erica arborescens floribus luteolis, vel herbaceis minimis. *J. B. T. 1. l. 10. 356.*
- Erica major, Scoparia, foliis deciduis. *C B P. 485.* an Scopa granula minuta, non dehiscencia habens, *Cæsalpin.*
- Erica major, floribus ex herbaceo purpureis. *C B P.* Erica Coris folio, *3a. Clus. Hist. lib. 1. 42.* Erica foliis Corios quaternis, floribus herbaceis, deindè ex albo purpureasc. *J. B. Tom. 1.*
- Erica peregrina *Brancionis Lobelio. J. B. T. 1. l. 10. 359.*
- Ericæformis Juniperinis foliis, Fruticulus *Æthiopica* flosculis in cymis. Fortè Chrysanthemulum Ericoides coronatum, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent. 1. 165.*
- Ericæformis, Coridis folio, *Æthiopica* floribus pentapetalis in apicibus. an Saniculæ Alpinae genus, Ericoides, ex *Prom. Bon. Spei, Phytogr. Tab. 279. fig. 5.*
- Erica Abietiformis *Æthiopica* Unionifera, s. capsulis globosis, *Phytogr. Tab. 279. fig. 3.*
- Erica Africana, foliis perexiguis, glabris, floribus in summis ramulis, velut in Umbellâ confertis, *Phytogr. Tab. 279. fig. 4.* an Eupatorio affinis, Suffrutex Ericoides, capitatus, Coris, seu Juniperi foliis, *Cap. Bon. Spei. Breyn. Fascic. Rariorum.*
- Erica tenuifolia, flosculis suave rubellis, *Promont. Bon. Spei, Phytogr. Tab. 175. fig. 2.* an Micatlach-Pahoaztli, *Nov. Hisp. Terent. apud Recc. 386.* Quæ primò ab amicissimo viro, *D. Patricio Adair*, deindè à *D. Doody*, nobis monstrata est.
- Erica Africana, minutissimis foliolis, floribus copiosissimè sparsis.
- Erica Coris folio floribunda ex *Promontorio Bonæ Spei.*
- Ericæ-formis *Æthiopica*, Cupressi foliis compressiusculis, *Phytogr. Tab. 279. fig. 2.* Hujus foliola ad cauliculum ita disponuntur, ut Catenarum series non imbelles efformant. Fortè Cupresso-pinulus, *Capitis Bon. Spei. Breyn. Cent. 1. fol. 22.*
- Erica supina, maritima, Anglica, *Park. Raii Hist. Pl. 1716.* Cali, s. vermiculari marinae, non dissimilis planta, quam ex siccâ, describit. *J. B. Tom. 3. l. 31. 703.* Ubi dubium movet, an sit Vermiculata exilior, totaque minor altera, minus crebris foliis, teretibus, oblongis, & flosculis Centinodii. Ex vireto generosi viri *Brancionis* oriunda, *Lobel. Observ. 207.* Fortè etiâ Polygonum pusillo vermiculato Serpylli folio, *ejusd. J. B. Tom. 3. Et Lob. Adv. & Icon. 1.*
- Erica baccifera procumbens nigra. *C B P. 486.* Erica baccifera, *Matthioli. J. B. Tom. 1. l. 5. 526.* Erica Coris folio, *xi. Clus. Hist. lib. 1. 45.*
- Erica erecta baccis candidis. *C B P.* Erica baccifera *Lusitanica. J. B. T. 1. l. 5. 528.*
- Frutex *Lusitanis* Camarinnas dictus *Linschot. Ind. Orient. Part. 4. fig. 21. lit. c.*
- Erica Coris folio x. *Clus. Hist. lib. 1. 45.*

ERUCA maxîma *Canadensis Cornuti, de Pl. Canad. pag. 15.*

Eruca *Virginiana* Bellidis majoris folio *Morif. Phytogr. Tab. 86. fig. 8.*

Eruca sylvestris minor, lutea, Bursæ pastoris folio. *C B P. Phytogr. Tab. 86. fig. 7.* Eruca pumila *Sicula* Bursæ pastoris folio, *Boccon. 19.* Eruca *Monensis* laciniata, lutea, *Raii Hist. Pl. 809. & Cat. Pl. Angl. 100.* Itè Synops. *Brit. 112.* Eruca vinealis,



nealis, parvis luteis floribus, *Morif. HR B.* 70. *Prelud. Bot.* 263. *Eruca lutea*, s. *Barbarea minima*; *Eruca Barbarea æmula minor*, *ejusd.*  
*Eruca montana minor laciniata*, flore luteo, filiquâ asperâ. *Sinapi parvum*, filiquâ asperâ. *C B P.* 99. & *in Prodr.* 41. *Eruca* 13<sup>a</sup> s. *Sinapi parvum*, filiquâ asperâ *Fratri Joannis Bauhini*, *C B. Phytopin.* *Sinapi Monspessulanum*, filiquâ asperâ hirsutâ. *J B. T.* 2. l. 21. 858. *Eruca Monspeliensis* filiquâ asperâ, *Raii Hist. Pl.* 808.  
*Eruca Alpina*, radice serpente, *Zanon. Hist. Botan.* 88.  
*Eruca tenuifolia perennis*, flore luteo. *J B. T.* 2. l. 21. 862. *Erysimum* fortè *Germanic.* *Trinciatellæ folio*, *D. Raii Hist. Pl.* 813. à *D. Bobart.* accepimus, sub hoc dubio titulo; àn *Leucoium terrestre*, majus, *Frigidarum Regionum*, *Column.*  
*Eruca Indica Tanaceti folio*, *Zanon.* 86: *Morif. HR B.* *Erysimum fruticosum Indicum Tanaceti folio*, *Raii Hist. Pl.* 813.

**ERYNGIUM** *montanum*, *Amethystinum.* *CBP.* 386. *Eryngium cæruleum.* *J B. T.* 3. l. 25. 86.  
*Eryngium Alpinum*, latis foliis, magno capite, oblongo, cæruleo. *J B. T.* 3. l. 25. 88. *Eryngium Alpinum cæruleum*, capitulo *Dipsaci.* *C B P.*  
*Eryngium latifolium planum.* *C B P.* *Eryngium planum*, latifolium, capitulo rotundo, parvo. *J B. ibid.*  
*Eryngium* ex semine plani degener. *HR P. & HR B.*  
*Eryngium capitulis Psyllij ex Sicilia*, *Paul. Boccon.* 87.  
*Eryngium pumilum.* *J B.* *Eryngium montanum*, pumilum: *C B P.* *Eryngium pumilum Hispanicum Clusio Park.*  
*Eryngium minus Arabicum Centiceps*, cujus capitula sunt admodum parva; *Psyllij instar*, *Hort. Oxon.*  
*Eryngium Americanum foetidum*; *Itubu Surinamensibus*, *H. Leyd.* 236. *Star-weed & Fit-weed*, *Barbadensibus Anglis*, vulgò.  
*Eryngium foetidum*, oblongis capitulis, *Americanum.* *Cohayelli*, s. *Chichica Hoazton*, feu *Herba ferratorum foliorum*, *Hernand.* apud *Recc.* 143.  
*Eryngium Americanum Yuccæ folio*, spinis ad oras molliusculis, *Phytogr. Tab.* 175. fig. 4. *Eryngium campestre*, *Yuccæ foliis*, spinis tenellis, hinc inde marginibus appositis, *D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.* àn *Ocopoatzli Mexicensibus*, s. *Scorpii spina*, *Hernand.* apud *Reccum* 222.  
*Eryngium lacustre*, *Virginianum*, floribus ex albido cæruleis, caule & foliis *Ranunculi flammei minoris*, *D. Banister.*

**ERYSIMUM** non laciniatum *Draba dictum*, *Raii Hist.* 811. *Draba lutea* quibusdam. *J B. T.* 2. l. 22. 939. *Draba lutea*, *Park.* 851. Itèm *Solidago Sarcenica*, s. *Germanica*, filiquosa, *ejusd.* *Park.* 539. *Draba lutea* filiquis strictissimis. *C B P.* 110.  
*Erysimum latifolium Neapolitanum*, *Park. Raii Hist.* 811. *Erysimum latifolium majus glabrum.* *CBP.* 101. *Iris Apulus alter*, lævi folio *Erucæ*, *Column. ecphr.* 264.  
*Erysimum angustifol. majus.* *C B P.* quæ bis repetitur in *Pinace*, semel hoc loco, & pag. 95. Ubi vocatur *Rapistrum Italicum* filiquis longissimis, (i. e.) *Rapistrum montanum*, s. *sylvestre*, *Irionis folio λεπτομακροκέχρον*, *Column. ecphras.* 266. Fortè etiam



etiã Eryfimo fimilis lævis, laciniata, floribus luteis. C B P. 101. Eryfimo fimilis, herba Sti. *Alberti*. J B. T. 2. l. 21. 862. àn Sinapi fylvestre *Monspessulanum*, lato folio, flosculo luteo minimo, filiquâ longiffimâ, ejusd. J B. T. 2. l. 21. 858. Eryfimum *Genevenfe*, fylvestre, *Raii Hist.* 812. Sinapi *Genuense*, fylvestre. J B. *ibidem*.

Eryfimum corniculatum, perenne, D. *Bobart*. Eryfimum corniculatum, majus, perenne, *Pyrenaicum*; àn *Eryfimo vero di. Dioscoride*, *Zanon. Schola Botan.* 83: àn Eryfimum alterum filiquis Erucae. C B P. *Vide Supp. p. 400*

Eryfimum latifolium, foliorum laciniis triangularibus, *Raii Hist. Pl.* 813. Eruca latifolia. C B P. 98. àn Eruca 3<sup>a</sup>. *Anglica Camerar.*

Eryfimum Sophia dictum, *Raii Hist.* 812. Seriphium *Germanicum*; Sophia quibusd. J B. T. 2. l. 21. 886. Sophia Chirurgorum; *Park. Theatr.* Nasturtium fylvestre, tenuiffimè divifum. C B P. 105.

Eryfimum Sophia dictum *Chalepense* procerius, foliis latioribus, & faturatè virentibus, *priori diverfa videtur, ut nos primo monuit, D. Doody.*

**ERYTHROXYLUM** *Americanum* Hydrolapathi foliis, Nuculas pyramidales, filamentoso cortice inclusas, nucleo verficolore, proferens, *Phytogr. Tab.* 175. fig. 5. Fortè *Brasilio* fimile Lignum, *Verninbock*, *Germanis* dictum, **Redwood** *Barbadensibus* vulgò. Et jam mutatâ sententiâ, maxime diverfam hanc Arborem esse *Uvisera Orientali* folio longo P B P. indubitanter pronuncio. Hunc usque in diem utraque vigent, in *Hort. Reg. Hampt.* Itâ ut diversitatem, cuiquam observanti liquidò appareat.

**ESCHAROXYLUM** s. Lignum focale *Americanum*, quod in focis extruendis, maximè usitatum, *Phytogr. Tab.* 175. fig. 6. Cui fructus Pyriformis, octies striatus, *Oxyacanthæ Virginianæ* magnitudine, per maturitatem lignescens. àn Lignum fomitis vicem præbens, *Clus. exot. l. 1. c. 8.* Fire-Sprig, *Barbadensibus* dictum. *Materies arboris adeo dura est, ut collisâ ignem Silicis instâr ejiciat*; Suberi affine Lignum fomitis vicem præbens. C B P. 424. Ligna in *Brasiliâ*, quæ Urakuciba vocant, quæ exsiccant, dein invicem terunt, ex quo attritu pulvis densus inflammatur, *Stadius Part. 3. Ind. Occid. c. 6?* Fortè Mahot arbor *Caribana*, s. Tænidiophoros nostra; hujus *Phytogr. fol.* 41. vid. *Leri, cap. 19. D. Rochfort. lib. 2. cap. 15. pag. 440.*

**EUEDEXYLUM**, s. Lignum odoratum *Americanum*, folio amplo, subrotundò, profundè venoso, fructu glandiformi, Beretini instâr, nullo calyce donato; Santali fortè genus, aut Agallochi, *Barbadensibus* nostratibus Sweetwood, nuncupatur. Hujus folia à Guajeru *Brasiliensium* *Marcgrav.* haud multum abludunt. Fortè Glandi Iligneæ, quodammodò similis fructus, cortice fragili. J B. T. 1. l. 3. 323. hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab.* 176. fig. 1.

Euedexylum *Americanum*, folio magis mucronato, *Phytogr. Tab.* 176. fig. 2. Samarana fortè *Malabarica*, *Garcie* apud *Raium, Hist.* 1804. Sweet-Smelling-Wood (i. e.) Lignum odore fragrans, *Barbadensibus* dictum.



EUONYMO vulgari quodammodo accedens ; ex *Prom. Bon. Spei.*

Euonymi nostratis folio, Arbor *Africana*, ex *Prom. Bon. Spei*, *Phytogr. Tab. 280. fig. 2.* àn *Periclymeni* surrecti genus *Æthiopicum* ?

Euonymus latifolius. *C B P. 428.* Enoymus latifolia. *J B. T. 1. l. 8. 202.* Euonymus primus, s. latifolius, *Clus. Hist.*

Euonymus *Virginianus*, rotundifolius, capsulis coccineis, elegantèr bullatis, *D. Banister. Phytogr. Tab. 28. fig. 5.*

Euonymus *Canellæ albæ* foliis, è *Maderaspatan. D. D. Frederici Slare* favore, ad exsculpend. accepimus. Pictura exhibetur, in *Phytogr. Tab. 88. fig. 5.*

Euonymus *Æthiopicus* *Canellæ albæ* foliis, magis acuminatis, *Phytogr. Tab. 280. fig. 3.*

Euonymus *Æthiopicus*, Alaterni foliis rotundioribus, duris, & non crenatis, *Phytogr. Tab. 280. fig. 4.*

Euonymus *Virginianus*, *Pyracanthæ* foliis, capsulâ verrucarum instâr asperatâ, rubente, *Phytogr. Tab. 115. fig. 5.*

Euonymus *Margaritifera*, pentacoccus, *Americana*, *Phytogr. Tab. 176. fig. 4.* *Margaritifera arbor Sirinamensis. P B P.*

Euonymus *Injubinis* foliis, *Carolinensis*, fructu parvo, ferè umbellato, *Phytogr. Tab. 28. fig. 6.* à foliorum similitudine cum *Rhamno Cathartico* ( ni fallor ) Hæc planta, *Buck-Thorn* (i. e.) *Spina Cervina*, *Barbadensibus* nostratibus nominatur. *Tithymalli* ( fortè ) fructu tricocco, Frutex *Virginianus*, *D. Banist.* *Penitooroe Zeylanensibus dictus. Vide Supp. p. 400*

Euonymo adfinis *Æthiopica*, sempervirens, fructu globoso, scabro , foliis Salicis rigidis, ferratis, *Hort. Leyd.* *Laurus non odorata*, fructu globoso, *Africana. Sterbeek. Citricult.* *Lauro ferratæ odoratæ, Stapeliana*, similis, inodora, *Capit. Bon. Spei, Breyn. Prodr. 1.*

Euonymo adfinis, *Æthiopica*, spinosa, *Lycii* foliis, & aculeis, fructu Euonymi *Pannonicæ Clusii* grandiore, *Phytogr. Tab. 280. fig. 5.* *Dioscoridis vel manca, vel certè oppido brevis Paliuri descriptio, usque adeo exercet Botanographos, ut dubitemus majus dissidium eorum, super ullo alio, quam hoc Frutice existat ; Intenditur etiâ hoc dissidium, potissimum ex Theophrasti, Paliuri discrepantibus descriptionibus. Alioquin hanc nostram Euonymo adfinem, nullis ferè notis reclamantibus, Paliurum Africanam, esse putarem ; cujus semina terna, lentorem quendam pinguem, præ se ferentia, siliquis conclusit Botanicorum Antistes, Theophrastus, lib. 3. Hist. Pl. cap. 17. Aut certè hæc est Paliurus siliquata, ejusd. aut Phanta quæ ipsam refert, ad cognitionem nostram nondum pervenit, quare & inter incognitas est reponenda Arbores ; in re tamen dubiâ, nihil asserere audeo.*

Euonymo adfinis Arbor *Orientalis Nucifera*, flore roseo, *Phytogr. Tab. 88. fig. 6.* *Styraci & Euonymo media affinis, The Sinensium, s. Tsja Japonensibus*, flore simplici, *Breyn. Prodr. 2.* *Thee*, Frutex *Bontii. Chaa herba Japonia. J B. Tom. 3. lib. 27. 5.*

Euonymo adfinis, *Occidentalis*, alatis *Ruscii* foliis, *Nucifera*, cortice ad genicula fungoso, *Phytogr. Tab. 94. fig. 4.* *Guaiacum Americanum* alterum, fructu Euonymi, *Breyn. Prodr. 1.* *Guaiacum foliis Lentisci, Horto Fageliano, ejusd. Breyn. Prodr. 2.* *Pock Wout, Belgarum.* Sub *Jasmini* titulo in *HRH.* primò nobis innotuit. Fortè *Avellana Americana* quadrifida ; *Oviedi, Hist. Amer. lib. 14.*



cap. 4. *Clus. exot. lib. 2. cap. 16.* Fortè etià Guaiacum, propemodùm sine matrice ; Quibusdam Lignum Sanctum, *Indis* Hoaxacan, & Matlalquauhitl, *Jonst. Dendrolog. 426.* *Anton. Recc. 62.* àn *Ibiræe Brasiliensibus, Marcgrav. 101.* Guaiacum foliis Cerasi acidæ, *Jonst. Dendrolog. 427.* & quid-ni, *Esquine de Laet. Arbor Floridana,* decantati contra Luem veneream usus, *Indiæ Occid. lib. 4. cap. 14.* Fortè etià Huazium, *Nova Hispan. Terent. apud Reccum, 380.*  
Euonymo adfinis *Philippinarum Insularum*, Anisum spirans, Nuculas in capsulis stelliformitèr coaggestis, proferens. Anisum peregrinum. *C B P. 159.* Anisum *Philippinarum Insularum, Clus. Hist.*

EUPATORIUM foliis Enulæ, *Cornut. de Pl. Canad. 191.* Cannabilla *Indicæ Stapel. Comment. in Theophr. 365.* àn *Xochicopalli, s. Copalla florens ;* ab aliis *Xarapisqua, Copallifera 8<sup>a</sup>. Hernand. apud Recc. 49.*

*Eupatorium triphyllon Mexiocanum,* floribus albicantibus. *Coapatlis Quauhua-censis, s. Coapatlis 4<sup>a</sup>. Hernand. apud Reccum, 36.*

*Eupatorium Virginianum,* Salviæ foliis longissimis, acuminatis, perfoliatum, *Phytogr. Tab. 87. fig. 6.* Huic folia longa cuspidata, bina opposita, & ad basim ità continua invicem, ut ea caulis transadigat, & sinum quendam, ceu cavitatem pelvi aquæ continendæ similem, efformant.

Idem folio trifoliato.

*Eupatorium Novæ Angliæ Urticæ foliis,* floribus purpurascantibus, caule maculato, *H. Leyd. append. 667.*

*Eupatorium Urticæ foliis, Canadense,* flore violaceo, *H. Leyd. 239.* *Valeriana Urticæ folio,* flore violaceo, *Cornut. 22. Moris. Umbel. 51.*

*Eupatorium Urticæ foliis, Canadense,* floribus albis. *Valeriana Urticæ folio,* flore albo, *Cornuti, 20. Cacalia Americana, Park. Th. 1221.*

*Eupatorium Americanum,* Melissæ foliis, magis acuminatis, *Phytogr. Tab. 87. fig. 3.* àn *Tzocuilpatli altera, Hernand. apud Reccum, fol. 149. & 183.* Fortè etià *Eupatorium Americanum,* Nepetæ folio latiore, floribus albis, brevioribus, *Breyn. Prodr. 2. Vide Supp. p. 400*

*Eupatoria Conyzoides,* odorata, folio crenato, molli, subincano, *Phytogr. Tab. 87. fig. 2.* *Serratula Noveboracensis,* folio levitèr crenato, molli, subincano. *P B P. 375.* *Serratula Indica major latifolia,* mollis, *Breyn. Prodr. 2.* Ubi nomine *Jaceæ & serratulæ affinis,* capitulis *Baccharidis ;* hujus mentionem in *Prodromo suo primo,* se fecisse fatetur. Et quod, per errorem hoc fuit, comperisse me jam audeo pronunciare. *Conyza Syriæ Rawolfii, Hist. Lugd. append.* Fortè etià *Tezompotonic,* seu *Capillus fœtidus, Hernand. apud Recc. 191.* Itèm *Tlacochichic,* seu *Salvifolia, ejusdem, fol. 305.* & *Virga amara* quibusd. 191.

*Eupatoria Conyzoides,* *Verbasci folio ;* *Phyteuosmos ; s. Baccharis Americana,* suaveolens (i. e.) *Sweet-weed, Barbadosibus dicta, Phytogr. Tab. 87. fig. 1.*

*Eupatoria Conyzoides,* integro *Jacobææ folio,* molli, & incano, *Indiæ Orient. Phytogr. Tab. 177. fig. 1.* *Jaceæ & serratulæ affinis, Breyn. H. Leyd. inter Addend. 677.* àn *Cattu-Schiragam, H. Malab. Part. 2. fig. 24.* quæ ut *Cl. Hermannus* monuit, pro foli diversitate, à se maxime variat. *Scabiosa Indica arborea, Raii Hist. Plantar. 1443.*

Eupatoria



- Eupatoria Conyzoides, integro Jacobææ folio, glabro, & duriusculo, *Indiæ Orient.*  
*Phytogr. Tab. 87. fig. 5.* Eruditissimo, D. D. *Slare*, nobis, hujus notitia debetur.
- Eupatoria Conyzoides, *Maderaspatana*, foliis glabris, flore purpurascente, *Phytogr.*  
*Tab. 177. fig. 2.* àn *Nari-patsja*, *H. Malab. Part. 10. fig. 62.* Conyza *Malabarica*  
*Lamii* folio, flore purpureo, *Commel. in Not.* Fortè etià *Yztac-cococ-Tlacotli*  
*Novæ Hispaniæ Terentii* apud *Recc. 450.*
- Eupatoria Conyzoides, maxima, *Canadensis*, foliis caulem amplexantibus, *Phytogr.*  
*Tab. 87. fig. 4.* Conyza major, alato caule, foliis *Primulæ veris* longè ampli-  
 oribus, graviter odoratis, *Lælii Triumphetti* apud *Fratrem.* àn *Virga aurea latissimo*  
*folio, Canadensis glabra, Schol. Botan. 201.*
- Eupatorium *Bermudense*, latifolium, flosculis pallescentibus; **Silver-weed** No-  
 stratibus vulgò, *Phytogr. Tab. 243. fig. 2.* Si non obfaret altera foliorum situs,  
 Eupatorio affinem Plantam *Zeylanicam*, foliis *Ulmi Breynio*, *Cent. 1. 142.* Huic  
 nostro proximè accedere putarem.
- Eupatorium angustiori folio *Bermudense*, floribus flavescentibus, **Hog-weed** No-  
 stratibus dictum, utrumque habuimus, à Sagacissimo *Botanico*, D. *Jacobo Pete-*  
*ver*, & posteriorem à Senecione *Africano*, latiori folio, nostræ *Phytogr. Tab. 223.*  
*fig. 5.* Haud multum abluere arbitramur.
- Eupatorium humile, *Africanum*, Senecionis facie, foliis *Lamii.* P B P. *Phytogr. Tab.*  
*88. fig. 1.* Senecio *Africanus*, *Lamii* folio. H R P. Senecio *Americanus* *Lamii*  
 facie, *Schol. Botan. 186.* àn *Virga aurea*, folio *Veronicæ*, *Mentzel. Fascic.*
- Eupatoria hirsuta, *Hyssopi* foliorum æmula, *Virginiana*, *Phytogr. Tab. 88. fig. 2.*  
 Eupatorium *Virginianum*, *Lavendulæ* foliis, floribus albis, *H. Beaumont. 16.* àn  
*Valeriana Hyssopi* folio, *Virginiana*, D. *Banister. Cat. Mss.* Huc fortè referatur  
*Cyanus Linifolius repens. J B. T. 3. l. 25. 25.* *Cyanus minimus repens, Lob.*  
*Icon. 549.* Fortè etià *Yztacpatli Tepuzcullulæ*, s. *Linaria argentea Mexiocana*  
*Hernand. apud Recc. 197.* Item *Tlalchinol Xochitl*, s. *Venerea Medicina 2a. ejusd.*  
*Hernand. 238. & 415.*
- Eupatoria *Virginiana*, *Serratulæ Noveboracensis*, latioribus foliis, *Phytogr. Tab. 280.*  
*fig. 6.* ad *Serratularum* genus averruncetur; & *Serratulam Virginiensem*, latioribus  
 foliis, jure merito nominare licebit.
- Eupatoria Conyzoides, *Urticæ* folio molli, & incano, capitulis magnis, *Americana*,  
**Arch-Angel** *Barbadensibus* dicta. àn Conyza *Americana*, *Urticæ* folio, flore cæ-  
 ruleo, *Hort. Amst. 99.* Fortè *Quaxoxouhqui*, *Nov. Hispan. Terent.* apud *Recc.*  
*406.* Huic fortè pertinet *Cyanus arborens* altera, *Styracis* folio, *Prosp. Alpini*  
*exot. 32.*
- Eupatoria Conyzoides *Palestina*, *Lapathi* rigidioribus foliis, imâ parte bigemellis,  
 auriculis donata. Behen album, *Rawolfii.* J B. T. 3. l. 25. 37. Conspeximus  
 hanc, tantum in *Herbario vivo Rawolfiano*, apud celeberrimum Theologum, D.  
*Isaacum Vossium.*
- Eupatoria *Valerianoides*, flore niveo, *Teucris* foliis, cum pediculis, *Virginiana*, *Phy-*  
*togr. Tab. 88. fig. 3.* Ad hujus classẽ fortè amandetur *Manja-adeca-mangen*,  
*H. Malab. P. 10. Tab. 17.* Conyza *Indica*, *Teucris* folio, flore flavo, odorato.  
 Huc fortè spectat etiam, *Quapopol Mexicensibus*, *Hernand. apud Recc. 218.*
- Eupatoria *Valerianoides*, *Virginienfis*, *Triflaginis* folio, absque pediculis, *Phytogr.*  
*Tab. 88.*



*Tab. 88. fig. 4.* Cacalia foliis rotundioribus, ad caulem sessilibus, *Banister. Cat. Mss. àn Tlacoxochitl; Nov. Hispan. Recc. 418.* Huic generi Plantarum, Cihoa-patli Tepoztemica, *Nov. Hispan. Recc. 370.* maxime convenit.

Eupatorio adfinis, *Americana*, bulbosa, floribus scariosis calyculis contectis, *Phytogr. Tab. 177. fig. 4.* Huic (in capitulis saltèm) perfimilis exhibetur Planta in *Hist. Mexican. Recci*, sub nomine Xararo, ut videtis, *pag. 196.* Planta pap-pescens, non lactescens, *Virginiana*, *D. Banister. Cat. Mss.*

EUPHRASIA pratensis, minor, purpurea, *Theatr. Park. 1330.* Euphrasia pur-purea, minor, *C B P. Prodr. 111.* Itèm Euphrasia pratensis, *Italica*, latifolia, *ejusd. C B P. 234.* Euphrasia 3<sup>a</sup> non scripta, *Fab. Column. ecphr.* Icon habetur, *Phytogr. Tab. 28. fig. 2.*

Euphrasia pratensis lutea. *C B P. 234.* Euphrasia pratensis major lutea, *Park. Th. Co-ris Monspessulana*, lutea. *J B. T. 3. l. 30. 433.* Euphrasia major lutea angustifo-lia, *Column. ecphr.* Sideritis pratensis lutea, *Hist. Lugd. 1121.* Ubi exhibetur Icon, satis fœliciter exsculpta.

Euphrasia lutea, latifolia, *Raii Hist. Pl. 772.* àn Cristæ galli affinis, planta, *Roma-na*, s. Crista galli major, *Italica. J B. T. 3. l. 30. 437.* Quærit & ipse *Raius.* Hu-jus Icon habetur in *Phytogr. Tab. 27. fig. 5.*

Euphrasia, s. Cratægonum, foliis brevibus, obtusis, *Vestmorlandicum, Raii, Phy-togr. Tab. 28. fig. 1.* Hujus flosculi sunt planè galeati.

Euphrasia, Acinos latiori folio, *Maderaspatana*, cauliculis pubescentibus, *Phytogr. Tab. 279. fig. 7.*

Euphrasia, Alfine majori folio, flore galeato pallidè luteo, *Jamaicensis, Phytogr. Tab. 279. fig. 6.* àn Tzompili-Huizpatli, *Nov. Hispan. Terent. apud Recc. 437.* Fortè etiàm Cara Caniram, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 56.*

Euphrasia, Alfine angustiore folio, Rubiæ modo spicata, *Golcondæa, Phytogr. Tab. 56. fig. 3.* Si alternè foliorum situs non obstaret, Tlaelpatli-Acatlanensi Alfine-foliæ 2<sup>æ</sup>. *Hernandez. apud Recc. 209.* eandem esse putarem.

Euphrasia lutea Alfine folia, radice squamatâ. *C B P. 234.* in *Prodr. descript.* Anonymos radice Dentariæ, *Column. ecphr. part. 2. 50.* Euphrasia lutea minor, radice squa-matâ, *Park. Th. 1330.* Dentaria Buguloides, radice globosâ, *Mentzelii*, ut vide-tur, *Raii Hist. Pl. 774. & Nobis.*

*Euphrasia* *angustata* Euphrasia angustis, & tricuspidatis foliis, flore albo, & purpureo, *Phytogr. Tab. 177. fig. 5.* àn Euphrasia Linifolia, *Fab. Column. ecphr. Part. 2. pag. 68.* Euphrasia foliis Lini angustioribus. *C B P. 234.* Euphrasia minima, *Park. 1328.*

Euphrasia pratensis, Satureiæ foliis scabris, è *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab. 177. fig. 6.* àn Euphrasia frutescens, Coridis folio, flore albo, spicato, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Prodr. 2. 46.*

Euphrasiæ affinis, *Indica*, Echioides, Kawatuwa *Zeylanensibus*, *H. Leyd. app. 668.* Buglossum echioides *Indicum*, Convolvuli cærulei minoris folio, *Ephemer. Ger-man. Ann. 4, & 5. Obs. 139.* Gratiolæ affinis Echioides, *Zeylanica* major, *Breyn. Prodr. 2. 54.* Pee-Tumba, *H. Malab. Part. 9. Tab. 46.* Flores quodammodò efformes, sed non galeati sunt, ut rectè notat *Breynius*; & ad *Lyfimachiam*, *Virginianam* hanc plantam proxime accedere vellet *Commelin. in Not.*



E.



**FAGARAS** *Abensina*, *Clus. ad Garc. Hist. Arom. lib. 1. cap. 23.* Cubebis affinis, *Fagara major. C B P. 412.* Guegela-etta *Zeylanensibus* dicta.

**FAGI**-foliis alterno positu alatis, *Arbuscula Bisnagarica, Phytogr. Tab. 89. fig. 10.* *Ofstryæ* fortè, s. *Carpino* adfinis angusto folio non ferrato, *Zeylanica. PBP. 360.* Ubi quærendum proponitur; àn *Frutex* innominatus primus instar *Salicis pumilæ, Marcgr. lib. 2. cap. 13.* *Wærellaghæ Zeylanens.* àn *Arbor Fago* similis in *Carthagenâ de Laet. Ind. Occid. lib. 8. cap. 13?*

**FAGOTRITICUM** Volubile nostras. *Fegopyrum* scandens sylvestr. *Raii Synops. Stirp. Brit. 32.* *Frumentum Saracenicum* alterum, *Convolvuli* modo scandens, femine triangulo minori nigro, *Morif. Hist. 2. 590.* *Convolvulus* minor femine triangulo. *C B P. 295.* *Helxine* femine triangulo. *J B. T. 2. l. 15. 157.* *Fagotriticum* Volubile majus *Virginian. Phytogr. Tab. 177. fig. 7.* *Convolvulus niger Virginianus* major, *Hort. Oxon.* *Helxine* latè scandens, feminibus majoribus, *Banister.* *Frumentum Saracenicum* maximum *Americanum, H. Leyd.*

**FERRUM** equinum vulgare aploceraton, *Fab. Column.* *Ferrum* equinum filiquâ singulari. *C B P. 349.* *Solea* equina. *J B. T. 2. l. 17. 347.* *Sferro Cavallo, Camerar.* *Ferrum* equinum majus, *Park.*

*Ferrum* equinum, filiquâ multiplici. *C B P.* *Ferrum* equinum polyceraton, *Park. Column. ecphras. 303.*

*Ferrum* equinum comosum, *Park.* *Ferrum* equinum capitatum, s. comosum, *Column. ecphr. 302.* *Ferrum* equinum *Germanicum* filiquis in summitate. *C B P. 346.* *Ornithopodio* affinis, vel potiùs *Soleæ*, vel *Ferro* equino, *Herba. J B. Tom. 2. lib. 17. 348.*

*Ferrum* equinum *Italicum* magis intortis filiquis, in summitate grandioribus: àn *Ferrum* equinum *Gallicum*, filiquis in summitate. *C B P?*

**FERULA** fœmina, *Plinii. C B P. 148.* *Ferrula* folio *Fœniculi*, femine latiore, & rotundiore. *J B. T. 3. l. 27. 43.* *Ferula* mas, *Cæsalpini.*

*Ferula* folio glauco, femine lato, oblongo, *Quibusdam* *Thapsia* ferulacea. *J B. Tom. 3. l. 27. 45.* *Ferulago* latiore folio. *C B P. 148.* Itèm *Libanotis* *Fœnicul.* folio, femine foliaceo, *ejusd. Pin. 158.* *Ferula* latiore folio, *Park.* *Ferula* fœmina, *Cæsalpini.*

*Ferula* *Libanotidis* odorem & succum fundens, s. *Panax Asclepium, Morif. Umbel. 35.* *Libanotis* *Ferulæ* folio & femine. *C B P. 158.* *Libanotis* *Quibusd.* flore luteo, femine *Ferulæ.* *J B. T. 3. l. 27. 41.* *Libanotis* *Ferulæ* folio, & femine, s. *Panax Asclepium* *Ferulæ* facie, *Lobelio. Parkinsoni.* *Ferula.*



*Ferula lucida Hispanica*. HR P. *Ferula Tingitana* folio angusto, lucido, Hort. Leyd. 242.

*Ferula Tingitana*, folio latissimo lucido, Hort. Edinburg. 119. *Ferula Tingitana* lucido folio, segmentis Apii, Breyn. Prodr. 2. 46.

*Ferula fruticosa sempervirens*, foliis Anisi Galbanifera; ex quâ Galbanum Officinarum. P B P. 334. Anisum *Africanum* fruticescens, folio & caule, rore cæruleo tinctis, Phytogr. Tab. 12. fig. 2. àn Oreo selinum anisoides arborescens, Ligustici foliis, & facie, flore luteo, Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. 79. Fortè Acocotlis Ligustici facie, Hernand. apud Recc. 32. & fortè non immerito hùc referri poterit Theu Copalli *Mexicensibus*, s. Copalli Dei, ejusd. Hernand. apud Reccum, 231. Si Autor in Descriptione, (flores lanuginosos) non addiderit.

**FICUS** humilis. C B P. 457. Chamæficus, s. humilis Ficus Lobel. Chamæsyce arbor, Hist. Lugd. 336. Chamæficus. J B. T. 1. l. 1. 129.

Ficus sylvestris *Dioscoridis*. Caprificus Plinio. C B P. 457. Caprificus, *Anguillare*, *Cordi. in Dioscorid.* & Hist. Hujus ramuli ex *Insulis Fortunatis* allati; pictura habetur in *Phytogr. nostr.* Tab. 281. nondum edit.

Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens. C B P. 459. Sycomorus *Alpino*. J B. T. 1. l. 1. 124. Sycomorus Gjeumez vocata, Pr. Alpin. de Pl. Ægypt. 20. Sycomorus, s. Ficus *Ægyptia*, Park. Theatr.

Ficus folio Sycomori, fructum non in caudice gerens. C B P. ibid. Ficus *Cypria*. J B. ibid. Sycomorus altera, s. Ficus *Cypria*, Park. Th.

Ficus *Indica* Tiliæ folio, subtus albo & villoso, polyrhizos, s. filamentis è summis ramis ad terram missis radicata; à Plinio, Theophrasto, & Strabone descript. Phytogr. Tab. 178. fig. 3. Ficus *Indica*, *Clusii exot.* Ficus *Indica* foliis Mali Cotonei similibus, fructu ficibus simili, in Goa. C B P. 457. àn Ficus arborescens *Benghalensis*, folio subrotundo, fructu orbiculato; Pipal *Benghalensibus*, Hort. Beaum. Fortè etiàm Arbor resinifera *Tabacensis de Laet Ind. Occid.* lib. 17. cap. 28. *Broad-leaved Mangrove*, *Barbadensibus* nostratibus (unde & ipse habui) appellata.

Ficus arbor *Americana*, Arbuti foliis non ferrata, fructu Pisi magnitudine, funiculis è ramis ad terram demissis prolifera, Phytogr. Tab. 178. fig. 4. Fortè Ficus arborescens *Africana* Arbuti foliis non ferratis, Hort. Beaum. àn Katou-alou, Hort. Malab. P. 10. Tab. 57. Quæ ipsissimam Ficum *Indicam Clusii*, perperam, nostrâ sententiâ facit. *Celeberrimus Commelinus in Not.* Nostræ autem folia, omninò sunt glabra, infernè quidem albicantia, non lanuginosa; Fructus etiàm, Katou-alou sunt multò minores, idcirco ad Tsjakelam, ejusd. Hort. Malab. potiori jure referendam esse videtur. Alhu arbor fortè, *Zanon.* 19. Et Logato *Jamaicensium*, s. Arbor *Americana* *Sindophoros* nostra. Hujus *Almagest. Botan.* fol. 41. àn Ficus *Sinensis Justi Heurnij*; apud *Bodæum à Stapel.* ad *Theophrast. Hist.* lib. 4. cap. 5. *Bearded Fig-Tree* (i. e.) Ficus barbata, *Barbadensibus* audit.

Ficus *Americana*, latiori folio venoso, ex *Curacao.* àn Ficus arbor *Barbadensium Ligonis*, pag. 69? Peralu (fortè) Hort. Malab. Part. 1. Fig. 28. in Hort. Reg. Hampton. in hodiernum colitur. Iconem videsis, Phytogr. Tab. 178. fig. 1.

Ficus *Malabarensis*, folio cuspidato, fructu rotundo parvo gemino, D. Syen. Arealu, Hort. Malab. Part. 1. Fig. 27. *Cingalensibus Bogab.* Estque ex religione ipsorum, hanc



*hanc arborem adorare, quamobrem ab Incolis Christianis Arbor Diaboli nominatur. Hujus Icon exhibetur in Phytogr. Tab. 178. fig. 2.*

*Ficus arbor densioribus foliis parvis integris Ambonensis, Phytogr. Tab. 243. fig. 4. àn Arbor Sycophora Jamaicensis foliis minoribus, Almagest. Botan. fol. 42. Ittyalu (fortè) Hort. Malab. Part. 1. Fig. 26. Hæc est una de Arboribus illis, quæ fibris, s. funiculis è summis ramis exeuntibus, ad terram usque demissis & ibidem radices asagentibus, mirifice propagatur.*

*Ficus Malabarica fructu Ribesii formâ, & magnitudine Tsjela dicta, Raii Hist. Pl. 1435. Tsjela, Hort. Malab. Part. 3. Tab. 63. Arbor Sycophora Caryophylli aromatici foliis, & facie Jamaicensis. Hujus Almagest. Botan. fol. 42. ab hac parùm differre videtur. Præcedentis species est, eodemque modo crescit, & propagatur, quo illa.*

**FICUS Indica** racemosa, foliis & fructu amplissimis, Musa Arabibus dicta. Pacoeira, Pison. 154. Marcgr. 137. Musa. *J. B. T. 1. lib. 1. 148.* Mauz-Musa, *Alpini, de Pl. Ægypt. 80.* Bala, s. Musa Serapionis, *Hort. Malab. Part. 2. 27.* Dudaïm, *Ludolf. lib. 1. cap. 9.* Eloxochitl (fortè) *Hernandez. 376.* Palma humilis longis latisque foliis. *C B P. 507.* Itèm Ficus Indica fructu racemoso, foliis oblongis, *ejusd. Pinac. 508.* Ideoque hæud sine ratione culpatur gravissimus Autor à D. Arnolodo Seyn: *Dùm à se invicem disjungit Musam, & Ficum Indicam fructu racemoso, &c. cum reverà una & eadem sint, viz. Pacoeira arbor; ut etiàm Cl. noster Raius ipse arbitratur, Hist. Pl. 1374. The Plantane-Tree, Nostratibus dicta, Fructu recurvo.*

*Ficus Indica* racemosa, foliis venustiùs venosis, fructu minore. Banana, *Marcgr. ibidem.* Bananeira Pisonis *ibid.* & Rochforti, *Hist. des Antilles.* Musæ affinis altera. *C B P. 508.* Banam fructus in Regno Congiano, formâ, & gustu Musæ Ægyptiacæ, *Part. 1. Ind. Orient. lib. 2. cap. 1.* Itèm arbor foliis amplissimis, fructu Cucumeris formâ, *ejusd. C B P. ibidem.* The Bonana-Tree, nostratibus nuncupata. *Hujus folia prioribus sunt ad apicem paulo strictiora & venis purpureis (spectabili visu) plurimis paralelis transversim discurrentibus ornata; à Pacoeirâ maxime diversa.*

**FICUS** arbor Utriusque Indiæ Platani foliis *μονοσέληνης*, fructu Mali Cydonii, aut Melonis magnitudine, *Phytogr. Tab. 278. fig. 1.* Arbor Platani folio, fructu Peponis magnitudine eduli. *C B P. 431.* Itèm Ficum specie Fructus Peruvianus. *C B P. 457.* Papaye Peruvianus. *J. B. T. 1. lib. 1. 147.* Papaya *Hernandez. 99.* Fanyaycu, *Boym. Flor. Sinens. Jonston. Mantiss. de Arboribus, 474.* Hujus sunt mas & fœmina. Prior est Ambapaja, *Hort. Malab. Part. 1. Fig. 15.* altera Papajamaram, *ejusd. Hort. Malab. ibid.* Arbor Melonifera, Papayo vulgò dicta, *Bontii. 96.* Mamoera mas, & fœmina, *Park. Theatr. In utraque Indiâ satis frequens conspicitur.* Gulielmus Piso, *marem aque ac fœminam fructum ferre refert (secùs ac Clusius, & Horti Malabarici Autores statuunt) licet minorem & oblongiorem; falsumque esse Fœminam non ferre fructum, nisi mas adstet, quod & confirmat Rochfortius, Hist. des Antilles.* Hujus & altera varietas habetur in Insulâ Jamaicensi, quæ summo caudice ramos emittit.



Ficus arbor Papaie sylvestris nomine missa ex Sirinam, *Phytogr. Tab. 278. fig. 2.* Ficui similis arbor fructu oblongo. *C B P. 457.* Arbor Cucurbitifera; Ficus Nigritarum. *J B. T. 1. l. 1. 111.* Inter Cucurbitiferas per errorem utraque sortiebantur; nunc vero comperimur, ad Ficuum genera potiori jure illas amandari debere.

Ficus arbor Sirinamensis multifido, umbilicato folio, supernâ parte admodum scabro, aversâ, densâ lanugine, molli, *Phytogr. Tab. 243. fig. 5.* Ambaibæ altera species, Ambaitinga Brasiliensibus, Pisonis, 148. Cui folia sunt tam impense scabra, ut loco limæ lignis levigandis inserviant. Ambayba Brasilianorum de Laet. Ind. Occid. lib. 15. cap. 8.

Ficus arbor Brasiliensis, spinosa, digitatis Mandihocæ foliis frondosis. Jaracatia Pisonis, & Marcgravii. Arbor peponifera Brasiliensis, spinosa; fructu Mamoeræ simili ramosa, Raii Hist. Plantar. 1669.

**FICUS Indica** Tuna dicta, s. Opuntia solâ hirsutie pungens. Ficus Indica lævis, pilosa. *C B P. 458.* Et fortè, Ficus Indica humilis ejusd. ibidem. Yztac-nochtli Mexicensibus Hernandez. apud Recc. 77. In omnibus fere Americæ plagis, Hæc (ratione inferendi) mirabilis planta, est admodum familiaris; nec Veteribus fuit prorsus incognita, ut mihi facile persuadeo, neque India quam vocant Occidentalis sola ei natale Solum esse videtur, nisi refragetur, fuisse Plinii Opuntiam, qui scribit circa Opuntem Boeotiæ oppidum, ejusdem nominis Sinui, Euboico à Livio, Modernis Golfo di Negreponte dicto, vicinum, nasci etiâ, homini dulcem, mirumque à folio ejus radicem fieri, & sic plantam nasci, Hist. Nat. l. 21. cap. 17. Quid igitur quæris unde in Europam veniret. & quo evanesceret, non nisi ex Americâ postliminio reditura? Cum in plurimis Europæ regionibus olim verisimilius oriebatur, & sicut nos monuit percelebris Vir D. Tancredus Robinson, variis in Italiciæ locis ex propriâ observatione, etiânum sponte nascitur, satis obvia, & frequens, ut in cantibus montosis circa Neapolin & juxta viam Appiam prope tres Tabernas, & in toto isto tractu inter Neapolin & Romam frequentissima: Siciliæ etiâ alumna est, & in Catalogo hujus Regni stirpium Indigenarum à Celeber. Viro, & rei Herbariæ longe peritissimo, Dno. Paulo Boccono enumeratur. (Bocc. Recherches & Observation's Naturelles, pag. 194.) Ficus Indica lævis pilosa. *C B P.* quam nos intrepidè pro hujus Synonymo ponimus; Hæc ad Bauhinum ex Cretâ missa est, eaque duplex, altera folio rotundo, altera folio oblongo. Opuntiam nonnulli credunt de quâ Theophrastus Hist. lib. 1. cap. 12. Sic: Huic Ficui Indicæ (arcuatæ) similis est, vel potiùs quodammodo mirabilius, si qua ex folio radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse aiunt, quæ & esu suavis est.

Ficus Indica major lævis, s. non spinosa, vermiculos quos Cochenilla vocant proferens, *Phytogr. Tab. 281. fig. 2.* Ficus Indicæ grana. *C B P. 458.* Arbor Cochenille Claud. Dureto. Nocheznopatli, seu Nopalnocheztli, in quo Coccus Indicus nascitur, Hernandez. apud Recc. fol. 78. àn Ficus Indica folio oblongo media. *HRP. 60?* Tuna, s. Napalli Saxi innascens Nierembergii, lib. 14. cap. 35? Hujus fructus forte sunt Mettaquusunnauks Virginensibus, D. Ogylveii, Americ.

Ficus Indica, s. Opuntia major, folio spinis longissimis, & validissimis armata, Breyn. Prodr. 35. Fortè Tzaponochthli Mexicanorum, Hernandez. apud Recc. 77. Ficus Indica spinosa sylvestris. *C B P. 458.*

Eadem folio minori, rotundiori & compressiori, Hort. Leyd. 243. Coznocthli Mexic. sens. Hernandez. apud Recc. 77.

Ficus



- Ficus Indica* major spinis nigricantibus, floribusque purpureis *Curassavica*, *Hort. Beaum.* 19. àn *Opuntia* foliis longissimis atroviridantibus maxima *Americana*, *Breyn. Prodr.* 2. 79. *Atlatothli*, *Mexicensium*, *Hernand. ibid.*
- Ficus Indica*, s. *Opuntia* maxima, folio spinoso, latissimo & longissimo, ad imum compresso. *Ficus Indica* platycaulos, *H. Beaum.* 19.
- Ficus Indica*, s. *Opuntia* maxima, folio spinoso, longissimo, & angusto, ad imum rotundiore. *Ficus Indica* maxima spinosa, caule rotundo, *H. Beaum. ibid.*
- Ficus Indica*, s. *Opuntia* minor caulescens, Arbusculi in modum, ramis cineritiis spinosissima, *Phytogr. Tab.* 281. fig. 3. àn *Ficus Indica* folio spinoso, fructu minore. *C.B.P.* 458. *Opuntia* vulgò dictæ cognata, *Ferruminatrix Indorum*. *J.B. T. I. l. I.* 156. *Ficus Indica*, s. *Opuntia Curassavica* minor, spinosissima, flore luteo, *H. Beaum.* ubi pro *N. D.* ponitur. àn *Cacanothli Mexicensium*, *Hernand.* apud *Recc.* 77? *Opuntia Ostocollos*, quos artuum fracturis, & luxationibus pro-  
fit: De quâ & Author *Hist. generalis Indiarum*. Arbor rupturas consolidans *Ovied.* qui suspicatur, *Carduum Tunes* in hanc arborem transmutare. àn *Ficus Indica* minima folio subrotundo. *H.R.P.* 70? *Vid. Suppl. p. 400*
- Ficus Indica* omnium minima, spinulis tenellis undique armata. ex *Virginîâ*. Fortè *Ficus Indica*, s. *Opuntia Curassavica* minima, *H. Beaum.* 19. *Opuntia Americana* minima, spinis creberrimis, tenuissimis, *Breyn. Prodr.* 2. Fortè etiam *Opuntia minima Indica*, *Bellucii Indic.* *H. Pisan.* 39. *Ficus Indica* minima spinis brevissimis munita, ex *Hort. Fageliano. Schol. Botan.* 33. *The pin-pilloe*, nostratibus vocatur.
- FICOIDES** s. *Ficui* affinis *Americana* erecta *Cerei* effigie maxima, crassissima, spinosa, & angulosa, flore viridi subluteo, fructu spinoso rotundo, extûs & intûs rubro, seminibus minutis, nigris, referto, *Hort. Beaum.* 20. *Cereus Curassavicus* erectus maximus, fructu rubro spinoso. *P.B.P.* 321. *Dadus Indigenis & Dildo Tree*, nostratibus dicta. *Tetzivactlis Mexicensibus*, *Hernand.* 78.
- Ficoides*, s. *Ficui* affinis *Americana* spinosior, & angulosior, spinis albicantibus, s. griseis. (lanugine ruffâ cum excrescunt oblitis) flore ex viridi-luteo, fructu ovali, non spinoso, foris rubro, intûs subviridi, seminibus nigris pleno, *H. Beaumont.* 20. *Cereus Curassavicus* erectus, maximus, fructu rubro, non spinoso. *P.B.P.* 321.
- Ficoides Americanum* multangulare, canulatum glauci coloris, spinis subluteis, tomento itidèm subluteo intertextis, flore subviridi, fructu non spinoso, extûs rubro, pulpâ viridi, seminibusque nigris repleto. *Cereus erectus Curassavicus* lanuginosus, fructu viridi spinoso. *P.B.P.*
- Ficoides Americanum* quadrangulare vel potiùs angulorum numero variabile, spinis longissimis armatum, flore subviridi, fructu spinoso, rotundo, seminibus nigris majoribus, & splendentibus pleno, *H. Beaum.* *Cereus erectus Curassavicus*, tetragonus, articulatus. *P.B.P.* 322. àn forte idem cum proxime sequenti.
- Ficoides Americanum*, s. *Cereus* erectus, cristatus, foliis triangularibus, profundè canaliculatis, *Phytogr. Tab.* 29. fig. 3. *Cereus* spinis crebrioribus horridus, *Raii Hist. Pl.* *Cereus cristatus Beaumontianus*. *P.B.P.* *Jamacaru prima Pisonis*, *Hist. Nat. Brasil.* 188. *Lusitanis Cardon.* àn *Planta pinnata arundinacea*, *Park. Th.* 1629?
- Ficoides Americanum*, arborecens, nodosum; ad nodos admodum aculeatum, *Jamacaru quarta*, *Pison.* 190. *Hujus arboris, tibiæ fere crassitiei, quinque circiter pedum longitudinis, caudex emedullatus, & concavus, in illustris viri, D. Gulielm. Cortene Medii Templi Londinensis Musæo instructissimo, in hunc diem curiosè asser-*



vatur. Hujus Medulla (inquit Piso) Sambucinâ facile mollior, quæ exaresacta in levissimum pulverem redigitur, qui cum decidat, Scapus cortice suo echinato contectus relinquitur concavus, miris cancellis quasi ex arte fabricatus, adeoque siliquæ alicujus spinosæ emulus, ut ni ipse fallor, hallucinandi Ratio nostro Sagacissimo ansam præbuit, cum sub titulo Fruticis exotici ramus in clavata mechinatam filiquam terminatus; hujus caudicem excavatum, in Hist. suâ Plantar. Univerf. 1800. exhibuerit; & siliquam veram, ut sibi videbatur esse pronunciet.

Ficoides triangulare articulatum, amplexicaule, spinis brevioribus obfitum. Cereus Peruvianus amplexicaulis, articulatus, fructu rotundo maximo, coccineo. PBP. 322.

Ficoides Americanum, s. Cereus minima serpens Americana, Phytogr. Tab. 158 fig. 6. Fortè Cereus Curassavicus amplexicaulis, polygonus minor. PBP. an Idem minimus, articulatus ex Vera Cruce, ejusd. PBP. ibidem?

FICOIDES, s. Melocactus, Americana tomentoso capite, fulcis rectis. Ficoides Occidentale spinosum, Meonon facie, fulcis rectis, H. Leyd. 670. Melocactus Indiæ Occidentalis. CBP. 384. Echinomelocactus vulgò, & Noftratibus Turks-Cap, nuncupatur.

Ficoides, s. Melocactus Americana major, fulcis obliquis. Echinomelocactus major, tomentoso capite, costis obliquis. PBP.

Ficoides, s. Melocactus major, longioribus aculeis donata. Echinomelocactus longioribus aculeis, Schol. Botan. 33.

Ficoides, s. Melocactus Americana spinis nigricantibus brevioribus, Hort. Beaum.

Ficoides, s. Melocactus mammillaris glabra, fulcis carens, fructum suum undique fundens, Phytogr. Tab. 29. fig. 1. Ficoides Occidentale spinosum, minus, absque tomento, H. Leyd. 670. Echinomelocactus minor lactescens, absque tomento cylindris laxioribus. PBP. 331. Echinomelocactus tuberosus, s. globularis minor Ex Hort. Fageliano Schol. Botan. 33. Ficoides vel Ficus Americana, sphaerica, tuberculata, lactescens, flore albo, fructu rubro, pyramidalis, Hort. Beaum, 21. Opuntia Echinomelocacti effigie tuberosa, fructu levissimo Amethystino, Breyn. Prodr. 2.

Ficoides, s. Melocactus minima, lanuginosa, spinis mitioribus, fructu sparsim egrediente, Phytogr. Tab. 29. fig. 2. Echinomelocactus minor, aculeis brevioribus, & densioribus in orbem positis, ex Hort. Fageliano, Schol. Botan. 33.

FICOIDES Africanum, Mesembrianthemum; s. Ficus Aizoides, frutescens, maxima, procumbens, fructu turbinato eduli, flore luteo. Ficus Aizoides Africana, major, procumbens triangulari folio, fructu maximo, eduli, Hort. Leyd. 244. Ficus Hottentottorum vulgò.

Ficoides Africanum Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides Africana major, procumbens folio triangulari ensiformi, H. Leyd.

Idem folio triangulari longissimo, & aliquomodo denticulato, H. Beaum. 17.

Ficoides Africanum Mesembrianthemum crassissimo, & valde succulento folio, nigris punctulis notato. Phyt. Tab. 325 fig. 4

Ficoides Africanum Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides frutescens, Media erecta, triangulari folio crasso, glauco, fructu turbinato, parvo, quinquangulari lignoso, flore luteo majore. Ficus Aizoides Africana minor erecta, folio triangulari glauco, flore luteo, Hort. Leyd. ubi optimè figuratur. Fi



- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides frutescens, floribus albis parvis umbellatis, *Phytogr. Tab. 117. fig. 1.* Mesembrianthemum *Africanum* frutescens minus, erectum triangularibus foliis, viridibus, cornuum Taurinorum in modum reflexis, fructu turbinato, parvo, pentagono lignescente, flore albo, *Breyn. Prodr. 2. 68.* Fortè Ficoides, s. Ficus Aizoides *Africana* minor erecta foliis tereti, floribus albis. *P B P. 334.*
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides frutescens, erecta partim, & procumbens, tenuiore folio, flore purpureo, Amaranthino majore. Ficus Aizoides *Africana* minor folio tereti, procumbens flore purpureo, *H. Leyd. 251.*
- Idem procumbens triangulari folio glauco minimo, veluti tuberculis exasperato, flore suave purpurascente, s. carneo minore, *Breyn. Prodr. 2.*
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides *Africana* minor erecta folio triangulo viridi, *Hort. Leyd.*
- Idem triangulari folio viridi, flore intus aureo, foris purpureo, *ejusd. H. Leyd.*
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides minus, maximè procumbens, teretifolio, viridi brevior; caulibus puniceis; flore purpureo. àn Mesembrianthemum *Africanum* tereti folio viridi brevior, insignitè repens, caulibus rubentibus, *Breyn. Prodr. 2. 69.*
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides teretifoliis, succosis, micis argenteis interspersis, flore carneo ex *Insulis Fortunatis*. Cosca *Insulanis* vulgò.
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, floribus ad geniculos albis, teretifoliis, succo glaciali turgidis. Mesembrianthemum teretifolium minimum *Neapolitanum*, flore albo, fructu subrotundo, quinquecapsulari, *Breyn. Prodr. 2. 69.* Kallifloridum repens, Aizoides *Neapolitanum*, *Fab. Column. ecphras. Part. 2. 72.* Kalli secundum, s. *Ægyptiacum* album, *Prosp. Alpin. de Pl. Ægypt. 125. J B. T. 3. l. 35. 705.* Ubi Kalli 3<sup>ii</sup> *Prosp. Alpini* figura per errorem appingitur. Kali Craf-fulæ minoris folio. *C B P. 289. Moris. Hist. 2. 610.*
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides *Africana* major, flore flavo, folio plano latiore, *H. Leyd. 252.* Mesembrianthemum *Africanum* latifolium majus, flore luteo, fructu orbiculari compresso multicapsulari, *Breyn. Prodr. 2. 69.* Chrysanthemum Aizoides *Africanum* primum, s. latifolium, *ejusd. Cent. 1. 160.*
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides *Africana* folio plano latiore minor multicaulis, flore intus rubentè, extus incarnato, *H. Leyd. 254.* Mesembrianthemum *Africanum* latifolium minus, s. foliis, Anchusæ, floribus ex roseo & argenteo colore variegatis, fructu orbiculari quinquecapsulari, *Breyn. Prodr. 2. 69.* Malè igitur in Icone *Hermannianâ* multicapsularis depingitur, ut animadvertit & ipse *Cl. Breyn.*
- Idem flore pallido, *H. Leyd. append. 670.*
- Ficoides** *Africanum* Mesembrianthemum, s. Ficus Aizoides *Africana* triangulari folio longissimo, fructu multicapsulari, flore luteo, major, *H. Leyd. 254.* Chrysanthemum similis Aizoides *Africana* major, triangulari folio, flore luteo majore, *Breyn. Prodr. 1<sup>o</sup>. p. 25.* Aster Aizoides, *Capitis Bon. Spei, Zanoni, Istor. Botan. c. 18. p. 35.*
- Idem minus, *H. Leyd. 255.* Mesembrianthemum *Africanum* triangulari folio longissimo, fructu multicapsulari flore luteo minus, *Breyn. Prodr. 2. 70.* Chrysanthemum Aizoides *Africanum*, triangulari folio, flore aureo, *ejusd. in Centur. 163.*



Hujus conspicitur quadruplici florum colore, luteo, carneo, purpureo & albo quarum postrema planta, inventu admodum rara est, ut ipse fatetur *Cl. Breynius*, qui in *Prodromo suo secundo*, has diversas species, aut saltem varietates fusius & distinctius, enumeravit, ut videsis, *pag. 67.* & in *Centuriâ, fol. 163.* Hoc genus Plantarum nunquam calescere videtur.

*Ficoides Africanum* Mesembrianthemum, teretifolium majus, flore luteo majore, *Breyn. Prodr. 2.* Chrysanthemum Aizoides *Africanum* secundum, s. teretifolium, *ejusd. in Centur. 161.* Chrysanthemo similis Aizoides *Africana* major secunda, s. teretifolia eidem, *Breyn. Prodr. 1. 26.*

**F I L I X.** Saxatilis non ramosa minima, *Raii Cat. Exterar.* Ubi dubium movet, An sit Dryopteris, *Dalechampii. J B. Phytogr. Tab. 89. fig. 2.*

Filix pumila Lonchitidis *Maranthæ* species *Cambrobritannica*; An Lonchitis aspera *Ilvensis, Hist. Lugd. Phytogr. Tab. 89. fig. 5.* Filicula Alpina Pedicularis rubræ foliis, subtus villosis, *Raii Synops. Stirp. Britan. 27.*

i/ Filicula crispa lanugine hepatici coloris vestita, ex *Insulis Fortunatis, Phytogr. Tab. 281. fig. 4.*

Filix Saxatilis omnium minima elegantissima. *HRP. Phytogr. Tab. 89. fig. 3.*

Filix Saxatilis pervenuista, foliis punctatis, s. Adiantum *Maderense* folio Filicis, caule tenui candicante, *Phytogr. Tab. 284. fig. 4.* àn Filix pulverulenta, pinnulis obtusè dentatis, *Plumier. Tab. 25.*

Filix Saxatilis *Canadensium* globulifera. Filix baccifera *Cornuti, de Pl. Canadens. p. 5.*

Filix Saxatilis caule tenui fragili, *Raii Synops. Stirp. Britan. 26.* Adiantum album folio Filicis. *J B. T. 3. lib. 37. 741.* Filicula fontana major, s. Adiantum album Filicis folio. *C B P. 358.* Dryopteris candida *Dodonæi, Hist. Lugd. 1227.* Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab. 180. fig. 5.*

Filicula fontana latiori folio ad imum solummodò ramosa, *Phytogr. Tab. 180. fig. 6.* àn Filicula fontana Adianthi facie latifolia, dentata, *Schol. Botan. 3.*

Filicula fontana Rutæ murariæ facie tenerifolia, *Phytogr. Tab. 181. fig. 1.* àn Filicula fontana minor. *C B P. 258.*

Filix arborea, s. Dryopteris *Tragi, Hist. Lugd. 1225.* Filicis genus parvum alterum, in montibus *Cæsalpini.* Filix querna. *C B P.* ubi plures & diversas confundit eo titulo plantas. Ut rectè animadvertit Frater *Joannes, Tom. 3. l. 37. 741.* Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab. 179. fig. 4.*

Filix Saxatilis Rutæ murariæ foliis *Americana, s. Adiantum album folio Filicis ex Insulâ Jamaicensi. Phytogr. Tab. 282. fig. 1.* Fortè Kalpanna Maravara, *H M. P. 12. Tab. 16. Vid. Suppe. pag. 400*

Filix *Americana* elegans, s. Adiantum Calomelanos folio Filicis *Americanum* majus, *Phytogr. Tab. 282. fig. 2.* Avenqua fortè *Lusitanis* major, *Marcgrav. Hist. Brasil.* àn Adiantum nigro simile, albissimo pulvere conspersum, *Plumier. Tab. 44.*

282/

Filix *Americana* non ramosa tenerior, pinnulis verè capillaceis, s. Filicis genus ex *Insulâ Jamaicensi* molliusculum foliis tenuissimè pennatis, *Phytogr. Tab. 89. fig. 3.* à D. *Sherard.* habuimus.

Filix *Jamaicensis* non ramosa, ex unâ radice cespitis instar contextâ, pediculis numerosis, foliis auriculatis profundius secta, *Phytogr. Tab. 283.* Filix



- Filix minor palustris, *Raii Hist. Pl.* 146. Dryopteris, *Lobel. Adversar.* Dryopteris, s. Filix [querna repens, *Park. Theatr.* 1041. Dryopteris, *Matthioli Hist. Lugd.* 1227.
- Filix palustris mas non ramosa, pinnulis obtusioribus planis, ex *Insulâ Bermudensi*, *Phytogr. Tab.* 243. fig. 6. Huc fortè spectat Filix non ramosa latiùs dentata major, *Plumier. Tab.* 17.
- Filix *Bermudensis* non ramosa, petræa, pinnulis acutioribus planis, hirsutis pubescentibus, *Phytogr. Tab.* 244. fig. 1. àn Filix non ramosa latiùs dentata minor, *Plumier. ibidem.*
- Filix *Jamaicensis* non ramosa maxima, foliis radici propioribus longiusculis, Centaurii majoris facie, tenuiùs & profundè laciniis ad ambitum undulatis incisa, *Phytogr. Tab.* 292. Huic multùm convenit Filix arborefcens latifolia aculeata, *Plumier. Tab.* 3.
- Filix pumila palustris, *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 284. fig. 1. *Vid. Suppl. p. 400*
- Filix *Virginiana* non ramosa, foliis planis partim, & dentatis, rachi medio apophysis foliaceis (plerùmque ex opposito) per intervalla elegantèr ad nexis, *Phytogr. Tab.* 284. fig. 2. àn Filix mas rachi, s. nervo medio alato, *D. Banister. Cat. Virginian. apud Raium.*
- Filix Saxatilis, foliis non ferratis. *C B P.* 358. Filix minor non ramosa. *J B. T.* 3. l. 37. 740. Filicis genus parvum primum in montibus *Casalpini*. *Hujus Icon. Phyt. Tab.* 179
- Filicis è *Chinâ* genus molle, auriculâ ad pinnulæ basim, supernè productâ, summo folio longiùs mucronato, *Phytogr. Tab.* 30. fig. 2.
- Filix mas vulgari similis, pinnulis amplioribus planis, nec crenatis, *Virginiana*, *Phytogr. Tab.* 179. fig. 2. *Hujus delineatio Viri longi celeberrimi omnique laude majoris, Sagacissimi Naturæ Mystes, & (dùm viveret) Botanici (apud Virginienses nostrates) consummatissimi, D. Joan. Banisteri manu propria, (ad vivum) accuratissimè exarata fuit, & in Angliam transmissa; Hujus equidem incomparabilis Viri è Vivis tristissimo casu excessum, candore & ingenio pollentes, rei Herbariæ cultores quotquot sunt, mecum meritissimè condoleant. àn Karibeli-panna Maravara, Hort. Malab. Part. 12. Tab. 17?*
- Filix mas non ramosa, pinnulis angustis rarioribus, profundè dentatis, *Ger. emac.* 1130. *Raii Hist. Plant.* 144. Filix mollis, s. glabra, vulgari mari non ramosæ accedens. *J B. T.* 3. l. 37. 738. *H. Leyd.* 257. non refragante *Raio Hist. app.* 1920. *Hujus Icon exhibetur, Phytogr. Tab.* 180. fig. 4.
- Filix *Staffordiensis* elegans, foliorum apicibus multiscissis, *Phytogr. Tab.* 284. fig. 3. Fortè precedentis tantùm varietas; à *D. Doody*, communicata. *Vid. Sup. p. 400.*
- Filix pumila Saxatilis altera, *Clusii Park. Phytogr. Tab.* 179. fig. 5. Filix non ramosa, nigris maculis punctata. *C B P.* 358. *Quiddam humani subit in hoc titulo. Vid. Sup. p. 400.*
- Filix mas aculeata nostras, alis expansis, muscosâ lanugine aspersa, *Phytogr. Tab.* 180. fig. 1. àn Filix aculeata major. *C B P.* 358. Filix *Lonchitidi* affinis. *J B. T.* 3. l. 37. 739. Fortè etiam Filix mas non ramosa pinnulis latis densis, minutim dentatis, *Ger. emac.* 1129.
- Filix *Africana* humilis spinosa, pinnulis latioribus minus patula. *H R H. Phytogr. Tab.* 180. fig. 2. *a/*
- Filix aculeata, *Lonchitidi* æmula nostras, *Phytogr. Tab.* 180. fig. 3.



- Filix mas non ramosa, pinnulis latis, auriculatis spinosis, Ger. *emac. Phytogr. Tab.* 179. fig. 6. Lonchitidi affinis Oxyacanthæ folio oblongo, valdè aculeato, D. Lhwyd.
- Filix parva *Cambrobritannica* pinnulis latis, auriculatis brevibus, aculeata, *Phytogr. Tab.* 89. fig. 6. Filix aculeata minor. C B P. 358. & in *Prodr.* 151.
- Filix parva *Virginiana*, pinnulis productioribus, subrotundis, asperis, ad basim utrinque auriculatis. *Phytogr. Tab.* 287. *Fig. 2. & Vid. Supp. p. 400*
- Filix Lonchitis aspera dicta. C B P. 159. Lonchitis aspera cum foliis denticulatis, s. Lonchitis altera *Matthioli*. J B. Tom. 3. lib. 37. 744.
- Filix, s. Lonchitis aspera *Jamaicensis* elatior pinnis longioribus utrinque auriculatis, subtùs punctatis, & obtusioribus denticellis spinosa.
- Filix, s. Lonchitis aspera *Jamaicensis* nostrati similis foliis tamèn longioribus, à latere tantùm superiori auriculatis, argutis per ambitum, & creberrimis denticellis spinosum. àn Lonchitis glabra minor, *Plumier*?
- Filix, s. Lonchitis aspera *Jamaicensis* pinnulâ latâ, brevi, angulosâ.
- Filix, s. Lonchitis aspera maxima *Indorum*, *Phytogr. Tab.* 30. fig. 4. Filix *Zeylanica*, Lonchitidis facie, *Breyn. Cent.* 1. 189.
- Filix, s. Lonchitis altera folio *Polypodii*. J B. T. 3. l. 37. 745. Lonchitis minor. C B P. 319.
- Filix, s. Lonchitis, *Jamaicensis* *Polypodii* folio pediculis nigris. *Polypodium* nigrum tenuiùs sectum, *Plumier. Tab.* 37.
- Filix minor, *Africana* Lonchitidis folio, pinnulis auriculatis planis, *Phytogr. Tab.* 89. fig. 7. Filix *Africana* minor, Lonchitidis facie. P B P. 335. Huic etiàm pariter ac nostrati, duo sunt foliorum genera.
- Filix *Virginiana* pinnulis oblongis angustis, auriculatis, tenuissimè crenatis, longè ab invicèm distantibus, non spinosa, *Phytogr. Tab.* 89. fig. 8. àn Filix mas foliis integris, auriculatis, *Barist. Cat. Virg.* apud *Raii Hist. app.*
- Filicula maritima ex *Insulis Caribæis*, s. *Adiantum* maritimum, segmentis longioribus, angustis, auriculatis & crenatis, pediculo atronitente, *Phytogr. Tab.* 286: fig. 1. proxime precedenti in plurimis convenit. *Vid. Supp. p. 400*
- Filix marina *Anglica*, *Park. Theatr.* 1045. Chamæfilix marina *Anglica*. J B. Tom. 3. Filicula maritima ex *Insulis Stæchadibus*. C B P. 358.
- Filicifolia Lonchitidis facie *Jamaicensis*, ad basin uniuscujusque pinnæ, binis auriculis obtusis donata, ambitu æquali, & aversâ parte, ferrugineis punctis duplici ordine notata, *Phytogr. Tab.* 286. fig. 2.
- Filicifolia non ramosa *Jamaicensis* pediculis nigris, pinnulis latis auriculatis falcatas, minutim dentatis, posticâ parte canescentibus glabris. *Adiantho Jamaicensi* Lonchitidis amplioribus folijs non ramoso, pediculo atronitente, hujus *Almagesti fol. 11.* in plurimis convenit, in quibusdam discrepat.
- Filix *Jamaicensis*, *Pastinacæ* aquaticæ foliis, alternis, crassiusculè dentatis, pediculo splendente nigro, *Phytogr. Tab.* 285. fig. 2. Hùc spectat Lonchitis *Americana* juxtà nervum pulverulenta *Plumier. Tab.* 29. quodammodò etiam convenit Lonchitis glabra major ejusd. *Plumier. Tab.* 27. Itèm Filix latifolia ramosa caudiculis nigris ejusd. *Tab.* 4.
- Filix *Jamaicensis* simpliciter pinnatis *Asplenij* foliis, aversâ parte, duplici serie punctorum



- etorum notatis *Phytogr. Tab. 290. fig. 1.* forte Filix non ramosa Scolopendrioides, Carol. Plumier. *Descript. des Plantes de L' Amerique. Tab. 11.*
- Filix *Jamaicensis* foliis semel subdivisis, pinnulis obtusioribus Costæ adnascentibus, Sorbi aucupariæ foliis quodammodò referentibus, *Phytogr. Tab. 291. fig. 1.* Tancapez ( fortè ) Nov. Hispan. Terentii apud Recc. 407. àn Filix non ramosa *Guyanensis* foliis Asplenij obtusioribus, Breyn. Cent. 1. 187? Huic convenit Filix latifolia, non ramosa rotundiùs crenata, Plumier. Tab. 10.
- Filix non ramosa *Jamaicensis* pediculo albicante, alis Marrubij aquatici ferè divisuris, quarum pinnulæ à tergo, lineâ candidissimâ, aspergine conflatâ, & per ambitum ductâ ornatae sunt. Filix non ramosa *Brasiliana* foliis Asplenii acutioribus, Breyn. Cent. 1. 187. Huic proximè accedit; Filix pinnulis Lonchitidis obtusis, non dentatis, ad oras pulverulentis, Plumier. Tab. 14. vid. *Phytogr. Tab. 290. fig. 2.*
- Filix Polypodium dicta minima, *Jamaicensis*, foliis aversâ parte, ferrugineo pulvere Asplenij ritu, circumquaque respersis, *Phytogr. Tab. 289. fig. 1.* àn Polypodium *Americanum* radice tenui, & repente, Plumier. Tab. 36.
- Filix Polypodium dicta minima *Virginiana* platyneuros, *Phytogr. Tab. 289. fig. 2.* àn Polypodium minus alterum Scolopendriæ facie, Banist. Cat. Mss.
- Filix, s. Polypodium tenuifolium minus, *Virginianum*, *Phytogr. Tab. 89. fig. 9.* Caticaa ( fortè ) s. Polypodium *Brasilense* Pisonis, lib. 4. fol. 233. *Fig. Supp. p. 400*
- Filix Polypodium dicta major serratis foliis *Virginiana*, *Phytogr. Tab. 287. fig. 1.* Polypodium *Virginianum* segmentis denticulatis.
- Filix, s. Polypodium *Jamaicense* latifolium, pinnis infimis auritis.
- Filix amplissima lobis foliorum laciniatis *Cambrica*, *Phytogr. Tab. 30. fig. 1.* Polypodium *Cambrobritannicum* pinnulis ad margines laciniatis, Raii Hist. Pl. 137.
- Filix, s. Polypodium *Indianum*, foliis profundè sinuosis, Marrubij aquatici æmulis, *Phytogr. Tab. 30. fig. 3.* àn Filix *Indica* Osmundæ facie, Bod. à Stapel. in Theophrast. Histor. 320. Sim. Pauli Quadripart. Botan. 302.
- Filix *Africana* maxima, Polypodij facie. P B P. *Phytogr. Tab. 179. fig. 1.* Fortè etiàm Filix *Africana* lobis profundè incis, & mucronatis, ejusd. P B P. inter Addenda.
- Filix, s. Polypodium *Jamaicense* Hydrophylli Morino ferè divisuris, summo folio raris denticulis profundius crenato, *Phytogr. Tab. 289. fig. 3.* Tuzpatli ( fortè ) *Mexicensibus* Hernand. apud Recc. lib. 5. 147. s. Planta Cœsia, Fab. Column. apud eund. Recc. 873.
- Filix *Jamaicensis*, s. Polypodium Cicutariæ latifoliæ foetidiss. foliis quodammodò conveniens, pinnulis amplis mucronatis, circa margines ferris latiusculis profundè sinuosis, *Phytogr. Tab. 289. fig. 4.*
- Filix non ramosa, pediculo hirsuto, Coriandri foliis *Americana*, *Phytogr. Tab. 284. fig. 5.*
- Filix *Jamaicensis* pinnatis Fraxini foliis tenuissimè crenatis, apicibus mucronatis, *Phytogr. Tab. 286. fig. 3.*
- Eadem foliorum apicibus obtusis, & subrotundis, *Phytogr. Tab. 286. fig. 4.* Huic in quamplurimis convenire videtur, Filix scandens latifolia, ferrata, Plumier. Tab. 12. at nostra neque scandit, neque aculeis asperatur; huc fortè spectat Embuayembo *Brasilensibus* Marcgr. lib. 1. cap. 13. Lusitanis corruptâ voce Occoembo. Lingua Cervina caulifera *Brasiliana*, Raii Hist. Pl. 1346.



Filix *Jamaicensis* alato pediculo Fraxinellæ foliis crenatis, radice repente, *Phytogr. Tab. 287. fig. 3.* Lonchitis hirsuta florida *Plumier.* ab hujus foliorum similitudine haud multum abludit.

Filix non ramosa *Jamaicensis* pinnatis foliis integris, serratis, ad basin apophysi parvodonatis, subtus duplici ordine punctorum ferrugineorum agminatim insignitis, *Phytogr. Tab. 285. fig. 1.* an Filix non ramosa foliis integris serratis *Zeylanica, Breyn. Cent. 1. 188.* Phyllitis fortè ramosa, *Pr. Alpin. exot. 67.* Quæ ab Hemionitide *Iluensi Dalechamp. (i. e.)* multifido folio *Parkinson.* plurimum diversa est (licet aliter sentit Eruditiss. *Raius*, ideoque distinctionis gratiâ potiori jure hæc dici possit; Filicifolia, s. Hemionitis Osmundæ regalis folio furculoso. Istæ verò proximè accedere videtur Filix latifolia non ramosa foliis Gladiformibus serratis, *Carol. Plumier. Descript. des Plantes de L' Amerique, f. 10. Tab. 15.*

Filicifolia, s. Phyllitis ramosa *Americana* biformis. Filix altera longissimis angustis, & ad basin foliosis foliis, *Plumier. Tab. 19.*

Filicifolia Hemionitis multifida *Americana* non crenata. Lonchitis ramosa limbo pulverulento, *Plumier. Tab. 30.*

Filix *Jamaicensis* Jaceæ majoris *Gerard.* aut potius Centaurij majoris lutei *Parkinson.* æmula, falcatis foliis integris, & margine æquali, *Phytogr. Tab. 288. fig. 1.*

Filix simpliciter pinnatis foliis, s. Phyllitis ramosa *Jamaicensis* maxima, aversâ parte, ferrugineâ lanugine circumquaque obducta, *Phytogr. Tab. 288. fig. 2.* Phyllitis *India Orientalis, Bontij. lib. 6. cap. 34.* Filix non ramosa, foliis integris, non serratis, maxima, *India Orient. Breyn. Cent. 1. 189.* Filix palustris aurea foliis Linguae Cervinæ; Hamamaligra *Caribeis Plumier. Tab. 7.* Scolopendrium *Terterii des Antilles, Traite troisieme, cap. 1. paragr. 3.*

Filicifolia Hemionitidi affinis *Americana* epiphyllanthos, folio simpliciter pinnato, radice reptatrice, carnosa, ad foliorum crenas florida, *Phytogr. Tab. 36. fig. 7.* Ad hoc genus Plantarum spectat Nella panna-maravara, *H. Malab. Part. 12. Tab. 28.*

Eadem angustiori & longiori folio, ramosa, caulescens, *Phytogr. Tab. 247. fig. 4.* Conambaya (fortè) *Brasilensibus, Marcgr. fol. 79. quoad Iconem.* Phyllanthos *Americana* frutex, flores è singulis foliorum crenis proferens. *P B P. Hort. Beaumont. 34.* Hippoglossa fortè cognata *Surinamensis*, foliis Oleandri serratis, in crenarum extremo flosculos perminutos sanguineos gerentibus; vel fortè Hemionitidi affinis, *Breyn. Prodr. 2. 57.*

Filix *Jamaicensis* amplissimo folio, Phyllitidis facie triphylla. Polypodium *Indicum* Scolopendriæ facie secundum, *Breyn. Cent. 1. 191*

Filicifolia Phyllitis dicta, s. Lingua cervina maxima undulato folio, auriculato per basin. *HRP. 148.* an Phyllitis crispa. *JB. T. 3. l. 37. 757. Phytogr. Tab. 248. fig. 7.*

Filicifolia Phyllitis, s. Lingua cervina minor crispa, folio multifido ramosa, *Phytogr. Tab. 248. fig. 2.* Lingua cervina minor crispa, uno pediculo trifolia. *HRP. 148.*

Filicifolia Phyllitis, parva Saxatilis *Virginiana* per summitates foliorum radicata, *Phytogr. Tab. 105. fig. 3.* Herba de raiz. Hujus folium Phyllitidis ramosæ *Alpini* folium particulare quodammodo assimulat, & huic fortè illa proximè cognata est, alterius ramificationis defectum, alteri per admirabile propagandi modum (& sibi fere peculiarem) suppeditante beneficâ Naturâ.

Eadem breviori, & latiore folio; ex Insulâ *Jamaicensi.*

Filicifolia



- Filicifolia Hemionitis pumila*, foliis integris, trifidis, & quinquifidis varia, *Cambrobritannica*, *Phytogr. Tab. 36. fig. 6.* *Hemionitis pumila trifolia*, vel *quinquefolia maritima*, *D. Llwyd. Raii Synops. 26.*
- Filix*, s. *Hemionitis dicta India Orientalis*, Phagi, s. *Esculi folio aliquatenus accedens*, *Phytogr. Tab. 36. fig. 5.* àn *Hemionitis multifida Zeylanica*, costâ sagittatâ, s. *Filix foliis integris*, *Zeylanica pediculo alato*, *Breyn. Prodr. 2. 55.* *Phyllitis* fortè *Virginiana foliis Quernis non descripta*, *Viridar. Leyd. Raii Hist. Pl. 135.*
- Filix*, s. *Hemionitis dicta Caribeorum amplissimis foliis trifoliata*, *Phytogr. Tab. 291. fig. 3.* *Hemionitis maxima trifolia*, *Plumier. Tab. 32.*
- Filix Hemionitis dicta Saniculæ foliis villosa*, *Phytogr. Tab. 291. fig. 4.* *Hemionitis aurea hirsuta*, *Plumier. Tab. 33.* ex *Insulâ Jamaicensi* allata est.
- Filix Hemionitis Americana speciosa*, folio *Securis Romane* figuram æmulante, *Phytogr. Tab. 36. fig. 4.* *Hemionitis parva Antegoana folio Platani* ferè in modum diviso, *Raii Hist. Pl. app.* ab honestissimo Viro, *D. Georgio Horsnel*, ex *Antego Insulâ* in Patriam reduce, nos accepimus.
- Filix Hemionitis Americana Petroselinii foliis profundè laciniatis*, *Phytogr. Tab. 286. fig. 5.* Huic est haud multùm impar *Hemionitis profundè laciniata*, ad oras pulverulenta, *Caroli Plumier. Tab. 34.*
- Filix Hemionitis Jamaicensis foliis Geranii Rupertiani* quodammodò æmulis.
- Filix Hemionitis dicta, Maderensis Hederæ arboreæ aliquatenus æmula*, s. foliorum basi auriculis binis, utrinque donato, *Phytogr. Tab. 287. fig. 4.* Ad *Hemionitidem peregrinam Clusii* accedit, Quæ non Naturæ lusus, sed *Hemionitidis* peregrinæ elegantia, & re verâ species distincta, nobis esse videtur, quicquid repugnat *Excellentiss. D. Rains Hist. Pl. 135.*
- Filix Hemionitis dicta Maderensis pediculis splendentibus nigris, crenatis foliis Asari rotundioribus crenarum segmentis oblongo quadratis, ob seminâ adnascencia per ambitum circumcircâ reflexis.* *Phyt. Tab. 287 fig. 5*
- Filix Hemionitis Lichenoides Americana Fungi auricularis Cæsalpini æmula*, radice reptatrice, *Phytogr. Tab. 285. fig. 3.* *Adiantum muscosum Lichenis petræi facie*, *Plumier. Tab. 50.*
- Filix Alpina Myrrhidis facie*, *Cambrobritannica*, *Phytogr. Tab. 89. fig. 4.* *Filix montana ramosa minor, argutè denticulata*, *Raii Synops. Stirp. Britan. 27.*
- Filix mas ramosa pinnulis dentatis*, *Ger. emac. Phytogr. Tab. 181. fig. 2.*
- Filix Bermudensis elegans ramosa, pinnis rarioribus profundè dentatis, speluncâ rupium innascens, cauliculis muscosâ lanugine obductis*, *Phytogr. Tab. 244. fig. 2.*
- Filix Jamaicensis ramosa, pediculis muscosis, pinnulis rarioribus dentatis*, *Phytogr. Tab. 294.* *Filix villosa minor, pinnulis profundè dentatis*, *Plumier. Descript. Plantar. Americ. Tab. 24.* à precedenti haud multùm discrepat.
- Filix Saxatilis ramosa maritima nostras*, *Raii Hist. Pl. 151.* *Filix Orubica ramosa*. *P B P. append. Hort. Reg. Hampton. alumna est.*
- Filix ramosa Jamaicensis expansalis Cicutariam palustrem, latifoliam albam, quodammodò mentientibus*, *Phytogr. Tab. 295.* *Singulare illud quod in alis, s. ramulis infimis, surculi ad alæ costam inferiores, oppositis longiores sunt, præsertim scapo proximi, notabili differentiâ; & quod pro quodam peculiari, Filici suæ montanæ ramosæ minori, argutè denticulatæ; à celeberr. nostro Raio adhibetur, his omnibus commune est. Ut ex Iconibus patet.*



- Filix exoitca prælongis, & angustis ramulis, denticulata, *Phytogr. Tab. 181. fig. 3.*
- Filix *Jamaicensis* prælongis, & angustis alis Filipendulæ accedentibus, pediculo senticoso rubente, *Phytogr. 293.* Huc fortè spectat Filix arborefcens, pinnulis dentatis, *Plumier. Tab. 1, & 2. Sed in nostrâ pediculi sunt aculeati.*
- Filix Saxatilis ramosa major, *Phytogr. Tab. 182. fig. 2. ex Horto Patavino inter Collectaneas suas, ostendit nobis, Clariff. Vir. D. D. More, annis & scientiâ gravis.*
- Filix mas *Jamaicensis* ramosa, pinnulis obtusis crenatis mediæ costæ alternatim appensis, averfa parte, pulvisculo fusco, aspersis, *Phytogr. Tab. 296. fig. 1.*
- Filix ramosa *Jamaicensis* Apij degeneris foliis dissectis longis, (*Morisono*) facie externâ, *Phytogr. Tab. 296. fig. 2.*
- Filix ramosa *Canariensis* Rutæ murariæ pinnulis angustis, altiùs incis, mediæ costæ alternatim alligatis, *Phytogr. Tab. 291. fig. 2.* Hujus folium totale, (circumscriptione) est ferè triangulatum.
- Filix ramosa *Jamaicensis* Fumariæ foliis, pediculis & rachi medio aculeatis. Eadem non spinosa, lævis.
- Filix *Jamaicensis* dichotomos, s. ramis bifidis, foemina nostratis pinnulis, ramossissima.
- Filix foemina ramossissima *Jamaicensis* pinnulâ alas claudente longissimâ. Eadem pinnis angustioribus.
- Filix ramosa procerior lacunis adnascens platyphyllos, ex Insulâ *Bermudensi*, *Phytogr. Tab. 244. fig. 3.* àn *Lonchitis* maxima, foliis planis (i. e.) non dentatis, nec pulverulentis maculis, notatis, uno in cespite foliorum unicum protrudens caulem, foliis angustioribus, pulverem, s. semina in membranulis, quasi in capsulis ferentibus compositum, apud *Adversar. Banisterian. post obitum visa.*
- Filix *Virginiana* non dentata florida, foliis alternis, & in summo caule feminibus occultatis, *Phytogr. Tab. 181.* Huc fortè spectat Filix ramosa, pinnulis longiusculis, partim auriculatis, *Carol. Plumier. Tab. 22.*
- Filix *Africana* Floridæ similis, in ambitu foliorum argutè denticulata, *Phytogr. Tab. 181. fig. 5.* àn Filix *Africana* vel *Monomotapensis*, ramosa, foemina, *Hort. Beaum. ab amico nostro D. Patricio Adaire, communicata.*
- Filix *Acaciæ* cornigeræ foliis peregrina, *Phytogr. Tab. 182. fig. 3.* Nobis communicavit Amicus noster integerrimus, Dr. *Tancredus Robinson.*
- Filix scandens *Adiantho Narbonensi* similis *Jamaicensis.*
- Filix scandens perpulchra *Brasiliana*, *Breyn. Cent. 1. 185.*
- Filix Sarmetosa, foliis variis, imis longioribus denticulatis, superioribus, rotundis planis ex Insulâ *Jamaica.*
- Filix *Americana* scandens, *Parietariæ* foliis, ex Insulâ *Jamaicensi.*
- Filix scandens *Periplocæ* foliis *Jamaicensis.*
- Filix scanfalis ex Insulâ *Jamaica* *Salicis* folio, ad costam, *Aurantia* instar, auriculis cavis donato.
- Filix scandens, *Potamogeti* majoris facie *Jamaicensis.*
- Filix sarmentosa bifrons, s. *Bryopteris* scandens *Jamaicensis* inter Filicem & *Lycopodium* media, *Phytogr. Tab. 290. fig. 3,* *Phyllitis* scandens cauliculis squamosis, *Plumier. Tab. 42.*



FOENICULUM vulgare *Germanicum*. CBP. 147. Fœniculum vulgare minus, acriori & nigriori semine. J B. T. 3. l. 27. 2.

Fœniculum vulgare *Italicum*, semine oblongo, gustu acuto. C B P. itèm.

Fœniculum sylvestre. CBP. ibidem; à priori vulgari non aliter differunt quàm accidentibus à loco & culturâ ortis, ut recte animadvertit Raius noster Hist. Pl. 457.

Fœniculum dulce, Park. C B P. Fœniculum vulgari simile, dulce. J B. T. 3. l. 27. 4. Itèm Fœniculum dulce majori & albo semine, ejusd. ibid.

Fœniculum dulce *Azoricum*; à communi dulci differt radiorum umbellæ magnitudine, & longitudine, umbellâ concavâ, feminibus grandioribus.

FOENUM-GRÆCUM fativum. CBP. 348. Hist. Lugd. 480.

Fœnum-græcum sylvestre. C B P. ibid. Fœnum græcum sylvestre *Dalechampii*, Hist. Lugd. 481. J B. T. 2. l. 17. 365. Fœnumgræcum sylvestre *μονοκέρατον* filiquâ brevior & latior, Moris. Hist. 2. 166.

Fœnumgræcum *διμέρατον* inodorum *Indicum*, flore parvo candidissimo.

Fœnumgræcum sylvestre alterum, polyceration. CBP. Fœnumgræcum sylvestre alterum *Dodonæi*, Hist. Lugd. 481. Fœnumgræcum sylvestre *πολυκέρατον* majus, filiquis pluribus longis, Moris. Hist. 2. 166. Fœnumgræcum sylvestre polyceration majus *Creticum*, Breyn. Cent. 1. 79.

Fœnumgræcum sylvestre minus, polyceraton, filiquis plurimis ad singula genicula, caulem ambientibus. Fœnumgræcum sylvestre *πολυκέρατον* minimum, filiquis multis curtis, Moris. Hist. 2. ibid. Hedyfarum minimum *Dalechampii*, Hist. Lugd. 446. Securidacæ genus triphyllon. J B. T. 2. l. 17. 373. Coronopus ex libro nostro, Bod. a Stapel. Not. in Theophrast. 831. Ex hac & proxime præcedenti, dum unam & eandem plantam constituere vult Excellentiss. Casparus Bauhinus, confundit duas omnino diversas Plantarum species.

Fœnumgræcum *Phaseolodes Virginianum* flore amplo cæruleo, Phytogr. Tab. 90. fig. 1. Securidaca trifolia, flore patulo cæruleo, radice Glycyrrhizæ sapore, Banist. Cat. Mss. Huc forte spectat Planta leguminosa *Brasiliana*, Phaseoli facie flore purpureo maximo, Breyn. Cent. 1. 78.

Fœnugraci flore, Parietariæ foliis, *Americana* Planta. P B P. vid. Anonymos.

FOLIUM *Indum Acoftæ*, Cadegi Indi (i. e.) Folium *Indum Arabib.* C B P. *Tamalapatra* ex quâ voce corruptâ *Malabathrum Garcie Clus.* vid. *Cassia Cinamomea*.

FRANGULA *Matthioli*, Hort. Leyd. 260. Alnus nigra baccifera. C B P. 428. J B. T. 1. l. 5. 560. Frangula, s. Alnus nigra baccifera, Park. Th.

Frangula, s. Alnus nigra, rotundior folio *Narbonensis*, Schol. Botan. 280.

Frangula minima rupestris, Pruno sylvestri affinis *Americani* folio. Alnus (fortè) nigra pumila, in *Broccenbergi* vertice *Thalij Harcyn.* *Saxonothing.* 15. Alnus, s. Frangula Alpina Saxatilis minima, Schol. Botan. 6.

FRAXINELLA, s. Dictamnus albus vulgò. C B P. 222. Fraxinella *Officinis* Dictamnus. J B. T. 3. l. 30. 494.

Eadem elatior, oblongiore spicâ saturatiore, foliis nigricantibus. CBP. ibid.

Eadem



Eadem humilior, læviore spicâ, flore & foliis dilutioribus purpureis. *C B P. ibid.*

Fraxinella minor purpurea, *Belgarum H R P. 72.*

Fraxinella niveo flore, *Clusii Hist. rarior Plantar. lib. 1. 100.*

**FRAXINUS** excelsior. *C B P. 416.* Fraxinus vulgatiore. *J B. T. 1. l. 8. 174.*

Fraxinus tenuiore & minore folio. *J B. ibid.* Fraxinus humilior, s. altera *Theophr. minore & tenuiore folio. C B P. ibid.*

Fraxinus *Americana* florida, *Raii Hist. Pl. 1704,* Fraxinus florifera botryoides, *Morif. Prælud. Botan. 265.*

Fraxinus *Alepenfis*, *H. Leyd. Phytogr. Tab. 182. fig. 4.* Fraxinus rotundiore folio. *C B P. J B. Ornus Galli Pressani, lib. de re Rusticâ. Mannæ arbor vulgò.*

**FRITILLARIA** præcox purpurea variegata. *C B P. 64.* Meleagris, s.

Fritillaria saturatior, & dilutior. *J B. T. 2. l. 19. 681.* Fritillaria vulgaris *Park.*

Fritillaria flore magno pleno. *C B P. 64. Morif. Hist. 2. 403.*

Fritillaria ramosa. *C B P. ibid.*

Fritillaria alba præcox. *C B P.* Fritillaria albo flore, *Clus. app. alt. & Auctuar. & Cur. Posterior.*

Fritillaria alba variegata. *C B P.*

Fritillaria angustifolia lutea, variegata magno flore. *CBP. Morif. 2. 403.*

Fritillaria ferotina, atro-purpurea. *CBP.* Xantonica ferotina, *Lob. Adver. Part. 2.*

Eadem flore multiplici. àn Fritillaria minor polyanthos colore atropurpureo *Swertii* fol. 7?

Fritillaria umbellifera. *C B P.* Fritillaria *Hispanica* umbellifera *Park.*

Fritillaria ferotina, floribus ex flavo-virentibus. *C B P.* itèm Fritillaria flore minore, *ejusd. ibid.* ex sententiâ *Raii Hist. Pl. 1148.* Meleagris, s. Fritillaria *Aquitonica* reflexis oris. *J B. T. 2. l. 19. 683.* Itèm Meleagris, s. Fritillaria *Pyrenæa* flore minore *ejusd. ex mente Raii ibidem.* Fritillaria *Pyrenæa*, s. *Apenninæa* *Park.* Fritillaria *Aquitonica* minor, flore luteo obsoleto, *Ger. emac. à Swertio pingitur. Tab. 7. Frog-Fritillarie Nostratibus dicta*

Eadem flore pleno. *H R P. 72. H. Leyd. 260.*

**FRUMENTUM** *Indicum* Mays dictum. *C B P. 25.* Triticum *Peruvianum* album longum. *J B. Tom. 2. lib. 18. 454.* Tlaolli, s. Maizio *Hernand. Hist. Mexic. 242.*

Idem granis rufescentibus. *C B P. 26.* Xochopalcentli *Nov. Hispaniæ Terent. apud Rescum, 439*

Idem granis crocantibus. *C B P. 26.*

Idem granis cæruleis. *H R P. 73. Amethistinis. Yyanh-centli, Nov. Hispan. Terentij apud Recc. 448.*

Idem granis ex albido & coccineo variegatis.

Frumentum *Indicum* Mays dictum minus. *C B P.* Frumentum *Indicum* Mays dictum alterum. *J B. T. 2. l. 18. 455. præcedenti multo humilior est.*

**FRUTEX** *Cormandeliensis* baccifer Mali Granatæ foliis amplioribus, *Phytogr. Tab. 29. fig. 5.*

Fru-



Frutex baccifer Prunifolius non ferratus, è *Maderaspatan*. *Phytogr. Tab. 183. fig. 3.*

Frutex baccifer è *Cormandel* Rorismarini obtusis & veluti punctatis foliis plurimis ex uno tuberculo convenientibus, *Phytogr. Tab. 31. fig. 1.* vid. *Raii Hist. Pl. fol. 1801.* àn *Vitis Idææ species Indiæ Orientalis.*

Frutex *Indicus* Lavendulæ folio, *Cormandelienfis.*

Frutex *Maderaspatanus*, Hyperici frutescentis facie; cortice cinerco, *Phytogr. Tab. 183. fig. 2.* àn Frutex *Guineensis* Hyperici (arborecentis dicti) foliis majoribus, *H. Beaumont. 22.*

Frutex *Guineensis* Zyzzyphi foliis, levitè ferratis, & odoratis, *H. Beaumont. Phytogr. Tab. 182. fig. 5.*

Fruticulus incognitus Polygoni foliis ex Insulâ *Jamaicensi.*

Fruticulus capsularis hexapetalos, *Cassæ Poetarum* foliis, è *Maderaspatan*. *Phytogr. Tab. 183. fig. 4.* Frutex baccifer foliis Lini vel *Cassæ Poeticæ Maderaspatensis, ejusd. Phytogr. Tab. 31. fig. 2.* àn *Euonymo* affinis alatis foliis alternis, pericarpio in sex loculamenta diviso. Fortè *Niruri* vel *Nirpulla*, *Hort. Malab. Part. 10.* Huc etiam spectat Frutex *Indicus* baccifer *Vitis Idææ secundæ, Clusii* foliis, *Breyn. Cent. 1. fol. 8.* àn *Hujus* affinis sit *Costic-Xihuitl*, *Nov. Hispaniæ Terentij* apud *Hernand. lib. 8. fol. 303.*

Idem foliis brevioribus, subrotundis, & densius stipatis, *Phytogr. Tab. 183. fig. 5.* in *Hort. Regio Hampton.* è semine natus est. *Kirganeli* (fortè) *H. Malab. Part. 10.*

Idem brevioribus foliis & angustis, *Phytogr. Tab. 183. fig. 6.* ex *Plantis siccis de Boissanis* utrumque excerpimus. àn *Tsjeru-Kirganeli*, *H. Malab. Part. 10. Vid. Supp. p. 400.*

Fruticulus *Americanus*, cordatis foliis pentapetaloides, radice lignosâ, *Phytogr. Tab. 115. fig. 6.*

Frutex *Virginianus* trifolius *Ulmi Samarris Banisteri.*

Frutex *Africanus* ambram spirans, *Phytogr. Tab. 183. fig. 1.* in *Horto Comptoniano* ex seminibus oritur; & in *Codice Comptoniano* depingitur. *Vide Supp. p. 400.*

Frutex cineraceus muscosus, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Cent. 1. 24.* *Tamarisci, s. Myricæ* (fortè) genus *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab. 297. fig. 1. Vide Supp. p. 400.*

Frutex *Æthiopicus* Conifer, foliis *Cneori*, *Salici æmulus*, *Breyn. Cent. 1. 21. species major.*

Frutex *Æthiopicus* Conifer, fructu parvo sparsim inter folia *Rusci*, seminibus cylindraceis, *Phytogr. Tab. 297. fig. 2.* à *Dno Alexandro Brown* habuimus.

Frutex *Æthiopicus* leguminosus, foliis *Rusci* majoribus, in ambitu spinulis fimbriatis. Planta leguminosa *Æthiopica* foliis *Rusci*, *Breyn. Cent. 1. 68.*

Frutex *Æthiopicus* foliis *Rusci*, floribus papilionaceis, sericeâ lanugine fuscâ villosis. Fortè de *Genistarum* genere *Æthiopico*, *Phytogr. Tab. 297. fig. 3.*

Idem angusto & minore folio, *Phytogr. Tab. 297. fig. 4.* àn Planta foliis *Rusci* minoribus, *Breyn. Fascic. Rarior. 25.*

Fruticulus *Indicus* Fabaginis folio minore, cauliculo spinulis longuidioribus armato.

Fruticulus *Virginianus* Corni foliis, floribus albis fistulosis, racematim in spicam congestis, *D. Banister.*

Frutex *Gangeticus* Alaterni folio, spinosus, *Phytogr. Tab. 29. fig. 6.* Frutex aculeatus *Orientalis*, *Ilicis* folio, noster, *Raii Hist. Plantar. 1801.*

Frutex *Bisnagaricus* spinosus, *Coryli* foliis densis, spinis brevioribus crassis, *Phytogr. Tab. 29. fig. 7.*



*Frutex Capensis* baccifer spinosus, foliis pennas avium referentibus, *Phytogr. Tab. 184. fig. 1.* Fortè Arbor spinosa ex Javâ undè Cate, s. Lycium exprimitur *Bontij, Hist. Ind. Orient. lib. 6. cap. 3.* àn Uty *Brasilensibus* Arbor *Marcgr. Hist. Brasilens. Plantar. 120.* Lycium foliis Ericæ. *CBP. 479.* Lycium Ericæ foliis, s. Cate *Garcia, Indis* Hacchic, & Lignum sempervivum *Jonston. Dendrogr. 268. Garc. Hist. Arom. lib. 1. cap. 10.* *Wormij* Cate, Massa fuit quædam purpurea, Cui sub titulo Gummi Categu ab *Herfurto* donatum *Worm. in Museo, cap. 34. fol. 225.* Hujus (fortè) Arboris succus inspissatus; Terra *Japonica*, & *Catechu Officinarum nostratum*, illius nomine, extractum ipsum prout ad nos adfertur; hujus autem appellatione, Compositum quiddam ex Extracto, aliisque Ingredientibus adjectis, intelligentes, ut Vir in Medicamentorum Simplificum cognitione versatissimus, *Daleus* noster nupèr observavit, *Pharmacol. 388.*

*Frutex Coralloides marinus Virginienfis*, *D. Banister. Phytogr. Tab. 244. fig. 4.* àn *Coralloides fruticosa*, Planta marina rectior. *J B. Tom. 3. lib. 39. 806.*

**FUCUS** fœniculaceus colore livido nobis *Raii Synopsis. append. Phytogr. Tab. 47. fig. 13.* *Coralloides lenta fœniculacea, J B. T. 3. l. 39. 797.*

*Fucus trichôdes nostras aurei coloris*, ramulorum apicibus furcatis, *Phytogr. Tab. 184. fig. 2.* àn *Coralloides tenuifolia obsequiosa minima. J B. T. 3.*

*Idem foliis argenteis.*

*Fucus parvus segmentis prælongis, teretibus acutis, Raii Synopsis. 4.*

*Fucus parvus plurimis ab eâdem radice cauliculis, segmentis teretibus, in summo apice bifidis vel trifidis.*

*Fucus Kali Arabum* divisurâ, angulis ad divaricationes rotundiusculis. àn *Fucus Kali geniculato nonnihil similis, non tamen geniculatus, Raii Hist. Pl. 72?*

*Fucus, s. Alga exigua dichotomos arenacei coloris, Raii Synopsis. 3.*

*Fucus fistulosus nudus, setas erinaceas æmulans.*

*Fucus chordam referens teres, prælongus, Raii Synopsis. 5.*

*Fucus Indicus* teres, setam piscatoriam referens, longissimus, *Phytogr. Tab. 184. fig. 3.* Gramen (fortè) sparteum, setas equinas referens, ex quibus *Javanenses* tapetia texunt. *CB Prodr. 11.* Cujus (fortè) mentio fit in *Clus. Cur. Posterioribus.* Sub Herbâ *Sparto Hispanico* non absimili, ut sentit idem *Bauhinus* ubi supra. Itèm *Toncon* herba apud *Brasilianos* quâ ad piscandum utuntur, *Lerij Descript. Brasil. cap. 11.* *Spinas in hamorum modum componunt, lineamque Herbâ illâ conficiunt. CBP. 360.* àn Filum maritimum *Germanicum*, quod ex Mari *Baltico* accepit, *Casp. Bauhinus Prodr. 155.* de hujus sit genere. inquirendum est.

*Fucus foliis Ericæ, Raii Hist. Pl. 73.* *Erica marina quibusdam. J B. T. 3. l. 39. 799.* *Tamarisco similis maritima. CBP. 365.* Ex sententiâ *Fratri.*

*Fucus, s. Frutex marinus Ericæ facie, Clus. Exot. lib. 6. cap. 5.* *Ericæ similis maritima. CBP. 365.* *Ericæ facie Frutex marinus. J B. T. 3. l. 39. 807.*

*Fucus Cupressinus Imperati.* *Fucus Cupresso similis. CBP. 365.*

*Fucus folliculaceus foliis Abrotani. CBP. 365.* *Fucus marinus tenuifolius, Tabernæmont. Icon. 812.* *Musculus marinus Abrotonoides, Park. Theatr. Cremenei Istri Abrotoni vel Thymi foliis. J B. T. 3. l. 39. 798.*



- Fucus folliculaceus serrato folio.* *C B P.* Lenticula marina ferratis foliis *Lobellii, Hist. Lugd. Sargazo Acostæ Linschot. Part. 3. Ind. Orient. Cap. 4, 5, 8. & Part. 4. Fig. 10. Sargazo Hispanorum Pisonis, 266.* Hujus est altera varietas latiori folio profundius serrato. *Fucus* (fortè) maritimus bacciferus. *C B P.* Herba mari innatans, foliis rutaceis, baccis Juniperinis similibus; Mare ita herbidum efficiens, ut pratium referret, *Lerio Descript. Brasil. c. 20.*
- Fucus folliculaceus Linariæ folio* *C B P.* Lenticula marina *Serapionis*, & Uva marina quorundam *Lobelij, Hist. Lugd. Acinariæ marinæ altera species Imperati, lib. 27. fol. 644.*
- Fucus folliculaceus folio non dentato, racemosus ex Guineâ.* àn *Fucus racemosus*, vel racemus marinus. *C B P.* *Acinaria marina prima, Imperati ibid. à proximo præcedenti parùm discrepat.*
- Fucus maritimus*, vel *Quercus maritima* Vesiculas habens. *C B P. 365. Quercus marina, Clus. Hist. 1. 21.* hujus est varietas minor.
- Fucus maritimus nostras, foliis in modum spiræ convolutis.* In litoribus nostris *Orientalibus* satis frequens invenitur.
- Fucus, s. Alga spiralis maritima Bocconi de Pl. Sicul. 70.* à nostrate plurimum diversa est.
- Fucus minor segmentis angustioribus, vesiculis in summitate bipartitò & tripartitò divisis.* *Fucus, s. Alga vesicaria minor polyspermos.* *Fucus maritimus*, vel *Quercus maritima*, foliorum extremis tumidis, quam aliqui glandiferam vocant. *C B P. 365.* Qui unâ in figurâ Hanc cum priore antepenultimo, à *Lobelio, Tabernamontano, & Clusio in Histor.* exprimi, rectè animadvertit. *In litore ad Æstuarium Sabrinianum inter alia maris rejectamenta jampridem invenimus.*
- Fucus maritimus nodosus.* *C B P.* *Fucus, s. Alga marina angustifolia vesiculas habens, Raii Synops. p. 2.*
- Fucus maritimus medio caule ad intervalla nodosus, flagellis plurimis è latere confertim prodeuntibus, folliculo bullato terminatis.*
- Idem flagellis singularibus imâ parte barbatis, & in summo vesiculis bullatis donatis.* àn *Fucus maritimus foliis tumidis barbatis.* *C B. Pin. 365. & Prodr. 154.*
- Fucus angustifolius, vesiculis longis filiquarum æmulis Raii Hist. Pl. 73.*
- Fucus angustifolius, foliis dentatis, Raii Synops. p. 2.* *Fucus tenuifolius, foliis dentatis, ejusd. Hist. Pl. fol. 71.*
- Fucus, s. Alga latifolia major dentata, Raii Hist. Pl. & Synops. ibid.*
- Fucus maritimus caulescens foliis crispis subrotundis, in summitate bifidis.* *Alga crispa, Scabiosa rubra & pallida. J B. Tom. 3.*
- Fucus parvus dichotomos segmentis variis, partim latis, planis, & compressis, partim capillaceis rotundis, s. Fucus parvus membranaceus ad divaricationem cirrosus.*
- Fucus maritimus veluti in orbem expansus. Rosa marina. J B. T. 3. l. 39. 800.*
- Fucus, s. Alga Cornu Cervi divisurâ. C B P. 364.* Herba *Cretica* quæ *Tinctori- bus Rubella*; hoc nomine *Imperatus* misit. *Alga tinctoria. J B. Tom. 3. l. 39. 796.*
- Fucus membranaceus Ceranoides ramosus per siccitatem obsoletè virescens.*
- Fucus membranaceus Ceranoides albidus ramulorum apicibus stellatis.*
- Fucus, s. Alga membranacea purpurea parva, Raii Synops. 3. Ubi dicit, multæ hujus*



*hujus varietates observantur, latitudine, figurâ & divisurâ foliorum ludentes.*  
*Fucus membranaceus Ceranoides. C B. Prodr. 155. Scotis Dils dictus, Hibernis Du-*  
*lesch. Hunc, Hiberni apud quos copiosè invenitur, studiosè exiccatum & convo-*  
*lutum assiduè in ore habent, & masticant, vid. Raii Hist. Pl. append. 1849.*

*Fucus, s. Alga membranacea candida segmentis plurimùm laciniatis.*

*Fucus, s. Alga membranacea purpurea ex uno puncto multifolia, costâ carens.*

*Fucus maritimus Phyllitidis facie, folio tenuissimo, instar eburnei rasaminis candi-*  
*do, transparenti.*

*Fucus maritimus Gallo pavonis pennas referens. C B P. 364. & Prodr. 155. Auri-*  
*cula marina, Raii Hist. Pl. 77. Fungus auricularis Cæsalpini.*

*Vide Supp. p. 400*

**FUMARIA** major, scandens flore pallidiore, *Raii Hist. Pl. 405. Fumaria*  
*altera Cæsalpin. Fumaria major scandens foliorum pediculis, flore majore pal-*  
*lidiore, Moris. Hist. 2. 261.*

*Vide Supp. p. 400*

*Fumaria alba latifolia, Park. Th. Fumaria claviculis donata. C B P. 143. Fuma-*  
*ria cum capreolis. J B. T. 3. l. 26. 204. Vide Supp. p. 400*

*Fumaria radice fibrosâ, foliis ad petiolum sinuatis, crassioribus, ex Hispaniâ. an Fu-*  
*maria Hispanica Saxatilis, foliis amplioribus cordatis, semine compresso, &c. E-*  
*lemens de Botanique. 334?*

*Fumaria minor tenuifolia. CBP. 143. Fumar. vulgaris minor tenuifolia, Moris.*  
*Hist. 2. 260. Fumaria minor, s. tenuifolia surrecta. J B. T. 3. l. 26. 203.*

*Fumaria minor tenuifolia præcox, semine Lini compresso, Præhud. Botan. 266.*

*Fumaria filiquosa sempervirens, Cornuti Hist. Pl. Canadens. 57. Fumaria filiquosa*  
*Americana, Park. Theatr.*

*Fumaria Tingitana, radice fibrosa perennis, flore ex albo flavescente, filiquis curtis,*  
*Phytogr. Tab. 90. fig. 2. an Fumaria sempervirens & florens ex Hortis Batavis*  
*Cat. Hort. Reg. Paris. Fumaria (fortè) filiquosa bivalvis radice fibrosâ, latifolia*  
*perennis, humilior, sine claviculis, flore albo, Moris. Hist. 2. fol. 260. an Fu-*  
*maria lutea montana, & alba, s. Split Illyrica Adversar. Lob. Fumaria lutea mon-*  
*tana, s. Split, Chelidonium Capnites Ætij. Corydalis Anguillare Observ. Lob. 438.*

*Fumaria filiquosa radice grumosâ, flore bicorporeo, ad labia conjuncto, Virginiana,*  
*Phytogr. Tab. 90. fig. 3. Fumaria filiquosa grumosâ radice, flore gemello mon-*  
*itroso, Banist. Cat. Mss. an Fumaria Canadensis radice tuberosâ squamatâ, A-*  
*cad. Reg. Paris.*

**FUNGUS** arboreus *Virginianus*, platyceros parvus, *D. Banister. Phytogr. Tab.*  
*184. fig. 4.*

*Fungus ramosus flavus & albidus. J B. T. 3. l. 40. 837. Fungus ramosus & Im-*  
*perati. C B P.*

*Fungus ramosus candidissimus ceranoides, s. digitatus minimus, D. Plot. Hist. Nat.*  
*Stafford. an Fungi s digitatus candidiss. Raii Hist. Pl. 104. Figuræ Fungi di-*  
*gitati Park. respondens; sed à Fungo ramoso. J B. & C B. longissimè diver-*  
*sus, & ab eo omnino separandus.*

*Fungus ramosus niger compressus parvus, apicibus albidis, Raii. Hist. Pl. 104. an*  
*Fungus digitatus niger, velut cornua exprimens. J B. cujus meminit Tom. 3.*  
*lib. 42. cap. 40.*

*Fungus*



Fungus ramosus niger compressus parvus, apicibus bifidis.

Fungus Ophioglossoides niger, *Raii Synops.* 10. Fungus Ophioglossoides *Phytol. Britan. Merett. Pin.* 43.

Fungus parvus luteus ad Ophioglossoidem accedens, *Raii Hist. Pl.* 104.

Fungus Piperi *Æthiopico* similis, vel digitatus niger, *Merett. Pin.* 43. Hypoxylion excrementum ligni putridi fungosum digitatum, *Mentzel. pugill. Rarior.*

Fungus putridis Arborum ramis inhærens plurimis simul cohærentibus. *C B P.* 372.

Fungus Spongia lignorum dictus. *J B. Tom.* 3. l. 40. 842.

Fungus Lariceus, s. Agaricus *Officinar.* Agaricum. *J B.* Agaricus, s. Fungus Laricis. *C B P.* Agaricus ex Larice; *Park.*

Fungus Intybaceus. *J B. Tom.* 3. ad radices Quercuum.

Fungus durus Arborum, s. igniarius, *Park. Theatr.* Fungus noxius 3. s. Fungus in caudicibus nascens unguis equini figurâ. *C B P.* Fungi arborei ad ellychnia. *J B. Tom.* 3.

Fungus villosus arboreus, coloris Ochrae tinctorius. *J B. Tom.* 3. ex arboribus *Prunorum non raro collegimus.*

Fungus arboreus maximus lignescens, quodammodò ramosus, intus citrino colore perfusus.

Fungus Fraxineus niger, durus, orbiculatus, *Raii Hist. Pl.* 109.

Fungus holosericus Iridiformis quasi colorum alternatione variegatus. Fungus Arborum & Lignorum putrescentium coloris varij, *Raii Hist. Pl.* 109. Fungus Ceraforum imbricatim, alter alteri innatus, variegatus. *C B P.* 372. Fungus Ceraforum coloris varij perniciosus. *J B. T.* 3. l. 40. 848. Duplex est hujus species, una uti in aliis Fungis, substantiâ inferiore in lamellas, s. membranulas à pediculo ad circumferentiam extensas dividitur; & lamellatus dicatur; altera foraminulenta, s. poris creberrimis pertusa est.

Fungus holosericus Iridiformis subtus exiguis poris foraminatus; nominetur.

Fungelli stipitibus plantarum putridis adnascens. Fungellus *Mithridaticus* omnium minimus, *Mentzel.*

Fungis congener Acetabulum petraeum, s. Fungus minimus petraeus orbiculatâ crustulâ compositus, *D. Lloyd, Raii Synops. Phytogr. Tab.* 90. fig. 4.

Fungus parvus pyxioides fungulorum foeturâ, multis quasi seminibus prægnans, cineracei coloris. Fungus minimus *ὀκτώπους* *Clus.* Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens. *C B P.* an Fungi calyciformes feminiferi *Mentzelij.* Hunc etiâ diversis in *Virginiam* locis invenit, *D. Banister.* cujus delineationem in *Angliam* transmisit, ut videsis in *Phytogr. Tab.* 184. fig. 9.

Fungus campaniformis niger parvus, multa semina plana in se continens, *Merett. Pin.* 41. à præcedenti in quibusdam differt.

Fungi Pezicæ, *Plinij Fab. Column.* Fungus noxius 5<sup>us</sup>. seu acetabulorum modo cavus, radice carens. *C B P.*

Fungus phalloides parvus, s. Penis Caninus *Virginianus*, *Banister, Phytogr. Tab.* 184. fig. 6.

Fungus phalloides *Virginianus* glande tessulato, *D. Banister.*

Fungus pulverulentus, s. Orbicularis *Botryoides*, s. racemosus.



- Fungus pulverulentus, s. Ovatus, cum pediculis ramosus.  
 Fungus pulverulentus *Virginianus* caudice corallino, topiario opere contorto, D. Banister. *Phytogr. Tab. 184. fig. 5.*  
 Fungus pulverulentus granulatus *Virginienfis*, D. Banister. *Phytogr. Tab. 184. fig. 7.*  
 Fungus pulverulentus Pyriformis, fundo spongioso. Ex *Virg. Phytogr. Tab. 184. fig. 8.*  
 Fungus stellatus crepitum Lupi dorfigerus nostras, D. Sherard. à Lycoperdon vesicarium stellatum, D. Turnesfortij *Elemens de Botanique. Tom. 1. 441.* Cujus Icon habetur. *Tom. 3. Pl. 331. Vide Suppl. p. 401.*  
 Fungus *Virginianus* ex stercore equino capillaceus canus, capitulo rorido, nigro punctulo in summitate notato, D. Banister. *Phytogr. Tab. 116. fig. 7.*  
 Fungus Bombycinus murini coloris, è fimo felino, tenuissimis capillis. Hujus ortum primò observavit, D. Doody. Et ex cujusdam Unguenti putredine conspexit, D. Gidley, & nobis communicabant.  
 Fungus *Virginianus* barbatus foetidus Banister. *Phytogr. Tab. 184. fig. 10.*  
 Fungus spongiosus niger, pannum laneum texturâ simulans, doliolis vinosis adnascens. à D. Doody, primò observatus.

## G.



**ALACTOXYLON**, s. Arbor *Americana* baccifera, lacteum liquorem ex ligno fundens, qui durus instar Gummi evadit, *Phytogr. Tab. 185. fig. 1.* à Pimpinichi arbor lactescens. *J. B. Tom. 1. lib. 1. cap. 68.* Ex Monard. *Med. Simpl. cap. 50.* Fortè Acomas, D. Rochfort. *Hist. Nat. des Isles Antil. 69.* **Milk-wood** *Barbadiensibus* vulgò.

**GALEGÆ** degener folio singulari, floribus parvis, herbidis muscosis, *Phytogr. Tab. 90. fig. 5.* Galega unifolia, flore herbaceo, *Cat. Hort. Patav. Georgio à Turre.*

**GALLIUM** flore rubro Sprengerianum. *J. B. T. 3. lib. 36. 721.* Gallium rubrum. *C B P. 335.* Gallium nigro-purpureum montanum tenuifolium, *Column. ecphras. 298.* Nostrâ enim sententiâ sunt unum & idem, utpotè, *Casp. Bauhinus* duas facit.

**GENISTA** *Hispanica* Ger. Genista juncea. *J. B. T. 1. l. 11. 395.* Spartium arborescens, seminibus Lenti similibus. *CBP. 396.*

Genista *Hispanica* monospermos, semine reni simile. Spartium *Hispanicum* lobis rotundiusculis flore luteo. *J. B. T. 1. l. 11. 397.*

Eadem floribus candidis. Spartium *Hispanicum* flore candido. *J. B. ibidem.*

Genista, s. Spartium nudum Equiseti folio *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab. 317. fig. 3.* à Spartum sterile. *C B P. 396.* Sparti genus in *Hispaniâ* & *Africâ* Juncus propriè aridi Soli, quod neque folium, neque florem, neque semen fert, quo ad varia utuntur *Guilandin. Papyr.*

Genista Spartium cæruleum, *Capitis Bonæ Spei. Breyn. Cent. 1. 66.*

Genista-Spartium cæruleum *Africanum* foliis pinnatis, *Breyn. Prodr. 36.* Genistæ affinis.



- affinis Arbor *Africana* monospermos flore cæruleo, foliis pinnatis, *Hort. Leyd.* 272. *Genista Roeteri* vulgò.
- Genista Africana* foliis Abrotani incanis, floribus cæruleis, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 3.
- Genista Æthiopica* Pinastris foliis triphylla, *Phytogr. Tab.* 298. *fig.* 1.
- Genista tinctoria Maderaspatana* Rorismarini foliis, ad caulem radiatis, *Phytogr. Tab.* 31. *fig.* 3. àn Legumen cujus siliquula, à D. Terentio, ex Indiâ missa, & titulo Herbæ Anil inscripta fuit. *C B P.* 342. Isatis *Indica* foliis Rorismarini, Glasto affinis, *ejusd. C B P.* 113. Anil, s. Nil *Indorum* color. *J B. T.* 2. l. 22. 945. Annil, s. Indigo Gali, s. Nil Herba Rorismarini facie *Linschot. Part.* 4. *Ind. Orient.* 52. *Genistæ Iluensi*, *Hist. Lugd.* (i.e.) *Genistæ radiatæ* vel *stellari* *J B.* (i.e.) Sparto triphylo. *C B P.* valdè similis, si non eadem. Huic etiam proximè accedit *Cytisus acuminatis* foliis. *C B P.* quoad D. Turnefortium, ex relatu D. Sherard. *Cytisus Indicus* flore luteo hirsutus, *Hort. Patav. à Turre.* *Cytisus* foliis argenteis flore luteo, vulgò. *Nostræ* caulis angularis est, proinde eam ad *Genistarum* genera magis propriè disponendam arbitramur; quam, ut audio, preparant pro cærulei coloris tincturâ in Regno *Bisnagar* aliisque in locis *Indiæ Orientalis Indigena*. Sub titulo *Tree-Rosmary*, (i.e.) *Rosmarini* arboris accepimus.
- Genista tinctoria frutescens* foliis incanis. *C B P.* 395. *Genista tinctoria Hispanica*, *Clus. Hist.* 1. 101. *Genista infectoria Hispanica*, *Tabern. Icon.* 1101.
- Genista Oleastri Germanici* foliis singularibus *Maderaspatana*, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 4.
- Genista tinctoria Germanica*. *C B P.* *Tinctorius flos.* *J B. Tom.* 1. l. 11. 391. *Genista tinctoria vulgaris*, *Clus.* 101.
- Genistella pilosa*. *J B. T.* 1. l. 11. 393. *Chamægenista Pannonica*, *Park. Theatr.* *Chamægenista*, foliis *Genistæ* vulgaris. *C B P. ibid.*
- Genista ramosa*, foliis *Hyperici*. *C B P. ibid.* *Genista minima*, *Hist. Lugd.* l. 2. 173.
- Genistella minor* non spinosa *Æthiopica*, foliis *Serpylli* candicantibus, & *serici* instar mollibus, *Breyn. Prodr.* 2. 50.
- Genista minima Æthiopica*, foliolis *Thymi* confertis, hirsutis pubescentibus, *Phytogr. Tab.* 297. *fig.* 6. Huc fortè spectat *Kalu-polapen*, *H. Malab. Part.* 9. *T.* 66.
- Genistella herbacea*, s. *Chamæ-Spartium*. *J B. T.* 1. l. 11. 393. *Chamægenista sagittalis*. *CBP.* 397. *Genistella montana Germanica*, *Park. Theatr.*
- Genista angulosa trifolia*. *J B. Tab.* 1. lib. 11. 388. *Genista angulosa & scoparia*. *C B P.* 395.
- Genistæ* similis *Frutex* foliis coevis (triphyllos) *P B P. Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 3. Fortè *Trifolium majus* *Genistæ* facie, *Barthol. Act. Med. Hafn.* 1674. *Observ.* 23. pag. 38.
- Genista elegans triphyllus*, argenteis foliis peregrina. *Genista* (fortè) candidioribus & mollioribus foliis, *Hispanica*, *Dod. Edit. Latin. in fol.* 762. Cujus *Calphurnius* meminit; hanc non novit, C. *Bauhinus*.
- Genista arborea Cretica*, folio perpetuo *Zanon. Istor. Bot.* 99. *Genista*, s. *Spartium*, *Wheleri*, è *Zacyntho. Itinerar.*
- Genista spinosa major*, brevibus aculeis. *C B P. Sub Autumnum florens.*
- Genista spinosa major*, longioribus aculeis. *C B P. Primo vere florens. Genistella*



la spinosa major vulgaris, s. Scorpius *Theophrasti*, quem *Gaza* Nepam transtulit, *Park. Theatr.*

Genistella *Montis Ventosi*. J B. Tom. 1. lib. 11. 400. *Phytogr. Tab. 91. fig. 1.*

Genista aculeata foliosa. J B. Tom. 1. lib. 11. 399. Genista spinosa *Germanica*. C B P. 395.

Genista minor Aspalathoides, vel Genista spinosa *Anglica*. C B P. 395. & *Prodr.* 157. Hanc *Botanographi* nostrates (ut rectè notat *Celeberr.* noster *Raius*) pro Genistâ proximè præcedenti (quæ nunquam spontè in *Angliâ* invenitur) haberunt; Errandi ansam præbuit, *Cassp. Bauhinus*, qui Genistellam aculeatam, *Lobel.* (i. e.) Genistam hanc aspalathoidem nostratam, pro Genistâ spinosâ minore *Germanicâ* perperam accepit.

Genista spinosa minor *Hispanica* villosissima. C B P. *ibid.* Genistella *Monspeliaca* spinosa, *ejusd.* C B. *Prodr.* 157.

Genista-Spartium spinosum majus, flore luteo. C B P. Aspalathus secunda *Monspeliens.* J B. T. 1. l. 11. 402.

Genista-Spartium spinosum minus. C B P. Aspalatho *Monspeliano* affinis, Scorpius 2<sup>us</sup>. *Clusio.* J B. *ibid.* 403.

Genista-Spartium spinosum, foliis Lenticulæ, floribus ex cæruleo pupurascens, C B P. Genista Erinacea. J B. *ibid.* Erinacea *Hispanica Clusii*, *Park. Theatr.*

Genista-Spartium spinosum, foliis Polygoni. C B P. *ibid.* Agul & Alhagi *Arabibus* Planta spinosa Mannam resipiens. J B. T. 1. l. 11. 405.

Genista-Spartium spinosum minimum, plurimis Thymi foliolis glabris, ex uno puncto confertis, *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab. 297. fig. 7.*

Genista-Spartium bacciferum Ericæ foliis *Africanum*, ex *Codice Comptoniano*, *Phytogr. Tab. 185. fig. 6.* an Erica Serpylli folio *Æthiopica* flore purpureo pulchro, *Breyn. Fascic.* an potiùs Copal Quauhxiotl, s. Arbor Leprosa fundens Copalli, Copallifera 3<sup>a</sup>. Leprosa *Hernand. Hist. Mexic.* 47.

Genista *Capensis* spinosa, Ligustri foliis (pentaphyllos) pinnatis, floribus spicatis rubris, *Phytogr. Tab. 185. fig. 5.* an Genista Aspalathoides polyanthos major, *Cap. Bon. Spec. Breyn.* Lignum *Rhodium* à quibusdam putata.

G E N T I A N A major lutea. C B P. 187. Gentiana vulgaris major Ellebori albi folio. J B. Tom. 3. l. 31. 520.

Gentiana Asclepiadis folio. C B P. Gentiana folio Asclepiadis vulgò creditæ. J B. *ibid.* fol. 523.

Gentiana *Maderaspatensis* foliis Asclepiadis caule ramoso, *Phytogr. Tab. 90. fig. 6.*

Gentiana major *Virginiana* floribus amplis ochroleucis, *Phytogr. Tab. 186. fig. 1.* Fortè Yztacxihuitl *Mexicensibus*, s. Basium monile vulgò *Hernand.* apud *Recco* fol. 233.

Gentiana cruciata. C B P. Gentiana minor, s. Vulgi Cruciata. J B. *ibid.* 522.

Gentiana punctato flore subcæruleo *Pennæo*. J B. *ibid.* 528. itèm Alisma *Tossani Caroli ejusd.* J B. *ibid.* 519. Gentiana palustris latifolia, flore punctato. C B P. Alisma folio glabro, *ejusd.* *Phytopin.* 520. Gentiana 12. punctato flore, *Clusii Hist.* 316.

Gentianella Alpina magno flore. J B. *ibid.* 523. Gentianella Alpina verna major, *Park.*



- Park. Theatr.* Gentiana 5<sup>a</sup>. Gentianella major Verna, *Clusii Hist.* 314. Gentianella Alpina angustifolia. *C B P.* 187.
- Gentianella minor Verna, *Park. Theatr.* Gentianella Alpina Verna major. *C B P.* Gentianula quæ Hippiion. *J B. T. 3. l. 31.* 527.
- Gentianella Alpina verna minor. *C B P.* Gentianella purpurea minima, *Column.* Gentianella æstiva minima *Neapolitana*, *Park. Theatr.*
- Gentianellæ minimæ *Bavaricæ Camer.* *Hort. Medic.* 65. Gentianella minima elegantissima *Bavarica Camerarij*, *Park. Theatr.* 407.
- Gentiana palustris angustifolia. *C B P.* Gentianæ species Calathiana quibusdam radice perpetuâ, sive palustris. *J B.* Gentianella Autumnalis Pneumonanthe dicta, *Park. Theatr.*
- Gentianella cærulea oris pilosis. *C B P.* 188. Gentiana angustifolia Autumnalis minor, floribus ad latera pilosis, *ejusd. ibid.* Gentianella fimbriata angustifolia autumnalis, *Column. ecphras.* 221. Gentianula lanugine ad singulorum foliorum floris lacinias donata, flore quadripartito. *J B. ibid.* 525.
- Gentiana cærulea calice turgido pentagono, *Raii Hist. Pl.* 721. Gentiana utriculis ventricosis. *C B P.* Gentianella æstiva cordata, *Park. Theatr.* Gentianella cærulea cordata, *Column. ecphras.* 221.
- Gentianellæ species quibusdam, àn *Cordo* Pneumonanthe, aut Gentiana fugax altera, *Clusii J B. ibid.* 526. Gentiana pratensis flore lanuginoso. *C B P.* 188. Est *Angliæ* nostræ alumna. *Pariter ac quæ sequitur.*
- Gentianella autumnalis Centauræ minoris foliis, *Park. Theatr.* 406. Gentianella brevi folio. *C B P.* Gentianella fugax 4<sup>a</sup>. *Clusii*, flore dilutè purpurascēte & cæruleo elegantissimo. *J B. T. 3. l. 31.* 527.
- Gentianella omnium minima. *C B P.* & in *Prodr.* 97. *J B. T. 3. l. 31.* 528. *Hæc nisi summè amara esset, Muscus aliquis floridus censeretur posset, inquit Author.*
- Gentianella Utriusque *Indiæ* impatiens foliis Agerati, *Phytogr. Tab.* 186. fig. 2. *Hujus capsulæ aquâ aliquandiu immersæ cum strepitu dissiliunt, & semen-maturum exiliendo evibrant & inde ratio nominis Snap-Grass, Barbadosibus vulgo. àn Gentianæ affinis foliis glabris serratis, floribus Ranzæ rixo referentibus, Cat. Virg. apud Raii append. Huic fortè referenda sunt Pee-tsjanga puspam; & Kattu-pee-tsjanga puspam, Hort. Malab. Part. 9. Tab. 58, & 59.*
- GERANIUM folio Malvæ rotundo. *C B P.* 318. Geranium folio rotundo multum serrato, s. Columbinum. *J B. T. 3. l. 30.* 473.
- Geranium Columbinum minus majori flore, & foliis florum bifidis, *Bot. Monsp.* 107.
- Geranium Columbinum majus, flore minore cæruleo, *Raii Hist. Pl.* 1059.
- Geranium Columbinum tenuius laciniatum. *C B P.* Geranium Malacoides, s. Columbinum tenuius laciniatum, *Park. Theatr. variat flore candido.*
- Geranium Columbinum majus, foliis tenuiter dissectis foliis florum bifidis, *Bot. Monsp.* àn Geranium Malacoides laciniatum, s. Columbinum alterum, *Park. Th.*
- Geranium Columbinum dissectis foliis, pediculis florum longissimis, *Raii Hist. Plant.* 1059.
- Geranium Columbinum maximum foliis dissectis, *Hist. Nat. Oxon.* Geranium Columbinum majus foliis imis longis usque ad pediculum divisis, *Moris. Hist.* 2. 511.
- Geranium



*Geranium Columbinum Pyrenaicum* perenne latifolium, magno flore, *Schol. Botan.* 227.

*Geranium Robertianum*. C B P. 319. *Geranium Robertianum murale*. J B. T. 3. l. 30. 480. *variat flore albo*.

*Geranium lucidum*. J B. *ibid.* 481. *Geranium lucidum faxatile*. C B P. *Geranium alterum montanum faxatile rotundifolium*, *Column. ecphr.* 138.

*Geranium Robertiani* laciniis ex virore lucidum brevioribus rostris. *Geranium* (fortè) *faxatile Robertiano simile Anglicum*, *Schol. Botan.* 228.

*Geranium Africanum* Uvæ crispæ folio, cauliculis procumbentibus, floribus exiguis rubellis, *Hort. Leyd.* 287. Fortè Tlatlauh-Capatli *Mexicensibus*, s. *Oxygeranium* 2<sup>m</sup>. *Hernandez.* apud *Reccum* 293. *Geranium Columbinum* minus procumbens Uvæ crispæ foliis, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 2. 52. *Vide Suppl. p. 401*

*Geranium Africanum* tenuifolium Robertiani divisuris, flore magno striato, ex *Codice Bentingiano, Phytogr. Tab.* 186. fig. 4. àn *Geranium Anemones* folio, & flore amplissimo albo, striis violaceis variegato, *H. Fageliani, Breyn. Prodr.* 2. 51.

*Geranium argenteum Alpinum*. C B P. *Geranium argenteum Montis Baldi*. J B. *ibid.* 474. *Geranium argenteum Alpinum* longiùs radiculatum *Ponæ Parkinsono, Moris. Hist.* 2. 516. *Phyt. Tab.* 186 fig. 3

*Geranium tuberosum*. J B. *ibid.* *Geranium tuberosum majus*. C B P.

*Geranium Batrachoides odoratum*. C B P. *ibid.* *Geranium Batrachoides* longiùs radiculatum odoratum. J B. *ibid.* 477.

*Geranium Batrachoides*. J B. *ibid.* 475. *Geranium Batrachoides, Gratia Dei Germanorum*. C B P. *variat floribus albis, & flore albo lineis cæruleis variegato*.

*Geranium Batrachoides montanum nostras*, *Raii Hist. Pl.* 1062. àn *Geranium Batrachoides folio Aconiti*. C B P. 317. *Geranium Batrachoides aliud, folio Aconiti nitente Clusio, ibid.* 476. *Geranium* 2<sup>m</sup>. *Ἐτερχιδες* minus, *Clus. Hist. lib.* 5. fol. 99. Quærit & ipse *Raius, ubi supra*.

^ J. B.

*Geranium Muscoviticum* purpureum, *Park. Theatr.* 705. àn *Geranium bulbosum Pennæ*, s. grumosa radice, *ejusd.* 703. *Geranium Asphodeli* radice. J B.

*Geranium annuum minus Batrachoides Bohemicum*, purpuro-violaceum, *Moris. ibid.* *Geranium Bohemicum* flore cæruleo, *Schuyl. Cat. Hort. Leyd.* 35. Hæc si non annua esset, *Geranio Batrachioide* hii futo, flore atro-rubente. C B P. s. *Geranio* 1<sup>o</sup> pullo flore, *Clus. Hist. non simile quidem sed ipsissimum idem esse conje-ctarem. Hæc minus artificiosè depingitur in Tabulis Morisonianis, Tab.* 15. *Seçt.* 5.

*Geranium sanguineum maximo flore*. C B P. *Geranium sanguineum*, s. *Hæmatodes*, crassâ radice. J B. *ibid.* 478.

*Geranium Hæmatodes*, s. flore pallido minore, striis rubris versicolore. *Geranium hæmatodes Lancastrense*, flore elegantè striato, *Raii Hist. Pl.* 1061.

*Geranium phæum* flore reflexo. J B. *ibid.* 477. *Geranium montanum fuscum*. C B P. *Geranium fuscum*, s. maculatum, *Park. Paradis.*

*Geranium Romanum* versicolor, s. striatum, *Park. Paradis. Moris. Hist.* 2. 516. *Raii Hist. Pl.* 1063.

*Geranium nodosum*. C B P. *Park. Theatr.* 703. *Geranium nodosum Plateau Clusio, Ger. emac. Geranium magnum folio trifido*. J B. *ibid.* 478.

*Geranium latifolium annuum*, cæruleo flore, acu longissimâ, *Moris. Hist.* 2. 513.

*Geranium*



- Geranium latifolium longissimâ acu. C B P. 319. & in Prodr. 138. Geranium speciosum annuum, longissimis rostris *Creticum*, J B. *ibid.* 479.
- Geranium *Cretico* simile minus incanum acu pusillâ, ex *Insulis Fortunatis*.
- Geranium Althææ folio. C B P. 310. Geranium Malvaceum. J B. *ibid.* 472. Geranium Althæodes majus, *Park. Theatr.* 707.
- Geranium Althæodes minus, *Park. ibid.* Floribus saturatiùs rubentibus, *Hort. Leyd.* 290.
- Geranium *Africanum* frutescens Malvæ folio laciniato odorato, *H. Leyd.* 278. Geranium Malvæ folio, odoratum, flore purpurascente, *Cap. Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 36. *variat interdum foliis glabris. Vide Suppe. pa. 401*
- Geranium *Africanum* arborescens, Ibisci folio rotundo, Carlinæ odore, *Hort. Leyd.* 274.
- Geranium *Africanum* Betonicæ folio maculato, & laciniato, *H. Leyd.* 281.
- Geranium *Africanum* Betonicæ folio procumbens, floribus parvis elegantèr variegatis. In *Horto instructissimo*, D. D. Uvedal observavimus.
- Geranium pusillum supinum maritimum Althææ, aut Betonicæ folio nostras, *Raii Hist. Pl.* 1056. Geranium minimum procumbens, foliis Betonicæ, *Morif. Hist.* 2. 512. Hujus Iconem videsis in *Phytographiâ nostrâ*, *Tab.* 31. *fig.* 4.
- Geranium *Africanum* Alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis, *H. Leyd.* 283.
- Geranium *Africanum* noctuolens Aquilegiæ folio, flore incarnato rubente, *Phytogr. Tab.* 187. *fig.* 1. Ex *Codice Comptoniano*.
- Geranium *Africanum* noctuolens, tuberosum & nodosum, Aquilegiæ foliis, *Hort. Leyd.* 285.
- Geranium *Africanum* noctuolens flore ruberrimo Anemones folio latiore, *Phytogr. Tab.* 186. *fig.* 5.
- Geranium *Africanum* noctuolens bulbosum, flore rubro Anemones folio angustiori, *Phytogr. Tab.* 185. *fig.* 6. *Utramque ex Codice Comptoniano transtulimus.*
- Geranium *Americanum* noctuolens, radice tuberosâ, triste, *Cornuti.* 109. Geranium triste, s. *Indicum* noctuolens, *Parkinson.*
- Geranium *Africanum* noctuolens, radice tuberosâ, foliis Pastinacæ incanis, lanuginosis latioribus, flore pallidè flavescente, *H. Leyd.* 282. Geranium *Æthiopicum* noctuolens, radice tuberosâ, foliis Myrrhidis latioribus, *Breyn. Cent.* 1. 126. Idem foliis tenuioribus. Geran. *Afric.* noctuolens radice tuberosâ, foliis Pastinacæ incanis, lanuginos. angustioribus, &c. *Breyn. Cent.* 1. 127.
- Geranium noctuolens *Æthiopicum* radice tuberosâ, foliis Myrrhidis angustissimis ciliatis, flore subrubente, *H. Beaum.* Geranium noctuolens *Æthiopic.* radice tuberosâ, foliis Myrrhidis angustiss. vel potiùs Scandicis villosissimis, *Breyn. Prodr.* 1.
- Geranium Moschatum, *Park. Th.* Geranium Moschatum folio, ad Myrrhidem accedente majus. J B. *ibid.* 479. Geranium Cicutæ folio Moschatum. C B P. 319.
- Geranium Moschatum folio ad Myrrhidem accedente minus. J B. *ibid.*
- Geranium Cicutæ folio minus, & supinum. C B P. Geranium annuum Cicutæ folio, inodorum, *Morison. Hist.* 2. 412. *variat flore albo.*
- Geranium Cicutæ folio, radice crassâ, fœtidum, *Lob. Illustrat. Botan. Monsp.* 109.
- Geranium *Hispanicum* magnâ radice, Cicutæ folio crassiori, *Schol. Botan.* 230. an Geranium Cicutæ folio, acu longissimâ. C B P. quod 3. in *Prodr.* 138. *Insulis*



etiā *Fortunatis* reperitur, in quibus collectum fuit, & nobis allatum.

Geranium Coriandri folio, odorum, C B P. 319. Geranium *Apulum* Coriandri folio alterum, odorum, *Column. ecphr.* 135.

Geranium *Africanum* Coriandri folio, floribus incarnatis majus, *H. Leyd.* 279. Geranium *Aethiopic.* Myrrhidis folio tertium, flore magno striato, *Breyn. Cent. 1.* 129.

t. Tab. 328 /  
fig. 3 / Geranium Pimpinellæ Saxifragæ tenuifoliæ facie, *Africanum.* àn Geranium *Aethiopicum*, flore galeato, carneo, medio, foliis Pulsatillæ, s. Dauci sylvestr? *Breyn. Prodr.* 2. 51.

Geranium *Africanum* Coriandri folio, floribus incarnatis, minus, *H. Leyd.* 280.

GINGIDIIUM Umbellâ longâ. C B P. 151. Visnaga, s. Gingidium, *Morif. Umb.* 6. Gingidium *Matthiolo.* J B. T. 3. l. 27. 79.

GLADIOLUS *Aethiopicus*, flore coccineo, *Cornuti, de Pl. Canad.* 78. Gladiolus *Aethiopicus*, flore miniato. *HRP.* àn Gladiolus *Africanus* coccineus maximus. P B P. 336.

Gladiolus *Africanus* angustissimo folio, dilutè purpurascens, ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab.* 187. fig. 4. àn Gladiolus pumilus *Africanus* angustissimo folio. P B P.

Gladiolus Phalangoides *Aethiopicum*, floribus parvis flavescentibus ex *Codice Beningiano. Sifynrichij* (fortè) species *Africana, Phytogr. Tab.* 187. fig. 2.

Gladiolus Phalangoides *Aethiopicum* (fortè *Sifynrichij* genus) flore pentapetalo obsoletè coloris, ex *Codice Beningiano, Phytogr. Tab.* 187. fig. 3.

Gladiolo affinis aquatica, reptante radice. Gladiolus lacustris *Dortmanni, Clus. Cur. Posterior.* 40. Leucoium palustre flore subcæruleo. C B P. Gladiolus lacustris *Clusii*, s. Leucoium palustre, flore cæruleo *Bauhini, Parkinson. Theatr.*

Gladiolo lacustri accedens *Malabarica*, è capitulo botryoide florifera. *Kotsjiletti-pullu, H. Malabar. Part.* 9. *Tab.* 71. Forte Jupucal, *Pison. lib.* 6. fol. 238. Gladiolus luteus tripetalos, floribus pluribus minimis, ex uno capitulo squamoso erumpentibus, *Banisteri Cat. Stirp. Virginian.* àn *Subularia lacustris*, s. *Calamistrum* herba aquatico-Alpina, *Raii Synops. Stirp. Britan.* 210. *Aizoides Fusiforme* Alpinorum lacuum, *D. Lloyd. Hujus plantæ* (inquit) *nil vidimus præter folia, & radices, unde quo genere orta sit, prorsus ignoramus. In fundo lacus exigui, prope summitatem montis Snowdon Plynnon Vreth dicti, invenit.*

GLAUX latiore folio *Thuringiaca.* C B P. 215. GlauX *Cordi* in *Dioscoridem*; altera *Camerar.* à foliorum glauco colore sic dicta, cum alioqui non multum discrepet à *Dioscoridis* descriptione, præterquam quod non ad mare nasci observari, *Toach. Camerar. Hort. Medic.* pag. 67. *Varietas* in hac, alia enim major, foliis modo latioribus, modo angustioribus, alia minor densis cespitibus, cauliculo inferius, ob folia delapsa, geniculato, qualis circa Egram locis nitrosis provenit, similem ex *Scotiâ* habuit *Casparus Bauhinus, habemus & nos, ex Indiâ Orientali.*

GLYCYRRHIZA *Americana*, s. *Ibareem Brasiliensibus, Pison. fol.* 245. à *Germanicâ* haud multum diversa.

GNA--



- GNAPHALIUM** legitimum, *Clus. Hist.* 329. **Gnaphalium** maritimum. *C B P.* 326. *J B. T. 3. l. 26. 157.* àn *Polium Gnaphaloides*, *Prosp. Alpin. Exot.* 146. *U. Suppl. sp.*
- Gnaphalium** Plantaginis folio *Virginianum*, *White Plantain* (i. e.) *Plantago candida Nostratibus*, vulgò.
- Gnaphalium** latifolium *Americanum*. *C B P.* 263. **Gnaphalium** *Americanum*. *J B. Tom. 3. lib. 26. 162.*
- Gnaphalium** alterum *Americanum*, *D. Banister. Cat. Mss.* **Gnaphalio** *Americano* affinis. Planta, capitulis conglobatis. *H R P. Phytogr. Tab. 187. fig. 7.* Fortè *Tzonpoticum*, s. *Heliochrysum Mexicanum Hernand.* apud *Recc.* 233. àn *Stæchadi citrinæ* accedens *Jaloux Paludano.* *J B. T. 3. l. 26. 157.*
- Gnaphalium** majus latò oblongo folio. *C B P.* **Elichryson** sylvestre latifolium capitulis conglobatis *ejusd.* in *Phytopin.* 514. **Gnaphalium** 2<sup>m</sup>. Plateau, *Clus. Hist.*
- Gnaphalium** ad *Stæchadem citrinam* accedens. *J B. Tom. 3.* habetur Icon in *Phytogr. Tab. 31. fig. 6.*
- Gnaphalium** *Lusitanicum* comis argenteis, *Phytogr. Tab. 31. fig. 5.* àn *Chrysocome Syriaca* candidissimis floribus, *Breyn. Prodr.* 1. Fortè etiam **Gnaphalium** majus, angustò oblongo folio alterum. *C B P.* *Filago Germanica* altera secundum folia florida, *Lob. Icon.*
- Gnaphalium** majus, angustò oblongo folio. *C B P.* **Gnaphalium** rectum. *J B. T. 3.* **Gnaphalium** *Anglicum* vel *Belgicum* folio longiore, *Lob. Icon.* 482.
- Gnaphalium** erectum minus *Æthiopicum* flosculis umbellatis, *Phytogr. Tab. 298. fig. 6.* Ad *Promont. Bon. Spei* collegit *Ornatissimus Vir, D. Alexander Brown.*
- Gnaphalium** minus *Æthiopicum* amplioribus comis, cauliculo magis folioso, *Phytogr. Tab. 298. fig. 5.* Ab eodem inventore accepti.
- Gnaphalium** minus *Æthiopicum* latiori folio virescente, floribus sanguineis conglomeratis, *Phytogr. Tab. 298. fig. 7.*
- Gnaphalium** montanum flore rotundiore. *C B P.* *Pilosella* minor quibusdam aliis **Gnaphalij** genus. *J B. Tom. 3.* **Gnaphalium** montanum, s. *Pes Cati*, *Park. Th.*
- Gnaphalium** montanum, longiore & folio & flore *C B P.* 263. *Pilosella* major quibusd. aliis **Gnaphalij** genus. *J B. ibid.* **Gnaphalium** montanum purpureum, & suaverubens, *Lob. Icon.* 483. variat floribus albis, ex candido & rubro mixtis, luteis, & sulphureis. Hujus varietates videsis apud *Icones Roberti* nitidissimè exsculptas.
- Gnaphalium** Alpinum pulchrum. *J B. T. 3. l. 26. 161.* **Gnaphalium** Alpinum magno flore, folio oblongo. *C B P.* 264. *Leontopodium*, *Matthioli, Hist. Lugd. Icon Roberti.*
- Gnaphalium** aureum *Æthiopicum* flore roseo pleno, *Phytogr. Tab. 298. fig. 3.* àn *Chrysocome*, s. *Stæchas citrina*, flore globofo majore, *Grisleij Viridar. Lusitan.*
- Gnaphalium** latiore folio *Æthiopicum* flore roseo, caliculis spinosis. *Inter delineationes nostras nondum editas. Phyt. Tab. 323 Fig. 1.*
- Gnaphalium** supinum echinato femine *Lusitanicum*, *Grisleij*, *Phytogr. Tab. 187. fig. 6.*
- Gnaphalium** minimum, caliculis echinatis *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab. 298. fig. 9.*
- Gnaphalium** Umbellatum minimum. *J B.* **Gnaphalium** roseum sylvestre. *C B P.*
- Gnaphalium** roseum hortense proliferum, *Breyn. Prodr.* 2. 53. Cui varietas saltem videtur **Gnaphalij** rosei hortensis. *C B P.*



Gnaphalium minus, s. Herba Impia, *Park. Th.* Gnaphalium Germanicum. *J. B. Tom. 3.* Gnaphal. vulgare majus. *C B P.*

Gnaphalium impium, s. Filago dicta, *Cap. Bon. Spei.* Gnaphalio Plateau 3. simile genus, sed diversum, *Phytogr. Tab. 31. fig. 7.*

Gnaphalium minimum. *J. B.* Gnaphalium minus repens. *C B P. sed repens ab Autore perperam adjicitur, non enim repit sed erigitur; ut recte notat Raius, Synops.*

Gnaphalium minimum alterum nostras, Stæchadis citrinæ foliis tenuissimis, à D. Samuele Dale acceptum, *Phytogr. Tab. 298. fig. 2.* à Gnaphalium vulgare tenuifolium? *J. B. Tom. 3. Vid. Suppe. p. 401*

Gnaphalium tenuifolium *Æthiopicum* foliis brevioribus, capite cernuo, *Phytogr. Tab. 298. fig. 8.* Chrysocome (fortè) s. Stæchas citrina petrea, *Grisleij Viridar. Lusitan.*

Gnaphalium longifolium humile ramosum, capitulis nigris, *Raii Synops. 52.*

Gnaphalium procumbens nostras maximè tomentosum, capitulis ex viridi flavescente compositis. Fortè Gnaphalium medium. *C B P. 263.* Gnaphalio vulgari similis. *J. B. T. 3. l. 26. 159.* Filago minor, *Park. Theatr.*

Gnaphalium latiori folio minus, ramosum, capitulis pallescentibus è *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab. 187. fig. 5.*

Gnaphalium *Æthiopicum* minus, ramosum, capitulis coccineis, *Phytogr. Tab. 198. fig. 4.* Chrysocome (fortè) s. Stæchas citrina polyclonos, *Grisleij Viridar. Lusitan. Vide Suppe. p. 401.*

GOEZONDA, Planta marina foliis crassiusculis ex Insulâ Javâ.

GOSSIPIUM frutescens, annuum, folio trilobato *Barbadense*, *Phytogr. Tab. 188. fig. 1.* Gossipium frutescens, semine albo. *C B P. 430.* Xylon, s. Gossipium herbaceum. *J. B. Tom. 1. l. 3. 343.* à Gnossipium *Brasilianum* flore flavo,

*pp. p. 401/*

*Aminiju Indigenis, Algodon Lusitanis, Marcgr. 59.* Xylon *Brasilianum.* *J. B. T. 1. l. 3. 343.*

Gossipium frutescens annuum, folio Vitis ampliori, quinquifido, Insulæ Providentiæ, *Phytogr. Tab. 188. fig. 2.*

Gossipium frutescens pentaphyllos, ex Insulâ *Barbouthensi*, segmentis foliorum ad latera rotundioribus, ex quo Cotonum optimum, s. Bombax serici instar candidissima, *Phytogr. Tab. 299. fig. 1.* Hujus enim lanugini, candore mollitiâve, nulla alia præferenda censetur.

Gossipium herbaceum, s. Xylon *Maderaspatense*, rubicundo flore pentaphyllæum, *Phytogr. Tab. 188. fig. 3.* à Cudu-pariti, *H. Malab. Part. 1.* Fortè Xylon arboreum. *J. B. T. 1. l. 3. 346.*

Gossipium, s. Xylon arbor *Orientalis* digitatis foliis lævibus, fructu quinque capsulari, albâ & nitente lanugine fæcto, *Phytogr. Tab. 183. fig. 4.* Gossipium *Javanense* Salicis folio. *C B P.* Lanigera arbor, s. Gossampinus *Plinio Bontij, Hist. Nat. Ind. Orient. Panja-Panjala, H. Malabar. Part. 3.* Lanifera arbor peregrina. *J. B. Tom. 1. lib. 3. 347. V. Suppe. p. 401.*

Gossipium, s. Xylon arbor *Occidentalis* digitatis foliis per marginem crenatis, fructu conoide quinque capsulari, lanugine leucophæâ referto, *Phytogr. Tab. 189. fig. 1.* Hujus ramuli sunt aculeis armati. Ideoque fortè Gossipium arboreum caule spinoso. *C B P. 431.* Fortè etiam Moul-Elavou, s. Arbor lanigera spinos. *H. Malab. Part. 3. Tab. 52.*

Gossip-



Gossipium, s. Xylum arboreum ἀλάουτος ritè dictum, ex Monte Serrato, Americanum, quinque capsulari fructu cylindroide, leucophæâ lanugine farcto, *Phytogr. Tab. 189. fig. 2.* àn Moçarix *Nieremberg. lib. 14. cap. 6.* Hujus solummodò Fructus Icon exhibetur, quem ab Insigni Botanico D<sup>no</sup>. *Gulielmi Cortene*, habuimus.

GRAMEN maritimum spicâ loliaceâ, foliis pungentibus, nostras, *Phytogr. Tab. 33. fig. 4.* àn Gramen sparteum spicatum foliis mucronatis, vel spicâ secalinâ. *C B P.* Spartum spicatum pungens *Oceanicum.* *J B.*

Gramen Sparteum maximum maritimum spicâ Secalinâ *Hollandicum*, *Raii Hist. Pl. 1260.*

Gramen Sparteum *Oceanicum* pungens *Orientale.*

Gramen caninum maritimum spicatum. *CBP. Phytogr. Tab. 33. fig. 3.*

Gramen Caninum maritimum asperum, s. spicâ echinatâ, *Casp. Bauhin. Theatr. 16.*

Gramen caninum maritimum spicâ triticeâ nostras, *Raii Synops. 179.* Gram. caninum spicâ triticeâ latiore compactâ. *C B P.*

Gramen secalinum *Indicum* spicâ gracili tomentosâ, longioribus aristis ad se invicem intortis, *Phytogr. Tab. 191. fig. 5.*

Gramen hordeaceum à maritimis pumilum, *Phytogr. Tab. 33. fig. 2.* Gramen Secalinum palustre & maritimum, *Raii Hist. Pl. 1256. Synops. 180.* àn Gramen Hordeo disticho simile. *C B P.*

Gramen spicâ Brizæ minus. *C B P. J B. Park. Phytogr. Tab. 33. fig. 1.*

Gramen spicatum *Ingleburgense* asperum, *D. Newton. caule tenui, spicâ in cacamine brevi, foliis striatis, & si deorsum digiti ducantur, asperis.*

Gramen montanum pumilum spicatum nostras, amethystinis splendentibus glumis. à *D. Fitz Roberts, in Borealibus nostris inventum.*

Gramen parvum repens ἀυσταχυόφορον *Jamaicense*, spicâ longiore compressâ, *Phytogr. Tab. 32. fig. 5.*

Gramen parvum *Gangeticum* spicâ gemellâ habitiori, *Phytogr. Tab. 91. fig. 6.* àn Gramen ἀυσταχυόφορον. *Column. ecphras. 338.* Hujus spicæ *Amaraci capitula squamata quodammodo exprimunt.*

Gramen exile duriusculum maritimum, foliolis circumvolutis, veluti junceis, brevibus, *Phytogr. Tab. 32. fig. 7.* Gramen pumilum Loliaceo simile, *Raii Synops. 182.* àn Gramen exile duriusculum maritimum, *ejusd. ibid. pag. 190. & Hist. Pl. 1287.* Fortè etiam Gramen foliolis junceis brevibus minus. *C B P. 5.*

Gramen Loliaceum majus, spicis in verticillas multiplicatis, *Maderaspatanum, Phytogr. Tab. 191. fig. 6.*

Gramen paniculâ sparsâ luteâ loliaceâ, *Botan. Monsp. append. 297.*

Gramen μυλοικυφόρον ὀξύφυλλον *Carolinianum*, s. Gramen altissimum, paniculâ maximâ speciosâ, è spicis majoribus compressiusculis utrinque pinnatis Blattam molendinariam quodammodo referentibus compositâ, foliis convolutis mucrone pungentibus donatum. àn Gramen maritimum maximum *Curassavicum* paniculis divisis. *P B P.* Fortè Gramen Festucarium, s. Bromoides genus, & Gramen Gros *Carolinianum.* Hujus ad exsculpendum nobile specimen nobis dedit *Insignis, & in omni naturali Scientiâ Vir magnâ Judicij soliditate, siquis alius, præcellens.*



- cellens, D. Gulielmus Cortene, olim Condiscipulus, & semper mei amicissimus.
- Gramen, s. Festuca Avenacea sterilis, spicis erectis, D. Bobart. *Raii Synops. append.* 237. ab inventore habuimus. Iconem videsis in *Phytogr. Tab.* 299. fig. 2.
- Gramen Avenaceum glabrum, paniculâ è spicis raris strigosis compositâ, aristis tenuissimis à Doodeo observatum, *Raii Synops. Stirp. Brit.* 192.
- Gramen Avenaceum glabrum, paniculâ purpuro-argenteâ splendente, D. Doody, *Raii Synops.* pag. 192.
- Gramen paniculatum Bromoides minus, paniculis aristatis unam partem spectantibus, *Raii Synops. Pl.* 189.
- Gramen Avenaceum vulgari simile *Æthiopicum*.
- Gramen paniculatum Gallo provinciale Aquilegiæ semine, *Schol. Botan.* 258. *Phytogr. Tab.* 32. fig. 2.
- Gramen Avenaceum *Maderaspatanum*, locustis rarioribus turgidulis, aristis brevibus donatis, *Phytogr. Tab.* 191. fig. 4.
- Gramen Avenaceum *Maderaspatanum* paniculâ sparsâ, aristis longioribus ornata, *Phytogr. Tab.* 191. fig. 3.
- Gramen Avenaceum maximum Utriculis cum lanugine albâ, & aristis longissimis, *Botanic. Monspel.* 121. ubi picturam vide.
- Gramen Avenaceum parvum procumbens, paniculis non aristatis, *Raii Phytogr. Tab.* 34. fig. 1. non tamen procumbit, sed erigitur.
- Gramen *Bermudense* Frumentaceum, foliis brevibus obtusis, spicâ crassâ compressâ, antrorsum gemino versu, velut in foveis granifera, *Phytogr. Tab.* 244. fig. 6.
- Crop-Grass** nostratibus vulgo. à D. Petever. habui.
- Gramen Paniceum spicâ simplici. C B P. Gramen Paniceum spicâ simplici lævi, *Raii Synops.* 180. & *Hist. Pl.* 1261.
- Gramen Paniceum spicâ asperâ. C B P. 8. Gramen geniculatum, *Tabern. Icon.* 200.
- Panicum sylvestre dictum, & Dens Canis primus. *J B. T.* 2. l. 18. 443. Tenna (fortè) *Hort. Malab. Part.* 12. *Tab.* 79.
- Gramen Paniceum, s. Panicum sylvestre maximum, *Ind. Orient.* Gramen Alopecuroides spicâ maximâ, *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 32. fig. 4. Jactsa-vetlue à *Maderaspatanis Gentilibus* nuncupatur.
- Gramen paniceum spicâ divisâ. C B P. Graminis genus quibusdam *Gallis* dens Canis secundus, s. Panicum sylvestre spicâ divulsâ. *J B. variat spicâ nudâ & aristata.*
- Gramen paniceum minus, spicâ divulsâ *Insulæ Barbades.* *Phytogr. Tab.* 189. fig. 5. **Pargiter-Grass** & **Pestis Coloni** nostratibus nuncupatur.
- Gramen paniceum multiplici spicâ *Maderaspatanum.* *Phytogr. Tab.* 191. fig. 2. an Gram. paniceum plurimis spicis obtusis per culmum sparsis. *Griseij. Virid. Lusit.*
- Gramen multiplici spicâ *Maderaspatanum*, Vaginis foliorum secundum calami longitudinem aculeatis, *Phytogr. Tab.* 191. fig. 2.
- Gramen dactylon maximum *Americanum*, *Phytogr. Tab.* 190. fig. 1. Gramen dactylon *Indicum* esculentum spicâ articulata *Ambrosin.* *Phytolog.* 546. Sesamum perenne *Indicum*, *Zanon. Hist. Bot.* 181. Frumentum *Indicum* spicâ articulata perenne, *H. Bles.* 89.
- Gramen dactylon *Orientale* majus Frumentaceum, semine Napi, *Phytogr. Tab.* 91. fig. 2. Coracan *Cingalensibus*, D. Knox, *Itiner.* fol. 11. Nachani (fortè) semen conficien-



conficiendis panibus aptum, *Garcia*; Cujus farinâ cum nigri cujusdam ligni quod in Indiâ nascitur scobe, & *Lycij* Indici, s. Cate formantur Pastilli sublinguales. Hujus seminis inquit *Clusius* meminit is qui naufragium Navis S<sup>i</sup>. *Benedicti* nomine, quæ paulo supra Promontorium Bon. Spei ad scopulos allisa est, descripsit, aitque *Sinapi* similem esse, sed nigriorem, cujus Farinâ in panes orbiculares subactâ, vescuntur tota illa *Æthiopix* ora maritima, præsertim inter fluv. S. *Christophori*, & eum qui à S. *Luciâ* nomen accepit, *Clus. Not. in Garc. Arom. lib. 1. cap. 10. fol. 164. V. Supp. p. 401.*

*Gramen dactylon Americanum* cruciatum *Barbadensibus* nostratibus *Dutch-Grass* dictum. *Gramen Javanicum* cruciatum *Jac. Bontij*, *Nejem-El-Salib*, seu *Gramen crucis*, *Pr. Alpin. de Pl. Egypt. 122.* Huc fortè spectat *Cavara-pellu*, *H. Malab. Part. 12. Tab. 69. Phyt. Tab. 189. Fig. 7.*

*Gramen dactylon Orientale stellatum*, spicâ elegantiori, è *Maderaspatan.* àn *Gramen stellatum Ægyptiacum Vestling. Obs. in Alpin. 52.*

*Gramen Ischæmon Bermudense* speciosius, foliis brevibus obtusis, *Phytogr. Tab. 245. fig. 1.*

*Gramen Ischæmon Malabaricum* speciosius, longioribus & mucronatis foliis, *Phytogr. Tab. 300. fig. 8.*

*Gramen dactylon aromaticum* multiplici paniculâ, spicis brevibus tomento candicantibus, ex eodem pediculo binis, *Phytogr. Tab. 190. fig. 1. Schoenanthos, s. Juncus odoratus. J. B. Juncus odoratus aromaticus. C B P.*

*Gramen dactylon Maderaspatense*, cum pluribus spicarum paribus ad summum caulis velût in Verticillas positis, *Phytogr. Tab. 119. fig. 2. Folia magnâ sui parte, culmum ceu vaginâ complectuntur, reliquam surrigunt breviorē, rigidam, marginibus crispam.*

*Gramen dactylon Siculum* multiplici paniculâ, spicis ab eodem exortu geminis, *Raii Hist. Pl. 1271. àn Festuca junceo folio, spicâ geminâ. C B P? Phyt. Tab. 92 fig.*

*Gramen Ischæmon Virginianum*, numerosis spicis dodecastachion, *Xerampelinis* hirsutis foliis, elegantèr undulatis.

*Gramen Canarium Ischæmi* paniculis, *Park. Theatr. 1178. Gramen repens* cum paniculâ *Graminis Mannæ. J. B. T. 2. l. 18. 459. Gramen dactylon folio arundinaceo majus. C B P. 7. Quod nomen huic nostro, utpote minore & supino minime convenit, ut antè nos rectè animadvertit Cl. Raius, Hist. Pl. 1271. Attamen hujus nominis minus, à majore, solâ magnitudine distinctum, apud Doctiss. Magnol. invenio, Botan. Monspel. 112. Extrâ oras maritimas nusquam offendimus.*

*Gramen dactylon latiore folio. C B P. Graminis genus, Dens caninus 3<sup>m</sup>. s. Gramen primum, vel Galli crus. J. B. T. 2. l. 18. 444. Ab hoc sativum (quod Gramen Mannæ vocant) non nisi cultuâ differre videtur, inquit Joan. Bauhinus. Gramen dactylon esculentum. C B P.*

*Gramen digitatum hirsutum. J. B. T. 2. l. 18. 445. Gramen dactylon angustifol. spicis villosis. C B P. Ab hoc, specie non diversum putat noster Celeberr. Raius. Gramen Scoparium Ischæmi* paniculis *Gallicum. J. B. T. 2. l. 18. 460. Ex cujus nimirum radiculis scopulæ ad vestes purgandas sunt.*

*Gramen tremulum maximum. C B P. J. B. T. 2. Gramen tremulum maximum, Hispanicum, Park. Theatr.*

Gramen.



- Gramen tremulum minus, paniculâ magnâ. *CBP.* ¶ *B.* Gramen tremulum minus alterum, *Park. Theatr. Amourettes* alterum, *Clus. Cur. poster.*
- Gramen tremulum. ¶ *B.* Gramen tremulum majus. *CBP.* Gramen tremulum, s. *Phalaris media Anglica* prima, an secunda, *Park. Theatr.* 1165.
- Gramen Filiceum paniculis integris, *Boccon. de Pl. Siculis*, pag. 63.
- Gramen paniculis elegantissimis, s. *Eragrostis major.* *CBP.* 2. Gramen Filiceum, s. *polyanthos.* 2 *Hist. Lugd.* Gramen amoris dictum. ¶ *B.*
- Gramen amoris alterum paniculis minoribus, & angustioribus magisque sparsis, *Raii Cat. Exterar.* 136. in *Historia autem desiderata.* Hujus Icon exhibetur, in *Phytogr. Tab.* 92. fig. 2.
- Gramen amoris *Indiæ Orientalis* paniculâ sparsâ, spicarum petiolis huc illuc undatim inflexis, *Phytogr. Tab.* 190. fig. 3.
- Gramen *Maderaspatanum*, paniculâ spicatâ longâ, speciocissimâ, *Phytogr. Tab.* 190. fig. 4.
- Gramen paniculatum ex Oris *Malabaricis*, paniculâ delicatiore, *Phytogr. Tab.* 300. fig. 2.
- Gramen *Virginianum* supinum, paniculis elegantissimis, ex cauliculorum nodis prorumpentibus, *Phytogr. Tab.* 300. fig. 3.
- Gramen parvum *Æthiopicum* tenuissimis foliis; *Amonrettes* spicâ simplici, & gemellâ, *Phytogr. Tab.* 300. fig. 4.
- Gramen Miliaceum latiori folio *Maderaspatanum* apud exsiccatas *du Boisianas*, *Phytogr. Tab.* 189. fig. 4.
- Gramen Miliaceum *Americanum* majus, paniculâ minore, *Phytogr. Tab.* 92. fig. 7. Fortè *Coiniqui-cumachuqua*, *Nov. Hispan. Terent.* apud *Recc.* 373.
- Gramen Miliaceum *Americanum* minus, paniculâ parvâ, *Phytogr. Tab.* 92. fig. 6.
- Gramen Miliaceum *Americanum* medium, paniculâ magis sparsâ, & speciosâ, *Phytogr. Tab.* 92. fig. 8.
- Gramen arundinaceum *Halepense* *Tragopogonis* folio, paniculâ miliaceâ, *D. Bobart.* *Phytogr. Tab.* 32. fig. 1.
- Gramen *Jamaicense* nostrati pratenfi simile, paniculâ compactiore. Gramini pratenfi minori simile *Curassavicum*, paniculâ speciosâ, *D. Sherard.*
- Gramen capillaceum, locustellis pennatis, non aristatis *Raii*, *Phytogr. Tab.* 34. fig. 2.
- Gramen foliolis junceis brevibus, radice nigrâ & albâ. *CBP.* & *Prodr.*
- Gramen montanum, spicâ foliaceâ gramineâ. *P B.* *Raii Synops. Pl.* 184.
- Gramen arvense paniculâ crispâ. *CBP.* *Park. Th.* 1158. Gramen cum paniculâ molli rubente. ¶ *B.* *T. 2. l.* 18. 464.
- Gramen arvense paniculâ crispâ longiore nostras.
- Gramen *Æthiopicum* paniculâ molli virente, aristis autem crispatis longioribus fuscis, *Phytogr. Tab.* 300. fig. 1.
- Gramen aureum *Dalechampi*, paniculâ amplissimâ, ex *Insulis Fortunatis.* Gramen paniculâ aureâ. ¶ *B.* *T. 2.* Gramen paniculâ pendulâ aureâ. *CBP.* 3.
- Gramen Alopecuroides, spicâ asperâ. *CBP.* 4. Gramen Alopecuroides, spicâ asperâ brevi, *Park. Theatr.* 1169. Gramen cum caudâ Leporis asperâ, s. spicâ murina. ¶ *B.* *ibid.* 473.
- Gramen Alopecuroides maximum, spicâ longissimâ, ex plurimis minoribus spicis constatâ, *Capitis Bon. Spei.* Gramen



Gramen Alopecuroides *Maderaspatanum* spicâ quasi geniculatâ molli, *Phytogr. Tab.* 190. fig. 6.

Gramen *Indicum* Alopecuroides holosericeum majus, spicâ longâ pappescente, *Phytogr. Tab.* 92. fig. 5. àn Gramen Alopecuroid. *Curassavicum* spicâ longissimâ, & sericeâ candidâ. *P B P.* àn Alopecuros tomentosa. *J B.* Fortè Gramen Alopecuros lanuginosus *Grisleij, Viridar. Lusit.* Fortè etiam Gramen spicatum, spicis longis, laxis, pappo sericeo canescentibus, *D. Sherard. Raii Cat. Stirp. Exter.* 398.

Gramen Alopecuroides *Indicum* minus, Spicâ sericeâ candidâ, laxiori, *Phytogr. Tab.* 92. fig. 4.

Gramen geniculatum brevifolium crispum, spicâ purpuro-sericeâ *Maderaspatanum*, *Phytogr. Tab.* 119. fig. 1. Fortè Tsjeria-Kuren-pullu, *H. Malab. P.* 12. *Tab.* 62.

Gramen Alopecuro accedens ex culmi geniculis, spicas cum petiolis longiusculis promens, *Phytogr. Tab.* 33. fig. 9. Gramen serotinum arvense, spicâ laxa pyramidali, *Raii Hist. Pl.*

Gramen montanum hirsutis foliis, spicâ leucophæâ disruptâ, *Phytogr. Tab.* 33. fig. 7.

Gramen pumilum hirsutum, spicâ purpuro-argenteâ molli nostras, *Raii Histor. Plantar. His duabus novissimè memoratis Graminum speciebus, multis abhinc annis nos ditavit ex propriâ collectione amicissimus Vir, D. Samuel Doody, Pharmaceutices, & Rei Herbariæ callentissimus.*

Gramen *Maderaspatanum* spicâ interruptâ, totali è pluribus spicis parvis villosis, elegantissimè constructâ, *Phytogr. Tab.* 190. fig. 5.

Gramen parvum præcox, spicâ laxâ canescente *Raii, Phytogr. Tab.* 33. fig. 9.

Gramen parvum præcox paniculâ sparsâ, *D. Doody.* Fortè Gramen paniculatum, locustis parvis purpuro-argenteis annuum, *Raii Synops. Stirp. Britan.* 189.

Gramen phalaroides spicâ brevi reclinatâ, ex Utriculo prodeunte, *Phytogr. Tab.* 33. fig. 5. àn Gramen Phalaroides *Lusitanicum*, *Raii Hist. Pl. Icon quæ apud J. Bauh. in Histor. Pl. Tom. 2. fol. 463. Graminis tenuis duriusculi descriptioni (per errorem) adpicta, huic nostro apprimè convenit.*

Gramen typhinum maritimum minus *Raii, Phytogr. Tab.* 33. fig. 8. àn Gramen typhinum *Danicum* minus *Parkinsono*, quærit & ipse *Clariss. Raius.*

Gramen typhinum minus *Jamaicense*, spicâ magis gracili.

Gramen Typhoides pumilum, nodosâ radice. Gramen nodosum spicâ parvâ. *CBP. & Prodr.*

Gramen geniculatum foliis brevibus aculeos mentientibus *Maderaspatanum*, *Phytogr. Tab.* 189. fig. 3. Arundo (fortè) graminea aculeata, *Pr. Alpin. exot.*

Gramen supinum aculeatum. *J B. ibid.* 461. Gramen album, capitulis aculeatis *Italicum. C B P.* 7.

Gramen spicâ subrotundâ echinatâ. *C B P.* 7. Gramen echinatum tribuloides, *Fab. Column. ecphr.* 338. Gramen perpusillum capitulo rotundo spinoso, *Cherleri J B. ibid.* 468. Gramen echinato capitulo, *Park. Th.* 1187.

Gramen *Americanum* spicâ echinatâ majoribus locustis, *Schol. Botan. Phytogr. Tab.* 92. fig. 3. Fortè etiam Gramen aculeatum *Curassavicum. P B P. Seminibus à D. Sherard. communicatis in Horto D. Doody, Exoticarum Stirpium refertissimo enatum, primo observavimus.*

Gramen tribuloides spicatum maximum *Virginianum*, ejusdem, *D. Doody.*



Gramini Luzulæ accedens glabrum in palustribus proveniens, paniculatum, *Phytogr. Tab. 34. fig. 11.* àn Gramen Cyperoides palustre leucanthemum, *Raii Hist. Pl.*

Gramini Luzulæ affine, flore albo. *J B. ibid. 492.* Gramen nemorosum hirsutum angustifolium minus, paniculis albis. *C B P. 7.* Gramen leucanthemum, *Dalechampij Hist. Lugd. 426.* Gramen Nemorum hirsutum minus, *Park. Th. 1186.* Gramen hirsutum *Indicum* glomeratis capitulis, Lagopi æmulis, glumâ à squamulis plurimis purpurascens aristâ unicâ donatis compactili, *Phytogr. Tab. 190. fig. 7.*

Gramen marinum Cyperoides. *J B. T. 2. l. 18. 498.* Gramen Cyperoides maritimum. *C B P. 6.* Juncus Cyperoides maritimus, *Lob. Icon. 87.* Juncus maritimus *Narbonensis*, *Park. Theatr. 1194.*

Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, capite ex spicis pluribus acuminatis in cacumine caulis glomerato, *Phytogr. Tab. 300. fig. 7.* à D. Alexandro Brown, habuimus.

Gramen Cyperoides *Maderaspatanum* spicis plurimis apicibus obtusis, summo caule in orbem congestis, *Phytogr. Tab. 192. fig. 4.*

Gramen Cyperoides latiori folio aspero, paniculâ in summitate caulis conglomeratâ, *Phytogr. Tab. 90. fig. 8.*

Gramen Cyperoides ex Monte *Ballon* simile, in maritimis & arenosis nascens *Raii*, *Phytogr. Tab. 34. fig. 8.*

Gramini Cyperoidi ex Monte *Ballon* simile, spicâ totali è plurimis spicis compositâ *Raii*, *Phytogr. Tab. 34. fig. 7.* àn Gramen Cyperoides elegans multiferâ spicâ, *Park. Theatr.*

Gramen Cyperoides polystachion lanuginosum *Raii*, *Phytogr. Tab. 34. fig. 6.* àn Gramen Cyperoides *Norvegicum* parùm lanosum, *Park. Theatr.*

Gramen Cyperoides angustifolium, spicis parvis sessilibus in foliorum alis *Raii*, *Phytogr. Tab. 34. fig. 3.*

Gramen Cyperoides polystachion flavicans, spicis brevibus, propè summitatem caulis *Raii*, *Phytogr. Tab. 34. fig. 5.*

Gramen Cyperoides elegans, spicâ compositâ molli, à *Raiiano*, *hujus tituli diversum*, *Phytogr. Tab. 34. fig. 4.*

Gramen Cyperoides foliis Caryophyllæis, spicâ granis rarioribus, & tumidioribus conflata *Raii*, *Phytogr. Tab. 91. fig. 7.*

Gramen Cyperoides tenuifolium, spicis ad summum caulem sessilibus globulorum æmulis, *Phytogr. Tab. 91. fig. 8.* Gramen Cyperoides foliis mollibus tenuibus, spicis brevibus coacervatis tribus quatuorvè in summitate caulis, *Raii Hist. Pl.*

Gramen Cyperoides exiguum feminibus bullatis *Raii*, *Phytogr. Tab. 91. fig. 2.*

Gramen Cyperoides minimum, feminibus deorsùm reflexis puliciformibus *Raii*, *Phytogr. Tab. 34. fig. 10.*

Gramen Cyperoides, spicâ simplici compressâ distichâ, D. *Plukenet*, *Raii Phytogr. Tab. 34. fig. 9.*

Gramen Cyperoides minus *Virginianum* spicâ simplici longiore, *Phytogr. Tab. 300. fig. 6.*

Gramen Cyperoides perpusillum, *Ind. Orient.* spicâ longâ gracili, caudam muris æmulante, D. *Petever.* Gramen



- Gramen Cyperoides *Americanum* spicis grandioribus oblongo-rotundis Sparganii in modum echinatis, ad summum caulem pediculis longis innitentibus, *Phytogr. Tab. 91. fig. 4.*
- Gramen Cyperoides pumilum elegans è *Maderaspatan. Phytogr. Tab. 191. fig. 8.*
- Gramen Cyperoides *Indiæ Orientalis* elatius, paniculâ sparsâ pallescente, *Phytogr. Tab. 191. fig. 7.*
- Gram. Cyperoid. rarius & tenuius spicatum è *Maderaspatan. Phytogr. Tab. 192. fig. 1.*
- Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, paniculâ magis sparsâ & speciosâ, *Phytogr. Tab. 192. fig. 2.* Item ex *Promontor. Bon. Spei* nuperrimè nobis allatum est.
- Gramen Cyperoides elegans, paniculâ spicis valdè mollibus compositâ *Maderaspatanum*, *Phytogr. Tab. 192. fig. 3.*
- Gramen pratense tomentosum paniculâ sparsâ. *C B P.* Item Gramen montanum junceum capite squamoso, *ejusd. C B P.* & in *Prodr. quod præcedenti idem est priusquam tomentum capite suo erumpit.* Gnaphalium Tragi, s. Juncus Bombycinus. *J B. T. 2. l. 18. 514.*
- Gramen tomentosum *Virginianum* paniculâ magis compactâ, aureo colore perfusâ, *Phytogr. Tab. 299. fig. 4.* *χρυσόπικρον* & dici possit.
- Gramen tomentosum pumilum, *Promontorij Bon. Spei, Phytogr. Tab. 299. fig. 5.*
- Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, Juncelli *Gesneris* capitulis sparsis, *Phytogr. Tab. 119. fig. 3.*
- Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, caule compresso, sparsâ paniculâ Junci, *Phytogr. Tab. 192. fig. 5.*
- Gramen junceum elatius caule articulato *Virginianum*, Cyperi paniculis inter folia, propè summitatem prodeuntibus, *Phytogr. Tab. 301. fig. 1.*
- Gramen junceum minus è *Maderaspatan. s. Juncus pumilus*, capitulis in summitate aphyllis, *Phytogr. Tab. 192. fig. 7.*
- Gramen Juncoide glomeratis capitulis *Maderaspatense*, *Phytogr. Tab. 189. fig. 6.*
- Gramen junceum, s. Juncus foliaceus humilis, caule rotundo *Maderaspatensis*, *Phytogr. Tab. 192. fig. 6.*
- Gramen junceum perpusillum, capillaceis foliis *Æthiopicum*, *Phytogr. Tab. 300. fig. 5.*
- Gramen junceum elatius, pericarpis ovatis *Americanum*, *Phytogr. Tab. 92. fig. 9.*
- Gramen junceum folio articulato aquaticum. *C B P. 5. & Theatr. 76.* Juncus foliaceus, capsulis triangulis. *J B. T. 2. l. 18. 521.*
- Gramen junceum folio articulato aquaticum, cum paniculâ & utriculis, *C B. Th. 77. Merett. Pin. 54.*
- Gramen junceum capsulis triangulis minimum *Raii, Hist. Pl. 1307.* Graminis juncei varietas minor, *Ger. emac.*
- Gramen junceum aquaticum, capitulis cum foliis capillaribus simul ortis, proliferum, *Phytogr. Tab. 32. fig. 3.* àn Gramen junceum capsulis triangulis, cauliculis tenuibus, foliis ad nodos, & panicularum divaricationes prælongis *Raii, Hist. Pl. ibid.*
- Gramen junceum parvum supinum, s. *Holosteum strictissimis, & hirsutis foliis, Maderaspatanum, Phytogr. Tab. 299. fig. 3.* à *D. Alexandro Brown*, habuimus. Juncus foliatus minimus, *J B. T. 2. l. 18. 523.* Quem Autori *Nemuso* attulit *Gener Cherlerus glomeratis suis capitulis, huic nostro Gramini maxime convenit.*



Gramen junceum clavatum minimum, s. Holosteum palustre repens, foliis, capitulis & feminibus Pſyllij Raio, *Phytogr. Tab. 35. fig. 1.* à Reverendo Viro D. Mattheo Dodsworth, *Evangelij prædicatore vigilantissimo & Botanicorum numero nequaquam postremo, nobis primum ostenditur.*

Gramen junceum, s. Holosteum minimum palustre, capitulis quatuor longissimis staminibus donatis, Raii, *Phytogr. Tab. 35. fig. 2.* Fortè Holosteum aquaticum Alsinantheon. *HRP. app. Plantago palustris gramineo folio monanthos Parisiensis, Elemens de Botanique. 104.*

Graminifolia aquatica Thlaspeôs capitulis rotundis, septo medio siliculam dirimente, *Phytogr. Tab. 188. fig. 5.* à D. Sherard. inventore ex Hiberniâ in Angliam nuperrimè nobis transmissa est. Forte ad Thlaspeôs genera accenseri, debet.

Graminifolia repens palustris, vasculis granorum Piperis æmulis Raii, vid. *Muscus.*

GRATIOLA Centauroides. *CBP. 279.* Digitalis minima Gratiola dicta *Morison. Hist. 2. 479.*

Gratiola Indica minor vera, s. Hyssopoides à Maderaspatan. *Phytogr. Tab. 193. fig. 1.*

Gratiolæ affinis Chamædryoides Maderaspatensis, *Phytogr. Tab. 193. fig. 2.* à Gratiola foliis latioribus ferratis, D. Banister. *Cat. Stirp. Virgin. apud Raium, in Hist. 1928.*

Gratiolæ affinis Americana purpurea Persicæ folio ferrato, *H. Leyd. 304.* Galeata & verticillata Persicæ folio Digitalis æmula, *Morif. Præhud. 274.* Digitalis Americana purpurea folio ferrato, *Dodart. Memoir. 78.* Pseudo-Digitalis Persicæ foliis, *Boccon. de Pl. Sicul. 12.* Dracocephalon Americanum, *Breyn. Prodr. 1. 34.* à Tlalmatzalin, s. Amygdaloides ferrata, *Fr. Hernand. 294.* Galeata & verticillata Persicæ foliis tetraspermata.

Gratiolæ affinis è Cormandel, foliis superioribus Rubiæ quadrifoliæ crenatis, imis Coriandri modo tenuissime divisis, *Phytogr. Tab. 35. fig. 5.*

Gratiolæ affinis Maderaspatana, Digitalis æmula, folio Clinopodij, capsulis in verticillas positis, *Phytogr. Tab. 193. fig. 3.*

GUAIACANA. *J. B. T. 1. l. 2. 238.* Arbor Guaiacana, s. Guaiacum Patavinum, *Park. Theatr. Lotus Africana latifolia & angustifolia. CBP. 447.*

Guaiacana Loto arbori, s. Guaiaco Patavino affinis Virginiana, Pishamin dicta Parkinsono, *Phytogr. Tab. 244. fig. 5.* Loti Africane similis Arbor. *CBP. 448.* Indiæ Occid. Palmæ sanctæ similis Arbor, *Adv. Lob. & Icon. Puchaminifera, Virginiae de Laet. Ind. Occid. lib. 3. cap. 25.*

GUAIACUM Jamaicense Lentisci subrotundis foliis læte virentibus, flore albo, *Phytogr. Tab. 35. fig. 3.* Guaiacum Officinarum. *PBP.* Guaiacum foliis Lentisci. *CBP.* Guaiaci ramulus, *Clusii ad Monardem.* Guaiacum Terentij apud *Hernand. fol. 63.* Fructus Guaiacum putatus, & folia. *J. B. Tom. 1. lib. 4. 499.*

Guaiacum Jamaicense foliis veluti muriâ conditis spissiùs virentibus, flore subcæruleo, *Phytogr. Tab. 35. fig. 4.* à Guaiacum foliis Ceratonix, Aceris, s. Bursæ pastoris fructu, flore cæruleo, *Breyn. Prodr. 2.*

GUAIAYA



GUAIAVA alba acida, fructu rotundiori, *Ind. Orient. Phytogr. Tab. 193. fig. 4.*  
 Guyabo pomifera *Indica. C B P.* Guaiava *Indica* fructu Mali facie. *J B. Tom. 1.*  
*Xalxochotl Mexicensibus, s. Pomum arenosum Hernandez.* Araca-guacu *Brasili-*  
*ensium, Pisonis. 152. Quæ fructu est majore, ejusque pulpâ albicante, Pela simplici-*  
*ter dicta, H. Malab. Part 3. Quæ fructu minore, & carne sanguineâ, Malacka-*  
*pela, H. Malab. Pisoni, est Guayava, fol. 153. ut rectè notat, Raius noster Hist.*  
*Pl. 1455. àn Cieuku Boymij Flor. Sinenf. Jonst. de Arborib. Mantiss. 475.*

H.



EDER A arborea ex argenteo & viridi foliis elegantèr variegatis.

Hedera (fortè) *Dionysias, s. Chrysocarpus Dalechampij, Histor. Lugd.*  
*1420. Hedera Dionysias Dalechampij. J B. T. 2. l. 15. 113. Huic val-*  
*dè similem si non idem habuimus ex Insulâ Barbadosi. Neque prorsus*  
*abhorret à Yerva Mora Canariensibus Hispanis. Hujus Almagesti, fol. 42. non au-*  
*tem scandit hæc sed erigitur.*

Hedera Clematitis *Atragenes* singulari folio splendente, *Phytogr. Tab. 93. fig. 1.*

Hedera monophyllos *Convolvuli* foliis *Virginiana, Phytogr. Tab. 36. fig. 2.* Clematis hederacea *Virginienfis* umbilicato folio, flore papposo. *HR P.* Hedera *Virginian.* Clematitis facie, radice flavescente, *H. Leyd. Si hujus Flores pappis coronantur, ad Clematitis genus amandari debet: multoties hanc Plantam nos florentem conspeximus, at nunquam nobis Pappus occurrit. Fortè Batta-valli, H. Malab. Part. 11. Tab. 62.*

Hedera trifolia repens *Canadensis Cornuti. 96. Vitis sylvestris trifolia, Park. Th. 1556. Itèm Hedera trifolia Virginienfis, ejusd. Park. 679. Apocynum trifolium. Indicum vulgò Epimedium. Bod. à Stapel. in Theophr. 364.*

Hedera trifolia sinuatis, & dentatis foliis *Americana.* Fructu baccarum instar, racemoso, per maturitatem albicante striato sicco. Indebus *Americanis* dicta.

Hederæ trifoliæ *Canadensi* affinis surrecta, Arbor tinctoria *Virginiana multis.* Hederæ trifoliæ *Canadensi* affinis planta peregrina, Arbor venenata, quorund. *HR P. 84. Arbor trifolia Venenata Virginiana folio hirsuto, Raii Hist. Pl. 1799. Hujus Iconem elegantissimè depictam, apud Icones Robertinas exhibitam invenies, variat etiam foliis glabris.*

Hederæ *Virginianæ* triphyllæ quodammodò accedens Arbor *Jamaicensis.* Fortè *Nyrvala, H. Malab. Part. 3. Tab. 42.*

Hedera quinquefolia *Canadensis Cornuti, de Pl. Canad. 100. Vitis hederacea Indica Bod. à Stapel. Not. in Theophr. 364. Hujus folia sunt Acetosa sapore, ut rectè nos monuit, D. Petever. Fructum habet per maturitatem aridum.*

HELICTERES arbor *Indiæ Orientalis* filiquâ varicosâ & Funiculi in modum contortuplicatâ, *Phytogr. Tab. 245. fig. 2. Ifoca-Murra, H. Malab. Part. 6. Frutex Indicus, fructu è Styli apice egresso, sextuplici funiculo, in spiram convoluto constante, Raii Hist. Pl. 1765.*

Helicteres.



*Helicteres arbor Indiæ Occident. fructu majore ; Jamaicensibus nostratibus Button wood dicta, Phytogr. Tab. 245. fig. 3.*

**HELIOTROPIMUM** maximum *Jamaicense* Limoniæ Mali folio, suprâ scabro, subtùs lanugine ferruginea molli. Tlachichinoa Patlahoac, s. Herba uita latifolia, *Hernand. Hist. Mexic. 292.*

*Heliotropium Americanum* cæruleum foliis Hormini, *Dodart. Memoir. Phytogr. Tab. 245. fig. 4.* Jacua-Acanga, *Brasil. Pison. 229.* Fedagoza Lusitanis *Marcgrav. Bena Patsja, H. Malab. Part. 19.*

*Heliotropium Gnaphaloides* litoreum fruticescens *Americanum* Sea-Labender, *Barbadiensibus* dictum, *Phytogr. Tab. 193. fig. 5.*

*Heliotropium Indicum* procumbens glaucophyllon floribus albis, *Phytogr. Tab. 36. fig. 3. Est vere tetraspermon.* *Heliotropium Curassavicum* maritimum, folio glauco oblongo, flore albo, *Hort. Beaum. 24.* *Heliotropium Curassav. Lini umbilicati foliis. P B P.* *Heliotropium Americanum* Cynoglossi marini foliis, flore albo, *Hort. Amstelod. 152.* àn Totecy-Xochiuh *Mexicensibus Hernand. 432.* *Heliotropium Americanum* minus glabrum, folio angusto glauco, *Breyn. Prodr. 2. 55.*

*Heliotropium Siculum* majus flore amplo odorato, *Boccon. de Pl. Sicul. 90. ex Insulâ Maderensi.*

*Heliotropium majus Dioscoridi. C B P. 253.* *Heliotropium majus* flore albo. *J B. T. 3. l. 33. 604.*

*Heliotropium minus erectum*, foliis subtùs incanis, *Maderaspatanum, Phytogr. Tab. 48. fig. 7.* Myosotis Scorpioides *Indiæ Orientalis.* àn *Heliotropio* similis planta cujus meminit *Plutarchus, de Flamin. & Montium* appellation. *Quam Incolæ ad fluvij Hydaspiis portas, in tenuissimum pulverem conterunt, & succo æstibus se inungunt, ut sine periculo immoderationis caloris evaporationem ferant.*

*Heliotropium tinctorium* tricoccon: *Heliotropium tricoccon. C B P. 253. J B. T. 3. l. 33. 406.*

*Heliotropium pumilum* glabrum, Nasturtij foliolis *Americanum, Phytogr. Tab. 245. fig. 5.*

*Heliotropium Americanum* majus, foliis Populi nigrae lanuginosis, flore albo minimo, *Breyn. vid. Solanum.*

*Heliotropium Curassavicum*, Scammonij foliis mollibus, subhirsutis. *P B P. vid. Solanum.*

**HELLEBORINE** angustifolia montana purpurascens. *C B P. 187. ex Hiberniâ.* Helleborine (fortè) angustifolia, flore rubente *Virginiana, D. Banister.*

Helleborine *Virginiana* bulbosa, flore atrorubente, *D. Banister.*

Helleborine *Virginiana* Ophioglossi folio, *D. Banister. Phytogr. Tab. 93. fig. 2. Hujus exemplar pulchrè exsiccatum, nec non picturam propriâ manu ad vivum apprime delineatam eruditissimus Inventor non itâ pridem amicis suis in Angliam transmisit.*

Helleborine flore rotundo, s. Calceolus. *C B P. 187. Damasonij species quibusd. s. Calceolus, D. Mariæ. J B. T. 3. l. 31. 518.*

Helleborine *Canadensis*, s. Calceolus *Mariæ. Icon. Roberti. Calceolus Marianus Canadensis Cornuti. 204.*

Helleborine *Virginiana*, s. Calceolus angustifolius, flore amplo purpureo, *D. Ban. Helleborine*



- Helleborine Alpina lutea*, s. *Calceolus Mariae* Icon. Roberti. *Helleborine Virginiana*, flore rotundo luteo, D. Banister. Vid. Supp. p. 401.
- Helleborine similis Canariensis*. Flos Spiritus Sancti, vulgò. Flos Spiritus Sancti. P B P. 335.
- Helleborus niger trifoliatus*, Tob. Aldin. Hort. Farnes. 93. *Helleboraster alter trifolius spinosus*, Park. Theatr. *Elleborus niger trifoliatus*, Sardinia Belluc. Ind. H. Pisan. 23.
- Helleborus Ranunculoides* flore globofo decapetalo major. *Ranunculus montanus Aconiti folio*, flore globofo. C B P. 182. *Ranunculus* flore globofo, quibusd. *Trollius flos* J B. T. 3. l. 30. 419.
- Helleborus Ranunculoides globosus minor*. *Ranunculus Alpinus* flore globofo minori. H R P.
- HESPERIS** prodigiosa hortensis Molluginis ad imaginem degenerans, Phytogr. Tab. 37. fig. 1.
- Hesperis Africana* σμυρόφυλλο floribus Lini cæruleis, siliquis strictissimis, torosis. *Leucoium Africanum* cæruleo flore, angusto Coronopi folio minus, H. Leyd. 366.
- Hesperis maritima perfoliata parva*, flore cæruleo. *Leucoium maritimum latifol.* C B P. 201. *Leucoium maritimum latifolium annuum*, Moris. Hist. 2. 241. *Leucoium maritim. latifol.* flore cæruleo-purpurante. J B. T. 2. l. 21. 880.
- Hesperis aizoides Alpina parva*, flosculis albis. *Sedum* vel potiùs *Draba siliquosa*, flore albo, àn *Hesperidis Alpinae* species. Vallot. H R P. Hæc planta (meo quidem arbitrato) nihil differt à *Sedo petraeo montano*, Lob. Icon. 381. (h. e.) *Sedo Alpino hirsuto luteo*. C B P. exceptis hirsutis & florum colore.
- HETICH** Americum Theveti, Hist. Lugd. Lerio-Descript. Brasil. cap. 12. *Hetich Indis & Æthiopibus Dalech.* in Plin. *Hetich Americanum* Wallow-leaf'd Potato's. Park. Theatr. 1625. in Virginia nascens.
- HIERACIUM** fruticosum, angustissimo incano folio, Hort. Leyd. 316.
- Hieracium Terracrepola Monspeliensis* dictum. *Chondrillis* affinis laciniata quædam, àn *Trinciarella*. J B. T. 2. l. 24. 8021. D. Magnol. in Indic. suo Plantar. circa *Monspelum nascentium*, hanc non distinguendam autumat a *Crepide Dalechampi* Hist. Lugd. quam J. Bauh. alio in loco, viz. T. 2. l. 24. 1918. proponit sub titulo *Sonchis* affinis *Terræcrepolæ*; Figuram autem quam adhibet vitiosam ex *Lugdunensis depravatâ Icone* expressam existimat. In hoc etiam Raius noster concurret, quibus & nos libenter assentimur, vid. Botan. Monsp. p. 64.
- Hieracium Trinciattelæ*, Joan. Bauhini, foliis annuum, nostras. àn *Hieracium parvum* in arenosis nascens Raii, Querendum proponit, D. Sherard. in cujus penu exhibetur totius plantæ specimen nitide asservatum, quod in arvis Hockleianis prope Oxonium, invenit idem Sherardus.
- Hieracium incanum lanuginosum Ragusinum* Pilosellæ flore, H. Leyd. *Chondrilla* (forte) è *Ragusâ* non descripta Bellucc. Indic. H. Pisan. append. 60. àn *Chondrilla* foliis *Cichorij tomentosis*. C B P. 130.
- Hieracium*, s. *Pilosellæ majoris* species, foliis rariùs dentatis, flore singulari nostras, Phytogr. Tab. 37. fig. 3. Hieracium



- Hieracium latifolium pilosum coccineum umbellatum *Indicum*, H. Leyd. *Phytogr. Tab. 194. fig. 4.* Pilosella *Indica Cornuti*, de Pl. *Canad. append. 209.*
- Hieracium hortense, floribus atro-purpureiscentibus. C B P. 128. Hieracium *Pannonicum* flore saturato croceo. J B. T. 2. l. 24. 1040. Hujus speciem aut saltem præcedentis, *Tzonpotic* Mexicenisibus Hernandez. esse suspicamur, utut *Heliochrysi* titulo exhibetur. Gym the Collier, nostratibus vulgo. *Vide Supp. p. 401.*
- Hieracium Chondrilloides majus *Africanum* Papaveris folio, flore luteo. Chondrilla *Tingitana* floribus luteis, Papaveris hortensis folio. Hort. Leyd. Hoc genus Hieracij sub Chondrilla prioris Dioscorid. titulo à D. Alexandro Balaam, multis abhinc annis accepimus; quodque Hedypnoidis Monspeliens. J B. non parum convenit, ut cuius vel descriptiones solum conferenti patebit. Attamen de Sonchorum genere potius est existimandum, eo quod foliorum ejus ambitus arguto spinularum agmine sunt exasperata.
- Hieracium foliis in tenues lacinias profundè sectas, flore luteo, *Phytogr. Tab. 93. fig. 3.* Chondrilla lutea. J B. T. 2. l. 24. 1020. Sonchus lævis in plurimas lacinias divisus. C B. Prodr. 61. Chondrilla Coronopi aut Cyani facie, tenuifolia lutea vinearum, Lobel. *Adversar.*
- Hieracium rotundifolium *Pyrenaicum* amplexicaule, Schol. Botan. 189.
- Hieracium Alpinum humile Doronici folio, Schol. Botan. *Phytogr. Tab. 194. fig. 1.*
- Hieracium *Pyrenaicum* Verbasci folio tomentosum, Schol. Botan. 190.
- Hieracium *Pyrenaicum* Cerinthes folio latifolium villosum, Schol. Botan.
- Hieracium magnum *Hispanicum*, Park. *Phytogr. Tab. 116. fig. 1.* Dens Leonis latifolius caulescens. C B P. 126. & in Prodr. 62. Hieracium *Pyrenaicum* Blattariæ folio minus hirsutum, Schol. Botan. 189. Ubi pro nondum descripto, ponitur.
- Hieracium Alpinum latiore folio pilosum flore inajore, *Phytogr. Tab. 194. fig. 2.* an Hieracium Alpinum latifolium villosum magno flore. C B P. an Pilosella, s. Pulmonaria lutea, angustiore folio, valdè pilosa. J B. Tom. 2.
- Hieracium pilosissimum, parvo flore non ramosum, *Phytogr. Tab. 194. fig. 3.* an Pilosella *Syriaca*. C B P. Pilosella maxima *Syriaca*, Lobelii *Hist. Lugd.* Sub quo titulo in *Herbarijs vivis*, apud *Patavinos* compilatis sæpenumerò offendimus.
- Hieracium peregrinum Limonij folio non sinuato, floribus in-summitate ternis.
- Hieracium exoticum foliis fidium instar sinuatis, & dentatis, floribus luteis singulis, vel binis. an Hieracium perfoliatum singulare, *Creticum Cat. Hort. Patav. à Turre?*
- Hieracium peregrinum Jaceæ folium, calyce squammato habitiori.
- Hieracium parvum *Virginianum* Venum, cujus Pappi in semina, ex quinque petalis membranaceis, totidemque staminulis conflantur, D. Banister.
- HORMINUM comâ purpuro-violaceâ. J B. T. 3. l. 28. 309. Horminum sativum. C B P. 238. Horminum *Creticum*, Pr. Alpini exot. 113. Horminum *Creticum* comâ cæruleâ, Icon. Roberti.
- Horminum comâ rubrâ. J B. *ibid.* Horminum *Creticum*, spicâ incarnatâ eleganti, Marc. Mappi. *Cat. Pl. Hort. Argentin.* 66.
- Horminum *Aethiopicum* incanum, foliis sinuosis, *Aethiopis* dictum, Hort. Leyd. 318. *Aethiopis* multis. J B. T. 3. variat interdum foliis in profundas lacinias divisis.
- Horminum



- Horminum majus** amplo flore violaceo, lobis florum punctis aureis notatis, *Morif. Præhud.* 272. **Horminum Indicum** maximum flore variegato. *HRP.* 89. *est odore fætidum.*
- Horminum majus Lusitanicum** foliis profundius incis, *D. Edv. Morgani.* **Horminum sylvestre latifolium Tingitanum**, *H. Edinburg.*
- Horminum sylvestre maculatum tuberosum**, *Francisc. de Honuphrijs.* **Horminum sanguineum Asphodeli radice Triumphetti**, *Observ.* pag. 69.
- Horminum Lapathi unctuosi folio**, seu majus hastato folio, *Morif. Præhud.* 273. *Hujus folia sunt marginibus dentata.*
- Horminum hastatis amplioribus foliis**, s. Ari modo alatis, caulibus & pediculis araneosâ lanugine villosis, ex Insulâ Gomerâ, *Phytogr. Tab.* 301. fig. 2. *Mustazi Insulanis & Salvia arborea vulgo. Vid. Supple. p. 401.*
- Horminum luteum glutinosum.** *CBP.* 238. **Galiopsis species**, lutea, viscida, odorata, nemorensis. *J. B. ibid.* 314. **Salvia montana maxima**, fol. **Hormini** flore flavescente, *Turnefort. Elemens de Botanique.* 149.
- Horminum glutinosum Pyrenaicum Anguriæ foliis**, *D. Fagon. Schol. Bot.* 68.
- Horminum Syriacum Sclarea** dicto congener, flore albo, an **Bisermas Camerarij** *HRP.* **Gallitrichum exoticum** flore magno albo. *J. B. ibid.* 311.
- Horminum pratense foliis ferratis.** *CBP.* **Gallitrichum sylvestre vulgo**, sive sylvestris **Sclarea**, flore purpureo, cæruleovè magno, *J. B. ibid.* 311. *Botanici nostrates (ut optime notat Celeberr. noster Raius) hætenus per errorem habuerunt hanc plantam pro Hormino sylvestri vulgo in Angliâ proveniente; cum sint omnino diversæ. Horminum enim quod apud nos tam frequens sponte oritur Hormini sylvestris 4<sup>ti</sup>. Clusii 5<sup>a</sup> species est (i.e.) Horminum sylv. Lavendulæ flore. CBP. ex sententiâ Raij & nostrâ. quod idem est Gallitrichis affini Maru si non genus aliquod, Sclareâ Hispanicâ Tabern. J. B. T. 3. l. 28. 313. Item Gallitricho flore minore purpurascente, & rubro, ejusd. ibidem. Nihilominus hoc sylvestre Herbariorum genus, licet Sagacissimo nostro Autore in Angliâ nunquam offendeatur, aliquando utut rarissime apud nos etiam spontaneum occurrit, & idem videtur quod semel saltem (si narratoribus habenda sit fides) in agri Cantiani Vivario Cobhamensi, nuper inventum est. Variat interdum flore albo, & foliis incanis: Indè.*
- Horminum pratense niveum foliis incanis.** *CBP.* 238. **Gallitrichum sylvestre** flore majore albo. *J. B. ibid.* 310.
- Horminum Napifolium**, s. auriculatum, hirsutis foliis, **Stachydis** odore. **Horminum sylvestre latifolium verticillatum.** *CBP.* **Gallitricho affinis planta**, **Horminum sylvestre latifolium Clusio**, *J. B. ibid.* 31.
- Horminum latifolium Canariense pilosum**, foliis alterno situ positis, *Phytogr. Tab.* 301. fig. 3.
- Horminum sylvestre Salvifolium minus.** *CBP.* 239. **Gallitrichum glabrum folio Salviæ** flore purpureo, *J. B. ibid.* 312.
- Horminum Scutellariæ facie crassioribus foliis floribus dependentibus.** **Gallitrichum folio rotundiore**, flore magno violaceo. *J. B. ibid.* *Britannica quorundam, & Fracastorij, fortè Media inter Betonicam & Horminum sylvestre. Britannica Fracastorij Ponzæ, s. Gallitrichum flore cæruleo Bauhin. H. Patav. à Turre. 18. à D. Doody, habuimus. Qui inter multas alias rariores ex Hort. Patavino, collectas sub titulo solitario Britannicæ accepit; Hoc idem esse suspicor illâ sideritidi querno*



*folio Dalechampiij, Lugd. simili, quam eodem in Horto Britannicæ nomine, anno 1578. legit Casparus Bauhinus, ut ipse affirmat in Pinac. 233. Forte etiam Sideritis altera Cassidæ foliis flore cæruleo, Wheleri Itinerar. Melissa Pyrenaica caule brevi Plantaginis folio, Turnefort. Elemens Botanique. 162.*

**Horminum** pratense foliis ferratis, floribus dilutè cæruleis omnium minimis, *H. Leyd. Gallitrichi (fortè) varietas. J B. T. 3. l. 28. 311. Horminum pratense flore minimo, Schol. Botan. 68.*

**Horminum minus album** Betonicæ facie. *C B. Prodr. àn Gallitrichum flore albo minimo. J B.*

**Horminum** Verbenæ lacinijs angustifolium *Triumfetti, Obs. Icon. 5. Horminum minus, folio sinuato flore minore dilutè cæruleo, Moris. Præclud. 273. Fortè etiam Horminum angustifolium laciniatum. CBP. & in Prodr. Monspeffuli foliis Scolopendriæ modo divisus legit Autor Casparus Bauhinus. }*

**Horminum** flore minore, folio integro. *HR B. 97. Horminum minus folio Betonicæ Schuyt. Hort. Leyd. 38.*

**Horminum** valdè pumilum laciniatum, flore amplo cæruleo, *D. Sherard.*

**Horminum** rugoso, verrucosoque folio, cornu cervinum exprimente. *P B P. Phytogr. Tab. 194. fig. 5. Horminum Syriacum tomentosum foliis Coronopi, s. profundè laciniatis, Breyn. Prodr. 2. Horminum rarum foliis laciniatis, Rawolf. in Herbario Vivo, & Itinerar.*

**Horminum Arabicum** alatis foliis, flore rubello, *Hort. Oxon. Phytogr. Tab. 194. fig. 6.*

**Hormino** accedens angustissimo folio *Maderaspatensis, Phytogr. Tab. 194. fig. 7. Ex Plantis siccis du Boisianis, habuimus.*

**HYACINTHUS** stellaris spicatus, s. fastigiatus, latâ depressâ spicâ, *Moris. Hist. 2. 474. Hyacinthus stellaris spicatus cinereus. CBP. 46. Hyacinthus stellatus multiflorus cineracei coloris, J B. T. 2. l. 19. 583. Hyacinthus stellatus Someri.*

**Hyacinth. stellaris** obsoletè cæruleus vel major. *CBP. Hyacinthus stellatus, Byzantinus, J B. ibid. 582. Hyacinthus stellatus Byzantinus nigrâ radice, Park. Parad.*

**Hyacinthus stellatus Byzantinus** alter, s. flore Boraginis, *Park. Hyacinthus stellatus Byzantinus alter elegantiss. serotinus bullatus, J B. ibid. 583. Item Hyacinthus rarus, ejusd. ex sententiâ, Raii. Hyacinth. stellaris cæruleus amœnus. CBP. 46. Qui & Hyacinthum latifolium, Dalechampiij, quodd Iconem huc refert. Hyacinth. stellaris Byzantinus Boraginis flore. HR P. 91.*

**Hyacinthus stellatus** spicatus, floribus incarnatis, caule & folio Orchidis. *Ex Promontorio, Bon. Spei. Codic. Comptonian. Phytogr. Tab. 195. fig. 4.*

**Hyacinthus stellaris Africanus** latifolius floribus cæruleis parvis umbellatis, *Musæi Cortenian.*

**Hyacinthus Peruvianus**, *J B. ibid. 585. Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus. CBP. 47. Hyacinth. stellatus, Baticus major, vulgò Peruanus. Hyacinthus stellatus Peruvianus multiflorus floribus cæruleis, in rotundam metam fastigiatis, Moris. Hist. 2. 375.*

**Hyacinth. stellatus Peruv.** multiflorus, floribus niveis, visu peramœnis *Moris. ibid. Hyacinthus Eriophorus Orientalis, Moris. ibid. Bulbus Eriophorus Orientalis. CBP.*

**Hyacinthus** floribus Campanulæ uno versu dispositis. *C B P. 44. Hyacinthus Hispanicus.*



- Hispanicus* major flore Campanulæ instar, *Park. Parad.* Hyacinthus totus albus. Campanilla, *J B. T. 2. l. 19. 586.*
- Hyacinthus *Hispanicus* obsoletus flore oblongo. Hyacinthus obsoletior *Hispanicus Anglico* similis, *J B. ibid. 587.* Hyacinth. obsoleto flore. *C B P. 44.*
- Hyacinthus *Orientalis* flore cæruleo pleno. *CBP. 45.* variat etiam fl. albo multiplici.
- Hyacinthus *Orientalis* flore subcæruleo pleno maximus *Belgarum.* *H R P. 91.*
- Hyacinthus *Orientalis* maximus. *C B P. 44.* Hyacinth. minor. πολυάνθης *J B. T. 2 l. 19. 576.* variat flore albo.
- Hyacinthus *Indicus* minor, tuberosâ radice, *Park. Parad. Raii Hist. Pl. 1164.* Hyacinth. *Indic.* tuberosus, flore Hyacinthi *Oriental.* *CBP. 47.* Hyacinth. *Indic.* tuberosâ radice, *J B. ibid. 588. Moris. Hist. 2. 376.*
- Hyacinthus *Indicus* major, tuberosâ radice, *Park. parad. Raii Hist. Plant. 1164.* Hyacinth. *Indicus* Autumnalis flore amplo albo odoratissimo, radice partim tuberosâ, partim bulbosâ, *Moris. Hist. 2. ibid.* Hyacinth. *Indicus* tuberosus, flore Narcissi. *C B P. 47.*
- Hyacintho affinis tuberosâ radice *Africana*, umbellâ cæruleâ, inodorâ, *H. Læyd. Phytogr. Tab. 195. fig. 1.* Hyacinthus *Africanus* tuberosus flore cæruleo umbellato, *Breyn. Prodr. 39.*
- Hyacinthus *Africanus* foliis Colchici, floribus coccineis major ex *Codice Bentingiano*, *Phytogr. Tab. 195. fig. 2.* hujus varietas fortè sit Omizochitl, s. Flos offe-us, *Hernand. apud Recc. 277.*
- Hyacinthus coccineus *Africanus* minor, flore longo cernuo ex *Codic. Bentingiano*, *Phytogr. Tab. 195. fig. 3.*
- Hyacinthus *Africanus* Orchioides Serpentarius, folio singulari undato pilis ciliari-bus fimbriato, floribus ex aureo puniceis, *Codic. Comptoniani, Phytogr. Tab. 195. fig. 5.*
- Hyacinthus *Africanus* Orchioides triphyllos, flore croceo Colchici Fritillarici, foliis undatis, capsulâ inflatâ ex *Codice Comptoniano, Phytogr. Tab. 195. fig. 6.*
- Hyacinthus racemosus cæruleus major. *C B P. 42.* Item racemosus latifolius speciosus, *ejusd. C B P. ibid.* Hyacinthus racemosus major latifolius speciosus, Ar-buteo flore cæruleo, *Moris. Hist. 2. 372.*
- Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius. *C B P. ibid.* Hyacinthus Botry-oides vernus minor latifolius, cæruleus inodorus. *J B. ibid. 572.* Hyacinthus botryoides cæruleus amœnus, *Lob. Icon. 108.* variat flore albo.
- Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius. *C B P. 43.* Hyacinthus vernus botryoides minor cæruleus, angustioribus foliis odoratus. *J B. ibid. 571.* variat etiam flore albido.
- Hyacinthus racemosus moschatus. *C B P. ibid.* Hyacinthus odoratissimus dictus Tibcadi & Muscari. *J B. ibid. 578.* Hyacinthus botryoides major moschatus, s. Muscari flore cineritio *Park.* Hyacinth. racemosus, s. Botryoides major, s. Mus-chari majus, obsoleto albo flore, *Moris. Hist. 2. 372.* Dipcadi vulgò.
- Hyacinthus racemosus moschatus luteus. *C B P. 43.* Hyacinthus odoratissimus, Tibcadi luteus. *J B. ibid. 579.* Muscari flavo flore, *Clus. Hist.* Hyacinthus Botryoides major moschatus, s. Muscari flavo flore, *Parkinson. Paradis.*
- Hyacinth comosus major purpureus. *C B P. 42.* Hyacinthus maximus Botryoides, comâ cæruleâ. *J B. ibid. 574.*



*Hyacinthus comosus Byzantinus, Clus. Hist.* *Hyacinthus comosus Byzantinus candidans cum staminulis purpureis. J B. ibid. 583.*

*Hyacinthus comosus albus, Park. Parad.* *Hyacinthus comosus albus Belgicus. C B P. 42.* *Hyacinth. comosus albo flore Clus.* *Hyacinth. comosus albus, cum cæruleis staminibus. J B. ibid. 584.*

*Hyacinthus pennatus, s. comosus ramosus elegantior, Park. Parad.* *Hyacinthus Sannesius comâ paniculosâ Column.* *Hyacinthus comosus, paniculâ cæruleâ. C B P. 42.*

*Hyacinthus comosus ramosus purpureus Park.* *Hyacinthus comosus calamistratus Cornuti, de Pl. Canad. 210.*

**HYOSCIAMUS** vulgaris. *J B. T. 3. l. 34. 627.* *Hyosciamus vulgaris, vel niger. C B P. 169.*

*Hyosciamus albus, J B. ibid.* *Hyosciamus albus. major vel tertius Dioscoridis, & quartus Plinij C B P.* *Itèm Hyosciamus albus minor. J B. C B. ibidem.*

*Hyosciamus Creticus luteus major. C B P. ibid.* *Hyosciamus Creticus luteus minor, J B. ibid. 628.* *Hyosciamus Creticus alter, Clus. Hist.*

*Hyosciamus aureus, Pr. Alpin. exot. 99.* *Hyosciamus Creticus luteus minor. C B P.* *Hyosciamus quartus, s. albus Creticus, Clus. Hist.*

*Hyosciamus pusillus aureus Americanus Antirrhini foliis glabris, Phytogr. Tab. 37. fig. 5.* *Fortè Hyosciamus albi Ægyptij Vestlingiani varietas minor ex Americâ. Hujus unam aut alteram plantam à feminibus ex Americâ delatis, curâ & vigilantia D. Georgij London. Regij nunc Hortulani, & de rebus Botanicis optimâ meriti pronatam conspeximus.*

**HYPECOUM** legitimum *Clusij, Park. Theatr.* *Hypecoon. C B P. 172.* *Hypecoon filiquosum. J B. T. 2. l. 21. 899.* *Hypecoum filiquis erectis articulatis incurvis, Moris. Hist. 2. 579.* *Cuminum sylvestre alterum filiquosum, Icon. Lobelij. 744.*

**HYPERICUM** vulgare. *C B P. 279.* *Hypericum vulgare, s. Perforata caule rotundo, foliis glabris, J B. T. 3. l. 29. 381.*

*Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum. C B P. ibid.* *Hypericum minus supinum, J B. ibid. 384.*

*Hypericum pulchrum Tragi, J B. ibid. 383.* *Hypericum minus erectum. C B P.*

*Hypericum ferè orbiculato folio, floribus amplis, pallidè luteis, petalis florum in ambitu crenatis, Phytogr. Tab. 93. fig. 4.* *Hypericum Numulariæ folio. C B. Prodr.* *Fortè Hypericum folio brevior, ejusd. C B. Pinac.* *Hypericum Syriacum & Alexandrinum. J B. Tom. 3.*

*Hypericum foliis parvis crispis, s. sinuatis Siculum, Raii Hist. 1018.* *Fortè etiam Hypericum minus toto caule elegantè ramoso, & crispatis foliorum oris Lelij, Triumfetti apud Fratrem. 65.*

*Hypericon Montis Olympi foliis circà margines hirsutis, Whel. in Itiner. lib. 3. 221.*

*Hypericum supinum tomentosum minus, vel Monspeliacum. C B P.* *Hypericum tomentosum, Lobelij, J B.* *Androsæmum album Dalechamp. Hist. Lugd.* *Hoc autem Lobelius cum Hyperico tomentoso Hispanico majore Clusij idem dicit, cujus*



cujus sententiæ accedit & *Raius* noster, at *Clusius* negat idem esse, & *Lobellium* sibi injurium conqueritur, quod hanc plantam Hyperico suo *Hispanico* eandem esse asserat.

- *Hypericum Virginianum* frutescens pilosissimum, *Phytogr. Tab. 245. fig. 6.* àn *Hypericum frutescens*, flore tetrapetalo decussato, s. *Cruce S. Andreae*, *D. Banist. Vid. Supp.*
- Hypericum*, s. *Coris legitima* *Ericæ* similis, *Morif. Hist. 2. 469.* *Coris lutea*. *CBP. 280.* *Hypericoides* *Coris* quorundam, & *Coris Cretica*. *J B. ibid. 384.*
- Hypericum*, s. *Coris Olympiaca* foliolis crispis ad caulium nodos numerosis, confertim erumpentibus. *Coris* foliis crispatis *Wheleri*, in *Itinerar.* àn *Polium montanum pumilum tenuifolium Africum*, *Park. Theatr. 26.*
- Hypericum Virginianum* parvum fruticosum, ramulis equiseti. Planta est bicapsularis ex flore pentapetalo luteo.
- Hypericum Ericoides* minimum, foliis cinereis ex *Hispaniâ*, *Phytogr. Tab. 93. fig. 5.* àn *Hypericum Francorum* non scriptum tenuifolium, *Belluc. Ind. H. Pisan. 28.* Fortè etiâ *Hypericum minus* *Ericetorum Lusitanicum*, *Grisleij. Invenit in Hispaniâ. D. Turnefortius. Foliola nimis longa pinguntur. Hypericum* (fortè) *tomentosum Lusitanum* minimum. *Elem. de Botan. 222.*
- Hypericum Androsæmum* dictum. *J B. T. 3. l. 29. 382.* *Androsæmum* alterum foliis *Hyperici*, quod aliquibus *Hypericoides*. *CBP. 280.* *Hypericum majus*, s. *Androsæmum Matthioli*, *Park. Th. 576.* *Androsæmum* alterum hirsutum, *Column. Ecphr. 74.*
- Hypericum*, s. *Androsæmum perfoliatum*, & *perforatum*. *CBP. Androsæmum* alterum *Apulum*, *Column. ecphr. 78.*
- Hypericum elegantissimum* non ramosum, folio lato. *J B. ibid. 383.* *Hypericum*, s. *Androsæmum bifolium glabrum perfoliatum non perforatum*, *Morif. Hist. 2. 471.* *Ascyrum*, s. *Hypericum bifolium glabrum non perforatum*. *CBP. 280.* *Androsæmum Matthioli*, *Park. Theatr. 574. quoad descriptionem. Androsæmum Campoclarense*, *Column. ecphr. 74.*
- Hypericum*, s. *Androsæmum magnum Canariense* ramosum, copiosis floribus fruticosum, *Phytogr. Tab. 302. fig. 1. Vide Supp. p. 401.*
- *Hypericum Chalepense*, angustis *Rosmarini* foliis, *Phytogr. Tab. 302. fig. 2.* Fortè *Hypericum Lusitanum* *Linariæ* folio. *Elemens de Botanique. 222.*
- Hypericum Alpinum* magno flore nigris punctis insignito, *Schol. Bot. Phytogr. Tab. 93. fig. 6.* Fortè *Ascyron* magno flore. *C B. Prodr. munere præstantissimi viri, D. Sherard. accepimus. Hypericum* (fortè) *Alpinum* humilius magno flore punctato, *Elemens de Botanique 222*
- Hypericum*, s. *Androsæmum foetidum*, capitulis longissimis filamentis donatis *CBP. Ruta Hypericoides* quibusd. *Sicilianæ* affinis, s. *Tragium*, *J B. T. 3. 384.*
- Hypericum maximum*, *Androsæmum* vulgare dictum, *Raii Synops. 143.* *Hypericum*, s. *Androsæmum maximum* (quasi frutescens) bacciferum, *Morif. Hist. 2. 472.* *Androsæmum maximum frutescens*. *CBP. 280.* *Siciliana*, aliis *Ciciliana*, vel *Androsæmon*, *J B. T. 3. 385.*
- Hypericum*, s. *Androsæmon* flore & thecâ quinquecapsulari, omnium maximis, *Morif. Hist. 2. 472.* Qui *Ascyrum* magno flore. *C B. pro hujus Synonymo proponit. Androsæmum Constantinopolitanum* flore maximo *Wheleri Itiner. Ascyroides.*



roides *Cretica* major, *Park. Theatr.* & *Ascyroides*, *Pr. Alpini exot.* ex sententiâ, *Raii Hist. Pl.* 1017.

*Hypericum*, s. *Androsæmum Ascyrum* dictum, caule quadrangulo glabro, *Morif. Hist.* 2. 471. *Hypericum Ascyrum* dictum, caule quadrangulo, *J.B. T.* 3. 382.

*Hypericon Ascyron* dictum quartum, s. *Androsæmum hirsutum*. *CBP.* 280. Sed male hoc genus denominat hirsutum; cum nulla in ejus caulibus, aut foliis hirsuties percipi possit. *Vid. Supp. p. 401*

*Hypericum*, s. *Ascyrum supinum villosum palustre*. *CBP.* *Ascyrum supinum* ἐλάδης *Clus. Ger. emac.* Hujus coma (attritu) sanguineum succum minime reddit, ut recte *Clusius* animadvertit.

*Hypericum frutescens Americanum* flore albo *Park.* vid. *Pruno affinis*.

**HYSSOPUS** ab unâ parte alba, altera viridis, *Lobel. Adversar.* *Hyssopus Anglica*. *CBP.* 218.

## I.

**J**ACEA maxima *Hierosolymitana*, *Pr. Alpin. exot.* 282. *Jacea* latissimo laciniato folio. *CBP.* 272. Item *Jacea Babylonica*, ejusd. *Prodr.* 129. *Jacea fruticans Pini* folio. *CBP. Phytogr. Tab.* 94. fig. 3. *Stœbe capitata Rosmarinæ* folio *Ponæ*, s. *Chamæpitys fruticosa Cretica Belli.* *J.B. T.* 3. l. 25. 36. *Stœbe fruticosa angustifolia Cretica*, *Park. Theatr.* àn *Chamæpeuce*, *Pr. Alpin. exot.* 77. à *Stœchadi citrinæ Affini*, capitulis longioribus, *J.B.* plurimum est diversa hæc rarissima planta, utcunque Celeberrimus noster *Raius* eandem esse suspicatur, cui *Jaceam* foliis angustissimis subtus incanis denominare placuit, *Hist. Pl.* 326. *Illustrioris hujus plantæ nobile specimen* à Reverendiss. *D. Wheler.* ad exsculpend. impetravimus.

*Jacea* major *Gerardi*; itemque *Scabiosa* flore purpureo ejusd. *Raii Hist. Pl.* 325. *Scabiosa* major, squammatis capitulis. *CBP.* itemque *Scabiosa* major altera squammatis capitulis, s. *Jacea rubra latifolia laciniata* ejusd. *CBP.* 269. *Centaurium Collinum Gesneri* flore purpureo. *J.B. T.* 3. l. 25. 32.

Eadem flore albo. *CBP.* 269. *J.B. ibidem.* *Jacea laciniata alba*, *Park. Theatr.*

*Jacea nigra pratensis latifolia*. *CBP.* 271. *Jacea nigra vulgaris*, capitata, & squammosa, *J.B. T.* 3. l. 25. 27.

*Jacea nigra vulgaris laciniata*, *Park. Th.* 470. *Jacea nigra laciniata*. *CBP.* 271.

*Jacea Austriaca sexta Clus. Hist. poster.* 7. *Jacea* cum squamis cilij instar pilosis, *J.B. T.* 3. l. 25. 28.

*Jacea latifolia Virginiana* radice tuberosâ, *D. Banister.*

*Jacea angustifolia tuberosâ radice Virginiana*, *D. Banister.*

*Jacea angustifolia minor Virginiana* tuberosâ radice, *D. Banister.*

*Jacea squamato capite purpurea*, foliis ad tactum glutinosi. àn *Jacea nigra*, squamoso capite major. *CBP.* 271. *Jacea montana squamosa* major, semine nigro, *J.B.*



- J. B. T. 3. l. 25. 29. Jacea montana Austriaca major, Park. Theatr. Forte etiam Stœbe Salamantica tertia Clusij.*  
*Jacea nigra squamoso capite minor. C B P. 271.*  
*Jacea cum squamis pennatis, s. capite villoso, elatior, J. B. Tom. 3. l. 25. 29. Jacea Austriaca villoso capite, s. quarta elatior Clusij, Hist. 2. Jacea latifolia capite hirsuto. C B P. 271. Jacea Pannonica capitulo crispo Camerar. Hort. Medic. 78. Cyanus sylvestris κυνογλωσσόφυλλον Thalij Harcyn. 29.*  
*Jacea cum squâmis pennatis, s. capite villoso humilior. J. B. ibidem. Jacea montana villoso capite, s. quinta Clusij, Hist. 2. fol. 6. Jacea angustifolia capite hirsuto. C B P. 271.*  
*Jacea incana Cyani majoris folio, in aculeum definente, squamis cum ciliaribus nigris, Phytogr. Tab. 38. fig. 4. an Jacea nigra angustifolia, vel Lithospermum arvensis foliis. C B P. quæ prima in Prodromo. Item Jacea nigra angustifolia altera, foliis longioribus lanuginosis ejusd. C B. in Prodr. Fortè etiam Jacea minor foliis aculeatis, Cyani majoris nomine missa, ejusdem in Pinac. an Cyanus Alpinus capite pennato, Schol. Bot. 210.*  
*Jacea Monspeffulana cui in squamis fibræ nigræ, interdum acaulis, J. B. T. 3. l. 25. 29. Jacea humilis Hieracij folio. C B P. Fortè Jacea Hispanica, Pr. Alpin. exot. 313. variat flore albo & purpureo.*  
*Jacea Lusitanica sempervirens, Moris. Præhud. Botan. 276. Jacea elatior Lusitanica Boccon. Icon & Descript. 72. Jacea Lusitanica maxima sempervirens, Dodart. Memoir. 85.*  
*Eadem minor & humilior.*  
*Jacea laciniato Sonchi folio, s. latifolia purpurea, capitulo spinoso. C B P. Phytogr. Tab. 39. fig. 1. Ex capitulorum squamis, spinulæ plures pulchro ordine stellatim dimidiatam referentes, atque deorsum tendentes exeunt, quarum media cæteris latior & longior evadit.*  
*Jacea marina Baetica Parkinsono, Phytogr. Tab. 94. fig. 1. Jacea purpurea maritima, capitulo spinoso Neapolitana Raii Cat. Exter. 59.*  
*Jacea spinosa Sonchi, angusto folio maritima minor, ad squammas capituli spinulis plurimis, Phytogr. Tab. 38. fig. 3.*  
*Jacea Tingitana Centauroides, echinato capite villoso, ex unaquâque squamâ plurimis aculeis circularitè radiatis, Phytogr. Tab. 38. fig. 5. Huic proxime accedit, & ni fallor eadem est Jacea capite longis aculeis spinoso. C B P. Quam iste Vir magnus, & in arte Botanicâ ο τεισμεύς, à Jaceâ montanâ echinato capite Clusij, diversam rectè pronunciabat; Centaurij marini nomine ad Casparum Bauhinum, D. Doldius misit.*  
*Jacea montana, alato caule purpurea, ex singulis capitulorum squamis, spinulis plurimis in hemicyclum dispositis, Phytogr. Tab. 38. fig. 2. Jacea montana purpurea, echinato capite, Park. Th. 473. Jacea Cyanoides echinato capite. C B P. Jacea montana, echinato capite, Clusij. Fortè etiam Jacea capitulis hirsutis Boelij, Ger. emac. Sub hoc enim titulo multis abhinc annis, & à D. Edw. Morgano, viro in rebus Botanicis hæud infimæ notæ accepimus.*  
*Jacea Sphærocephala spinosa Tingitana Sutherland. H. Leyd. 333.*  
*Jacea latifolia, caule alato, capite magno turbinato, multiplici aculeo deflexo è squa-*



- squamularum cuspidibus orto, *Phytogr. Tab. 38. fig. 1.* Jacea latifolia spinosa, capitulis pulchris, flore purpureo, *J. B. T. 3. l. 25. 33.* àn Jacea Cyanoides altera, alato caule, *Cyanus Creticus spinosus Belgarum. H. R. P.* Jacea foliis Seridis candicantibus purpurea. *C. B. P.* Cyanoides echinato capite *eiusd. C. B. P.* Jacea purpurea *Valentina* muricato capite *Clusij.* Cui, & ille attribuit folia Seridis candicantia. àn Jacea laciniata Sonchi folio *C. Bauhini, Hort. Leyd. append. 675.*
- Jacea peregrina Napifolia, hirsutis capitulis, caule alato, *Phytogr. Tab. 94. fig. 2.* è seminibus à D. Sherard. cum ab Exteris in Angliam rediret secum allatis & ab ipso communicatis, in Hortis quibusdam Curiosorum apud Nostrates nata est, & nuperrime succrevit in Horto Academico Oxoniensi, sub auspiciis, D. Bobart: qui hujus specimen nitide exsiccatum nobis amicissime transmisit.
- Jacea incana *Cretica* flore luteo medio purpureo, squamis in molliores spinas abeuntibus, *H. Leyd. 335.* Jacea spinosa *Cretica Zanoni. 105.*
- Jacea incana capite Pini. *C. B. P. 272.* Jacea montana capite magno Strobili. *J. B. Tom. 3. l. 25. 30.* Jacea pumila *Narbonensis. Park. Th.*
- Jacea tenuifolia purpurea, capitulo Calcitrapæ in modum aculeato, *Phytogr. Tab. 93. fig. 7.* Capitulis spinosis Jacea *Adversarior.* Jacea cum spinosis capitulis purpurea tenuifolia *J. B.* àn Stœbe squamis asperis. *C. B. P.* Fortè etiam Jacea tenuifolia capite spinoso *Cetobrigensis, Griseij.*
- Jacea minor Stœbe *Gallicæ & Austriacæ* accedens, squamis capitulorum crebrioribus quarum singulæ, unico saltèm aculeo, sunt armatæ, *Phytogr. Tab. 39. fig. 2.*
- Jacea minor exotica, ad foliorum margines spinulis donata, *Phytogr. Tab. 39. fig. 3.*
- Jacea minor Coronopi foliis atrovirentibus odorata, capitulis parvis, ad caulem sessilibus.
- Jacea minor *Attica* capitulis plurimis, ex apicibus squamularum, spinâ rectâ singulari, *Phytogr. Tab. 39. fig. 4.* à Doctiss. pariter ac humanissimi, nec non Reverendi admodum Viri, D. Georgii Wheler. Equ. aurat. liberalitate accepimus.
- Jacea *Melitensis* capitulis conglobatis *Boccon. de Pl. Sicul. &c. 65.*
- Jacea Cyanoides latifolia supina peramara, capitulis squarrosis. *Cyanus repens latifolius. C. B. P. 274.* *Cyanus peramarus supinus capitulis squarrosis Sesamoides parvi, Adv. Lobel.*
- Jacea Cyanoides angustifolia, peramara, supina, capitulis squarrosis. *Cyanus peramarus repens folio Lavendulæ, J. B.*
- Jacea incana, capite squamato, *Francisci de Honuphriis 11.* Jacea cinerea latifolia, flore purpureo, *Triumfetti Obs.* àn Jacea incana tenuiter laciniata, capitulis Jaceæ nigrae vulgaris, *Raii Catalog. Exterar. 60.*
- Jacea montana candidissima Stœbes foliis. *C. B. P. 271.* Jacea incana laciniata capitulis *Cirsij,* flore uno aut altero, *J. B. Tom. 3. l. 25. 34.* priori pluribus accedit.
- Jacea *Africana* subrotundis argenteis foliis, in minores lacinias divisas, flore aureo, *Hort. Comptonian.*
- Jacea arborea argentea *Ragusina Zanoni. 107.* Jacea lutea *Cretica* foliis *Cinerariæ, Acad. Reg. Paris.* àn Jacea argentea, *Pr. Alpin. exot. 117?*



- Jacea lutea* capite spinoso. *C B P.* 272. *Jacea lutea* capitulis spinosis, *Park. Th.* Centaurium Collinum, s. *Jacea spinosa*, flore luteo, *J B. T.* 3. l. 25. 34.
- Jacea Sicula* Cichorei foliis, flore luteo, capite spinoso, *Boccon. de Pl. Sicul.* *Jacea Sicula* *Erucae* folio lutea, echinata, *Dodart. Memoir.* 87. àn *Jacea lævis maxima* Centauroides lutea *Apula, Fab. Column. ecphras.* 35.
- Jacea lutea* Cichorei foliis, minus laciniatis *Americana*, *Phytogr. Tab.* 196. fig. 1. *Ex seminibus è Virginia missis in Hortulo nostro per biennium floruit.*
- Jacea minor Cretica*, *Erucae* folio, flore luteo, capite muricato.
- Jaceæ species Americana*, alato caule *Ptarmicæ Austriacæ* foliis. *HRH.*
- Jacea Æthiopica*, *Stæchadis citrinæ* majoribus tomentosis foliis, capitulorum spinis & squamulis ex aureo colore nitentibus, *Phytogr. Tab.* 302. fig. 3. àn *Jacea Syriaca* *Gnaphalij* folio *Belluc. Ind. H. Pisan.* 28.
- Jacea pumila* *Stæchadis citrinæ* folio, flore oblongo. *Stæchas citrina* altera inodora, *Lob. Icon.* 486. Itèm fortè *Stæchas odorata purpurea Pilleterij, ejusd. Lobel. Illustrat.* *Stæchadi citrinæ* affinis, capitulis longioribus, *J B. Elichryson sylvestre* flore oblongo. *C B P.* 265. *Chrysocome* quarta, peregrina tertia, *Clus. Hist.* 327. huc pertinet *Axixpatli Mexicensibus; Recc.* 355.
- Jacea Stæchadis citrinæ* foliis prælongis paucis, capitulo minore subrotundo, aspero. *Elichryso sylvestri* flore oblongo similis. *C B P.* 265. In *Phytopin. & in Prodr.* 123. Ubi exhibetur Icon satis congruè exsculpta. *Stæchadi citrinæ* alteri inodora *Lobelii* affinis, capitulis brevioribus, *J B. Stæchas citrina sylvestrior, Park. Theatr.* 69.
- Jacea Hisp.* *Stæchadis citrinæ* foliis permultis, brevibus, capitulo singulari magno.
- Jacea Stæchadis citrinæ* foliis angustissimis, prorsus incanis, capitulo minore. *Stæchadi citrinæ* affinis, capitulis parvis raris squammosis in pappos evanescentibus, *J B. àn Elichryson sylvestre angustifolium, capitulis conglobatis. C B P.* *Stæchas citrina altera, Adv, Lob. & Icon.* 486. *Chrysocome altera, peregrina prima, Clus. Hist.* 326. *Stæchas citrina altera odora, Park. Theatr.* 69.
- Jacea Oleæ* foliis, capite spinoso, flore rubello: àn *Jacea incana* folio *Oleæ, Hist. Lugd.* Pusilla incana *Jacea altera, folio Oleæ; Ptarmicæ species, Lob. Icon.* 545.
- Jacea Oleæ* folio, capitulis compactis. *C B P.* 272. *Xeranthemi* forè species, *J B. T.* 3. l. 25. 26.
- Jacea Oleæ* folio, capitulis simplicibus. *C B P.* *Ptarmica Austriaca Clusio, Park. Theatr.* *Xeranthemum aliud, s. Ptarmica quorundam, J B. T.* 3. l. 25. *variat flore albo & purpureo, simplici & multiplici.*
- Jacea Oleæ* folio, flore minore. *C B P.* *Ptarmica Imperati, s. minor, Park. Theatr.* *Ptarmica Imperati, àn Ptarmicæ Austriacæ species Clusij, Cur. posterior? Xeranthemum, J B. ut supra.* Variat etiam hæc species floribus albis & purpureis, simplicibus, & plenis, ut nos aliquando observavimus.
- JACOBÆA vulgaris, *J B. T.* 2. l. 24. 1057. *Jacobæa vulgaris laciniata. CBP.* 131. *Jacobæa vulgaris major, Park. Th. Ragwort.*
- Jacobæa Senecionis* folio incano, perennis, *Raii Hist. Pl.* 285. Fortè *Jacobæa vulgaris minor, Park. Th.*
- Jacobæa latifolia* palustris, s. aquatica, *Raii Hist.* 285. *Jacob. latifol. J B. ut supra.*



- Jacobæa Pannonica* latifolia, *J. B. ibid.* 1057. Item *Conyza Alpina ejusd.* *J. B.* 1055.  
*Jacobæa Alpina* laciniata, flore Buphthalmi. *C B P.* 131. Item *Jacobæa Alpina* foliis rotundis serratis, *ejusd. ibidem*, *Jacobæa Pannonica* tertia, latifolia prima, & altera *Clus. Hist.* 2. fol. 22.
- Jacobæa maritima.* *C B P.* 131. *Jacobæa marina*, s. *Cineraria.* *J. B. Tom.* 2. 1056. *Achavanabiat*, s. *Artemisia alba*, *Pr. Alpini de Pl. Egypt.* 88.
- Jacobæa maritima*, s. *Cineraria latifolia.* *C B P. ibidem.* *Argentea Prosp. Alpina. Exotic.* 117.
- Jacobæa montana* lanuginosa, angustifolia non laciniata. *C B P.* *Jacobæa Pannonica* folio non laciniato, *J. B. ibid.* 1056. *Jacobæa Pannonica* secunda, *Clus. Hist. poster.* 22. *Jacobæa montana*, non laciniata nostras, *Raii Hist. Pl.* 272.
- Jacobæa lanola* foliis brevibus subrotundis, Pilosellæ flore impense flavo, *Phytogr. Tab.* 39 fig. 5. Fortè *Jacobæa lanata* foliis brevibus subrotundis, *D. Banister. Cat. Virginian.*
- *Jacobæa minor* incana, flore amplo luteo, *Cap. Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 302. fig. 4.
  - *Jacobæa minor Æthiopica*, florum petalis, lituris croceis striata, *Phytogr. Tab.* 392. fig. 5. *precedentis tantum varietas, ut nobis videtur.*
  - *Jacobæa pumila*, Stœbes foliolorum divisuris, tomentosa, *Capitis Bon. Spei, Phytogr. Tab.* 302. fig. 6.
- Jacobæa pumila*, Absinthij umbelliferi foliis incanis, floribus velut in umbellam positis, *Phytogr. Tab.* 39. fig. 6. *Chrysanthemum* fortè *Alpinum primum*, *Clus. Hist.* 333. *Chrysanthemum Alpinum Indenburgense* *Jacobææ* affine, *J. B. Tom.* 2. l. 24. 1058. an *Chrysanthemum Africanum* pumilum foliis Absinthij umbelliferi minoris? *Breyn. Fascic. Rarior. Pl.* apud *Raii Hist. app.* 1925. *Phyt. Tab.* 323. f. 2
- Jacobæa supina maritima* *Triumfetti, Obs.* fol. 90.
- Jacobæa pumila* sinuatis foliis argentea, summo caule, flore singulari, *Phytogr. Tab.* 39. fig. 7. Ingenioso admodum Viro & Chirurgo *Londinensi*, *D. Paræo*, hujus communicationem debeo.
- Jacobæa Æthiopica* procumbens, latioribus sinuatis foliis, floribus ad caulium nodos prodeuntibus. Fortè *Nelampata*, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 49.
- Jacobæa Sicula* *Chrysanthemi* facie, *Boccon. de Pl. Sicul.* 66.
- Jacobæa Africana* frutescens, folio Abrotani, s. *Crithmi* major. *B B P.* 343. *habetur Icon inter delineationes nostras nondum edit.* an *Chrysanthemum* vel potius *Buphthalmum* frutescens Abrotani folio, *Capitis Bon. Spei, Breyn. Prodr.* 2. 32.
- Jacobæa Africana* frutescens, foliis Abrotani, s. *Crithmi* minor, *Phytogr. Tab.* 196. Hujus ramulum à *Prom. Bon. Spei.* absque titulo allatum à Botanico exercitatis. *D. Samuele Doody*, accepimus; Cujus major species in *Hort. Reg. Hamptonienf.* nunc colitur. *Jacobæa* fortè) *Montis Tabulari* *Breyn. Cent.* 1. 178.
- *Jacobæa Æthiopica* foliis Abrotani trifidis, summo caule, capitulis parvis glomeratis, *Phytogr. Tab.* 302. fig. 7.
- Jacobæa Alpina* foliis multifidis *Etscheriana*, flore luteo, plerumque gemello. *Chrysanthemum Alpinum Etscherianum* *Jacobææ* affine, *J. B. ubi supra.* 1056. *Chrysanthemum Alpinum* secundum, *Clus. Hist.* 334. *Chrysanthemum Alpinum* 2<sup>m</sup> *Clusii, Park. Theatr.* 1371.



*Jacobæa Africana* Stœbes facie, flore *Calendulæ Africanae* latifolia. *P B P.* 341. *Anemonæ* affinis *Æthiopica*, fibrosâ radice, flore *Asteris*, *Taraxaci* foliis subincanis, *H. Leyd.* 41. *Chrysanthemum African.* Stœbes foliis latioribus, *Breyn. Prodr.* 1. 23. *Calendula Chrysanthemoides*, semine, s. fructu rotundo lanuginoso, Stœbes foliis latioribus, *ejusd. Prodr.* 2. 25.

Eadem foliis angustioribus. *P B P.* 342. *Hort. Leyd. ibid. Breyn. iisdem in locis; ut supra.*

**J A N G O M A S** *Prunis* similis, *J B. T.* 2. l. 2. 200. Fortè etiâ *Pruni* facie fructusè *Guineâ*, in quo semina, *ejusd. ibid.* *Pruno* similis spinosa. *C B P.* 444. *Hujus fructus Prunorum facie* propè refert, intus tamen nucleo viduus, cujus loco, granulis quibusdam parvis turget, idcirco non *Pruni* species sed inter *Pomiferas*, accenseri debet. An *Coccymelea arbor Ægyptia* insignis magnitudine, *Theophr. Hist. Pl.* lib. 4. cap. 3. Ita fortè à *Theophrasto* vocata, quod fructus multa contineat grana; κοκκος enim granum, μήλον malum significat, ideoque non tantum *Mali* granati, sed & *Ficum* similiter, nec non *Guaiacanæ* fructus, erit κοκκύμηλον. *Prunus Ægyptia* spinosa, pomo *Mespili*, *Plinio*, lib. 13. cap. 10. *Jangomas Garciae. Linschot. &c.* 4 Part. Ind. Orient. 10.

**J A S M I N U M** vulgatus flore albo. *C B P.* 397. *Jasminum*, s. *Gelseminum* flore albo, *Tom.* 2. lib. 15. 101.

*Jasminum* humilius magno flore. *C B P.* 398. *Jasminum Hispanicum* flore majore externè rubente, *J B. T.* 2. l. 15. 101. *Pilsjegam-mulla, Hort. Malab. Part.* 6<sup>a</sup> *Tab.* 52.

• *Jasminum album trifoliatum* flore magno ex *Insulâ Maderensi*, *Phytogr. Tab.* 303<sup>a</sup> *fig.* 1. *Jasminum* fortè *Azoricum* flore albo *Grisleii, Viridar. Lusit.*

• *Jasminum Myrsinites triphyllum Malabariense*, floribus oblongis rubellis, *Phytogr. Tab.* 303<sup>a</sup> *fig.* 2. *Jasminum* (fortè) flore rubro quod in *Asiaticis* Hortis reperiri *Clusius* refert, ut videsis apud *C. Bauhin. Pinac.* 397.

• *Jasminum Malabaricum* triphyllon, pediculis alatis, floribus ex oblongo tubulo, calathum quinquepartitum explicatis, colore puniceo, *Phytogr. Tab.* 303<sup>a</sup> *fig.* 3. Huc fortè spectat *Nela-Naregam, H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 22. Frutex *Malabaricus* trifolius, flore pentapetalo candidissimo, fructu triangulato *Comelin.* in *Not.* munere *D. Alexandri Brown.* utrumque habuimus.

*Jasminum flavum odoratum. H R P.* 94. *H R B.* 133. *Gelseminum Indicum* flavum odoratissimum *Ferrar. Flor. cultur.* 393. *Gelseminum*, s. *Jasminum Indicum* flavum odoratissimum, *Park. Paradis.* Hujus meminit flore albo *Excellentiss. Hermannus, H. Leyd. append.* 676. *Jasminum* (fortè) *Azoricum* trifolium, flore albo odoratissimo parvo, *Breyn. Prodr.* 2.

*Jasminum luteum* vulgò dictum bacciferum. *C B P.* 398. *Jasminum luteum*, s. *Trifolium fruticans*, aliis *Polemonium*, *Park. Th.* *Trifolium fruticans*, quibusdam *Polemonium* flore luteo, *J B. T.* 1. l. 11. 374.

*Jasminum humilius luteum. C B P.* 397. *Jasminum*, s. *Gelseminum luteum, J B. Tom.* 2. lib. 15. 102.

*Jasminum Indicum* odoratum, flore polypetaloide exalbido, ad geniculos prodeunte,



unte, fructu Cerasi minoris gemello. Tsjeregam Mulla, *Hort. Malabaric. Part. 6. Tab. 55.*

Jasminum *Indicum* inodorum flore pentapetalo fructu gemello quasi in unam baccam coalito, Tsjovanna Amelpodi, *H. Malab. Part. 6. Tab. 47. Nimis inadvertenter ponitur à nobis pro Synonymo Arboris tristis hujus Almagest. fol. 46.*

Jasminum *Indicum* sylvestre inodorum floribus albis ad unguiculos croceo tinctis Velutta Amel-podi Malabareis, *Hort. Malab. Part. 6. Tab. 48.*

Jasminum *Indicum* Lauri folio inodorum, umbellatum, floribus coccineis. P B P. *Phytogr. Tab. 59. fig. 2.* Jasminum arborescens *Indicum* flore tetrapetalo Umbellato phœniceo, foliis Laurinis latioribus, *Breyn. Prodr. 2. 58. Male autem dicitur tetrapetalos cum re verâ monopetalos sit; male iterum foliis latioribus, cum hujus folia proxime subsequenti sunt multum angustiora, & magis acuminata, Schetti, H. Malab. Part. 2. fig. 13.* Jasminum *Indicum* cujus fructus Pavon vocatur. Cerasus umbellata pavonina floribus coccineis, & Jasminum *Zeylanicum* flore pavonino, *Hermanni apud Breyn. Prodr. 2. pag. 58. Ratambala Zeylanensium. è Maderaspatan. habuimus.*

Jasminum *Indicum* Lauri folio inodorum umbellatum floribus albicantibus. P B P. *Phytogr. Tab. 109. fig. 2.* Jasminum arborescens *Indicum* flore tetrapetalo umbellato, foliis Laurinis longioribus & angustioribus, *Breyn. Prodr. 2.* Jasminum *Zeylanicum* flore pavonino luteo, *Hermanni apud Breyn. ibid. Schetti album, s. Bem Schetti, H. Malab. Part. 2. fig. 14.*

Jasminum *Canariense* foliis amplioribus læto virentibus, venosis, hirsutis & asperis, umbellatis *Schetti* floribus purpureis, ex caliculis inflatis, prorumpentibus. Ex *Insulis Fortunatis* nobis advecta. At ex *Indiâ Orientali*; ad D. *Petever* allata est.

Jasminum *Indicum* inodorum, flore pentapetaloide candidissimo dicoccon. Katu-Mulla, *H. Malab. Part. 6. Tab. 56.*

Jasminum *Indicum* sylvestre inodorum Lauri folio, flore polypetaloide summis ramulis innixo monococcon. Katu-Tsjeregam-Mulla, *H. Malab. Part. 6. Tab. 54.*

Jasminum *Indicum* flore polypetalo candido, oris rufescentibus, *Raii Hist. Pl. 1602. Catu-Pitsjegam-Mulla, H. Malab. Part. 6. Tab. 53.*

Jasminum *Indic.* suavissimum flore albo pentapetaloide quinque antheris grandiusculis erectis ornato. Tsjerij-Mulla, *H. Malab. Part. 6. Tab. 49.* Jasminum *Indicum* Myrti Laureæ foliis, flore albo, *Breynij Prodr. 2. 59.*

Jasminum, s. Sambac *Arabum Alpino, JB. T. 2 l. 15. 102. Sambac Arabicum, s. Gelseminum Arabicum, Prosp. Alpin. de Pl. Egypt. 72. Syringha Arabica foliis Mali aurantij. C BP. 398. Nalla-Mulla, H. Malab. Part. 6. Tab. 50. Hoc Jasmini genus describitur Nicuhenhovia in Itiner. sub nomine Fula de Mogori & Murguri, est flore simpliciori foliis ex adverso binis. Variat etiam flore pleniori, undè Jasminum *Indicum* mali aurantiæ foliis, flore albo pleno minore, *Breyn. Prodr. 2. 58. àn Huic referatur Acuilotl Mexicensibus, seu Volubilis aquatica, Hernand. 170. aliorum judiciis relinquo.**

Jasminum *Arabicum* flore amplo pleno odoratissimo, foliis ad genicula ternis. Kud-da-Mulla, *H. Malab. Part. 6. Tab. 51. Foula Mogori Soprano Lusitanis.*

Jasminum *Malabaricum* aurantiæ foliis, flore pentapetaloide niveo, fragrantissimum: Nandi-



Nandi-Ervatam minor, *H. Malab. Part. 2. Tab. 55. Plurimis convenit hoc Jasmini genus cum Arbore tristi Garciae & Acoſtæ hujus Almageſt. 46. Quæ ſatis propriè Jaſminum Indicum arboreum flore albo noctuolente bacciferum nominari poſſit.*

Jaſminum Indicum odoratum, Aurantiæ foliis album, flore multiplici roſeo, è *Maderaspatan. Fortè Nandi-Ervatam major, H. Malab. Part. 2. fig. 54. Fula de S<sup>to</sup>. Antonio Luſitanis. Syringa Malabarica lacteſcens, flore niveo pleno odoratiſſimo, Comelin. Not. in loc. Fortè eriàm Yzquixochitl Mexicenſibus Hernand. f. 69.*

IBERIS latiore folio. *C B P. 97. Iberis, J B. T. 2. l. 22. 918. Iberis Cardamantica, Lob.*

*Iberis Americana, latioribus ferratis foliis, ad caulem verticillatis, Phytogr. Tab. 39. fig. 8.*

*Iberis humilior annua Virginiana ramosior, Morif. Hiſt. 2. 311. aliis Piperitis, & Lepidium Americanum, Raii Hiſt. Pl. 827. Iberidis ſpecies Barbadeſibus Pepper-Grass dicta. Mexiquitl (fortè) Mexicenſibus, s. Naſturtium Iberiſvè Nierenbergij, lib. 14. cap. 58. fol. 316.*

*Iberis Hiſpanica Naſturtij foliis tenuioribus. Iberis Hiſpanica Griseij, Virid. Luſit. àn Iberis Naſturtij folio. C B P. 97. à Flore, ſiliquis, ſapore & odore Naſturtij ſunt ſpecies, eapropter ad eorum genera accenſeri debent.*

ILEX folio Agrifolij *Americana, Phytogr. Tab. 196. fig. 3. Fortè Agria, s. Agri-folia glandifera Anguillara, J B. quale autem ſit hoc ejus Aquifolium, ingenuè fatetur ſe ignorare Bauhinus.*

*Ilex aculeata cocci glandifera. C B P. 425. Ilex coccigera, J B. T. 1. l. 7. 106. Ilex Aquifolia, s. coccigera, Park. Theatr.*

*Ilex arborea, J B. T. 1. l. 7. 95. Ilex oblongo ferrato folio. C B P. 424.*

*Eadem folio anguſto non ferrato. C B P.*

*Eadem folio rotundiore ſpinofa; Ilex, s. Phellodrys candicans latifolia mollitè aculeata. C B P.*

*Ilex folio rotundiore molli, modiceque ſinuato, s. Smilax Theophrasto. C B P. quæ ab Ilice arboreâ, J B. ſpecie non differre putat Cl. Raius, Hiſt. Pl. 1391. ab illo tamèn hâc in re diſſentire cogor.*

*Ilex, s. Phellodrys nigra; J B. Ilex folio Agrifolij (fortè) Magnol. Bot. Monſp. Raii Hiſt. Pl. 1391. Quæ folia habet ſpinofa Agrifolij obſcurè virentia; quam tamen ipſam à vulgari Ilice arborea ſpecie diverſam eſſe, ſe nolle ſtatuerè ait, idem Excellentiff. Magnol. quouſque culturâ innotuerit, pag. 140. Raii noſtro & Nobis planè diverſam videtur.*

*Ilex aculeata foliis nigris ampliſſimis, Phytogr. Tab. 197. fig. 1. Fortè Phellodrys nigra latiſſimo folio, Hiſt. Lugd. 26. in Horto Comptoniano, ſuccreſcit.*

*Ilex, s. Phellodrys, foliis muricatis. C B P. Phellodrys foliis muricatis calyce glandis echinato, Hiſt. Lugd.*

*Ilex Suberifera perpetuo virens latifolia. Suber latifolium perpetuo virens. C B P. 424.*

*Ilex Suberifera anguſtifolia, Lobel. Adverſar. Suber anguſtifolium non ferratum. C B P.*

Ilicis



- Ilicis* facie foliis majoribus levitè aculeatis è *Maderaspatna*. *Phytogr. Tab.* 196. fig. 5. Fortè *Ahuapatli-Tiliacensis Mexicanorum Hernand.* apud *Recc.* fol. 91.  
*Ilex Caroliniensis* longis & angustis foliis, spinis ad oras rarioribus, *Mus. Cortenian.*  
 Fortè *Ilex aculeata baccifera arborea minus ferax Virginiana*, *D. Banister.*  
*Ilex aculeata sanguineis venis, radicibus tuberosis Americana*, *Phytogr. Tab.* 196: fig. 4. *Tlalizta-Patzin* (fortè) *Novæ Hispaniæ, Terentii* apud *Reccum*, fol. 422,

- IMPERATORIA** *Ranunculoides Saniculæ folio major.* *Astrantia major*, *Morif. Umbel.* 7. & 10. *Helleborus niger Saniculæ folio major.* *C B P.* 186. *Roberti Icon.* *Sanicula foemina quibusdam, aliis Elleborus niger*, *J B. T.* 3. l. 34. 368.  
*Imperatoria Ranunculoides Saniculæ folio minor.* *Astrantia minor*, *Morif. Umbel.* 11. *Elleborus niger Saniculæ folio minor.* *C B. Prodr.* 97. *Helleborine Saniculæ folio minor*, *ejusd. C B. Pin.* 186.  
*Imperatoria Ranunculoides Alpina, Saniculæ tenuissimo folio minima.* *Astrantia nigra Alpina minima*, *Raii Hist. Pl.* 475. *Helleborus minimus Alpinus*, *Astrantia flore*, *Boccon. Pl. Sicul.* 9, & 10.  
*Imperatoria Ranunculoides Africana enneaphyllos, Laferpitij lobatis foliis rigidis, margine spinosis*, *Phytogr. Tab.* 95. fig. 2. *Ranunculus perelegans*, *D. Franqueville foliis aculeatis*, *Lob. Illustrat.* 135. *Sphondylii, s. Panacis rigido hirtoque folio*, *Planta Africana caustica.* *P B P.* 378. *Nostræ tamen folia sunt penitus glabra, & lævove splendentia, idcircoque tota planta Laferpitio propius accedit, quam Sphondylia.* *Umbellifera urens, Capitis Bon. Spei.* Huic fortè congener est *Aztaxochitl Novæ Hispaniæ, Terentii* apud *Reccum.* 357.

- IRIS** *Virginiana pumila, s. Chamæiris Verna angustifolia, flore purpureo-cæruleo odorato*, *D. Banister. Phytogr. Tab.* 196. fig. 6.  
*Iris Virginiana pumila, s. Chamæiris Verna odoratissima, latifolia cærulea repens*, *D. Banister. Cat. Virgin.* apud *Raii Hist. Pl. app.*  
*Iris Phalangoides Bermudiana flore parvo, ex cæruleo & aureo versicolore, de Synrichiorum est genere forte.*

**ISATIS** *sylvestris minor Lusitanica*, *Hort. Leyd. in append.* 678.

- JUJUBÆ** *maiores oblongæ.* *C B P.* 446. *Zizypha sativa*, *J B. T.* 1. l. 6. 40.  
*Jujube Arabum, s. Zizyphus Dodonæi, Ger. emac. Jujube*  
*Jujubæ minores rotundæ.* *C B P. ibid.* *Zizyphus, s. Jujuba minor*, *Park. Theatr.*  
*Jujuba sylvestris.* *C B P.* *Zizypha sylvestris*, *J B. Zizyphus, s. Jujuba sylvestris*, *Park. Theatr.*  
*Jujubæ similis arbor Indiæ Orientalis inæqualibus spinis aureis, conjugatis ex cortice candidissimo prorumpentibus armata. Oenoplia (fortè) spinosa.* *C B P.* 477. *Nabca Paliurus Athenæi credita, Prosp. Alpin. de Pl. Egypt.* 19. *Nabca foliis Rhamni vel Jujubæ*, *J B. T.* 1. l. 6. 39. *Oenoplia spinosa*, *Honor. Belli apud Clus. Hist. & Epist.* 5. *Sadar Adhal Serapioni.* Hujus *Icon* exhibetur in *Phytogr. Tab.* 312. fig. 4.  
*Jujubæ similis arbor Mascatensis non spinosa, fructu rotundo. Ex Arabia felice.* *Oenoplia*



noplia (fortè) non spinosa. C B P. *ibid.* Oenoplia, s. Napeca *Bellonij*. *Connarus Alexandrinorum* (fortè) apud *Athenaum*, *Clus. Hist.* 27. àn Lotus *Libyca*. *Polybij Megalopolitani*, lib. 12. *Historiar.* Sadar Affri *Serapioni*. Habetur Icon in nostrâ, *Phytogr. Tab.* 312. *fig.* 3.

Jujuba *Indica* spinosa, folio & fructu longiori. Prunus *Zeylanica* spinosa, folio longiori. P B P. 367. àn Fructus peregrinus 4<sup>us</sup>. *Clus. exot.* lib. 2. cap. 30.

Jujuba *Indica* spinosa, folio & fructu rotundo. Prunus *Zeylanica* spinosa folio rotundo majori. P B P. Ilanda *Zeylanensibus* dicta. àn Fructus peregrinus quintus, *Clus. exot.* lib. 2. cap. 30. Hæc enim duo postrema, alicujus fructus officula fuisse sibi videbantur.

Jujuba, s. *Zizyphus Zeylanica* rotundifolia crenata minor, foliis subtus lanuginosis, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 2. Jujuba *Indica* rotundifolia spinosa foliis minoribus magis viridibus, *Breyn. Prodr.* 2. 60. Prunus *Zeylanica* spinosa folio rotundo minori. P B P. *ibid.*

Jujuba *Indica*. C B P. 446. Item Malus *Maluccensis* nonnihil spinosa, *ejusd.* C B P. 433. Item Pruno similis foliis, Laccam ferens, *ejusd.* 444. Ber *Indica* fructu Jujubino, *J B. T.* 1. l. 6. 44. Malus *Indica Lusitanis* Ber & Bor *Acosta*, *Park. Theatr.* Jujuba *Indica* rotundifolia spinosa, foliis majoribus subtus lanuginosis & incanis, *Breyn. Prodr.* 2. 60. Perin-Toddali, *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 41. Wæ-lambilla *Cinghalensibus* dicta. Massingue titulo, à Sinu *Gangetico* nobis transmissa est. In hujus ramis Formicæ alatæ Laccam conficiunt; & ramulum *Laccæ obsitum sub nomine* Boræ; *Terentius Societatis Jesu Theologus*, ex Indiâ ad Caspar. Bauhinum misit, *Phytopin.* lib. 11.

Jujube, s. *Zizyphus Africana* mucronatis foliis, spinâ gemellâ, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 3. Fortè Jujube *Africana* longissimis & acutissimis spinis horrida, Loti arboris folio, fructu subrotundo, parvo, dulci, *H. Beaumont.* 25. àn Leguanaria. Arbor *Arabica* spinosa, foliis & facie Loti arboris. P B P. 346.

JUNCUS acutus capitulis Sorghi. C B P. 11. Juncus pungens, s. Juncus acutus capitulis Sorghi, *J B. T.* 2. l. 18. 520. Juncus maritimus capitulis Sorghi, *Park. Theatr.* 1192.

Juncus acutus maritimus *Anglicus*, *Parkinsono*, *Raii Hist. Pl.* 1303.

Juncus acutus Alpinus *Cambrobritannicus*, *Park. Theatr.* 1193. Gramen Junceum foliis & spicâ Junci. C B P. 5. Gramen Junceum maritimum, *Lc. Lob.* 18.

Juncus parvus cum pericarpis rotundis, *J B. Tom.* 2. l. 18. 522. Male ponitur, hæc genuini Junci species, pro Gramine Junceo maritimo, *Lobelij à Celiberrimo nostro Raio in Synops. & alibi. quod si recte nos conjectemur, idem etiam est cum* Junco montano palustri, *ejusd. Synops. Stirp. Britan.* 201. Ubi Juncum proprie dictum non esse denunciat.

Juncus acutus paniculâ sparsâ. C B P. 11. Juncus acutus vulgaris, *Park. Theatr. ibidem.*

Juncus lævis vulgaris paniculâ sparsâ nostras, *Raii Hist. Pl.* 1304. àn Juncus lævis paniculâ sparsâ major. C B P. Juncus paniculâ arundinaceâ, *J B. Tom.* 2. 520?

Juncus lævis vulgaris paniculâ compactiore, *Raii Hist. Pl. ibid.* Juncus lævis glomerato flore, *Park. Theatr.* 1191. Fortè etiam Juncus lævis vulgaris, *ejusd. ibid.*

Juncus lævis paniculâ non sparsâ. C B P. 12. Juncus



*Juncus lævis* paniculâ glomeratâ nigricante, *Raii Hist. Pl.* 1305. *Juncus Lithospermi* femine. *H R B.* 106. *Bot. Monsp.* 145.

*Juncus acumine reflexo major.* *CBP.* 12. *Juncus melancranis*, & *Juncus Oxyschænos* foemin. *Hist. Lugd.* 985.

*Juncus acumine reflexo maritimus major*, capitulo rotundo compactiori, *D. Sherard.* Fortè *Juncus acumine reflexo alter.* *C B. Pin.* 12. & *Prodr.* 22.

*Juncus acumine reflexo minor vel trifidus.* *C B P.* 12. & *Prodr. ibid. ubi Icon exhibetur.*

*Juncus parvus* calamo suprà paniculam compactam longiùs producto, *Raii Hist. Pl.* 1305. In *Westmorlandiâ* invenit ille stirpium *Britannicarum* Explorator indefessus, *D. Jacobus Newton*, cujus munere accipiebam. *Hujus Icon habetur, Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 8.

*Juncus acutus maritimus capitulis rotundis.* *C B P. Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 4. *Juncus acutus maritimus alter,* *Park. Theatr.*

*Juncus minor acutus maritimus prolifer*, ex uno capitulo multa, *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 5. àn *Juncus lævis* paniculâ pluribus globulis congestâ, medio culmo prodiens, *Viridar. Lusit.*

*Juncus acutus maritimus*, caule triquetro rigido, mucrone pungente, *Phytogr. Tab.*

*Supp. p. 401* 40. *fig.* 1. àn *Juncus acutus maritimus*, caule triangulo. *C B P.* 11. & *Pr.* 22. *Juncus acutus maritimus*, caule triquetro maximo molli, & procerior nostras, *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 2. àn *Ramacciam*, *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 72.

*Juncus acutus maritimus* caule triquetro molli, spicâ glomeratâ, in Stylo sessili, *Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 3.

*Juncus glomeratus Maderaspatensis* acumine longo geniculato, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 6. *Tsjelli* (fortè) *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 71.

*Juncus minor Barbadosensis* paniculâ compactiori acumine bifido brevi, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 8.

*Juncellus Maderaspatensis* capitulis compactioribus, acumine bifido longiori, *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 7. àn *Motta-pullu*, *H. Malab. Part.* 12. *Tab.* 38.

*Juncus lævis maximus*, *Park. Th.* *Juncus maximus holoschænos*, *J B. Tom.* 2. *Juncus maximus*, s. *Scirpus major.* *C B P.* 12.

*Juncus*, s. *Scirpus medius.* *C B P.* 12. *Juncus Sylvaticus Tabernæmontano*, *J B. Tom.* 2. *lib.* 18. 524.

*Juncus Orientalis* paniculâ speciosâ ex *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 3. *Humanissimi Viri*, & *Mercatoris Londinensis* celeberrimi, *D. Hileard*, favore accepimus.

*Juncus inutilis* ex *Promontorio Bon. Spei.* Fortè idem cum nostrate.

*Juncus elegantissimus* capitulis pectinatis, *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 7. *D. Sherard. amice nobis communicavit.*

*Juncus capitulis longis*, s. *clavatus*, *J B. Tom.* 2. *l.* 18. 525. *Juncus capitulis Equiseti major.* *C B P.* *Juncus aquaticus minor capitulis Equiseti*, *Park. Theatr.*

*Juncus parvis palustris*, cum parvis capitulis Equiseti *Raii Hist. Pl.* 1306. An *Juncus montanus parvus*, cum parvis capitulis luteis, *J B. l.* 2. 523. *Gramen sparteum capitulis Equiseti Merrett. Pin.* 58. *Hujus exhibetur pictura in Phytogr. Tab.* 40. *fig.* 6.

Juncelli



Juncelli omnium minimi capitulis Equiseti, *Raii Phytogr. Tab. 40. fig. 7.* an Juncellus Equiseti capitulis fluitans. *C B. Pin. 12. Prodr. 23.* Primus ejus inventor in Angliâ nostrâ (post Gillenium) fuit amicissimus, & plurimum Reverendus Vir, reique Herbariæ amantissimus, D. Matthæus Dodsworth, qui etiam olim hujus exemplar optime exsiccatum nobis benigne communicavit.

Juncus Alpinus cum caudâ Leporinâ, *J B. T. 2. 514.* Juncus Alpinus capitulo lanuginoso, s. Schœnolaguros. *C B P. 12. Prodr. 23.* Juncus Alpinus Bombycinus, *Park. Th. 1272.* Item Gramen Juncoides lanatum alterum *Danicum*, ejusd. *ibid.* Item Gramen Junceum subcæruleâ spicâ *Cambrobritannicum*, ejusd. *fol. 1188.* Hujus enim spicæ subcæruleæ mox post Natalitia Christi apparent, & per errorem pro diversâ specie ponitur à Parkinsono. Oves cum avidè depascuntur unde *Bos-Crops* Vestmorlandicis dicitur autöre D. Lawson.

JUNIPERUS vulgaris arbor. *C B P. 488.* Item Juniperus Alpina fruticosa ejusd. *ibid.* Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis, *J B. T. 1. l. 9. 293.*

Juniperus Alpina Suevica, s. Polonica in Viretis Belgicis frequens. Exindè Juniperus Belgarum nostratibus vulgo.

Juniperus Virginiana Cupressi foliis rarioribus acutis Sabinam redolens. Juniperus Virginiana, *H. Leyd. 346.* Juniperus Virginiana & Barbadiensis, *Raii Hist. Pl. 1413.*

Juniperus Bermudiana, *H. Leyd. 345.* an Bruta arbor Cupressi fusæ similis exalbidis ramis *Plinij*, lib. 12. cap. 17.

Juniperus major *Monspeliensium*, *Lob. Icon. Part. 2. 223.* Juniperus major baccâ rufescente. *C B P. 489.* Cedrus Phœnicea *Bellonio*, s. Oxycedrus quibusdam, Juniperus major baccâ rubrâ, *J B. T. 1. l. 9. 297.* Oxycedrus, *Hist. Lugd. 38.*

Juniperus Alpina, *J B. T. 1. l. 9. 301.* Juniperus minor montana, folio latiore, fructuque angustiore. *C B P. 489.*

Juniperus major *Dioscoridis*, *Clus. Hist. 37.* Cedrus foliis Cupressi major, fructu flavescente. *C B P. 487.* Thuia genus quartum, *Hist. Lugd. 61.*

Juniperus folio Cupressi media, majoribus baccis teretifolia. Cedrus foliis Cupressi media majoribus baccis. *C B P. 487.* Cedrus Lycia retusa *Bellonio* dicta, *J B. T. 1. l. 9. 300.* Thuia *Massiliensium*, *Hist. Lugd. 59.*

Juniperus Alpina Sabinam referens. Sabina foliis Cupressi altera. *C B P. 487.* Sabina baccata altera *Hist. Lugd. 183.* Sabina altera Cupresso similis in Montis *Amani & Olympi* verticibus proveniens, *Bellonij de Coniferis.* Hanc *Bruæ* comparat, eidemque nomen Arboris vitæ imponit, male igitur quod ab utrisque *Bauhiniis*, ut & *Camerario* factum, hujus Synonymum ad Thuiam *Theophrasti* vulgo, adhibere.

Juniperus è Terra Mariana Cupressifolia ramulis teretibus, & strictissimis. Fortè Sabina Cupresso similis, *Hist. Lugd. 182.* Sabina foliis Cupressi. *C B P. 487.* Hujus generis Arbores adolescentulæ præferunt sua folia, Cedro *Virginiana* perquam similia, nec minus quam illa cuspidibus pungentia, Autore *Banistero.*

Juniperus Caroliniana Thuia *Theophrasto* vulgo, ramulis fusis & compressis, odoratior, *Phytogr. Tab. 40. fig. 9.*

Juniperus Barbadiensis Cupressi folio, ramulis quadratis, *Savin* or *Cypress-Tree* nostratibus dicta, *Phytogr. Tab. 197. fig. 4.* Juniperus fortè major *Americana*, *Parkinson. Theatr. 1029.* Vastæ enim magnitudinis est hujus Arbor ut ex aliorum relatu nos monuit, D. *Jacobus Petever.* C c Iuni-



*Iuniperi foliis Frutex Africanus*. PBP. *Phytogr. Tab.* 197. *fig.* 5. in *HRH.* conspeximus.

## K.



**KAKA-MULLU**, vel *Kaka Moullou*, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 19. Arbor filiquosa *Indica* spinosa flore Papilionaceo decapetalo, filiquis latis monospermis, *Raii Hist. Pl.* 2745. Crista pavonis monospermos secunda, s. Arbor *Vespertilionis Indica* Lentisci folio spinosissima, flore racemoso luteo parvo odorato, filiquâ & semine glabris, *Breyn. Prodr.* 2. 39.

**KAKA-TODDALI** *Malabarica* ex *Oris Cormandel*, *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 5. *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 41. Frutex baccifer *Indicus* spinosus trifolius, floribus spicatis, fructu plano rotundo tricocco, *Raii Hist. Pl.* 1612.

**KALI** majus cochleato semine. *CBP.* 289. Cali vulgare, *J B. T.* 3. l. 35. 702. Kali majus cochleatum, *Park. Theatr.*

Kali spinosum cochleatum. *CBP. ibid.* Kali spinosum, *Park. Theatr.* 1284. Kali spinosum longioribus & angustis foliis. *Tragum Matthioli, Icon Lobel.* 797.

Kali spinosum foliis crassioribus & brevioribus. Kali spinoso affinis. *CBP.* 289. *Tragus spinosus Matthioli*, s. Kali spinosum, *J B. Tom.* 3. l. 35. 706. *Drypis Theophrasti Tabern. Icon.* 144. Item *Tragum Tabernam. Icon.* 702. *Tragum Matthioli Icon. Valgrif.* 1035.

Kali gramineo folio. *CBP.* 289. quod secundum in *Prodr.*

Kali *Curassavicum* procumbens foliis subrotundis. *PBP.* 344. *Phytogr. Tab.* 95. *fig.* 4.

- Kali aizoides *Canariense* procumbens, *Portulacæ* pallescentibus succulentis foliis, aspergine roridâ perpetuò madidis, *Phytogr. Tab.* 303. *fig.* 4. *Poita Camilo Insulanis* dictum; Hæc species est ad caulium nodos prolifera cum floribus ferè inconspicuis. *Vide Supple. p.* 401

Kali geniculatum nostras vulgatissimum minus, non ramosum. Kali geniculatum alterum vel minus. *CBP.* 289. *Salicornia*, s. Kali geniculatum, *Park. Th.* 280.

Kali geniculatum majus. *CBP.* 289. Cali geniculatum, s. *Salicornia*, *J B. Tom.* 3. l. 35. 705. an Kali geniculatum majus sempervirens humilior, *Schol. Botan.* 37.

Kali geniculatum perenne fruticosius procumbens propè *Insulam Shepeij*, *Raii Synops.* 39. Kali geniculatum majus grandius & perpetuum. *CBP.* 289.

Kali geniculatum *Hispanicum* ramosum fruticans, ramulis ad unam partem vergentibus.

Kali *Siculum* lignosum, floribus membranaceis *Boccon. de Plant. Siculis.* 59.

**KATOU-PULCOLLI**, *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 23. Frutex *Indicus* filiquosus. *Alfines.*



Alfines facie diphyllus. Frutex *Indicus* flore dipetalo, capsulâ, oblongâ binis cellulis-bina femina continente, *Raii Hist. Pl.* 1765.

Katou-Tsjaka *Malabarais*, *H. Malab. Part.* 3. *Tab.* 33. Arbor *Indica*, floribus & fructu in globum aggregatis. Cum Arbore *Americanâ* triphyllâ, fructu Platani quodammodo æmulante, *hujus Almagest.* 47. quoad flores saltem, ac fructum, plurimis convenit.

KAUKI *Indorum Breyn. Cent.* 1. 20. Arbor *Indica* Pyri folio densiore, floribus odoratissimis. Elengi, *H. Malab. Part.* 1. ex mente *Anton. Leeuwenhoek Anatom. & Contempl.* 231. *fig.* 11.

KAYJANG, s. Frumentum *Indicum* *Insulæ Formosæ* *Oglew. Chin. Tom.* 2. Kajan (fortè) Tacorifolia, *Clus. exot. lib.* 2. *cap.* 21. *Draconis Arboris foliorum sunt valde similia*, Nascuntur in *Kajanâ & Wiopock*, vid. *Jonst. Dendrolog.* 289.

KINSU, s. Byssini aurei Herba *Sinensium* (i. e.) Silk of Gold, *Ogilv. Chin. T.* 2. 678.

L.



AMIUM luteum, *Park. Theatr.* Lamium folio oblongo luteum. *C B P.* 231. Galeopsis, s. Urtica iners flore luteo, *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 325.

Lamium luteum maculis albis respersum, *Hort. Leyd.* 351. Lamium luteum foliis maculatis, *H. Edinburg.* 181.

Lamium luteum foliis angustissimis nostras.

Lamium vulgare album, s. Archangelica flore albo, *Park. Th.* Lamium album non foetens folio oblongo. *C B P.* 231. Galeopsis, s. Urtica iners floribus albis, *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 324.

Lamium album elegans *Nepetæ* facie *Pyrenaicum* flore minore. àn Lamium album non foetens folio oblongo minus. *HR P.* 99.

Lamium album *Parietariæ* folio *Virginianum*, *Phytogr. Tab.* 41. *fig.* 1. Lamium *Parietariæ* facie, *Moris. Præhud. Bot.* 278. Lamium *Parietariæ* folio *Bruynero*, *Hort. Foncquet.* 69.

Lamium moschatum foliorum marginibus argentatum *Wheleri*, *Itiner. lib.* 4. 309.

Lamium montanum *Melissæ* folio. *C B P.* *Melissophyllon* *Fuchsj Park. Th.* *Melissa adulterina* quorundam, amplis foliis, & floribus non grati odoris, *J B. Tom.* 3. 233.

Lamium *Melissophyllon* album frutescens *Tingitanum*, flore amplo, folio viridi glabro, feminibus nigris pulposis. Lamium arboreum perenne *Candiense*, *Zanon. Hist.* 112. àn *Melissa fruticosa Sicula* calyce amplo patulo, *Raii Hist. Pl.* 568. *Teucrium Tingitanum* vulgò.



*Lamium vulgare* folio subrotundo, flore rubro, *Park. Th.* *Lamium purpureum* foetidum, folio subrotundo, s. *Galeopsis Dioscoridis*. *C B P.* 230. *Galeopsis*, s. *Urtica iners*, folio & flore minore, *J B. T.* 3. l. 28. 323. *variat interdum floribus albis*; undè *Lamium parvum* flore albo perenne *Bobarti*.

*Lamium rubrum* minus foliis profundè incisis *Raii, Phytogr. Tab.* 41. fig. 3.

*Lamium Melissæ* folio paludosum *Belgicum, H. Leyd.* 352.

*Lamium purpureum* foetidum, folio parvo acuminato, flore majore, *Phytogr. Tab.* 198. fig. 1. *Galeopsis*, s. *Urtica iners*, flore purpurascente majore, folio non maculato, *J B. T.* 3. l. 28. 321. àn *Lamium* folio oblongo, flore rubro, *Park. Theatr.* 606.

*Lamium albâ* lineâ notatum. *C B P.* 231. *Lamium Plinij*, lib. 22. quod *Milzatella Italorum* esse creditur, *Camerar. Hort. Medic.* 83. *Lamium Plinij montanum Campoclarense Column. ecphr.* *Galeopsis* folio maculato, *J B. T.* 3. l. 28. 322. *Ubi his verbis sententiam pronunciat, Ego (inquit) facile crediderim, eandem esse hanc, cum præcedenti. Galeopsi purpurea; & in solis foliorum maculis consistere differentiam.*

*Lamium inaculatum. C B P.* 231. *Urtica fatua λευκόςμιλον Thalij Hærcyn.* 132. *Urtica mortua* maculis albis respersa, *Fab. Column.* Hujus folia non lineâ albâ notantur, uti *Milzatella Italorum*, sed argenteis maculis nitent.

*Lamium pusillum rubrum* *Parietariæ* facie *Americanum, Phytogr. Tab.* 41. fig. 2. àn *Lamium Novæ Angliæ Parietariæ* foliis, *Raii Hist. Pl.* 560.

*Lamium* folio caulem ambiente majus & minus, *C. Bauhino, Raii Synops.* 82. *Galeopsis*, s. *Urtica iners* minor, folio caulem ambiente, *J B. T.* 3. app. 853.

*Lamium maximum Sylvaticum* foetidum. *C B P.* 231. *Galeopsis legitima, Dioscoridis, Park. Th.* *Galeopsis*, s. *Urtica iners* magna foetidissima, *J B. Tom.* 3. append. 853.

*Lamium maximum Sylvaticum alterum. C B P.* 231. *Galeopsis maxima*, flore magno rubro, *J B. ibid.* *Galeopsis maxima Pannonica, Park. Th.*

*Lamium Cannabinum* verticillis aculeatis purpureum. *Lamium Cannabis spuria dictum, Raii Hist. Pl.* 561. *Cannabis sylvestris* quorundam *Urticæ* inerti affinis, *J B. T.* 3. app. 855. *Sideritis arvensis aculeata* foliis *Cannabinis*, floribus purpureis, *H. Leyd.* 560. *Urtica aculeata*, foliis ferratis. *C B P.* 232.

*Lamium Cannabinum aculeatum album. Urtica aculeata* foliis ferratis, floribus candidis. *C B P. ibid.*

*Lamium Cannabinum aculeatum*, flore specioso luteo, labiis purpureis, *Phytogr. Tab.* 41. fig. 4. *Cannabis spuria* flore specioso luteo, labro purpureo, *Raii Hist. Pl.* 561. *Urtica aculeata*, foliis ferratis altera. *C B P.* 232. *Cannabis spuria Urticæ facie*, flore variegato, *Florent. Schuyt. Cat. H. Leyd.* 18. àn *Tonalxochitl Ocoitucensis*, s. *Solis nuncius, Hernandez. apud Reccum* 251. *quoad descriptionem.*

**LAPATHUM** præstantissimum *Rhabarbarum Officinar.* dictum, *Morif. Hist.* 2. 577. *Hippolapathum maximum*, rotundifolium exoticum, s. *Rha-ponticum Thracicum*, vel *Rhabarbarum verum, Park. Th.* 154. *Rha-ponticum, Prosp. Alpini exot.* 187. *Rha-ponticum* folio *Lapathi* majoris glabro. *C B P.* 117.

*Lapathum*



- Lapathum folio rotundo alpinum, *J B. T. 2. l. 23. 987.* Lapathum Alpinum folio subrotundo, *Morif. Hist. 2. 578.* Hippolapathum rotundifolium montanum. *C B P. 115.* Hippolapathum rotundifolium vulgare, *Parkinsono Theatr.*
- Lapathum hortense folio oblongo, s. secundum *Dioscoridis. C B P. 114.* Item Hippolapathum latifolium, *ejusd. 115.* Lapathum sativum. Lapas, *J B. Tom. 2. l. 23. 985.* Item Lapathum majus, s. Rhabarbarum Monachorum, *ejusd. ibid.* Lapathum sativum, s. *Patientia; Park. Theatr. 154.*
- Lapathum maximum, s. Hydrolapathum, *J B. T. 2. 986.* Lapathum aquaticum folio cubitali. *C B P. 116.* Lapathum longifolium nigrum palustre, s. *Britannica Antiquorum vera, vel Hydrolapathum nigrum Muntingij.* De cujus viribus & usu ad *Scorbutum* præcipuè, integrum librum *Belgicè* conscriptum promulgavit Author.
- Lapathum vulgare folio obtuso, *J B. T. 2. l. 23. 984.* Lapathum folio subrotundo. *C B P. 115.* Lapathum folio minus acuto, *Icon Lob. 285.* Lapathum sylvestre vulgatius, *Park. Theatr.*
- Lapathum acutum, s. Oxylapathum, *J B. T. 2. 983.* Lapathum acutum majus, *Park. Theatr.* Lapathum folio acuto plano. *C B P. 115.*
- Lapathum folio acuto crispo. *C B P. ibid.* Lapathum acutum crispum, *J B. T. 2. 988.* Lapathum acutum minus, *Park. Th.*
- Lapathum acutum minimum locis uliginosis gaudens. Lapathum minimum. *C B P. 115.* Lapathum acutum minimum, *J B. T. 2. 985.*
- Lapathum folio acuto flore aureo. *C B P. ibid.* Lapathum Anthoxanthon, *J B. T. 2. 987.*
- Lapathum Anthoxantho simile *Maderaspatanum.*
- Lapathum pulchrum *Bononiense* sinuatum, *J B. T. 2. 988.* Lapathum ramis procumbentibus, seminis involucreto dentato, foliis inferioribus fidium instar, *Morif. Hist. 2. 580.*
- Lapathum *Chalèpense* folio acuto, feminum involucris profundè dentatis, *Morif. Hist. 2. 580.* an Lapathum *Arabicum* feminum involucris spinosis, *Bobarti.*
- Lapathum folio acuto rubente. *C B P. ibid.* Lapathum sanguineum, s. Sanguis Draconis Herba, *J B. T. 2. 988.* Lapathum sanguineum, *Park. Th.*
- L A P P A major, Arcium *Dioscoridis. C B P. 198.* Personata, s. Lappa major, aut Bardana, *J B. T. 3. l. 32. 570.* Bardana vulgaris major, *Park. Theatr.*
- Lappa vulgaris major capitulis foliosis. Lappa rosea in *Prodr. descripta. C B P. 198.*
- Lappa major montana capitulis tomentosis, s. Arctium *Dioscoridis. C B P. ibid.* Personata altera cum capitulis villosis *J B. T. 3. 571.*
- Lappa major ex omni parte minor, capitulis parvis elegantè reticulatis. Fortè Arctium montanum, & Lappa minor *Galenii, Lobel. Obs. 318. Icon. 587.*
- L A P P A strumaria foliis angulosis dispersis, echinis bicornibus fursùm rigentibus ad foliorum alas confertis. Xanthium, s. Lappa minor, *J B. T. 3. l. 33. 572.* Xanthium *Dioscoridis* Lappa minor. *C B P. 198.*
- Lappa strumaria, s. Xanthium *Virginianum* folio & fructu grandiori. Lappa *Canadensis* minori congener, sed procerior. *H R P. 110.* Xanthium majus *Canadense, H. Leyd. 635.* Lappa



- Lappa minor polyacanthos*, s. *Xanthium Lusitanicum* validissimis aculeis munitum. *Xanthium spinosum Lusitanicum*. P B P. app. ad finem. Hujus pictura habetur in *Phytogr. Tab. 239. fig. 1.* *Xanthij notæ characteristicæ quoad nostrum Celeberr.* Raium sunt, Flores staminei inutiles, nec Fructui contigui; Fructus durus echinatus, binis intus cellulis bina semina (h. e.) in singulis singula continens, *Hist. Pl. 165.*
- Lappula Eupatoria dispermos*, pinnatis foliis, echinis propendentibus, in spicam adactis. *Agrimonia inodora*, s. minus odora, *Morif. Hist. 2. 614.* *Agrimonia*, s. *Eupatorium*, *J B. Tom. 2. 398.* *Eupatorium veterum*, s. *Agrimonia* C B P. 321.
- Lappula Eupatoria maximè odorata.* *Agrimonia odorata*, *Camerar. Eupatorium. odoratum. C B P. 321.* *Eupatorium alterum odoratum, & aromaticum, Column. ecphr.* Hujus flores sunt hexapetali summis seminibus innascentes, *Lappæ s. echini vascula seminalia duobus plurimum intus nucleis, s. seminibus latentibus; semina non sunt nuda ut vellet Sibbaldus, Hist. Nat. Scotiæ, Part. 2. lib. 1. 23.* Huic forte generi *Plantarum revocetur & Pupal-valli, H. Malab. Part. 7. Tab. 43.* Quæ hujusmodi titulo distingui possit. *Lappula Malabarica* alatis foliis, monospermos spicata, floribus albis pentapetalis.
- Lappula Incantatoria dipetalos spicata major.* *Solanifolia Circæa dicta major. C B P. 168.* *Ocimastrum verrucarium, J B. T. 2. l. 23. 977.* *Circæa Lutetiana major, Park. Theatr.*
- Lappula Incantatoria maxima Americana.* *Solanifolia Canadensis latifolia, flore albo, Schol. Botan. 144.*
- Lappula Incantatoria minor Alpina.* *Solanifolia Circæa Alpina. C B P. ibid.* *Circæa Lutetiana minor, Park. Theatr.* *Circæa minima Column.* Flore bifolio, una cum fructu echinato. Hæc species ab aliis omnibus hætenus allatis, abundè distinguitur.
- Lappula Æquicolorum Lithospermi foliis tetraspermos, echinis in spicam conoideis.* *Lappula rusticorum Elatine Tragi, Hist. Lugd. 1240.* Item *Cynoglossum pusillum Narbonense, ejusd. 1262.* *Cynoglossum minus, itemque medium. C B P. 257.* *Cynoglossum minus, J B. T. 3. l. 33. 600.* *Cynogloss. minus sive pusillum, Park. Theatr. 514.* Item *Cynoglossum minus flore cæruleo, ejusd. 513.* *Cynoglossum minus & medium. C B P. H. Leyd. 216.* Item *Buglossum marinum incanum cæruleo flore, ejusd. H. Leyd. 98.* *Cynoglossa minor montana ferotina altera Plinij, Column. ecphr. Part. 1. 180.*
- Lappula Bermudensis Althæoides spicata, fructu orbiculari majore, Phytogr. Tab. 245. fig. 7.*
- Lappula Benghalensis tetraspermos Ribesii folio, echinis orbicularibus ad foliorum ortus plurimis simul sessilibus, Phytogr. Tab. 41. fig. 5.* *Alcea India Orientalis, fructu lappaceo folio Ribes. Breyn. Prodr. 1.* *Nexpayan Mexicanis apud Hernandez. 390. huic pertinere videtur.*
- Lappula ferè umbellata folio quinquifido pentapetalos, binis feminibus simul junctis. Sanicula Officinarum. C B P. 319.* *Morif. Hist. 2. 616.* *Diapensia sive Sanicula mas Fuchsij, J B. T. 3. l. 34. 639.* *Sideritis tertia Dioscoridis, Fab. Column. Phytobas. 71.*



**LARIX** C B P. 493. Larix folio deciduo conifera, *J.B. Tom. 1. lib. 9. 265.* Conorum rudimentis ardentè rubentibus.

Larix folio deciduo, conorum rudimentis candidissimis.

Larix conifera ex *Promontorio Bon. Spei, Phytogr. Tab. 245.* vid. *Cedrus Conifera.*

**LASERPITIUM** lobatis foliis maximum; fortè *LasERPitium, Prosp. Alpin. 210.* Libanotis latifolia major. C B P. 157. Libanotis alba major, *Tabern. Icon. 107.* Libanotis *Theophrasti* major, *Park. Theatr. 951.* Sefeli *Æthiopicum* secundum, *Clus. Pannon. & Histor.*

*LasERPitium* foliis latioribus lobatis majus. Libanotis latifolia altera, sive vulgarior. C B P. 157. Libanotis *Theophrasti* quorundam, s. Sefeli *Æthiopicum Matthiolo* Cervaria alba, *J.B. Tom. 3. 164.* Fortè etiam Libanotis *Theophrasti* quorundam folio minus rotundo, *ejusd. ibid. 165.* Libanotis *Theophrasti* minor, *Park. Theatr. 951.*

*LasERPitium* foliis amplioribus femine crispo. Libanotidi *Theophrasti* quorundam valdè similis, Costus amara dicta, femine crispo, *J.B. T. 3. l. 27. 165.* àn Libanotis latifolia minor femine crispo. C B P. ut *suprà.* Ex Italiâ *Costi amari semine crispo nomine allata.*

*LasERPitium* minus Paludapij folio, femine cristato. Libanotis minor Apij folio. C B P. 157. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Cervaria nigra, *J.B. Tom. 3. 165.* Item Libanotis *Theophrasti* minor *Lobelio*, *ejusd. J.B. ibid. Lobel. Icon. 705.*

*LasERPitium* majus segmentis longioribus & indivisis, *Phytogr. Tab. 198. fig. 2.* *LasERPitium* (fortè) latiore folio non sinuatum, *Schol. Botan. 167.*

*LasERPitium* lobis angustioribus, & dilutè virentibus conjugatim positis, *Morif. Phytogr. Tab. 198. fig. 3.* àn *LasERPitium* angustifolium non sinuatum. *HRP.*

*LasERPitium* tenuifolium lobis obscurè virentibus, *Phytogr. Tab. 198. fig. 4.* *LasERPitio Lobelij* similis angustifolia, *J.B. Tom. 3.* *LasERPitio Massiolorico* similis angustifolia planta *Chabræi.* àn *LasERPitium* angustifolium femine crispo, *D. Fagon. Schol. Botan. 167.*

*LasERPitium* lobis angustioribus lucidis saturatè virentibus plurifariam divisis, *Phytogr. Tab. 198. fig. 5.* *LasERPitium Gallicum.* C B P. *LasERPitium Massioloricum Lobelij.* *LasERPitium* è Regione *Massiliæ.* allatum *J.B.* fortè etiam *LasERPitium Selinoides* femine crispo *Turnefortii Elem. Bot. 275.*

*LasERPitium* lobis angustioribus longioribus & dilutè virentibus plurifariam divisis, *Morif. Umbel. 64.* *Phytogr. Tab. 198. fig. 6.* *Clarissimus Hermannus, & Sutherlandus noster in suis Catalogis, hanc speciem pro eadem cum LasERPitio Gallico, s. Massiolorico ponunt; At ipse Morisonus in Prælud. clarè pronunciat illam ab hac distingui, quod folia producit dilutius virentia quam Gallicum, cujus folia sunt lucide atro-virentia.* *LasERPitium Selinoides* femine cristato lævi.

*LasERPitium* angustiore folio, Umbellâ concavâ & contractâ, *Phytogr. Tab. 199. fig. 1.* *Schol. Botan. 167.* *Elemens de Botanique, Tom. 1. 275.*

*LasERPitium* Daucoides *Prutenicum* viscoso femine, *Brcyn. Cent. 1. 167.*

*LasERPitium* exoticum, lobis longissimis integris, Ammeos quorundam divisuris, *Phytogr. Tab. 96. fig. 1.*



- LATHYRUS major perennis, *Park. Theatr.* Lathyrus major latifolius, flore majore purpureo Speciosior, *J B. T. 3. l. 17. 303.* Lathyrus latifolius. *CBP. 344.* Clymenum *Matthiol. edit. Valgrif. 971.*
- Lathyrus sylvestris major. *CBP. 344.* Lathyri majoris species, flore rubente & albido minore dumetorum, s. *Germanicus, J B. ibidem.*
- Lathyrus major *Narbonensis* angustifolius, *J B. T. 3. 304.* Lathyrus major sylvestris alter. *CBP. 344.*
- Lathyrus *Tingitanus* flore amplo ruberrimo, *Raii Hist. Pl. 896.* Lathyrus *Tingitanus* filiquis Orobi, flore amplo ruberrimo, *Morif. Hist. 2. 55.*
- Lathyrus sativus flore purpureo. *CBP. 344.* Lathyrus angustifolius flore purpureo, *Gerard.*
- Lathyrus sativus flore fructuque albo. *CBP.* Cicercula, s. Lathyrus sativus flore albo, *Park. Theatr.* Lathyrus anguloso semine, *J B. Tom. 2. 306.*
- Lathyrus filiquâ hirsutâ, *J B. ibid.* Lathyrus angustifolius filiquâ hirsutâ. *CBP. Flore est cæruleo pene violaceo.*
- Lathyrus arvensis filiquis Pisi minoris, *Morison. Hist. 2. 52.*
- Lathyrus arvensis repens tuberosus. *CBP. 344.* Lathyrus arvensis, s. Terræ glandes, *Park. 1061.* Chamæbalanus leguminosa, *J B. T. 2. 324.*
- Lathyrus ἀμφιμαχῶν *Lusitanicus*, filiquas suprà infraque terram gerens. Aracus sub terra filiquifera *Lusitanicus*, *Park. Th. 1069.* Ἀγρία ὀνόμιον *Theophrasti*, Araco similis planta ex *Hispaniâ* missa *Bod à Stapel. Annot. in Theophr. 39.*
- Lathyrus angustifolius semine maculoso. *CBP. 344.* Lathyrus quædam quibusd. *Ægyptia* Aracus, *J B. T. 2. 308.* Cicercula *Boetica* & *Ægyptiaca* *Clusio, Park Theatr. 1065.*
- Lathyrus angustifolius humilior, *Ervum Monspeliensium. CBP. 345.*
- Lathyrus *Boeticus* miniato flore. *Boelij.* Cicercula flore rubente, *Park. Th. 1065.* an Lathyrus foliis gramineis, floribus coccineis, *Raii Cat. Exter. & Hist. Pl. 896.*
- Lathyrus folio tenuiore floribus rubris, *J B. T. 2. 308.* Lathyrus angustissimo, s. capillaceo folio. *CB. Prodr. 148.* Lathyrus major angustissimo folio, *Parkin. Th. 1064.* Lathyrus angustifolius brachyplatolobus flore rubello, *Morisono. Histor. 2. 56.*
- Lathyrus angustifolius leptomacrolobus, semine rotundo, flore rubello, *Morif. ibid.*
- Lathyrus angustifolius leptomacrolobus, semine anguloso, flore cæruleo, *Morif. Hist. 2. 56.*
- Lathyrus sylvestris minor. *CBP. 344.* Catanance leguminosa quorundam, *J B. Tom. 2. 309.*
- Lathyrus luteus latifolius *Botan Monsp. 150.* Lathyri species lutea, *J B. T. 2. 304.*
- Lathyrus arvensis annuus luteus filiquis hirsutis, *Morif. Hist. 2. 52.*
- Lathyrus luteus sylvestris dumetorum, *J B. Tom. 2.* Lathyrus sylvestris flore luteo, *Park. Th.* Lathyrus sylvestris luteus foliis *Viciæ.* *CBP. nescio (inquit Raius noster cur viciæ folia ei attribuit, Synops. 128.)*
- Lathyrus *Boeticus* flore luteo, *Morif. Hist. 2. 51.* Lathyrus (sortè *Hispanicus* flore luteo, *H. Leyd. 357.* Lathyrus æstivus flore luteo, *Ger. emac. append.*
- Lathyrus luteus annuus, foliis *Convolvuli minoris*, *Morif. 2. 52.* *Vicia* sylvestris lutea, foliis *Convolvuli minoris.* *CBP. 345.* *Vicia* quæ *Pitine Anguillara*, latâ filiquâ, flore luteo, *J B. T. 2. 317.* *Aphaca* *Park. Th. 1067.* La-



*Lathyrus* folio integro producente bina foliola capreolos emittentia, *Morif. Hist.* 2. 58. *Ochrus* folio integro capreolos emittente. *C B P.* 343. *Lathyrus* species quæ *Ervilia sylvestris Dodonæi*, *J B. T.* 2. l. 305. *Ochrus*, s. *Ervilia flore & fructu albo*, *Park. Theatr.* 1066.

*Lathyrus* ex apicibus foliorum claviculatus, flore purpuro-rubente, fructu obscuro. *Ervilia* altera flore purpurascente fructu nigricante, *Parkinson. ibid.*

*Lathyrus Ochroides angustifolius* flore cæruleo. Fortè *Lathyrus annuus* flore cæruleo *Ochri filiquâ*, *H. Leyd.* 357.

**LAVANDULA** brevior folio & spicâ, *Clus. Hist.* *Lavendula minor Cordi* (h. e.) fœmina, *Lugd.* *Lavandula angustifolia.* *C B P.* 216. *Pseudonardus*, quæ *Lavendula* vulgò, *J B. T.* 3. l. 28. 281. Flore est cæruleo, habetur & albo. Hinc duæ figuræ apud *Lob. Tabern. Gerard. &c.*

*Lavandula* altera longior folio & spicâ, *Clus. Hist.* *Lavandula major Cordi in Dioscorid. & Hist.* *Lavandula mas, Hist. Lugd.* *Pseudonardus*, quæ vulgò spica, *J B. ibid.* *Lavandula latifolia.* *C B P. ibidem.* Flore communiter est cæruleo, habetur & albo, quare duæ figuræ apud *Tabern. Icon.* 368.

*Lavandula latioribus foliis spicâ brevior gracili.* àn *Lavandula Indica latifolia subcinerea*, spicâ breviori *H R P?*

*Lavandula maritima Canariensis* spicâ multiplici cæruleâ, *Phytogr. Tab.* 303. fig. 5.

• *Lavandula folio dissecto.* *C B P.* 216. *Lavandula multifido folio*, *J B. Tom.* 3. 281. *Lavandula folio multifido*, *Parkinson. Th.* 73.

*Lavandulæ foliis Frutex Gangeticus.*

**LAUREOLA** sempervirens, flore viridi, quibusdam *Laureola mas.* *C B P.* 462. *Laureola sempervirens*, flore luteolo, *J B. T.* 1. l. 5. 564.

*Laureola sempervirens Americana* latioribus foliis, floribus albicantibus, odoris. *Hujus pictura habetur in Phytogr. Tab.* 95. fig. 1. *sub exitum Æstatis floret.*

*Laureola folio deciduo*, flore purpureo, *Officinis* *Laureola fœmina*, *C B P.* 426.

*Laureola* [folio deciduo, s. *Mezereum Germanicum*, *J B. T.* 1. 566.

*Eadem* flore albido, fructu flavescente.

*Laureola Americana* angustiori folio, fructu acri & urente. Nextalpe (forte) aliis *Tlanoquizpatli*, *Nov. Hispaniæ* apud *Recc.* 178. àn potius *Yztacpatlis Atotonilci*, s. *Herba, Francisci Zimbren, Hernandez.* apud eundem *Reccum.* 152.

**LAUROTAXA** *Plinij, Fab. Col. ecphr.* 166. Itèmque, *Radix Idea ejusd. Phytobas.* 63. *Laurus Taxa Hist. Lugd.* 205. *Laurus Alexandrina* fructu pediculo infidente, *C B P.* 304. *Bonifacia*, s. *Bislingua*, *J B. T.* 1. l. 5. 557. *Hippoglossum*, s. *Bislingua* *Park. Theatr.*

*Laurotaxa epiphyllocarpos Victoriola* quibusdam. *Laurus Alexandrina* fructu folio infidente *C B P.* 305. *Laurus, Alexandrina.* *J B. T.* 1. 574. *Laurus Alexandrina* genuina, *Park. Th.* àn *Laurus Alexandrina & Chamædaphne*, *Fab. Column. ecphr.* 164. *Parkinsoni sententiâ diversæ sunt.*

*Laurotaxa angustifolia* ramosa in summitate caulium frugifera. *Laurus Alexandrina* ramosa fructu è summitate caulium prodeunte. *H R P.* 102. *Hippoglossum*



glossum foliis angustissimis, baccis ex oblongis petiolis in extrema ramulorum dependentibus, *Breyn. Prodr. Laurus, Alexandr. fructu longis pediculis caulibus alligato. H R B. 113. & 279.*

*Laurotaxa Myrsinites nostras foliorum cuspidē aculeato. Ruscus, C B P. 470. J B. Tom. 1. 579. Oxymyrline vulgo.*

**L A U R U S** latifolia, *πλατυτέρα Dioscoridis. C B P. 406. Laurus latifolia vulgaris Adolph. Vorstij, H. Leyd. Laurus latifolia Boetica, H. Amst. 189.*

*Laurus vulgaris. C B P. ibid. Laurus, J B. T. l. 4. 405. Laurus media baccifera Vorstij Cat. H. Leyd.*

*Laurus vulgaris foliis undulatis longissimis, Breyn. Prodr. 2. 61. Laurus vulgaris folio undulato H R P. Laurus angustifolia Gallica, Vorstij in Cat.*

*Laurus vulgaris folio undulato minimo, s. brevissimo, Breyn. Prodr. 2. an Laurus Cypria Plinij, quæ folio brevi, nigro, per margines imbricato, crispa?*

*Laurus vulgaris folio minimo lævissimo, Breyn Prodr. 2. an Laurus Delphica Plinij? Laurus Leodiensis Vorstij in Catalog. an Laurus angustifolia mas Tabernæmont. Icon. Tab. 952.*

*Laurus Maderensis angustifolia pallida odoratissima, venis foliorum aversâ parte magis extantibus. Phytogr. Tab. 199. fig. 2.*

*Laurus Regia odoratissima Maderensis P B P. 345. Laurus latifolia Azorica Cinnamonii odore, Hort Amst. 189.*

*Laurus Azorica pallidioribus & latioribus foliis, inodora. Phytogr. Tab. 199. fig. 3. an Laurus Mustacea Pompeio Lenæo Plinij lib. 15. c. 30. folio maximo flacido. & albicante?*

*Laurus Indica Hort. Farnes. Aldino 60. Laurus Americana cujus cortex Cassiæ lignæ multum assimilatur. Park Th. 1488. Laurus Indica, s. Americana Ferrarj. Laurus Regia H R P. An Laurus Regia & Augusta amplissima, & arbore & folio Plinij, dubium movet Breynius. Ego sagacissimi Autoris sententiam amplector, cum Hanc Arborem à Perseâ Clusij diversam esse pronunciarit. Hujus ramuli fructibus onusti pictura habetur in Phytogr. Tab. 304. fig. 1. Laurus Americana, s. Persea Clusij Florent. Schuyl. Cat. H. Leyd. 45.*

*Laurus Indica, s. Americana, foliorum pediculis puniceis.*

**L A U R I** facie Arbor foliis supernâ parte saturatè Viridibus, subtùs candore nitentibus *Americana, Phytogr. Tab. 199. fig. 4. an Laurifolia Arbor Americana, P B P.*

*Lauri facie Arbor venustissimè venosis foliis lacte turgens Americana, Phytogr. Tab. 199. fig. 6. an Mangaibæ, Brasiliensium cognata necnè, Gambodi titulo ex India Orientali inscriptam hanc arborem aliquando conspeximus.*

*Lauri facie Arbor graveolens, foliis pallidioribus, foliaceis pediculis Americana. Phytogr. Tab. 199. fig. 5. an Arbor Indica Nerij foliis splendentibus ex dictatis, D. Herman. subeodem enim titulo aliquando observavimus.*

*Lauri folia minor ex Java an Laurifolia Javanensis. C B P. 461. Mangestans foliis Laurinis, fructu exigui Mali aurei suavissimi, Garc. & Clus. qui addit Folia mali formam magis referre. Mangostans Prunorum Sylvestrium modo crescit*

Part.



Part. 4. *Ind. Orient.* 6. sed figura quæ *Tab. 5.* habetur est *Ligustri Ægyptiaci.* Hæc arbor dicit *Bontius* foliis, trunco & ramis, nisi quod spinosa non sit, *Mali Citrei* arborem æmulatur, nec nisi odore distingueretur.

- *Laurifolia Canarina* diphyllos. *Phytogr. Tab. 305. fig. 1.* Forté *Nimbo Javanensium* prima, s. *Laurus Indica* *Bonti, lib. 6. fol. 99.*

*Laurifolia Jamaicensis* baccifera fructu parvo, oblongo, striato.

- *Laurifolia Nucibaccifera Virginiana, Cornelian Cherry* nostratibus dicta, *Phytogr. Tab. 304. fig. 2.*

*Laurifolia Terenatensis* *C B P. 461.* Beretinus fructus *Clusij exot. lib. 2. cap. 17.*

*Laurifolia* fructu parvo typhoide non papposo gemello, filiquas æmulante, *Arbustula* è *Maderaspatan,* *Phytogr. Tab. 96. fig. 7.*

**L A U R U S** sylvestris Corni fœminæ foliis subhirsutis *C B P. 461.* *Laurus Tinus,* s. sylvestris, *J B. T. 1. l. 4. 489.* *Laurus Tinus Lusitanica,* cæruleâ baccâ, *Park. Th.*

*Laurustinus Lusitanica* triphyllos.

- *Laurus Tinus* alter, vel secundus *Clusij. Parkins. Th.* *Tinus altera,* *J B. ibid.*

*Laurus sylvestris* foliis venosis *C B P. ibid.*

*Laurus sylvestris* folio minore. *C B P.* *Laurus Tinus sylvestris* alter, s. tertius, *Park. Th.* *Tinus tertius* *Clusij, J B. ibid.* Hanc speciem in *Sylva Valena* propè *Monspeleum* oriri Observavit, *D. Raius,* & cùm *J. Bauhino,* sentit eandem esse illâ quam *Lobelius* in *Adversariis* *Laurum Tinum* cæruleâ baccâ vocat, & in *Valenæ nemore* *Narbonæ* plurimum, & plerisque locis *Ceti montis* inter cocciferas *Ilices,* frequentem nasci scribit, quamvis *Casparus Bauhinus,* & *Petr. Magnol* ad primum genus illam referant.

*Laurustino* similis *Jamaicensis,* venosis foliis glabris.

- *Laurustinus Virginiana* floribus albidis elegantè bullatis, *D. Banister. Phytogr. Tab. 199. fig. 7. & Tab. 305. fig. 2.*

**L E N S** vulgaris minor *Moris. Hist. 2. 59. C B P. 346.* *Lens J B. T. 2. l. 17. 341.*

*Lens* major *C B P. Moris. J B. ibid.*

**L E N T I C U L A** palustris vulgaris, *C B P. 362.* *Lens palustris, J B. T. 2. l. 38. 785.*

*Lenticula palustris* major *Comelin. Cat. Pl. Hollandiæ. 63. Morsus Ranae* pictura apud *J. Bauhinum. T. 3. 773.* huic ni fallor optimè convenit.

*Lenticula aquatica* trifulca, *CBP. ibid. J B. T. 3. 786.*

*Lenticula palustris* quadrifolia *CBP. ibid.* *Lens palustris* quadrifolia, *J B. Tom. 3. 785.*

*Lenticula palustris* latifolia punctata. *C B P. ibid.* *Lens palustris Patavina, J B. ibid.* Hanc speciem ad *Filicum* genus accensendam debere minus rectè putavit, *Cl. Rajus Hist. Pl. 142.*

*Lenticula palustris Indica* foliolis subrotundis, binis capillamentis ad imum barbatis, *Phytogr. Tab. 41. fig. 6.*



*Lenticula palustris Aegyptiaca*, s. *Stratiotes aquatica* foliis Sedo majore latioribus. C B P. *ibid* *Stratiotes Dioscoridis*, Hai-alem-maovi *Aegyptiis* vocata, *Prosp. Alpini de Pl. Aegypt. cap. 22. 106. Vide Supp. p. 401.*

**LENTISCUS**, *J B. T. 1. lib. 3. 283.* *Lentiscus vulgaris* C B P. 399. *Lentiscus* è *Chio* foliis angustioribus. àn *Lentiscus* foliis minoribus, & pallidioribus, *H. Leyd. 360.*

**LEONTOPETALON** C B P. 324. *Leontopetalon* quorundam *J B. Tom. 3. lib. 30. 489.*

**LEUCADENDROS** *Africana*, Arbor tota argentea sericea foliis integris. *The Atlas Tree* dicta, *Phytogr. Tab. 200. fig. 1.* àn *Salix conophora Africana* angusto obtuso folio lanuginoso P B P. 372. Hujus ramulus ex *Prom. Bon. Sp.* ad *D. Doody*, Botanicum acerrimum allatus est, qui nobis ad exsculpendum communicavit. àn Arbor ferens folia argentea, *Zanon. fol. 24?*

*Leucadendros Africana* arbor argentea, summo folio crenato, *Phytogr. Tab. 200. fig. 2.* àn *Leucadendros Africana* foliis ferratis *Herman.* fortè *Salix conophora Africana* lato, obtuso, crenato folio lanuginoso. P B P. à *Promontor. Bon. Spei* sibi allatum, ad me misit amicissimus Vir, *D. Patricius Adair.*

*Leucadendros Africana*, s. *Scolymocephalos*, angustiori folio, apicibus tridentatis. *Phytogr. nond. edit. Phytog. Tab. 304 fig. 6*

**LEPIDIUM** latifolium ferratum, *Morif. Hist. 2. 312.* *Lepidium latifolium.* C B P. 97. *Lepidium Aeginetæ Gesner. Hort. Lepidium Pauli, J B. Tom. 2. l. 22. 941.*

*Lepidium Dentellaria* dictum. C B P. 97. *Molybdæna Plinij, Camer. Hort. Med. 102. Plumbago Clus. Hisp. & Histor. Dentellaria Rondeletij Caustica quidem Planta est, quæ applicata carpo, in doloribus dentium admodum commendatur, quamvis alij etiam manu retentam, efficacem esse existiment; ad Lepidium tamen Dentellaria referri non debet, cum nec florem, nec capsulam seminalem conformem Lepidij capsulis, aut siliculis habeat; Sui generis planta esse videtur.*

**LEUCOIUM** bulbosum præcox majus, sex petalis æqualibus & albis, *Morif. Hist. 2. 364.* *Leucoium bulbosum hexaphyllum* cum unico flore, rarius bino, *J B. Tom. 2. l. 19. 590.* *Leucoium bulbosum vulgare.* C B P. 55. Idem flore pleno roseo.

*Leucoium bulbosum minus præcox* tribus petalis albis minoribus cingentibus terna minora herbacei coloris, *Morif. Hist. 364.* *Leucoium bulbosum trifolium minus.* C B P. 56. *Leucoium bulbosum minus triphyllum, J B. T. 2. l. 19. 591.*

*Leucoium bulbosum majus præcox Byzantinum*, tribus petalis albis majoribus terna minora herbacea, s. viridia cingentibus, *Morif. Hist. 2. 364.* *Leucoium bulbosum polyanthemum* tardiùs florens floribus minoribus, *J B. ibid 592.* *Leucoium bulbosum majus, s. multiflorum*, quod aliqui *Acrocorion Plinij* statuunt, C B P. 55.

*Leucoium*



*Leucoium bulbosum ferotinum majus multiflorum, Moris. ibid.*

**LEUCOIMUM** incanum majus. *CBP.* 200. *Leucoium Hyemale & diu durans album* *J. B. T. 2. l. 2. 874. variat flore roseo, purpureo vel rubro, violaceo, coccineo; floribus variè pictis.*

*Leucoium incanum majus multiplex. CBP.* 200. *Leucoium incanum majus, flore multiplici, plénove, Moris. Hist. 2. 240. variat etiam flore purpureo, violaceo, rubro-purpureo, albo: diversorum colorum.*

*Leucoium incanum majus variegatum pleno flore CBP.* 201.

*Idem flore maximo pleno.*

*Leucoium maritimum sinuato folio, CBP.* 201. *Leucoium marinum majus, Park. Th. 622. Leucoium maritimum magnum latifolium, J. B. Tom. 2. lib. 21, 876. Item Leucoiis (fortè) affine Tripolium Anguillara & Leucoium maritimum Camerarij, ejusd. ibidem.*

*Leucoium maritimum angustifolium, J. B. ubi supra. CBP.* 201. *Raij Hist. Pl. 780. Moris. Hist. 2. 241. Leucoium marinum minus angustifolium Lobel. Icon. 331.*

*Leucoium marinum Hispanicum, foliis latis Rapiſtri perfoliatis, flore purpureo Mentzel. pugil Rarior.*

*Leucoium Hispanicum purpureum foliis argenteis rigidioribus cauli appressis, àn Leucoium marinum Creticum primum, Clus. Hist. lib. 3. 298. Leucoium Creticum Thlaspiſifolium, CBP.* 201. *Leucoium marinum Creticum majus, Park. Theatr.*

*Leucoium Creticum marinum cæruleum, Park. Theatr. 623. Leucoium Creticum minimum folio subrotundo, CBP. Leucoium cæruleum marinum Pr. Alpin. exot. 120.*

*Leucoium annuum elegans, Edvard. Morgano. Leucoium annuum sinuato angusto folio, flore dilutè violaceo. Morison. Hist. 2. apud Icones Tab. 8. Sect. 3. item apud Icones Robertinas, hujus pictura absque titulo exhibetur.*

*Leucoium marinum parvum, folio virente crassiusculo, J. B. T. 2. l. 21. 877. Draba cærulea annua, folio virente crassiusculo, Moris. Hist. 2. 235.*

*Leucoium saxatile Thymi folio hirsutum cæruleo-purpureum. CBP.* 291. *Lithoreoleucoium minimum supinum Valvensium Column. ecphraf. 282.*

*Leucoium parvum petræum Atticum sinuatis angustis foliis, partim & gramineis. V. Supp. p. 401*

*Leucoium Africanum, flore Lini cærulei, Molluginis folio ex Codice Comptoniano. Phytogr. Tab. 200. fig. 3. fortè Chichimecapatli, s. Chichimecæ Gentis Medicina, Hernandez. apud Reccum. fol. 138.*

*Leucoium montanum minus, flore parvo, Raij Hist. Pl. 786. Draba alba filiquosa, CBP.* 109. *Hesperis Alpina, s. muralis minor repens, J. B. T. 2. 880. rectius Leucoium montanum, quo nomine ab Alphonso Pancio ad Clusum missa fuit, ut optime notavit idem Raius.*

*Leucoium montanum succulentum, Raij Hist. Pl. 786. Draba alba filiquosa repens, CBP.* 109. *Moris. Hist. 2. 234. Hesperidi Alpinae, s. Murariæ affinis, Draba succulenta, J. B. T. 2. l. 21. 880. Leucoium*

*Leucoium sylvestre latifolium flosculo albido parvo, Raij Hist. Pl. 786. Hesperis sylvestris latifolia flore albo parvo, Park. Th. 628. Draba Eryſimi flore & filiquis*



filiquis, *C B P.* 109. Hesperidi Alpinae murariae affinis surrecta & magna *J B. Tom.* 2. 881. Qui ambigit an non hæc sit Sinapi & Thlaspi media *Provincialis* planta *Lobelij Adv. & Icon.* 211.

*Leucoium Melancholicum*, *H. Eystetens.* Suspiciatur *Johnsonus*, apud *Gerard. emac.* Plantam hanc, minimè diversam esse ab Hesperide montanâ, & primâ *Clus.* (i.e.) Hesperide colore ineleganti. *J B. siquidem flores & siliquæ Hesperidis illius conveniunt hujus descriptioni, nec caules & folia multum abludunt. Parkinsonus* *Leucoium* alterum saxatile obsoleto flore *Columnæ*, huic unam & eandem Specie plantam esse fidenter affirmat; unde & Iconem hujus, sub istius titulo, assumit & proponit in *Theatr. Botan.* 627. *Casparus Bauhinus* ipse *Leucoium Melancholicum* Hesperidis *Syriacæ* *Synonymum* facit; & reverà Hesperis *Syriaca* ab Hesperide montanâ primâ *Clus.* vix aliâ in re quam magnitudine differt; unde eadem specie planta videtur. Quæ si ita sint (ut *Rajo nostro* & nobis etiam videtur) *C. Bauhinus* ex unâ plantâ quatuor facit, nimirum, 1. *Leucoium* incano folio hortense, 7<sup>m</sup>. s. livide rubente colore: 2. Hesperidem montanam pallidam odoratissimam. 3. Hesperidem siliquâ corniculatâ, flore obsoleto. 4. Hesperidem peregrinam filiquis articulatis. Hæc autem planta non est verum & genuinum *Leucoium* ut cum *Parkinsono recte monet Raius Hist. Pl.* 791. sed Hesperidis species Quocirca & illuc transferenda, & Hesperis flore obsoleto denominanda.

**LEUCOIMUM** flore albo odoratissimo folio lucidè virente, *Morif. Hist.* 2. 243. *Leucoium* album odoratissimum folio viridi, *C B P.* 202. *Leucoium* hyemale diù durans, flore albo, folio viridi, & livido glabro. *J B. T.* 2. 875.

*Leucoium* luteum vulgò *Cheiri* flore simplici, *J B. Tom.* 2. 874. *Leucoium* luteum vulgare, *C B P.* 202. variat flore pleno.

*Leucoium* luteum magno flore, *C B P.* 202. & in *Prodr. Keiri*, s. *Leucoium* luteum simplex majus, *Park. Paradis.* variat etiam flore pleno.

*Leucoium* petræum lignosius, folio rigido canescente vulgatissimum.

*Leucoium* sylvestre luteum virente folio lævi, *Leucoium* luteum sylvestre *Clusij.* *J B. T.* 2. 873. *Leucoium* luteum sylvestre angustifolium, *C B P.* 202.

*Leucoium*, s. *Keiri* Alpinum, foliis dentatis, flore flavo odorato, *Zanon.* 110. an *Leucoium* luteum montanum *Ponæ Ital.* *Leucoium* luteum montanum, serrato folio, *C B P.* 201.

*Leucoium* terrestre majus frigidarum Regionum, *Columnæ.* *Leucoium* luteum *Erucae* folio, *C B P.* 201.

*Leucoium* sativum, multiplici flore magno, pallidè flavescente thyrsis florum brevi & compresso. *Keiri*, s. *Leucoium* luteum alterum flore pleno *Raio, Hist. Pl.* 782. Hujus flores omnes simul & eodem ferè tempore aperiantur, non gradatim alij post alios, ut qui spicatim sunt dispositi.

*Leucoium* luteum, s. *Keiri* majus flore pleno ferrugineo. *Park. Parad.* *Leucoium* flore pleno, ex purpureo colore & aureo varium. *H R P.* 114.

**LEUCOIMUM** lunatum seu lunarium latifol. majus annuum filiquâ rotundâ flore violaceo. *Morif. Hist.* 2. 245. *Viola* lunaria major, filiquâ rotundâ. *C B P.* 203. *Lunaria* major filiquâ rotundiore. *J B. Tom.* 2. 881. variat fl. albo.

*Leucoium*



- Leucoium majus* perenne filiquâ lunatâ longâ coronatâ, *Morif. Hist.* 2. 246. *Viola*  
*Lunaria major* filiquâ oblongâ, *C B P.* 203. *Lunaria major*, filiquâ longiore,  
*J B. T.* 2. 882. *variat flore purpureo, & ex albo subcæruleo.*
- Leucoium Alyssoides clypeatum majus*, *C B P.* 201. *Alysson Dioscoridis*, *Park.*  
*Th.* *Alysson* filiquâ latâ aspera quibusdam, *Lunaria* flore luteo, *J B. T.* 2. 934.
- Leucoium Alyssoides clypeatum minus* *C B P.* *Leucoium peltatum Romanum* mi-  
 nus *Column. ecphr. part. alt.* 60. *Alyssum alterum Dioscoridis* minus, *Park.* 590.  
 (h. e.) *Thlaspi incanum Mechliniense*, *ejusd. Park. Th.* 846. *Thlaspi frutico-*  
*sum incanum.* *C B P.* 108. (i. e.) *Thlaspi capsulis sublongis incanum*, *J B.*  
*T.* 2. 923. ut *Rajo* nostro videtur & *Nobis.*
- Leucoium*, s. *Lunaria* vasculo sublongo intorto *Raij Phytogr. Tab.* 42. *fig.* 1.
- Leucoium incanum* filiquis tumidis subrotundis. *Morif. Hist.* 2. 247. *Leucoium*  
*incanum* filiquis rotundis, *C B P.* 202. àn *Leucoium Creticum* flore luteo utri-  
 culato semine *Beluc. Ind. Pis.* 31. huc forte etiam referatur *Leucoium luteum*  
 utriculato semine. *Pr. Alpin exot.* 119. *Eruca peregrina.* *Clus. Hist. lib.* 5. 134.  
*Patavinum* marinum *Leucoion* *Lob. Icon.* 333.
- Leucoium biscutatum asperum Hieracifolium majus*, *Morif. Hist.* 2. 249. *Thlaspi*  
*biscutatum asperum Hieracifolium & majus*, *C B P.* 107. *Lunaria biscutata*,  
*J B. T.* 2. 935.
- Leucoium biscutatum asperum minus.* *Morif. ibid.* *Thlaspi biscutatum asperum*  
 minus, *C B P.* *Iondraba Alyssoides* *Apula spicata* *Column.* *Lunaria lutea* *Dale-*  
*champij Hist. Lugd.* 1214.
- Leucoium Hieracifolium capsulis biscutatis maximis*, flore sulphureo, *Hort. Oxon.*  
*Thlaspi biscutatum* flore sulphureo. *Raij Hist. Pl.* 837. àn *Thlaspi biscutatum*  
 annuum asperum, *HR P.* 175. *Leucoium Alyssoides umbellatum montanum.*  
*Column.*
- Leucoium montanum* flore pedato. *Column. ecphr. Part. alt.* 61. *Thlaspi biscuta-*  
*tum villosum*, flore calcari donato. *C B P.* 107.
- Leucoium Siculum* *Irionis folio*, biscutatum, annuum. *Thlaspi biscutatum Raphani*  
 aut *Irionis folio*, *Boccon. de Pl. Sicul.* 45.

**LEUCOXYLON** arbor filiquosa quinis foliis, floribus Nerij, alato semine  
*Americana Phytogr. Tab.* 200. *fig.* 4. Pseud-apocyni genus quinquefolium *Bar-*  
*densibus* nostratibus, *White-wood*, *Tulip-flower* & aliquandò *Trumpet Flow-*  
*er* nuncupatur An huic Vicina sit Arbor *Xiloxochitl Quauhocolanensem* apud  
*Ant. Nard. Recc. lib.* 3. *cap.* 35. & *Not. Fab. Column. in eund. Recc. fol.* 868.  
*serius inquirendum propono* Fortè Lignum *Brasilianum* ut charta candidum *Ion-*  
*ton. Dendrolog.* 454. *Linschotanus* cretâ & nive candidius ait. *Ind. Or. Part.* 3.  
*cap.* 6. Lignum *Americanum* album, *C B P.* 392. Candidissimum Lignum  
*Brasilianum*, *J B. Tom.* 1. l. 4. 494.

**LIBANOTIS** montana *Apij hortensis foliis nigrioribus.* *Oreoselinum* *Morif. Umbel.*  
 41. *Apium montanum nigrum*, *J B. T.* 3. l. 27. 104. *C B P.* 153. Itèm  
*Apium montanum folio ampliore ejusd.* *C B P.* *Daucus autèm montanus* *Apij*  
*folio minor.* *C B P.* Ab hâc multum dissidet quanquam cum *Fratre*, *J. Bauhi-*  
 no



no, contraria Sententia *Rajo* nostro teneri videtur; adeoque. ex unâ planta duas solummodò facit idem *Casp. Bauhinus*, & non tres, *Vid. Raj. Cat. Stirp. in Exter. Regionib* 12. *Veelgutta Dodon.* 696.

Libanotis altera quorundam, aliis dicta *Cervaria nigra*, *J B. T. 3. l. 27. 165.* Libanotis nigra, s. *Saxifragia Venetorum Lobelij, Moris. Umbel.* 42. *Daucus montanus Apij folio major, C B P. 150. Daucus Selinoides major, Park. Theatr.* 898.

Libanotidis secundæ quorundam, s. *Cervariæ nigræ species, Valdebonæ nomine missa, J B. T. 3. lib. 27. 167. Sefeli secundum montanum Pannonicum, Clus. Hist.* 2. 193. *Daucus montanus Apij folio albicans, CBP. 150. Daucus Selinoides maximus, Park. Th.* 898.

Libanotis *Alsatica* umbellâ parvâ lutescente. *Daucus Alsaticus, C B. Prodr.* 77. *Umbellifera Alsatica magna, umbellâ parvâ, subluteâ, J B. T. 3. 106:*

L I C H E N marinus platyphyllos. *Fucus, s. Alga latifolia prima (i. e.) Muscus marinus Lactucæ folio, C B P. 364. Fucus marinus Lactuca marina dictus, Park. Th.*

Lichen longissimus fluitans tubulosus. *Lichen, s. Lactuca marina tubulosa, Raij Hist. Pl.* 77.

Lichen petræus latifolius seu *Hepatica fontana, C B P. 362. Lichen, s. Hepatica vulgaris, Park. Th.*

Lichen petræus umbellatus. *C B P. Lichen, s. Hepatica minor umbellata. Park. Th.*

Lichen petræus stellatus foliis plumaceis. *Stellati ( fortè ) C B P. varietas perelegans.*

Lichen petræus cauliculo calceato. *CBP. 362. Lichen alter minor caule calceato Column.*

Lichen petræus acaulis foliorum plano calceatus.

Lichen petræus acaulis, foliorum medio Lunulis seminiferis donatus. *Lichen, s. Hepatica lunulata επιφύλλοι κερπ @ Raij Hist. Pl. 125. D. Doody primo nobis ostendit.*

Lichen petræus minimus fructu Orobi, *CBP. 362. Lichen alter acaulis υποφύλλοι κερπ @ Column.*

Lichen petræus acaulis foliorum superficie verrucosus.

Lichen parvus erectus, foliolis profundè laciniatis. *Phytogr. Tab. 42. fig. 2. in Umbrosis humidis ad parvulum fluentum juxta Fontes medicatos apud Dolvicum quatuor circitè milliaria à Londino diffitum, in agro Surriensi, copiosissimum invenimus. Lichenem minimum foliolis laciniatis Raij. Natalis loci, atque Tituli convenientiâ, esse putarem, Nisi Autor ipse non ità pridem nobis asseruit, Hunc eundem esse Licheni caule calceato, Column. (ab ipso tempore à se invento) priusquam suum caulem emittit & capitulum promit.*

Lichen terrestris cinereus *Raij Hist Pl.* 117.

Lichen terrestris cinereus per longitudinem laciniatus, apicibus rubris orbiculatis.

Lichen terrestris foliis angustioribus virescens, *Raij Synops. Stirp. Britan.* 15.

L I G U S T I C U M vulgare foliis Apij, *J B. T. 3. l. 27. 122. Ligusticum vulgare,*



vulgare, àn Libanotis fertilis *Theophrasti*. C B P. 157. Levisticum vulgare, *Park. Theatr.*

Ligusticum humilius *Scoticum* à Maritimis, s. Apium maritimum dulce *Scoticum*, *Phytogr. Tab. 96. fig. 2.* Apium *Scoticum*, & Apium Marinum quibusdam *Newtono, Raii Hist. Pl. 447.* Imperatoriæ affinis Umbellifera maritima *Scotica Sibbald. Prodr. & Cat. Hort. Edinburg.* Siler maritimum *Scoticum* Imperatoriæ facie, *Breyn. Prodr. 2.* àn Ligusticum quorundam foliis Angelicæ, *J B. T. 3. 147.* quod in *Alpibus Liguriæ* vulgò Imperatoria vocatur, ut in hujus Descriptione notat *Casalpinus*.

LIGUSTRUM *Germanicum*. C B P. 475. variat foliis argentatis, & auratis, *Breyn. Prodr. 41.*

Ligustrum foliis majoribus & magis acuminatis toto anno folia retinens. àn Ligustrum Myrtifolium *Italicum*. C B P. 475. & in *Prodr. 158.* Myrti Ligustri folio nomine *Patavio* accepit *C. Bauhinus*.

Ligustrum *Indicum* Alcanna dictum *Bontij*, lib. 6. 143. Ligustrum *Ægyptiacum* latifolium. C B P. 476. Ligustrum *Orientale*, s. Cyprus *Dioscoridis* & *Plinij*, *Parkinson. Theatr. 1447.*

Ligustrum *Ægyptium* Elhanne, s. Tamarhendi vel Alcanna *Avicennæ*, *Prosp. Alpini de Pl. Ægypt. 47.* Ligustri *Indici* species 1<sup>a</sup>. *Bontij 143.* Ligustrum *Ægyptium* Cyprus *Græcorum* Elhanne *Arabum*, *J B. T. 1. lib. 5. 532.* Ligustrum *Ægyptiacum* angustiolium. C B P. 476. In *Hist. Ind. Orient. Part. 4. cum Figur. Tab. 14.* sub titulo Mangostans proponitur, ut rectè animadvertit idem, *Casp. Bauhinus, ibid.*

Ligustrifolia baccifera, fructu nigro caudato ex *Americâ*. Ab honesto Viro, & Hortulano admodum industrio, *Philippo Boufflers Belgâ*, accepimus.

LILIUM *Persicum*. C B P. 79. Lilium *Persicum*, s. *Susianum*, *J B. Tom. 2. lib. 19. 699.*

Lilium, s. Corona Imperialis. C B P. 79. Corona Imperialis, s. Tufai aliis, *J B. Tom. 2. 697.* Hujus plantæ multiplex habetur varietas; variat enim flore pleno, s. multiplici, coronâ etiam duplici, & aliquando triplici; floribus etiam luteis & interdum striatis; caule fasciato & multos deinde flores proferente, undè.

Lilium, s. Corona imperialis multiflora, latoque caule. C B P. quod nil nisi Lusus Naturæ nobis videtur; ut & Corona Imperialis monstrosa, *J B. Tom. 2. 699.*

Lilium, s. Corona Imperialis ramosa. C B P. Tufai *Αιμλωνος Clusii, Hist. 128.*

Lilium floribus reflexis montanum. C B P. 79. Lilium flore nutante ferrugineo minus, *J B. T. 2. l. 19. 692.* Lilium montanum, s. sylvestre. 2<sup>m</sup>. minus *Clus. Hist. 134.*

Lilium Martagon montanum majus floribus reflexis, *Morif. Hist. 2. 408.* Martagon Imperiale, s. Lilium montanum majus, *Park. Paradis.* Lilium flore nutante maximum, *J B. T. 2. 694.* Lilium pyramidale moschatum. C B P. àn Lilium sylvestre, s. montanum 4<sup>m</sup>. *Clus. Hist. 134.*



- Lilium Martagon* floribus reflexis rubris punctatum *Morif.* *Lilium montanum*, s. sylvestre minus *Park.* *Lilium* floribus reflexis alterum lanugine hirsutum. *CBP.* Idem non punctatum *Morif.* *Lilium* floribus reflexis dilutè purpurascens maculis carentibus. *CBP. Var. 78.*
- Lilium Martagon* floribus reflexis albis non punctatis *Morif.* *Lilium* flore nutante albo, *J B. T. 2. 694.* *Lilium montanum* flore albo puro, *Clus. Hist. Pl.*
- Lilium Martagon* floribus reflexis albis punctatis *Morif. CBP. 78.* *Martagon* flore albo maculato *Park.*
- Lilium* floribus reflexis polyanthos album punctatum. *CBP. 78. Morif. Hist. 2. 408.*
- Lilium Martagon Canadense* maculatum *Morif.* *Martagon*, s. *Lilium de Canadâ* auri colorem referens, flore intùs nigris maculis asperfo, *de Bry. Florileg.*
- Lilium Byzantinum* miniatum. *CBP.* Item *Lilium Byzantinum* miniatum polyanthos, *ejusd. ibid.* *Lilium* flore miniato nutante, s. *Hemerocallis Chalcedonica* quibusdam, *J B. T. 2. 695.* *Lilium rubrum Byzantinum*, s. *Martagon Constantinopolitanum*, *Park. Parad. Constantinopoli, Viennam ad Clusium, primo delatum ex Hortis supra Sinum in Cornu Byzantino vulgariter Pera nuncupato sitis, Zufiniare appellatione.*
- Lilium* purpureo-sanguineum flore reflexo. *CBP.* cum *Lilio Zufiniari idem esse vult, Clusius, ibid.*
- Lilium præcox* nutante flore rubro, *J B. T. 2.* *Lilium rubrum angustifolium. CBP. Lilium rubrum præcox, Clusij.*
- Lilium præcox* nutante flore rubro, tenuifolium, *J B. T. 2.* *Lilium* brevi & gramineo folio. *CBP. Lilium rubrum præcox 3<sup>m</sup> angustifolium, Clusij.*
- Lilium* miniatum odorum angustifolium. *CBP. 79.* *Martagon Pomponij, Clus. Cur. Poster. Martagon Pomponium, s. Lilium rubrum præcox, & Lilium Macedonicum, Parkinson.*
- Lilium Martagon flavum angustifolium. CBP. Morif. Hist. 2. 409.* *Lilium* nutante flore flavo, *J B. T. 2. 697.* *Lilium montanum flavo flore maculis distincto, & non distincto, Clusij. Martagon luteum punctatum, & non punctatum, Parkinson. Vide Suppl. pa. 401*
- LILIUM** album flore erecto & vulgare. *CBP. 76.* *Lilium album vulgare. J B. T. 685.*
- Lilium album* floribus dependentibus, s. peregrinum *CBP. Lilium album Byzantinum, Clus. Sultan Zambach, & Martagon Constantinopolitanum albo flore, ejusd. Hist. lib. 2. fol. 135.* *Lilium album Syriacum Rauwolfij, J B. Tom. 2. 687. variat aliquando lato caule numerosos flores proferente, Anno vero subsequente ad ingenium rediens; sic interdum Natura in Plantis ludere solet, inquit Autor.*
- Lilium Canadense* imperfectis floribus, & irregularibus multis albis, *Morif. Hist. 2. 410.* Fortè *Lilium fatuum Coudenbergio, J B. T. 2. 688.*
- Lilium rubens, vel croceum majus, J B. ibid. Lilium purpureo-croceum majus CBP. 76.*
- Lilium phœniceum. CBP. Lilium phœniceum dilutum, J B. T. 2. 690. à præcedenti specie non diversum putat. Cl. Rainus, Hist. Pl. 1110. Huc fortè referendum est Lilium Sandycis colore polyanthos. CBP. ut idem Rainus arbitratur, ubi supra.*
- Lilium rubens vel croceum minus, J B. ibid. Lilium purpureo-croceum minus. CBP. 77. Lilium pumilum cruentum, Park. Lilium*



*Lilium bulbiferum latifolium majus*, C B P. *Lilium bulbiferum majus*, J B. T. 2. 690.

*Lilium bulbiferum incanum*, J B. T. 2. 691. C B P. 77. *Clusij Histor. Plantar.*

*Lilium bulbiferum minus*. C B P. 77. *Lilium bulbiferum repens*, J B. *ibid.* *Lilium cruentum* secundum caulem bulbulis donatum, *Ger. emac.*

*Lilium croceum flore pleno*, J B. *Tom.* 2. lib. 19. 692.

**LIL IUM** luteum radice *Asphodeli*. C B P. 80. *Liliasphodelus luteus*, *Park.*  
*Lilium Asphodeli radice luteum*, s. *Lilio-asphodelus* quorundam flore luteo,  
J B. T. 2. 700.

*Lilium rubrum Asphodeli radice*. C B P. 80. *Liliasphodelus phoeniceus*, *Park.*

*Lilium radice Asphodeli phoeniceum*, s. *Lirioasphodelus* quibusdam, J. *Bauhin.* *Tom.* 2. 701.

**LILIO-NARCISSUS** albus maritimus major, *Morif. Histor.* 2. 366.

*Narcissus Illyricus* Liliaceus. C B P. 55. *Pancratij Monspeliiani* vel *Hemerocallidis Valentina* facie *Lilio-Narcissus*, vel *Narcissus tertius Matthioli*, J. *Bauhin.* *Tom.* 2. 613.

*Lilio-Narcissus* albus maritimus minor, *Morif.* 365. *Narcissus maritimus*. C B P. 54. *Pancratium Monspessulanum* multis, *Scylla alba parva*, J B. T. 2. 611.

*Lilio-Narcissus maximus Javanicus* umbellatis floribus, foliis repandis. *Lilium Javanicum* maximum umbellatum album, radice tuberosâ foliis repandis. P B P. 347.

Idem foliis erectis & crassioribus, *ejusd. ibid.*

*Lilio-Narcissus maximus Zeylanicus* floribus albis umbellatis. *Lilium Zeylanicum* Umbelliferum & bulbiferum, *H. Leyd. app.* 682. *Tolabo Zeylanensibus Mus.* *Zeyl.* *Belutta-pola-taly*, *H. Malab. Part.* 11. *Tab.* 38.

*Lilio-Narcissus Indicus* saturato colore purpurascens, *Morif. Hist.* 2. 367. *Lilium Africanum* *Narcissinis* foliis polyanthos saturato colore purpurascens, *H. Leyd.* 374. *Narcissus Indicus* Liliaceus, saturato colore purpurascens, *Fer. Flor. cult.* 119. *Lilio-Narcissus rubens Indicus Aldini*, *Hort. Farnes.* 83.

Idem diluto colore purpurascens. *Narcissus Indicus* Liliaceus diluto colore purpurascens, *Fer. Flor. cult.* 121. *Lilio-Narcissus* flore obsoleto, *Horti Mæno-Francofurtens.*

*Lilio-Narcissus longifolius polyanthos Africanus* pumilus, saturato colore purpurascens. *Lilium Africanum* humile longissimis foliis polyanthos saturato colore purpurascens, *H. Leyd. app.* 682.

Idem diluto colore purpurascens, *H. Leyd. biid.*

*Lilio-Narcissus Japonicus* rutilo flore, *Morif. Hist.* 2. 367. *Narcissus Japonicus* rutilo flore *Cornuti de Pl. Canad.* 157.

*Lilio-Narcissus Jacobæus latifolius Indicus* rubro flore, *Morif.* 366. *Lilium Indicum* *Narcissinis* foliis, monanthos rubrum, *H. Leyd.* 374. *Narcissus Indicus* totus ruber. C B P. 49. *Narcissus Indicus* latifolius, rubro flore, J B. T. 2. 609. Fortè & *Narcissus Indicus* major præcox & serotinus, *Cornuti* 155.



Idem ex albo rubrum. Narcissus ex albo rubescens. C B P. 49. Narcissus *Garëti* flore albo, exteriori parte rubicundo, *Swertij Florileg.*

Lilio-Narcissus *Americanus* puniceo flore *Bella Donna* dictus. *Lilium Americanum* puniceo flore *Bella Donna* dictum. P B P. 348.

Lilio-Narcissus *Indicus*, s. Narcissus *Liliflorus* aureus striis argenteis pictus, floribus amplis cernuis gemellis, caule magno *Cepæ* fistuloso, *Phytogr. Tab. 246. fig. 2.*

Lilio-Narcissus, s. Narcissus *Liliflorus Carolinianus* flore albo singulari, cum rubedine diluto, *Phytogr. Tab. 42. fig. 3. Ab honestissimo viro, & Hortulano admodum industrio, Gulielm. Darby, recepimus ad; quem hujus radices quam plurimæ ab amico suo è Carolinâ allatæ sunt & in Viridario suo Hogden, vic. Londini, ad aquilonem suburbanum. jam nunc superbiant. apud.*

Lilio-Narcissus *Indicus* pumilus monanthes albus, *Moris. Atamusco* dictus. Narcissus *Virginicus*, *Park. Paradis. vide Suppl. pa. 401*

Lilio-Narcissus *Indicus* flore albo hexagono. Narcissus *Zeylanicus* flore albo hexagono odorato, *H. Leyd. 691. Lunala Zeylanensis. Catulli-pola, H. Malab. Part. II. Tab. 40.*

Lilio-Narcissus *Indicus* maximus Sphæricus, floribus plurimis rubris Liliaceis, *Moris. Hist. 2. 368. Lilium Africanum Sphæricum*, floribus phœniceis majoribus bulbo rotundo, *H. Leyd. 374. Narcissus Indicus Sphæricus* flore Liliaceo, *Bapt. Fer. Florum. cult. 129.*

Lilio-Narcissus Sphæricus *Æthiopicus* foliis guttatis & cilij instar pilosis. *Lilium Africanum Sphæricum*, floribus minoribus obsoletè puniceis, foliis guttatis, ad margines cilij instar pilosis, bulbo oblongo, *H. Leyd. 375. Bulbus oblongus Æthiopicus* foliis guttatis, & cilij instar pilosis, *Breyn. Cent. 1. 89.*

Lilio-Narcissus *Africanus* gemino latiori folio humi strato, floribus puniceis. Narcissus *Africanus* bifolius, s. exoticus, *J B. T. 2. l. 19. 679. Narcissus Indicus* puniceus, gemino latiori folio, *Bapt. Ferr. Flor. cult. 137. Narcissus Indicus* *Serpentarius* παχυφύλλοι & πιλύκαροι *Fab. Column. Not. in Hernand. 885. & 899. Tulipa Capensis, s. Prom. Bon. Spei, Bod. à Stapel. 334. Hæmanthus Africanus, Hort. Leyd. 306. Hujus pictura apud Icones Robertinas satis artificiosè exhibetur.*

L I L I U M convallium album. C B P. 304. *Lilium convallium* vulgò, *J B. Tom. 3. lib. 31. 531.*

*Lilium convallium* flore rubente, *J B. T. 3. 533. C B P. ibid.*

*Lilium convallium* minus, s. *Monophyllum*. C B P. 304. *Unifolium*, s. *Ophris Unifolia*, *J B. T. 3. l. 31. 535. vide Suppl. pa. 401*

L I M O N I U M majus vulgare, *Park. Th. Limonium maritimum majus. C B P. 192. Limonium majus* multis, aliis *Behen rubrum*, *J B. T. 3. app. 876.*

*Limonium minus maritimum nostras. Fortè Limonium medium Anglicum, Park. Theatr. 1234. Limonium maritimum majus alterum ferotinum Narbonense. C B P. Schol. Botan. 6.*

*Limonium maritimum minus, Oleæ folio. C B P. 192. Limonium minus, J B. Tom. 3. append. 877:*



- Limonium* maritimum minus, foliolis cordatis. *C B. Prodr. J.B. Tom. 3. 877.*
- Limonium* maritimum copioso majore flore, foliis in extremo sinuosis. àn *Limonium Siculum* folio cordato, *Boccon. de Pl. Sicul. 64.* Fortè etiam *Limonium Juncoide* ex *Aleppo, Hort. Oxon.*
- Limonium* parvum *Bellidis minoris* folio. *C B P. Dodart. Memoir. 95.* *Limonium pumilum Clusij, Hist. 2. 82.*
- Limonium* minus annuum, bullatis foliis, vel *Echioides*, *Botan. Monsp. 157.*
- Limonium* maritimum villosis foliis *Lusitanicum.* *Limonium Lychnitis coronariæ* folio *Grisleij, Viridar. Lusit.*
- Limonium* fruticosum minimum glabrum, *Phytogr. Tab. 200. fig. 5.* *Limonium maritimum minimum, C B. Prodr. Boccon. de Pl. Sicul. 26.*
- Limonium* minus virgulis reteformitèr se invicem implicatis. *Limonium reticulatum* supinum *Boccon. Phytogr. Tab. 42. fig. 4.*
- Limonium* minimum comatum elegans, *Phytogr. Tab. 42. fig. 5.* An *Limonium* minus densâ caulium foeniculaceâ veluti comâ, *Lel. Triumphet. Catalog. apud Fratrem, 65.*
- Limonium* flosculis elegantissimis, *Francisci de Honuphriis.*
- Limonium* quibusdam rarum, *J.B. T. 3. app. 877.* *Limonium peregrinum Ranzwolfij, Park. Th. 1235.* *Limonium peregrinum* foliis *Asplenij.* *C B P. 192.*
- Limonium Arabicum* foliis solidiori texturâ in lacinias variè sectis. *Phyt. Tab. 95 fig. 6*
- Limonium* peregrinum, caule appendicibus crispis adaucto. *Limonium Africanum* humile & elatius, *Park. Th. 1234.*
- Limonium* *Ferulaceo* folio *Grisleij, Viridar. Lusit.* *Ericæ* facie *Polygonoides Africana* pentapetalos, viticulis in creberrima capillamenta squammulis conflata diffusis, *Phytogr. Tab. 28. fig. 4.* Fortè etiam *Limonium Ferulæ* folio *Boelij, Park. Th. 1235.* *Limonium Hispanicum* multifido folio, *Elem. Botan. 285.*
- Limonium* lignosum *Siculum, Boccon. de Pl. Sicul. 34.* *Polygonum* lignosum à maritimis *Africanum* azurei coloris, foliorum vice squammulis pellucidis ornatum, *Phytogr. Tab. 53. fig. 4.* à *D. Joanne Fissbwicke*, utræque ad nos transmissæ sunt.
- Limonium* peregrinum foliis formâ florum *Aristolochiæ.* *C B P. vid. Bucanephyllon.*
- LINARIA** vulgaris nostras, *Park. Th. 458.* *Linaria vulgaris* lutea, flore majore. *C B P. 212.*
- Linaria Pannonica* flore luteo minore quam in vulgari, *J.B. T. 3. l. 30. 458.* *Linaria* flore pallido; rictu aureo. *C B P. 213.*
- Linaria* lutea montana *Genistæ tinctoriæ* folio. *C B P. ibid.*
- Linaria* lutea parva annua, *J.B. Tom. 3. l. 30. 457.* *Linaria pumila* foliis carnosis, flosculis minimis flavis. *C B P. ibid.* *Linaria lutea Moravica, Clusio, Parkinson. Theatr. 462.*
- Linaria* lutea flore minimo. *C B P. Phytogr. Tab. 96. fig. 3.* Hæc (inquit Autor) in agris Provinciae Galliae brevibus, & angustis foliis, & minutissimis flosculis luteis occurrit. àn *Linaria minima* erecta, *Park. Th. 460?* *Linaria minor æstiva, Ger. emac. Append.*
- Linaria latifolia Dalmatica, Parkinson. Theatr. 456.* *Linaria maxima* foliis *Lauri Dalmatica,*



- Dalmatica*, J B. T. 3. 458. *Linaria latifolia Dalmatica* magno flore. C B P.
- Linaria triphylla major floribus parvis pallescentibus, rictu aureo, calcari subcæruleo donatis, *Phytogr. Tab. 96. fig. 4.* àn *Linaria latifolia triphylla major*. C B P.
- Linaria Cretica latifolia*, *Clus. Hist.* Fortè etiam *Linaria Americana* parvo flore, *Park. Th. 457.* Ex oris enim Orbis Atlantici (ni fallor) & nostra, primo ad nos allata est.
- Linaria triphyllòs minor lutea. C B P. Linaria trifolia, J B. T. 3. 459. Linaria *Valentina*, *Park. Paradis.*
- Linaria *Sicula* multicaulis Molluginis folio, *Boccon. de Pl. Sicul. 38.* Qui dubium movet àn sit *Linaria Cretica angustifolia*, *Clusij* (i. e.) *Linaria quadrifolia* exiguis flosculis cinereis. C B P. Quæ *Raij* nostri sententiâ ad *Linariam tetraphyllam luteam minorem Column.* (h. e.) *Linariam quadrifoliam luteam*, ejusd. C B P. proxime accedere videtur.
- Linaria purpurea magna, J B. T. 3. 460. Linaria purpurea major odorata. C B P. 213.
- Linaria odorata *Monspessulana*, J B. T. 3. 459. Linaria capillaceo folio erecta, flore odoro. C B. *Prodr. 106.* Linaria flore albicante Caryophyllata *Camerar. Hort. Medic. 90.* Linaria Caryophyllata albicans, *Park. Theatr. 458.* Linaria (fortè) sempervirens, *Prosp. Alpin. exot. 207.*
- Linaria odorata *Monspessulana* minor cærulea, J B. T. 3. 461. Linaria arvensis cærulea erecta, C B. *Prodr.*
- Linaria annua purpuro-violacea, calcaribus longis, foliis imis rotundioribus, minor cærulea *Pelisserij Illustr. Lob. Botan. Monspel. 159.* àn *Linaria minor cærulea erecta*, *Park. Th. 460.*
- Linaria annua *Chalepensis* minor erecta, flore albo lineis violaceis notato, *Morif. Hist. 2. 502.* Huic florum calyces ex quinque foliolis uncialibus constructi.
- Linaria annua angustifolia flosculis albis longiùs caudatis, *Triumfetti, 87.* *Præcedentis.* forte varietas calyce quinquefolio brevi. àn *Linaria annua Chalepensis* minor erecta flore omninò albo, *H. Leyd. 379.*
- Linaria odorata, *Park. Th. 459.* Linaria *Bellidis* folio. C B P. *Linariæ* aliquatenùs similis folio *Bellidis*, J B. T. 3. 459.
- Linaria *Americana* maxima purpureo flore, *H. Leyd. 376.* Linaria latissimo folio *Lusitanica.* H R P. 107. *Elem. Botan. 138.* *Antirrhinum triornithophorum*, *Grisleij Viridar. Lusitan.*
- Linaria triphylla cærulea, C B P. Linaria cærulea *Apula* triphylla, *Fab. Column. ecphr.*
- Linaria pumila *Hispanica*, *Park. Theatr. 460.* Linaria pumila supina lutea. C B P. 213. Linaria lutea parva serpens, J B. T. 3. 457.
- Linaria pumila flore pallido ciliis in rictu flavescentibus. àn *Linaria pusilla procumbens latifolia flore pallido, rictu luteo*, *Raii Hist. Pl. 755.*
- Linaria Alpina pumila glauco folio rictu aureo, *Schol. Botan. 72.* àn *Linaria parva Hispanica altera*, *Park. Theatr. 460.* Linaria foliis carnosis cinereis. C B P. 213. Linaria *Hispanica* quarta, *Clus. Hist.*
- Linaria cærulea repens. C B P. 213. Linaria purpurea parva foliis sine ordine dispositis, J B. *Tom. 3. 460.* Linaria cærulea procumbens, *Morif. Hist. 2. 501.*
- Linaria quarta, *Moravica* secunda, *Clus. Hist.*
- Eadem flore candidissimo.



*Linaria quadrifolia Alpina*, *Park. Th.* 461. *Linaria quadrifolia supina*. *C B P.* 213. *Linaria purpurea parva*, *J B. Tom.* 3. 460. *Linaria 3<sup>a</sup> Stiriaca*, *Clus. Hist.*

*Linaria minima*, foliis hirsutis, floribus obsoleti fusci coloris, *Morif. Hist.* 2. 502.

*Linaria Antirrhinum dicta*, *Raii Hist. Pl.* 760. { *Antirrhinum arvense minus*.

*C B P.* 212. *Antirrhinum minimum*, *J B. T.* 3. l. 30. 465.

*Linaria hirsuto folio subrotundo*, flore ex herbido flavescente, *Morif. Hist.* 2. 503.

*Linaria. Elatine dicta folio subrotundo*, *Raii Hist. Pl.* 759. *Elatine folio subrotundo*. *C B P.* 252. *Elatine mas folio subrotundo*, *J. B. T.* 3. l. 29. 372.

*Linaria hirsuto folio acuminato in basi auriculato*, *Morif. ibid.* *Linaria Elatine dicta folio acuminato*, *Raii ibid.* *Elatine folio acuminato in basi auriculato*, flore luteo. *C B P.* 253. *Elatine foemina folio anguloso*, *J B. T.* 3.

*Linaria folio glabro subrotundo*, *Hederæ folio Clematidis*, *Morif. ibid.* *Linaria Cymbalaria dicta Raii, ut supra.* *Cymbalaria.* *C B P.* 306. *Cymbalaria flosculis purpurascens*, *J B. T.* 3. lib. 35. 685.

*Linariae similis*, *J B. Tom.* 2. 461. *Linaria adulterina*, *Ger. emac.* *Linaria montana flosculis albicantibus.* *C B P.* 213. *Anonymos Lini folio*, *Clusij Hist.* Fortè *Yllomaxochitl*, *Novæ Hispaniæ Anton. Recchi, Hist. Mexic.* 444.

• *Linariae similis Arbuscula Canariensis*, folio longiore carnosio fragili, subtus purpurascens *Crithmum resiciens* *Arbor Lavendulae folio*, *J B. Tom.* 1. lib. 9. 265. *Frutex Ind. Orient. Lavendulae folio.* *C B P.* 401. *Arbor Lavendulae folio*, *Clus. exot. lib.* 1. cap. 5. *Pictura hujus exhibetur in Phytogr. Tab.* 304. fig. 3.

**LINUM** fativum. *C B P.* 214. *Linum*, *J B. T.* 3. l. 30. 450. *Linum annuum caeruleum fativum*, *Morif. Hist.* 2. 572.

*Linum arvense.* *C B P.* *Linum sylvestre*, fativum planè referens. *J B. T.* 3. 452.

*Linum sylvestre caeruleum perenne nostras*, *Raii Hist. Pl.* 1073. *Qui Lino perenni majori & minori*, *Morifono Hist.* 573. *Idem facit*; Nam hujus etiam duas species se observasse scribit, ex iisdem seminibus natas, *Histor. append.* 1921. *Alteram, caulibus erectis, foliis latioribus, capitulis majoribus*; *Alteram, caulibus terram versus reclinatis, foliis angustioribus, capitulis minoribus.*

*Linum sylvestre angustifolium flore magno.* *C B P.* *Linum sylvestre angustifolium, caeruleo vel albo, flore magno*, *Park. Th.* 1335.

*Linum sylvestre caeruleum, folio acuto.* *C B. Prodr.* 107. *Linum sylvestre angustifolium caeruleo amplo flore*, *Botan. Monspel.* 161.

*Linum sylvestre angustis, & densioribus foliis, flore minore.* *C B P.* 214. *Linum sylvestre angustifolium flore minore*, *Park. Th. ubi supra.* *Linum sylvestre 4<sup>m</sup> angustifolium 1<sup>m</sup>.* *Clus. Hist.*

*Linum sylvestre angustifol. floribus dilutè purpurascens, vel carneis.* *C B P.*

*Linum sylvestre angustifolium*, *J B. T.* 3. 493. *An Linum sylvestre sextum* *Clus. dubitanter quærit Cl. Raius Hist. Pl.* 1074.

*Linum pratense flosculis exiguis.* *C B P.* 214. *Linum sylvestre Catharticum*, *Ger. emac.* *Chamælinum Clusij, flore albo*: s. *Linum sylvestre Catharticum*, *Park.*

*Th.* *Alsine verna glabra flosculis albis*; vel potius *Linum minimum*; *J B. T.* 3.

*Linum sylvestre minus luteo flore*, *Pinac. Botan. Monspel.* 160. *Linum pumilum, foliis.*



foliis semper binis, albo flore, vel luteo pallente, *Johan. Bauhini, Tom. 3.*  
*Linum luteum Narbonense, J. B. Tom. 3.* *Linum maritimum luteum. C B P.* *Linum sylvestre angustifolium luteum, Park. Th. 1336.*

*Linum latifolium luteum, J. B. Tom. 3.* *Linum sylvestre latifolium luteum. C B P.*  
*Park. Theatr.*

*Linum sylvestre luteum foliis subrotundis. C B P. 214.* Item *Rapunculus nemorosus angustifolius parvo flore ejusd. C B P. 93.* *Bis enim ponit hanc plantam sub diversis generibus.* *Campanula Linifolia lutea Montis Lupi, flore Volubilis, Advers. Lob.* *Campanula lutea Linifolia, Park. Th. 650.* *Lini folia Campanula lutea, J. B. T. 2. lib. 20. 817.* *Lini equidem genuinâ est species, ex flore & semine. Quod etiam Morisonus in Prælud. Bot. 432. asserere videtur, ubi dicit non potest esse Campanula, cum non lactescit, nec capsulam habet seminalem, nec semen Campanulæ, sed Lini. Utcunque alio in loco, viz. Hist. Oxon. 576. quasi oblitus est sui, de hac Plantâ differens sibi contradicit his verbis: Est enim (inquit à fine ultimo (i. e.) flore & capsulâ seminali, Campanula, ergo male collocatur inter Lini species à Casparo Bauhino. Exinde dubitanter locutus est noster Cl. Raius. An vera & genuina Campanulæ species sit, an inter Campanulam, & Linum, ambigat; me latet, ut qui vasculum seminale non observaverim, Hist. Pl. 737.*

*Linum luteum ad singula genicula floridum. C B P.* *Linum luteum, sylvestre latifolium, Fab. Column. Ecphr. Part. 2. 80.* *ubi habetur Icon artificiosè admodum exsculpta.*

*Linum sarmentosum, s. Volubile Jamaicanum, flore cæruleo.*

**LIQUID-AMBAR I** arbor, s. *Styraciflua* Aceris folio, fructu tribuloide, (i. e.) pericarpio orbiculari, ex quamplurimis apicibus coagmentato semen recondens, *Phytogr. Tab. 42. fig. 6.* *Ocosol Indorum Monardes apud Clus. 302.* *Xochicotzo-Quahuitl, Mexicensibus Hernand. Hist. Mexic. 56.* Forte Arbor *Chiapensis* resinam *Styracis* instar fundens *de Laetio Ind. Occid. lib. 7. cap. 4.* *Liquidambar* resina arboris *Ocosolt* dictæ, foliis *Hederæ*, odore *Styracis* liquidæ, *J. B. Tom. 1. lib. 9. 323.* *Liquidambar. C B P. 502.* *Styrax liquida ejusd. C B. Prodr. 158.* *Liquidambar, Park. Theatr. 1590.* Et *Styrax Aceris folio, ejusd. Park. Theatr. 1529.* *Styrax Aceris folio Honor. Belli.* *Styrax arbor Virginiana Aceris folio, Raij Hist. Pl. 1681.* Aut potius *Platanus Virginiana* *Styracem* fundens, *ejusd. 1799.* *Acer Virginianum odoratum Herman. H. Leyd. app. 641.* *Aceris odorati Gretici* titulo habuit, & *D. Edv. Morganus*, rei Herbariæ suo tempore callentissimus; qui in *Horto suo Medico* apud *Westmonasterienses* ponere *Abbatiam*, jam olim permultos annos hanc arborem enutrivit, at reverà nec *Acer*, nec *Platanus* proprie dici potest; Est enim quædam *Heteroclita* & sui generis Arbor.

**LITHOSPERMUM**, s. *Milium Solis, J. B. T. 3. l. 33. 590.* *Lithospermum vulgare minus, Park. Th. 431.* *Lithospermum majus erectum. C B P. 258.*

*Lithospermum minus erectum. C B P. ibid.* *Pulmonaria minor Dalechamp. Hist. Lugd. 1328.* *Lithospermum Anchusæ facie, Lobel. Icon. 458.* Fortè etiam *Lithospermum cæruleum, D. Pelisserij, Lob. Illustrat. 107.* *Lithospermum umbellatum latifolium, Boccon. 76.* *Lithospermum*



*Lithospermum angustifolium umbellatum*, *Pinac. Boccon.* 77. *Phytogr. Tab.* 42. fig. 7.

*Lithospermum Indicum* arborefcens Saligneis foliis quodammodò adumbratis, *vid. inter Arbores*, fol. 44.

*Vide Suppl. p. 401.*

LOBUS membranaceus planus niger, *J.B. Tom. 2. lib.* 17. 278. Ex *Indiâ Orient.* Lobus cum feminibus *Convolvulo* majori accedentibus, *J.B. T. 2. l.* 15. 166. Ex *Indiâ Orientali.*

LOCUS spuria punctatis foliis, Arbor *Americana* fructu parvo Pruniformi officulo fulcato, *Phytogr. Tab.* 200. fig. 6. Fortè Frutex innominatus 5<sup>m</sup>. *Marcgr.* lib. 2. cap. 15. s. Frutex arborefcens innominatus foliis oblongis, acuminatis, levitè ferratis, alternis & veluti perforatis, *ejusd. ibidem.* fol. 81. & 82. An Officulum Fructus *Indici* tuberculofum, *J.B. T. 1. l.* 3. 314. Bastard Locus-Tree *Barbadensibus* vulgo.

LOTUS *Celtis* arbor, *Hist. Lugd.* 347. Lotus arbor fructu Cerafi, *J.B. T. 1. l.* 2. 229. Lotus fructu Cerafi. *CBP.* 447. nigro. Urtica arbor (i. e.) Nettle Tree, à figurâ & scabritie foliorum *Nostratibus*, vulgo.

Lotus arbor *Virginiana* foliis lævibus, fructu Cerafi rufefcente. Lotus arbor *Virginiana* fructu rubro, *Raij Hist. Pl. app.* 1917. Lotus arbor folio glabro, fructu rubro, *Schol. Botan.* 287.

LOTUS filiquofa flore fulco, tetragonolobus, *J.B. T. 2. l.* 17. 359. Lotus ruber filiquâ angulosâ. *CBP.* 332. Lotus quadripinnatis filiquis, *Park. Theatr.* Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγωνόλοβος annua *Cretica* flore saturatè rubro, s. holoserico coccineo, *Morif. Hist.* 176.

Lotus filiquofa lutea *Monspeliens.* *J.B. T. 2.* 359. Lotus pratensis filiquofus luteus, *CBP.* 332. Lotus pratensis *Monspeliensium*, *Park. Th.* Lotus quadratâ filiquâ flore luteo, *Hort. Patav.* Lotus ὀλιγοκέρατος τετραγωνόλοβος perennis *Monspel.* flore luteo, *Morif. Hist.* 2. 176.

Lotus filiquofa lutea, filiquis pinnatis strictioribus & longioribus, *Raij Hist. Pl.* 967. Lotus maritima filiquofa, folio pingui glabro, *Bot. Monspel.* 165. *Hort. Leyd.* 383.

Lotus corniculata glabra minor, *J.B. T. 2.* 356. Lotus, s. Melilotus pentaphyllos minor glaber. *CBP.* 332. Trifolium corniculatum primum, *Dodon.* Lotus πολυκέρατος lutea minor, foliis & filiquis glabris, brevioribus, crassioribus, *Morif. Histor.* 2. 177.

Lotus pentaphyllos frutescens tenuissimis glabris foliis. *CBP.* 332. Itèm Trifolium corniculatum frutescens tenuissimis foliis, *ejusd. Prodr.* 144. Trifolium corniculatum minus angustioribus foliis fruticosius, *Raij Hist. Pl.* 967. Lotus corniculatus frutescens, *Park. Theatr.* 1102.

Lotus corniculata, filiquis singularibus, vel binis, tenuis, *J.B. T. 2.* 356. Lotus annua, ὀλιγοκέρατος filiquis singularibus binis, ternisvè, *Morif. Hist.* 2. 175.

Lotus tenuifolius *Maderaspatanus* filiquâ singulari glabrâ, *Phytogr. Tab.* 201. fig.



- 2 Manneli, *Hort. Malab. Part. 9. Tab. 37.* Quam Genistellæ tinctoriæ speciem facit *Commelinus in Not. supr. Loc.* huic Loto nostro propius quam Anil sylvestri *Bisnagarico, Phytogr. Tab. 101.* accedere videtur.
- Lotus pentaphyllos flore majore luteo splendente. *CBP. 332.* Loti corniculatæ major species, *J. B. T. 2. 355.* Trifolium corniculatum 3<sup>m</sup>. *Dodon. Videtur hanc describere, D. Magnol. sub Titulo Loti pentaphylli majoris hirsutæ candicantis. CBP. Botan. Monsp. 165.*
- Lotus pentaphyllos minor hirsutus, filiquâ angustissimâ. *CBP. 332.* Sub Trifolio corniculato minore piloso in *Prodr. 154.* descriptus. Lotus corniculatus minor pilosus, *Park. Th.*
- Lotus *Maderaspatanis* villosus, Ornithopodij filiquâ singulari, *Phytogr. Tab. 200. fig. 7.* Huc forte spectat Melilotus quædam exotica, *Pr. Alpin. 273.*
- Lotus tetralobos minor *Creticus, s. Lotus parva Cretica* procumbens incana, quaternis filiquis cruciatim dispositis, *Phytogr. Tab. 43. fig. 3.* Candie Lotocruce.
- Lotus parvus hirsutus foliis acutis flore luteo *Creticus* noster, *Raii Hist. Pl. app. 1894.*
- Lotus filiquosus glaber flore rotundo. *CBP. 332.* Trifolium rectum, *Monspessulanum, J. B. T. 2. 359.* Trifolium hæmorrhoidale alterum minus, *s. Lotus Lybica Dalechamp. Park. Theatr.*
- Lotus pentaphyllos filiquosus villosus. *CBP. 332.* Trifolium album rectum hirsutum valdè, *J. B. Tom. 2. 360.* Lotus hæmorrhoidalis major, *s. Trifolium hæmorrhoidale majus, Park. Th. 1102.* Lotus incana, *s. Oxytriphylllum Scribonij Largi. Gerard. Dedit plantam siccam, J. Bauhino, D. Rentzius, hoc Titulo, Dorychnium Casabonæ Florentiæ, & in Horto Bembi.*
- Lotus pentaphyllos filiquosus, humilior & candidior. Trifolium hæmorrhoidale, *s. Lotus humilior & candidior, D. Fagon.* Lotus hæmorrhoidalis humilior & candidior, *Schol. Botan. 234.*
- Lotus πολυκέρατος frutescens incana filiculis subrotundis erectis, *Morif. Hist. 2. 278.* Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis. *CBP. 329.* Dorychnium *Hispanicum, Clus. Hist. 100.* Dorychnium *Monspessulanum* fruticosum, *J. B. T. 1. lib. 11. 388.* Dorychnium supposititium, *Monspeliense & Hispanicum, Park. Th.*
- Lotus πολυκέρατος incana flore majore viridi, *Morif. Hist. ibid.* Lotus pentaphyllos incanus. *CBP. 332.* Dorychnio congener Planta, *J. B. Tom. 1.* Dorychnio congener *Clusio, Park. Th.* Hujus Icon habetur, *Phytogr. Tab. 201. fig. 1.*
- Lotus fruticosior *Africana* foliis incanis, floribus binis amplis coccineis, *Phytogr. Tab. 43. fig. 2.* *Raii Hist. Pl. app. 1894.*
- Lotus argentea *Cretica, Phytogr. Tab. 43. fig. 1.* Lotus πολυκέρατος fruticosa *Cretica* argentea, filiquis longissimis propendentibus rectis, *Morif. Hist. 2. 177.* an Lotus incanus major, *s. Trifolium corniculatum filiquâ grandi incanum maritimum, Raii Hist. Pl. 967.* Hæc Loti species ab Autore circa *Neapolin* in *Italia* fuit observata.
- Lotus πολυκέρατος filiquis recurvis pedes corvinos referentibus, *Morif. Hist. 2. 177.* Loto filiquosæ aliquomodo similis, *Coronopus ex Codice Casareo, J. B. Tom. 2. 358.* Fortè Lotus flore luteo corniculis articulatis, *Sicula, Raii Hist. Pl. 970.*



- an Trifolium Scorpioides ex *Hispaniâ* Boelij, *Park. Th.* 1105. Hæc enim Auctori nostro *Raio* ostensa est *Monspelij* pro Coronopo ex *Codice Cæsareo*.
- Lotus Ornithopodij filiquis, *J. B. T.* 2. 359. *C B P.* 332. Lotus peculiaris filiquosa *Camerar. Hort. Medic.* 91. an Lotus sylvestris *Creticus*, *Park. Th.* 1100. *Cujus* Icon non bene convenit.
- LOT O affinis Arbuscula pinnatis foliis argenteo nitore villosis. Barba *Jovis* *C B P.* 397. *Jovis* Barba pulchrè lucens, *J. B. T.* 1. l. 11. 385. *Jovis* Barb. frutex, *Park. Theatr.*
- Loto affinis pumila pinnatis argenteis foliis, floribus cæruleis globosis. Barba *Jovis* pumila villosa flore globofo purpureo, *Breyn. Prodr.* 2. 22. Astragalus villosus floribus globosis. *C B P.* Orobus villosus globosis floribus, *Morif. Hist.* 2.
- Loto affinis candidior pusilla, pinnatis foliis, floribus in orbem dispositis. Astragalus *Monspeliano* candidior, & Onobrychis aliis, *J. B. T.* 2. 17. 339. Astragalus purpureus montanus, *Park. Th.* an Astragali per similis, pusilla planta palmaris, *Adv. Lob.* 404?
- Loto affinis alata foliis & facie Pentaphylloides fruticosi, floribus in spicam longiorem positis, *Phytogr. Tab.* 67. fig. 5. Trifolium purpureum Ebenus *Cretica* dictum, *ejusd. ibid.* Cytisus *Creticus* ἀρχονδοξύλον *Honor. Belli.*
- Loto affinis triphylla frutescens incana *Cretica*, floribus purpureis, breviori spicâ. Barba *Jovis*, lagopoides *Cretica* frutescens incana, flore spicato purpureo amplo, *Breyn. Prodr.* 2. 23. Trifolium purpureum Lagopodium frutescens incanum *Creticum*, *Morif. Hist.* 2. 140. Ebenus *Cretica*, *Pr. Alp. exot.* 279. Cytisi genus missum nomine Ebeni secundi, floribus purpureis, *J. B. T.* 1. l. 11. 374. Cytisus incanus *Creticus*, *C B P.* 390. Cytisus *Creticus* incanus, s. Ebenus *Cretica* *Belli*, & *Ponæ*, *Park. Theatr.*
- Loto affinis fruticosa Oleæ foliis argenteis integris, Dorychnium *Dioscoridis* fortè *Ponæ Ital.* *Park. Theatr.* Jaceæ Olææ folio affinis. *C B P.* 272. Item Cneoro albo affinis, *ejusd.* *C B P.* 463.
- Loto affinis Coryli folio singulari, *Icon. Roberti, Dodart. Memoir.* Anthyllis Ulmifolia quibusd. *Phytogr. Tab.* 96. fig. 5.
- Loto affinis Vulneraria pratensis. *C B P.* 332. Anthyllis leguminosa, Loto affinis *Vulneraria pratensis*, *Morif. Hist.* 181. *Vulneraria rustica*, *J. B. T.* 2. 362.
- Loto affinis hirsuta flore subrubente, *C. Baub. Phytogr. Tab.* 116. fig. 2. Anthyllis leguminosa purpurascente flore, *Clus. Hist.* Loto affinis hirsuta herba flore suaverubente, *Morif. Hist.* 2. Anthyllis leguminosa flore rubro pulchro, *Grisleij Viridar. Lust.*
- Loto affinis pentaphyllos vesicaria *Hispanica* major inodora. Lotus pentaphyllos vesicaria. *C B P.* Anthyllis leguminosa vesicaria *Hispanica*, *Park. Theatr.* 1094. Anthyllis leguminosa Loto affinis vesicaria *Hispanica*, *Morif. Hist.* 2. 181. Trifolium vesicarium, *Pr. Alp. exot.* 275. Trifolium Halicacabum, s. vesicarium, *J. B. Tom.* 2. 361.
- Loto affinis vesicaria triphylla *Cretica* minor odorata. Trifolium peltatum *Creticum*. *C B P.* *J. B.* Trifolium odoratum peltatum *Creticum*, *Park. Th.* an Melilotus vesicaria *Cretica*, *Hort. Aldorf?* *Raij Hist. Pl.* 952.



Loto affinis filiquis hirsutis circinatis, *C. Bauhini*, *Moris. Hist.* 2. 181. Item Loto affinis Anthyllis falcata *Cretica*, *Park. ejusd. Moris.* 182. Anthyllis leguminosa marina *Bætica* vel *Cretica*, s. Auricula muris *Camerarij*, *Park.* 1093. Item Loto affinis leguminosa falcata *Cretica*, *ejusd.* 1094. Trifolium falcatum, *Prosp. Alpin. exot.* 257. Auricula muris *Camerarij*, *J. B. Tom.* 2. lib. 17. 387.

*n/*  
**LUCINIUM** arbor Tiliæ foliis minoribus *Americanum*, *Phytogr. Tab.* 201. fig. 3. Fortè Curupicaiba *Brasiliensibus*, *Marcgr. fol.* 132. àn Arbor Populo similis resinosa. *C. B. P.* 430. Populo similis Tocotgebit, cui Resina, Thuris candidior, *J. B. T.* 1. lib. 9. 329. Tocot guebit (i. e.) Lignum Desiderij, s. exoptatum *Fragosi Ind. Occid.* Populo similis summi candoris, cujus materies ob candorem, levorem, & splendorem summè expetebatur ad Idola fabricanda. fortè etiam Arbor lucens *Jamaicensis* nostras, *Raij Hist. Pl.* An Arbor Muscarum splendentium, *Ionst. Dendrolog.* 471. *Barbadiensibus* nostratibus, *Quibusdam Light-wood*, *Alijs*, Lignum Rhodium nuncupatur, Fortè tamen non propter splendorem sed hujus ligni levitatem **Light-wood**, à Nostratibus nomen obtinuit, Et tum Elaphroxylon nominare placet, & querendum propono, An non sit Mofuma arbor *Angolensis*, ex cujus ligno omnes Canoas conficiunt *Indigenæ*; His enim arboribus lanugo quædam Capoc innascitur, quâ Nautæ utuntur plumarum vice, ad pulvinos suos sarcientos. *Ogilv. Afric.* 557. Inde suspicor hanc arborem Populum nigram & Africanam, & Americanam esse ab Europæâ foliis haud multum abludentem. An fortè, Ampousoutchy *Insulæ Madagascar* *Ogilv. Afric.* 688. Cujus lignum est levissimum, album, & facile secatur. àn Arbor Naldivensis Candou *Purches. Ionst. Dendrol. Raij Hist. Pl.* 1791. Suberi ligno affinis est, par *Inglanti* proceritate; Caudici, qui fungosus & Subere levior, Cortex candicans, fructus nullus. An forte Ceyvas arbor grandis in *Indiâ*, ex quibus Indi suas Canoas fingunt & excavant. 9. *Park. Ind. Occid. lib.* 4. c. 30. *C. B. P.* 513. Ligno est fungoso ut *Suberis*, fructu lanâ referto, & semine bombacis. Arbores maximæ allitudinis & crassitudinis, ut *Ceibæ*. *J. B. T.* 1. lib. 4. 503. Item Lignum levissimum *ejusd. J. B. T.* 1. 4. 494. de quo Ligno etiam *Clusius exot. lib.* 1. cap. 8. An Arboris *Igæ* cortex ad Navigia, *J. B. T.* 1. l. 4. 506. Yuera *Jo. Stadij. Part. Ind. Occid. lib.* 3. c. 25.

**LUNARIA** racemosa minor, vel Vulgaris, *C. B. P.* 354. Lunaria Botrytis *J. B. T.* 3. l. 35. 709. Lunaria minor, *Park. Th.*

Lunaria botrytis minor pinnulis laciniatis in Borealibus nostris. àn Lunaria racemosa minor *Adianti folio*. *Breyn. Cent.* 1. 183.

Lunaria botryites ramosa *Silesiaca*, *J. B. T.* 3. 711. Lunaria Botryites ramosa ex *Silesiâ Camer. Hort. Med.* 91. à *D<sup>no</sup>. Friderico Sebicio* sibi transmissa. Lunaria racemosa multifido folio, *C. Bauhini Breyn. Cent.* 1. 184.

Lunaria racemosa *Cicutariæ foliis Jamaicana*. àn Lunaria racemosa minor *Matricariæ folio*, *Breyn. Cent.* 1. 184.

**LUPINUS** sativus flore albo, *C. B. P.* 347. Lupinus vulgaris femine & flore albo sativus, *J. B. T.* 2. lib. 17. 288. Lupinus vulgaris, s. sativus albus *Moris. Hist.* 2. 86. Lupinus



- Lupinus peregrinus major villosus, *C B P.* 348. Lupinus exoticus hirsutissimus, *J B. T.* 2. 289. Lupinus cœruleus, maximus *Park.* Lupinus, *Indicus Cornuti.* 207. Lupinus major villosis foliis *Maderensis* flore albo & purpureo. àn Lupinus *Indicus* medius cœruleus, *Park. Th.* 1075. Lupinus medius cœruleus, *Raij Hist.* 907. Lupinus cœruleus minor, *Gadensis Moris. Hist.* 2. 87. àn Lupinus albus maximus, cujus flos antequàm aperiatur, subcœruleus, intùs verò albus, *Camerar. H. Medic.* 92. Lupinus sativus major, & Lupinus *Æthiopicus* quorundam, *H. Eyst.* Fortè etiam Lupinus incarnatus, *H. Leyd.* 386. *Vide Supp. pa. 401*
- Lupinus cœruleus minor, *Park. Th.* Lupinus sylvestris flore cœruleo. *C B P.* 348. Lupinus sylvestris purpureo flore, semine rotundo vario, *J B. T.* 2. 291. Lupinus sylvestr. angustifolius, *Moris. ibid.*
- Lupinus cœruleus minor perennis *Virginianus*, *Moris. ibid.* An Lupinus *Indicus* minor. *H R P.* 111.
- Lupinus flore flavo, *Park. Raij Hist. Pl.* 908. Lupinus sylvestris flore luteo. *C B P.* 348. Lupinus luteo flore, semine compresso vario, *J B. T.* 2. 291.
- Lupinus luteus *Virginianus* perennis. àn Lupinus peregrinus minor, s. angustifolius folio. *C B. Pin.* 348. Qui Lupini *Africani* nomine accepit, & sub Lupino minimo in *Prodromo* descripsit.
- Lupini folio planta *Africana* villosa. Ex *Promont. Bon. Spei.* àn Mica-xoxo-coyollin, *Nova Hispania*, *Anton. Recc.* 386.
- Lupulus mas. *C B P.* 298. *J B. T.* 2. l. 15. 151. Convolvulus perennis heteroclytus floribus herbaceis, capsulis foliaceis, Strobili instar, *Moris. Hist.* 2. 37
- Lupulus fœmin. *C B P. ibid.* *J B. ibid.* Lupulus sylvestr. minor sine fructu, *Moris. ibid.*
- Lupulus sylvestris *Americana* claviculis donata, *Phytogr. Tab.* 201. fig. 4. *Wild*  
Hop-seed *Barbadiensibus* dicta. Coryli, s. Avellanæ folio oblongo & acuminato  
Frutex Convolvulaceus capreolatus *Americanus*. *P B P. Phytogr. Tab.* 162.  
huic plurimùm convenit.
- Lupulo vulgari similis, *Ind. Orient.* floribus in spicam ex origine foliorum prodeuntem, *Phytogr. Tab.* 201. fig. 5. *à dispos.*

LYCHNIS hirsuta flore coccineo major. *C B P.* 203. Lychnis *Chalcedonica* flore simplici miniato *Park.* Flos *Constantinopolitanus* miniatus, albus, & varius, *J B. T.* 3. l. 29. 344. Flos enim colore variat albo, carneo, variegato, petalorum etiam multiplici serie.

Lychnis Auriculæ Ursi facie. *C B P.* 206. & in *Prodr.* Lychnis sylvestris latifolia, *Clusij*, Viscago *Cretica* Auriculæ Ursi facie, *J B. Tom.* 3. l. 29, 352. àn Lychnis Viscaria maxima *Cretica*, *Pr. Alpin. exot.* 136. Cl. noster *Raius* eandem esse suspicatur, quamvis nec descriptiones, nec Icones per omnia convenient.

Lychnis Umbellifera montana, *Helvetica Zanon.* 128. Lychnis coronaria sylvestris. *C B P.* 204. Item Verbascum acuto *Salviæ* folio, ejusd. *C B P.* 240. Verbascum Lychnites *Syriacum* incanum, summitate Floris *Hierosolymitani*, *J B. T.* 3. app. 876. Lychnidis *Chalcedonica* umbellâ, Phlomos Lychnitis altera *Syriaca Lobel.* Item Lychnis coronaria rure nata, ejusd. *Lob. Adv.*

Lychnis coronaria fativa. *C B P.* 203. Lychnis coronaria vulgò, *J B. T.* 3. 340. Flos



- Flos colore albo, carneo, coccineo, & ex candido carneoque mixto variat; Colitur etiam in Hortis multiplici petalorum serie insignis.*
- Lychnis sylvestris alba simplex CBP. 204. Ocymoides album multis, J B. Tom. 3. 342. Ocymastrum vulgò. *Variat etiam flore plenissimo.*
- Lychnis sylvestris, s. aquatica purpurea simplex. CBP. Ocymoides purpureum multis, J B. *ibid.* 343. *Variat etiam flore multiplici.*
- Lychnis sylvestris hirsuta annua flore minore carneo, *Moris. Hist.* 2. 541. àn Lychnis purpurea simplex, flore minore, folio rotundiore, *Schol. Botan.* 109.
- Lychnis annua foliis oblongis mucronatis flore amplo rubello, capsulâ oblongâ pyramidali, *Moris. Hist.* 2. 542.
- Lychnis noctiflora. CBP. 205. Lychnis frutescens noctiflora, *Moris. Hist.* 2. 538. Ocymoides non speciosum, J B. T. 3. 344.
- Lychnis vel Ocymoides repens montanum. CBP. 206. Saponaria minor quibusdam, J B. T. 3. l. 29. 344.
- Lychnis hirsuta angustifolia *Cretica*. CBP. 206. Lychnis sylvestr. 7. *Clus. Hist.* 290. Lychnis *Cretica* angustifolia, *Park. Theatr.* Ocymoides flore rubro minus *Creticum*, J B. T. 3. 352. *Vide Supp. pa. 401.*
- Lychnis *Africana* minor hirsutis subrotundis foliis, floribus copiosis in summitate rubellis.
- Lychnis sylvestris lanuginosa major. CBP. 206. Lychnis hirta, *Lobelij Icon.* 337. Lychnis sylvestris lanugine canescens, flore majusculo rubescente, *Clusio.* 5. J B. Tom. 3. 348. àn Lychnis sylvestris annua angustifolia flore rubente, *Raij Cat. Angl.* 193. Lychnis sylvestris trimestris flore rubello, *Grisleij Viridar. Lusit.*
- Lychnis sylvestris lanuginosa minor. CBP. Lychnis sylvestris 6. *Clusij.* Lychnis parva, J B. T. 3. 352. Lychnis sylvestris hirta minima, *Lob. Icon.* 339. àn Lychnis erecta parva, flore rubello, folio longo angusto, *Raij Hist. Plant.* 997. *Frequens habetur flore albicante.* Undè.
- Lychnis hirta minima flore albicante. àn Lychnis sylvestris flore albo minimo, *Raij Hist.* 996. *Synops.* 140. Lychnis arvensis minor *Anglica*, *Park. Th.*
- Lychnis hirsuta, flore elegantè variegato, *Raij Hist. Pl.* 997. Lychnis hirsuta minor flore variegato, *Dodart. Memoir.* 99. Lychnis, sylvestris lanuginosa. minor flore variegato, s. maculis rubellis ad nigredinem vergentibus notato, *Moris. Hist.* 2. 544.
- Lychnis sylvestris alba spicâ reflexâ, *Botan. Monsp.* 171. Lychnis sylvestris altera *Monspeliensium* spicâ nutante. *HRP.* 113. Lychnis segetum *Meridionalium* annua hirta, floribus albis, uno versu dispositis, *Moris. Hist.* 2. 544.
- Eadem floribus indiscriminatim circâ caulium summitates, *Moris. ibid.*
- Lychnis sylvestris viscosa, flore rubro reflexo, *Grisleij Viridar. Lusitan.*
- Lychnis minima cum floribus uno versu dispositis vix conspicuis. àn Lychnis sylvestris flosculo rubro vix conspicuo, *Grisleij Virid. Lusit.* Fortè etiam Lychnis sylvestris flore fugaci. *HRP.* 113.
- Lychnis minima rigida *Cherleri*, J B. T. 3. 352. Lychnis sylvestris minima exiguo flore. CBP. *Schol. Botan.* 112.
- Lychnis sylvestris minima angustifolia procumbens, flore ex albido virescente, in *Hort. D. Doody*, ex seminibus natam observavimus. àn Lychnis minima supina folio viridi angustissimo, flore herbacei coloris, *Schol. Botan.* 112. Fortè etiam
- Lychnis



- Lychnis maritima* repens strictissimis foliis, *Morif. Prælud. Botanic.* 283.
- Lychnis Æthiopica* noctiflora Spicæ foliis, *Breyn. Fascic.* àn *Lychnis peregrina* Spicæ vel Lavandulæ folio, *Schol. Botan.* 112.
- Lychnis Chalepensis* annua foliis parùm hirtis & angustis, flosculis carneis, pediculis infirmis biuncialibus insistentibus, capsulis ferè rotundis, *Morif. Hist.* 2.
- Lychnis sylvestris* peregrina noctiflora odorata, *Zanon.* 126.
- Lychnis sylvestris* pluribus foliis simul junctis. *C B P.* 205. *Lychnis sylvestris* foliis angustis & pluribus, ex geniculis singulis, *Clusio* 1. in *Hispan.* 8. in *poster. Hist.* 7 *B. Tom.* 3. 348.
- Lychnis sylvestris* latifolia calyculis turgidis striatis. *C B P.* *Muscipula* major calyce turgido ventrioso, 7 *B. Tom.* 3. 349. *Lychnis sylvestris* calyculis striatis, *Park. Theatr.*
- Lychnis sylvestris* angustifolia calyculis turgidis striatis. *C B P.* 205. *Muscipulæ* majori calyce ventrioso similis, 7 *B. T.* 3. 349. *Lychnis sylvestris* incana calyculis striatis, *Park. Th.* *Lychnis* angustifolia calyculis turgidis striatis, *Morif. Hist.* 2. 543. àn *Lychnis palustris* folliculo striato, *Grisleij.* Huic etiam affinis est *Tlatla-Lamotic*, *Novæ Hispan. Terentij* apud *Recc.* 427.
- Lychnis montana* viscosa alba latifolia. *CBP.* 205. *Polemonium petræum Gesneri*, 7 *B. T.* 3. 351. *Lychnis sylvestris*, s. *montana* latifolia viscosa, florum petalis suprà albis, subtùs virescentibus, interdù se contrahentibus, *Morif. Hist.* 2. 535. *Lychnis* major noctiflora *Dubrensis Newtoni*, *Raij Hist. Pl.* 995. *Fasc.* 15.
- Lychnis sylvestris* viscosa rubra angustifolia. *C B P.* *Odontidi*, s. *Flori cuculi* affinis, *Lychnis sylvestris* 1. *Clus.* in *Pann.* 4. in *Hist. poster.* *J B. T.* 3. 348. Eadem floribus immaculati candoris.
- Lychnis viscosa* rubra altera sylvestris. *C B P.* 204. *Muscipula* viscaria, s. *Lychnidis* species, 7 *B. T.* 3. 349.
- Lychnis viscosa* foliis lanuginosis floribus carneis. *C B P.* *Lychnis sylvestris* semine nata. 3. *Clus. Hist.* 294. *Muscipula Italica* flore carneo, *Park. Th.*
- Lychnis elatior* glabra, flosculis albidis, ad summa caulium internodia, rubidum exsudans viscum. *Banist.* est *Virginie* alumna.
- Lychnis viscosa* purpurea latifolia lævis. *C B P.* 205. *Muscipula Lobelij*, *Park. Th.* *Centaurium minus adulterinum*, quibusdam *Lychnidis* viscidæ genus, *J B. T.* 3. 355. *Flos variat colore candido, & carneo.*
- Lychnis viscosa Virginiana* flore amplo coccineo, s. *Muscipula regia*, *D. Banist. Phytogr. Tab.* 203. fig. 1.
- Lychnis viscosa* flore muscoso. *C B P.* 206. *Muscipula muscoso* flore, s. *Ocymoides Belliforme*, 7 *B. T.* 3. 350. *Sesamoides Salamanticum* magnum, *Clus. Hist.* 295. Hæc herba *Suffolcienfibus* nostratibus *Star of the Earth*, (i. e.) *Stella Terræ*, vulgo dicitur, estque in magnâ existimatione ad morsum *Canis rabidi*. Vid. plura in *Grayii, Medicin. Hippiatric. Anglice conscript. & in Philosoph. Transact.* No. 187.
- Lychnis* flore muscoso capillaceo, *Morif. Prælud.* 282. Præcedentis tantùm varietas.
- Lychnis sylvestris* minima flore muscoso, *Botan. Monsp.* 171. *Schol. Botan.* 111.
- Lychnis viscosa* erecta annua caryophylloides, *Raii Cat. Exterar.* 174.
- Lychnis sylvestris* quæ *Been album* vulgo. *C B P.* 205. *Been album Officinarum*, *J B.*



J.B. Tom. 3. 357. *Variat foliis hirsutis, & interdum flore ex viridi purpurascēte, Unde*

Lychnis sylvestris perennis latifolia hirsuta, *Morif. Præhud.* 283. Lychnis sylvestris quæ Been album vulgo, foliis hirsutis, *H. Edinburg.* 211.

Lychnis, s. Behen album Alpinum rotundiore folio, flore purpurascēte, *Schol. Botanic.* 110.

Lychnis sylvestris perennis, s. Behen album flore pleno, *Hort. Oxon.* à D. Bobart. habuimus. Lychnis sylvestris, Melandrium (fortè) *Plinij*, flore albo pleno odorato, *Clus. Hist.* 293. Papaver spumeum, s. Lychnis sylvestris, quæ Been album flore pleno, *Jacobi Breyn.* 43.

Lychnis sylvestris perennis angustifolia glabra. *Variat etiam flore albo & purpureo.* Lychnis, s. Behen album Alpinum, amplissimis & longissimis foliis glabrum.

Lychnis maritima repens. *C B P.* 205. Lychnis marina *Anglicana*, *J B. T.* 3. 357.

Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatæ. *C B P.* 204. Vaccaria, *J B. T.* 3. 357. Lychnis perfoliata folliculo pentagonali, *Grisleij Virid. Lusit.* Huic fortè spectat Cansjan-Cora, *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 52. Quæ nominari possit. Lychnidis æmula, alato caule, summis ramulis perfoliata.

Lychnis segetum major. *C B P.* 204. Pseudo Melanthium, *J B. T.* 3. 341.

Lychnis Pseudo-Melanthio similis *Africana* glabra angustifolia, *H. Leyd.* 392.

Lychnis Sicula glabra Pseud-Melanthij facie, *Icon Roberti.* Lychnis foliis glabris calyce durior *Boccon. Morif. Hist.* 2. 537. Itèm Lychnis segetum Nigellastrum minus glabrum, dicta, flore eleganter rubello, *ejusd. Hist.* 543. Pseudo-Melanthium glabrum *Siculum*, *Raii Hist. Pl.* 999.

• Lychnis, s. Pseudo-Melanthium *Africanum*, Agerati hirsutis foliis, flore purpureo parvo, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 1.

Lychnis segetum parva viscosa, *Raii Synops.* 139. Lychnis segetum parva viscosa flore albo, *Phyt. Brit. Merett. Pin.* 74. quam pridem nos à D. Newtono, accepimus.

Lychnis segetum minima, *Morif. Hist.* 544. Lychnis segetum minor. *C B B.* 204. Alfine corniculata *Clusij*, *J B. Tom.* 3.

Lychnis sylvestris sempervirens, s. Ocymoides arboreum sempervirens, *Clusij Hist.* 1. 293. Ocymoides arboreum, vel fruticosum potius foliis Myrti splendidis flore rubro *Joach. Camerar. Hort. Med.* 109. *Icon.* 33. Been albo *Officinarum* similis planta, sempervirens, *J B. T.* 3. 357. Lychnis frutescens Myrtifolia Been albo similis. *C B P.* 205. Itèm Saponaria frutescens Oleæ folio *ejusd. C B P.* 206. Saponaria altera fruticosior ex *Siciliâ Casalp.* Saponaria frutescens acutis foliis ex *Siciliâ Paul. Boccon. de Pl. Sicul.* 58. variat flore albo.

Lychnis Saponaria dicta major vulgaris simplex, *Morif. Hist.* 2. 547. Saponaria major lævis. *C B P.* 206. Saponaria vulgaris, *J B. T.* 3. 346.

Eadem multiplex, *Morif. ibid.* Saponaria flore pleno *Cornuti.* 209.

Lychnis Saponaria convoluto folio. Saponaria concava *Anglica. C B P.* 206. Gentiana folio convoluto, *J B. T.* 3. 521.

Lychnis ramosa admodum benè radicata, *Neapolitanis* dicta Saponaria lanaria, *Morif. Hist.* 2. 548. Saponaria Lychnidis folio, flosculis albis, àn Condisi *Ara- bum. C B P.* 206. Lanaria, s. Struthium *Dioscoridis Imperato*, *J B. Tom.* 3.



347. à Saponariâ frutescente Oleæ folio maximè diffidet, quamvis aliter sentit noster *Celeberrimus Rains Hist. Pl.* 1000.

*Lychnis Caryophylleus Virginianus*, *Gentianæ* foliis glabris, quatuor ex singulis geniculis caulem amplexantibus flore fimbriato noster, *Raij Hist.* 1895. *Phytogr. Tab.* 43. fig. 4. *Nata est hæc Planta in Horto D. Walkeri, senioris, in Plantar. notitiâ suo tempore expertissimi.* An *Lychnis plumaria alba* foliis ad geniculum quatuor cruciatim positis, thecis florum tumentibus, *Banist. in Cat. Virgin.* Huc fortè spectat *Eloquiltic Mexicensibus*, s. *Herba geniculata*, *Hern.* 210.

*Lychnis plumaria sylvestris simplex Park.* *Caryophyllus pratensis*, flore laciniato simplici, s. *Flos cuculi CBP.* 210. *Flos cuculi Odontis* quibusdam, *J B. T.* 3.

347. Variat flore albo: Habetur etiam in Hortis flore multiplicato. indè,

*Lychnis pratensis* flore laciniato pleno, *Morif. Hist.* 2. 537. *Caryophyllus pratens.* flore pleno. *CBP.* *Flos cuculi* flore multiplicato purpureo, *J B.* 348.

• *Lychnis Æthiopica* parva, tenuissimis confertis foliis, nodoso caule, cui flores ex uno capitulo plures, *Phytogr. Tab.* 304. fig. 5.

*Lychnis parva palustris* foliis acutis lanceolatis flosculis purpureis, *Mentzel. Tab.* 7.

*Lychnis minor Saxifraga.* *Saxifraga Antiquorum* quibusdam, *J B. T.* 3. 338. *Saxifraga magna Matthiol. Valgrif.* 979.

*Lychnis rupestris minima* folio glabro. *Auricula muris Alpina* glabra, s. *Lychnis glabra minima*, *Caryophyllei minima species*, flore albo, *J B. T.* 3. 360.

*Lychnis minima* foliis *Laricis* seu tenuissimè divisis, *Morif. Huc refer.*

*Lychnis noctiflora minima*, flore exiguo, *Boccon. de Pl. Sicul.* 93. *Tab.* 50.

*Lychnis minima muralis Morif.* *Caryophyllus minimus.* *CBP.* *Betonica coronaria*, s. *Tunica minima*, *J B. T.* 3. 337.

*Lychnis minima murali* similis, sed diversa. *Betonicæ*, s. *Tunicæ minimæ* similis planta, *J B.* 338.

*Lychnis Alpina pumila* folio gramineo, s. *Muscus Alpinus Lychnidis* flore. *CBP.* 206. *Muscus Alpinus* flore insigni dilutè rubente *J B.* *Ocymoides muscosus Alpinus*, *Park. Theatr.*

*Lychnis Alpina muscosis* foliis densis stipatis floribus parvis calyce duriore, *Phytogr. Tab.* 42. fig. 8. à præcedenti plurimum differt.

**LYCHNIDEA** umbellifera *Blattariæ* accedens *Virginiana* major, repens, *Pseudo-Melanthij* foliis pilosis, flore albo pentapetaloide fistuloso, *Phytogr. Tab.* 98. fig. 1.

*Lychnidea Blattariæ* accedens *Virginiana* minor repens hirsutis *Camphoratæ* foliis, floribus fistulosis in Umbellam sitis, *Phytogr. Tab.* 98. fig. 2.

*Lychnidea Blattariæ* accedens *Virginiana Camphoratæ* congeneris glabris foliis, flore ad summitatem ramulorum singulari, *Phytogr. Tab.* 98. fig. 3.

**LYCIUM** *Gallicum*, *J B. Tom.* 1. l. 6. 58. *Paliurus alter peregrinus*, *Advers. Lob.* 437. *Lycium latifolium.* *CBP.* 478. Itè *Lycium Gallicum*, ejusd. *ibid.* *Lycium latifolium Monspeliacum*, *Park. Theatr.* Itè *Lycium Gallicum Avenionense*, ejusd.

*Lycium Pyracanthæ* foliis latioribus, àn ipsa *Pyracantha* è *Madera spatam.* *Phytogr. Tab.*



Tab. 202. fig. 5. an potiùs Lycio Gallico affinis ex India Orientali.

Lycium *Italicum* Bod. à Stapel. *Phytogr. Tab.* 96. fig. 6. Lycium Buxifolio. C B P.

478. Lycium Buxi foliis rotundioribus *Syriacum* vel *Persicum*, Breyn. Prodr. 2.

Ofrum *Persarum* Rhamni species Adolph. Vorstij, Hort. Leyd.

Lycium cordatis foliis magis ramosum spinis rectis è *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab.* 201. fig. 7.

Lycium cordatis Buxi foliis *Maderaspatanum* ad singulorum foliorum sedem spinulâ parvâ munitum, *Phytogr. Tab.* 202. fig. 4. è du Boisianis habuimus.

Lycium minus cordatis Buxi foliis *Maderaspatanum*, *Phytogr. Tab.* 97. fig. 1. Fortè

Lycium *Hispanicum* foliis Buxi. C B P. Item Frutex exiguis foliolis confertis,

*ejusd.* C B P. *Hispanorum* Tamoxo Clusij, Hist. l. 1. c. 78. Jonst. Dendrogr.

Tamaio, s. Lycium verum *Fragos.* Lycium Buxi foliis angustioribus *Syriacum*,

Breyn. Prodr. 2. 64. Lycium *Dioscoridis* Hadhad Arabibus & Zaroa Incolis

Montis Libani, Rauwolf. Itiner. lib. 2. cap. 12. & lib. 3. cap. 22.

Lycium maximum cordatis foliis *Maderaspatanum* hamatis spinis, flosculis ex uno pediculo racemosis, *Phytogr. Tab.* 201. fig. 6.

Lycium Beloxylon binis aculeis in ramulorum fastigiis *Americanum*, *Phytogr. Tab.* 97. fig. 5.

Ex hujus ligno Sagittas, è fructibus Atramentum conficiunt Indigenæ.

Dartwood, and Ink-berry nostratibus nuncupatur, in Horto Regio Hampton. nunc colitur.

Lycium Myrti foliis subrotundis *Americanum* lactescens, limbis foliorum argentatis, *Phytogr. Tab.* 97. fig. 7. in Hort. Med. Chelseiano; aliquandiu succrevit.

Lycium *Maderaspatanum* Indici Alpino putati æmulum foliis minoribus, bijugis & grandioribus aculeis horridum, *Phytogr. Tab.* 97. fig. 2.

Idem foliis majoribus, *Phytogr. Tab.* 305. fig. 3.

Lycium *Maderaspatanum* Indici Alpino putati æmulum bijugis & gracilioribus aculeis horridum, *Phytogr. Tab.* 202. fig. 2.

Lycium *Portoricense* Buxi foliis angustioribus, H. Beaum, *Phytogr. Tab.* 202. fig. 3.

Berberidis facie Arbuscula *Americana* spinosa, foliis Lycio nonnihil similibus,

C B P. Fortè Agihalid *Ægyptiaca* Lycio affinis, Park. Th. 1011. (i. e.) Uzeg,

s. Lycium, *Indicum* Alpino creditum, de Pl. *Ægypt.* 43. Hæc enim diversa est

ab Agiahalid *Ægyptio* Buxifolio, J B. quod est verum Agiahalid, *Alpin.* ibid.

39. & de quo quærit Bauhinus, an Lycium sit.

Lycium ternis spinis simul cum foliis ad genicula prorumpentibus, *Phytogr. Tab.* 202. fig. 1.

Fortè Lycium *Creticum*, Pr. *Alpin. exot.* Lycium *Cretense*, s. Berberis

*Cretica*, J B. Berberis Alpina *Cretica*. C B P.

Lycium *Bisnagaricum* acuminatis minus durioribus foliis, & aculeis ex opposito

binis, *Phytogr. Tab.* 97. fig. 3. Tsjerou-Karæ, Hort. Malab. simile, si non idem.

Lycium putatum *Indiæ Orientalis*, Capparis rotundioribus foliis, & aculeis ex ad-

verso gemellis, *Phytogr. Tab.* 97. fig. 4.

Lycium majus *Americanum* Jasinini flore, foliis subrotundis lucidis, *Phytogr. Tab.* 97. fig. 6.

Jasminum spinosum *Americanum* folio lucido subrotundo. P B P,

342. Item Lycium *Curassavicum* folio subrotundo, Rabba de Caballo, vulgo.

*ejusd.* P B P. 349.



- *Lycium Malabaricum* subrotundis Pyrolæ densifloribus foliis floribus Jasmini aculeis rectis validissimis, ex adverso binis armatum, *Phytogr. Tab. 305. fig. 4.* Rhamnus Lycij Myrsinites facie *Gangeticus*, *Phytogr. Tab. 55. fig. 6.* Huic aliquatenus accedere videtur.
- *Lycium* subrotundis foliis *Malabaricum* spinis brevibus, crassis recurvis, ex uno versu conjugatis, armatum. *Phytogr. Tab. 305. fig. 5.* si Kurintikali, *H. Malab. Part. 10. fol. 41.* non de essent spinæ, idem huic nostro libenter existimassem. à D<sup>no</sup>. *Alex. Brown.*
- Lycio cognatus Frutex Polemonij facie triphyllus è Maderaspatàn, *Phytogr. Tab. 202. fig. 6.* à D<sup>no</sup>. *du Bois* accepimus.

LYSIMACHIA speciosa quibusdam Onagra dicta filiquosa, *J.B.T. 2. l. 21. 906.*

*Lyfimachia latifolia*, dicta Chamænerion, *C B P. 245. Variat flore purpureo interdum & immaculati candoris.*

*Lyfimachiæ Chamænerion dictæ latifoliæ similis planta Jamaicensis.*

• *Lyfimachia filiquosa speciosa angustifolia*, *J.B.T. 2. 905.* *Lyfimachia Chamænerion dicta angustifolia*, *C B P. ibid.*

• *Lyfimachia filiquosa minor Ocymifolia nostras.* *Lyfimachia filiquosa glabra minor, latifolia nostras*, *Raij. Hist. Pl. 862.*

• *Lyfimachia lutea corniculata non papposa Virginiana major*, *Moris. Hist. 2. 271.* *Lyfimachia Virginiana altera, foliis latioribus, floribus luteis majoribus*, *Cat. Altdorf. Raij. Hist. Pl. 862.*

• *Lyfimachia lutea corniculata non papposa Virginiana minor*, *Moris. ibid.* *Lyfimachia lutea corniculata*, *C B P. app. 520.* *Lyfimachia filiquosa Virginian Park. Th. Hyosciamus Virginianus, Pr. Alpin. exot. 325.* Plantam hanc *Lyfimachiæ Americanæ* titulo describit & depingit, *Fab. Columna. Annot. ad res Med. Nov. Hispan. Hernand.* Et *Axochiatl de Colan*, s. Florem aquæ ejusd. *Hernand. 251.* descriptum & depictum esse existimat, quod & *Rajo* nostro, & Nobis etiam videtur.

• *Lyfimachia lutea angustifolia Virginiana flore minore* *Phytogr. Tab. 202. fig. 7.* *Hujus plantæ siliqua, in corniculam non extenditur.* àn *Lyfimachia angustifolia, Canadensis altera, caule rubro, flore minore.* *Schol. Botan. 44.*

• *Lyfimachia corniculata maritima sinuatis, & pubescentibus, foliis Virginiana*, *Phytogr. Tab. 203. fig. 3.*

• *Lyfimachia non papposa Virginiana Tuberariæ foliis hirsutis, flore tetrapetalo rubello*, *D. Banister, Phytogr. Tab. 202. fig. 8.*

• *Lyfimachia non papposa flore luteo majore, siliqua Caryophylloide minore, ex Virginia*, *Phytogr. Tab. 203. fig. 2.*

• *Lyfimachia Indica non papposa, flore luteo minimo, siliquis Caryophyllum aromaticum æmulante*, *Hort. Leyd. 396.* *Carambu, Hort. Malab. Part. 2. Tab. 49.* *Caryophyllus spurius Malabariensis flore luteo minimo*, *Commel. in Not.*

• *Lyfimachia viscosa glabra, Parietariæ foliis Virginiana*, *H. Oxon.* Fortè *Memeya de Tepotzlan altera*, *Nov. Hispan. Terent. apud Recc. 385.* Icon habetur in *Phytogr. Tab. 203. fig. 4.*



*Lyfimachia non papposa humilis Maderaspatana Clinopodij Virginiani lutei foliis, fructu Caryphyolloide parvo, Phytogr. Tab. 203. fig. 5.*

**LYSIMACHIA** lutea major quæ *Dioscoridis. C B P. 245.* *Lyfimachia lutea*, *J B. T. 2. 903.* *Blattariæ affinis planta major flore luteo, Morison. Hist. 2. 491.*

*Lyfimachia lutea in alis foliorum florens Casalpin.* *Lyfimachia lutea minor, J B.* *Lyfimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis. C B P. Blattariæ affinis planta minor, flore luteo, foliis nigris punctis notatis, Moris. Hist. 2.*

*Lyfimachia altera lutea, Lobelij, flore quasi spicato, J B. Tom. 2. 904.* *Lyfimachia bifolia flore globoso luteo. C B P. ibid.*

*Lyfimachia sempervirens spicata, Ephemerum dicta, Blattariæ flore, H. Leyd. 397.* *Ephemerum Matthioli, vel potius Ephemerum spurium. C B P. 244.* *Blattariæ affinis planta bifolia lævis, flore albo, Ephemerum Moris. Hist. 491.*

*Lyfimachiæ Ephemerum dictæ genus Maderaspatense, Limonij foliis subrotundis, caule crasso fungoso, Phytogr. Tab. 43. fig. 5.*

*Lyfimachia spicata purpurea trifolia, caule hexagono, Spigel. Isagog. l. 1. c. 10. 22.*

*Lyfimachia purpurea spicata lanuginosa, Moris. Præluæ. 127. & 285.* *Item Blattaria rubra spicata major lanuginosa, folio subrotundo ejusd. Hist. 2. 490.* *Lyfimachia purpurea spicata, folio subrotundo Ocymii facie, H. Leyd. 397.*

*Lyfimachiæ spicatæ similis, Persicæ folio Planta Insulæ Barbadosis, floribus ex luteo albicantibus, Phytogr. Tab. 246. fig. 1.*

*Lyfimachia rubra minima, Clus. Hist. 2. 53.* *Lyfimachia Linifolia purpureo-cærulea. C B P. 246.* *Lyfimachia purpurea, s. rubra minima, Park. Th. 545.*

*Lyfimachiæ spicatæ purpureæ affinis Hyssopifolia, H. Leyd. 397.* *Hyssopifolia, C B P. 219.* *Hyssopifolia aquatica, J B. Tom. 3. l. 38. 792.*

*Lyfimachiæ spicatæ purpureæ affinis, Hyssopi folio è Maderaspatan. Phytogr. Tab. 203. fig. 6.*

*Lyfimachiæ affinis Hyssopi folio, floribus falcatis, s. Gratiola minor palustris, Malabarica.*

*Lyfimachiæ affinis Satureiæ folio Maderaspatensis, capsulis in summitate ferè umbellatis, Phytogr. Tab. 119. fig. 4.*

*Lyfimachiæ spicatæ purpureæ affinis Thymi folio, flosculis in cacumine plurimis quasi in nodis junctis, Phytogr. Tab. 43.* *Anthyllis, Pr. Alpini exot. 157.* *An Polygonum Creticum Thymi folio. C B P. 281. & in Prodr. 131.* *Hanc plantam inter exsiccatas, D. Cortene, in H R P. à seipso collectam, conspeximus sub titulo Sedi maritimi cordato, & villoso folio, flore reflexo, Anthyllis prior Dioscoridis.* *Hujus parvum Specimen Reverendis. Vir, D. Georg. Wheler, è Græciâ (quâ invenit) rediens, nobis munere donavit.* *Hujus congener esse videtur Kalu polapen, H. Malab. Part. 9 Tab. 66.* *Proindè denominari possit Lyfimachiæ purpureæ affinis, flore tetrapetaloide difformi, Vermicularis folio hirsuto.*

*Lyfimachiæ spicatæ purpureæ adfinis procumbens Chamæsyces folio tetraphyllos.* *Anthyllis maritima Chamæsyces folio. C B P. Anthyllidis species quibusdam, J B. T. 3. l. 29. 373.* *Anthyllis Valentina, Clusij Hist. Quadrifolium annuum Persicam, Zanon. Hist. Bôt. 164.*

*Lyfimachiæ*



*Lyfimachiaë purpureæ affinis Agerati foliis glabris. Ageratum purpureum, Dalechampi, J B. Ageratum ferratum Alpinum. C B P.*

*Lyfimachiaë purpureæ affinis Agerati foliis villosis. Ageratum purpureum ferratum Pyrenaicum hirsutum, Schol. Botan. 174.*

*Lyfimachiaë purpureæ adfinis Americana procumbens, Anonidis Vernæ frutescentis, folio singulari glabro, Phytogr. Tab. 98. fig. 4. Gratiolæ affinis frutescens Americana foliis Agerati, s. Veronicæ erectæ majoris, Breyn. Prodr. 2. 54. Hanc plantam Capræ apud Belgas Curassavienses pro pabulo avidè petunt; indè Capraria Curassavica, Cabritta vulgo. P B P. 316. Quam D. Wheler, sponte natam in Græciâ observavit; ubi Cufermout à Turcis nuncupatur. Florem habet nivei coloris, pentapetaloidem, capsulam cylindricâ figurâ bipartito divisam, seminibus parvis turgidam. Huc forte referenda est Aheaton, s. Quercus parva, Hernand. apud Recc. 211. à Quâ Tsjeru-parva, H. Malab, Part. 10. hæud multum abludivit. Fortè etiam Caa-ataya Brasiliensibus, Marcgr. fol. 31. Erva de purga de Iuan Paez Lusitanis, satis convenientèr huc referri potest. Euphrasie affinis Brasiliensis filiquosa, Raij Hist. Pl. 1329.*

*Lyfimachiaë purpureæ adfinis fruticosior, Anonidis singulari hirsuto folio, Maderaspatensis, Phytogr. Tab. 98. fig. 5.*

## M.



*A J O R A N A rotundifolia Scutellata exotica. HR P. 114. àn Origanum cognata Zatarhendi. C B P. 223. Zatarhendi herba, J B. T. 3. 256. Zatarhendi, Origanum Indicum Vesling. Obs. 31.*

*Majorana Syriaca vel Cretica. C B P. 224. Marum Syriacum vel Creticum, Park. Theatr. H. Leyd. 409. Marum Creticum, Prosp. Alpin. exot. 288. Ex Insulâ Maderæ nobis allata.*

*M A L A C C A - S C H A M B U Hort. Malab. Part. 1. Tab. 17. Jambos Paludano, Linschot. Part. 4. India. Orientalis, cap. 9. fig. 13. Canarinis Jamboli Christoph. Acoftæ. Arbor Indica flore tetrapetalo, staminibus longis referto, fructu majore umbilicato. Perfici officulo Fructus Malaccensis. C B P. 441.*

*M A L A - P O E N N A, H. Malab. Part. 5. Tab. 9. Arbor baccifera Indica fructu cuspidato monopyreno, Raij Hist. Pl. 1596.*

*M A L L A M - T O D D A L I, H. Malab. Part. 4. Tab. 40. Baccifera Indica racemosa, florum staminulis binis, acinis monopyrenis, fructu umbilicato, Raij Hist. Plant. 1597.*

*M A L V A trimestris, Clus. Hist. Malva æstiva, s. trimestris, Park. Th. 299. Item Malva Hispanica, flore carneo amplo ejusd. Park. ibid. Malva trimestris flore cum*



- cum unguibus purpureis, *J B. T. 2. l. 23. 950.* Item *Malva stellata ejusd. J B. T. 2.* *Malva folio vario. C B P. 315. & Prodr. 137.*  
*Malva rotundifolia glabra ex Hispaniâ flore amplo rubello, Phytogr. Tab. 44. fig. 3.*  
*an Malva Batica rotundifolia flore amplo, Florent. Schnyl. H. Leyd. 50.*  
*Malva hirsuta folio cordato, Moris. Hist. 2. 520.*  
*Malva sylvestris Betonicæ folio, Boccon. de Pl. Sicul. 15. Vide Suppe. pa. 401*  
*Malva annua Indie Orient. foliis maximis subrotundis flore minore.*  
*Malva Tingitana flore cæruleo parvo, Phytogr. Tab. 44. fig. 2.*  
*Malva rosea peregrina folio Ficus obscurè viridi, Moris. Hist. 2. 524. Malva rosea folio Ficus. C B P. 315. Variat Flore simplici & multiplici diverforum colorum.*  
*Malva arborea, Park. Th. 299. Malva arborea Veneta dicta, parvo flore. C B P. 315. Malva maritima arborea Veneta dicta, parvo flore, Moris. 523.*  
*Malva arborea maritima nostras, Park. Th. 301. Malva maritima arborea Britanica, Moris. Hist. 2. 523.*

**M A L U S** *Indica* pomo anguloso *Carambolas* dicta, *Raij Hist. Pl. 1449. Tamaratonga, s. Carambolas, H. Malab. Part. 3. Tab. 43, 44. Carambolas Acoſta Linschot. 4 Part. Ind. Orient. 10. Mala Goensia fructu octangulâri, pomi vulgaris magnitudine. C B P. 433. Erroneè tamen, Fructus enim quadrangularis, aut quam maxime pentagonus ut Nobiscum rectè notat Raius, ibid.*  
*Malus Indica fructu pentagono Bilimbi dicta, Raii Hist. Pl. 1449. Bilimbi, H. Malab. Part. 3. Tab. 45, 46. Billingsbing Bontij, Hist. Ind. Orient. lib. 6. fol. 133.*

**M A L U S** *Arantia major. C B P. 436. Arantia Malus, J B. T. 1. lib. 1. 97. Aurantium vulgare, Ferr. Hesperid. 474.*

*Malus Arantia sylvestris, J B. T. 1. 97. Aurantium sylvestre medullâ acriori, Ferr. ibid.*

*Malus Arantia folio crispo, H. Leyd. 406. Aurantium crispo folio, Ferrarij. Hesperid. 387.*

*Malus Arantia foliis & fructu variegatis. H R P. 116. Aurantium virgatum, striatumque, Ferr. 397.*

*Malus Arantia fructu corniculato, H. Leyd. 406. Aurantium Hermaphroditum dictum, s. corniculatum, Ferr. Hesp. 407.*

*Malus Arantia Lusitanica. H R P. 116. Aurantium Olyssiponense, Ferr. Hesp. 425. Pomum Sinense Belgis, H. Leyd. 407.*

*Malus Arantia fructus cortice dulci, H. Leyd. Aurantium dulci cortice, Ferr. 430.*

*Malus Arantia fructu Arantij Malo Citrio prægnantis, H. Leyd. 407. Malum Aurantium Malo Citrio prægnans, Boccon. de Pl. Siculis, 3.*

*Malus Arantia Hermaphrodita fructu medio Citrio, medioque Arantio odoratissimo, H. Leyd. 407.*

*Malus Arantia humilis. C B P. 436. Aurantium Sinense, Ferr. Hesp. 430.*

*Malus Arantia Lauri angustis foliis, Boccon. de Pl. Sicul. 3.*

*Eadem foliis & fructu ex argenteo, & viridi variegatis, Hort. Comptonian.*

*Malus Arantia foliis laceratis, s. in oblongum scissis. Ex Indiâ Orientali.*

*Malus Arantia Bermudensis fructu grati saporis amplo & specioso.*

Malus



**Malus Arantia** utriusque *Indiæ* fructu omnium maximo, & suavissimo; *Belgis Orientalibus* *Pompelmo's*, *Virginienſibus* noſtratibus (ab Inventoris nomine qui ex *Ind. Oriental.* ad *Oras Americanas* primo tranſtulit) *Shaddocks* audiunt. Arbor & magnitudine inſignis, & ſuavitate fructus, amplitudineque mirum in modum præcellens, *Theophr. Hiſt. Plantar.* lib. 4. cap. 5. *Hoc (inquit) Sapientes Indorum qui nudi degunt, cibo utuntur.* Arbor pomo & ſuavitate præcellentior, quo Sapientes *Indorum* vivunt, *Plin.* lib. 12. cap. 6. *Mali aureæ Dodon.* *Malus aurea* foliis prægrandibus, *J B. T.* 1. 153. *Ubi Dodonæum ſequutus, Hanc Arborem cum Palâ Indorum, ſive Muſa Arabum male confundit.* *Theophrastus enim (ut recte obſervavit Hermolaus) non unam, ſed duas facit Arbores, quarum altera Gymnoſophiſtæ Indorum veſcuntur, altera τῶν σεουδῶν πλέγῃ comparat: Plinius vertit, folium alas avium imitatur.* *Vencu (fortè) Sinenſium Martin. Atl. Sinenſ.* *Lusitanis Jamboa; Raij Hiſt. Pl.* 1793. *Arbor ſpiſoſa Limoniâ major, Flores albi, ſuaviſſimi odoris, Fructus capitis magnitudine, cui cortex Pomorum aureorum, pulpa rubefcens, Uvæ non omnino matura, ſapore; qui ſuſpenſus domi, ad annum durat; provenit in Fokien. Ex floribus fragrantiffima aqua elicitur; ex fructu, liquor pro potu exprimi ſolet.*

**Malus Citria**, s. *Medica*, *Raij Hiſt. Pl.* 1654. *Citria Malus*, *J B. T.* 1. 94. *Malus Medica. C B P.* 435.

**Malus Citria** fructu magno, *J B. T.* 1. 94. **Malus Medica** fructu ingenti tuberoſo. *C B P.* 435.

**Malus Citrea** dulci medullâ, *Ferr. Heſp.* 73.

**MALUS** *Cydonia* fructu breviori. *HRP.* 115. *Mala Cotonea minora. C B P.* 334. **Malus Cydon.** fruct. oblong. & læviori. *HRP.* 116. *Mala Cotonea majora. C B P.* *Cotonea Malus*, *J B. T.* 1. 27.

**MALUS** *Limonia* acida. *C B P.* 436. *Limonia Malus*, *J B. T.* 1. 96. *Limon vulgaris, Ferr.* 191.

**Malus Limonia** major dulcis. *C B P.* 436. *Limon* dulci medullâ, *Ferr. Heſp.* 227.

**Malus Limonia** minor acida. *HRP.* 331. *Limon* qui *Lima* nuncupatur acris, *Ferr.* 191.

Eadem dulcis, *H. Leyd.* 405. *Limon* qui *Lima* nuncupatur dulcis, *Ferr. Heſp.*

**Malus Limonia** *Citrata*, *Hort. Leydenſ.* 405. *Limon Citratus* primæ notæ lævior, *Ferr.* 265.

Eadem fructu fructum includente, *H. Leyd.* *Limon Citratus* alterum includens, *Ferr. Heſp.* 269. *Limonés* prægnantes alium fructum minorem in ſe continentes. *C B P.* 436.

**Malus Limonia** fructu ſuperficiè *Aurantij*, *H. Leyd.* *Adami Pomum*, *Ferr. Heſp.* 313. **Malus Adami.** *C B P.* 437. *Poma Adami*, *J B. Tom.* 1. lib. 1. 99.

**Malus Limonia** puſilla *Calabrica*, *H. Leyd.* 404. *Limon puſillus Calaber. Ferr.* 209.

**Malus Limonia** puſilla foliis *Phillyrææ*, *Ferr. Heſp. Deſcript.* 209.

**Malus Limonia** *Lentifci* foliis *Zeylanica*, fructu minimo, *Uvarum* magnitudine æmulo. *Tſjerou-Catou-Naregam, H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 14. **Malus Limonia Indica** fructu puſillo, *Raij Hiſt. Pl.* 1658.

MALUS



**MALUS** Punica sativa. *CBP.* 438. Malus Punica, *J. B. T.* 1. 76. Granata vulg.  
Malus Punica sylvestris. *CBP.* Malus Punica agrestis, *J. B. T.* 1. 78.

Malus Punica sylvestris major, s. Balauftium majus, *Park. Th.* Balauftia flore pleno majore. *CBP.* 438. Balauftia *Hispanica*, *J. B. T.* 1. 82.

Malus Punica sylvestris, s. Balauftium minus. Balauftia flore pleno minore. *CBP.*

Malus Punica *Barbadensium* (fortè) Igbucami *Brasilianorum de Laet. Ind. Occid.* lib. 15. cap. 8.

Malus Punica *Zeylanensium* spinosa. Malus Granata *Zeylanensis* aculeata, *Phytogr. Tab.* 98. fig. 6. Granata Malus *Zeylanica* spinosa. *PBP.* àn Catou-Naregam, *Hort. Malab. Part.* 4. *Tab.* 13.

**MAMEE** arbor *Ind. Occid.* Juglandis folio Vinifera, *Phytogr. Tab.* 204. fig. 2.

Mamaya, *J. B.* An Arbor Vinifera Couton Juglandi similis ejusd. *J. B. Tom.* 1.

Arbor *Indica* Mamei dicta. *CBP.* 417. The Mamee Domin & Toddy-Tree  
Nostratibus appellata.

**MANDARU** prima species, s. Chovanna Mandaru prima, *H. Malab. Part.* 1. fig. 32. Arbor filiquosa *Malabarica* foliis bifidis, flore purpurascente striato, *D. Syen. Not. in loc.* Kethesnar *Arabum*, Arbor *S. Thomæ*, s. Assitra, *Jac. Zanoni, Hist. Botan. Fig.* 15. Flos Divi *Thomæ* vulgò; eò quod Floribus apparent sanguineæ striæ ab effuso sanguine *D. Thomæ* enatæ; ut vulgò creditum. Siliqua sylvestris rotundifolia *Indica*. *CBP.* 402. ex mente, *Cl. Breyn. Prodr.* 2. 19. à Terentio accepit hujus semen cum hac Inscriptione, Semen *Nummulariæ*, est Arboris *Judæ Indicæ* cujus Flos magnus elegans & odoratus est. è *Maderaspatan.* nobis collata est.

Mandaru secunda species, s. Chovanna Mandaru secunda, *H. Malab. Part.* 1. fig. 33. Arbor filiquosa *Malabarica* foliis bifidis majoribus, flore intensius purpurascente striato, *D. Syen. Not. in loc.* *Javanensibus* Wehopai, *Anglis* Insulam *Antego* habitantibus *Doopwood* (i. e.) *Δενδρολύγ* s. Arbor *Viminalis*, eo quod hujus virgæ ad doliorum orbiculos conficiendos apud illos usitatissimæ sunt, ab honesto Viro, *D. Horsenel*, ex *Antego* in *Angliam* redeunte, hujus exemplar optimè siccatum secum attulit, & nobis impertivit.

Mandaru tertia species, s. Velutta Mandaru, *H. Malab. Part.* 1. Fig. 34. Arbor filiquosa *Malabarica* foliis bifidis minor, flore candido striato, *D. Syen. in Not.* Hujus specimen ex Insulâ *Jamaicensi*, nos habuimus.

Mandaru quarta species, s. Canschena-pou, *H. Malab. Part.* 1. Fig. 35. Arbor filiquosa *Malabarica* foliis bifidis minoribus, flore albo flavescente striato, *D. Syen.* è *Maderaspatan.* accepimus.

Mandaru *Maderaspatense* foliis firmioribus bifidulis, glabritie splendentibus, ad furculum densius stipatis, *Phytogr. Tab.* 44. fig. 6.

**MANDRAGORA** fructu rotundo, *CBP.* 169. Mandragora mas, *J. B. Tom.* 3. 617.

Mandragora fructu pyri. *CBP.* Item Mandragora flore subcæruleo purpurascente ejusd. *CBP. ibid.* Mandagora foemina, *J. B. Tom.* 3. lib. 34. 618.

MANGHAS



**MANGHAS** domestica Mao, *H. Malab. Part. 4. Tab. 1, & 2.* Arbor Mangifera Bontij, lib. 6. cap. 5. Idem est cum Arbore lonchifoliâ hujus *Almagest.* fol. 43. Cujus Icon habetur in *Phytogr. Tab. 142. fig. 1.* Mangas, s. Amba, *J. B. Tom. 1.* Item Amygdalum referens fructus hirsutus, ejusd. *J. B. The Mango-Tree.*

**Manghas-Orientalis** angustifolia officulo cordiformi binos nucleos continente. Odallam, *H. Malab. Part. 1. Fig. 39.* An fortè Hoitzxochitl *Mexicensium*, s. Arbor Lonchifolia, *Hernand. 39?* Fortè etiam Arkafondi, s. Akafond, *Zanon. Hist. Bot. fig. 8.* Cui plurimis convenit, at seminum parvitate discrepat.

**Mangha sylvestris**, *Ind. Orient. H. R. H. Phytogr. Tab. 203. fig. 7.* Fortè Cat-Ambalam, s. Pee-Ambalam; *H. Malab. Part. 1.* absque Figurâ. àn Mangas aliud genus. *C. B. B. 440?* Mangas in *Achar. Linschotani, Part. 4. Ind. Orient. 7.*

**Manghas sylvestris** lactescens venenata, Jasmini flore & odore. *P. B. P. 351.* Mangas fructu venenato. *C. B. P. 440.* Manghas brevis *Lusitanis Paludani* in *Linschot. Et Acoſta Hist. Lugd.* àn Persicæ nuci similis Fructus, nucleo venenato *Monardis, J. B. Tom. 1.* Ghonkaduru *Zeylanensibus.*

/ Brava

**MANGLE** arbor Pyrifolia salis & uliginosis locis in *Americâ* proveniens, fructu oblongo tereti, summis ramis radicata, *Phytogr. Tab. 204. fig. 3.* Mangles Pyrifoliis cum siliquis longis, Ficui *Indicæ* affinis, *J. B. T. 1.* Manges, s. Mangles 3<sup>a</sup> species Guaparaiba dicta, *Pisonis. 204.* Paretuveir *Rochfort. des Antilles.* Arbor de Raiz *Linschot. Ind. Orient. Part. 4.* Ficus *Indica*, s. Ostreifera *Americana*, *Ralieg. in Hist. lib. 1. cap. 4. Sect. 2.* Ostreifera arbor quæ in *Siera Lionia* provenit, *Purches. Navigat. Tom. 1.* Fortè Kandel, Kari-Kandel, vel Pee-Kandel, *H. Malab. Part. 6.* Swamp-Mangrove Tree, Nostratibus dicta; & aliquando The Oyſter-Tree. Huic similis si non eadem quam *Ferdinand. Lopez. de Castaneda, Hist. Orient. lib. 7. cap. 3.* Mangu appellat, & radicem caudicum instar sursum attollere, inque Provinciâ *Malaccâ* nasci prodit.

**Mangle alba** Coriaria, folio densiusculo subrotundo glabro, fructu formâ Caryophylli aromatici majore, *Phytogr. Tab. 204. fig. 4.* Mangu 2<sup>a</sup> species, s. Cereibuna *Brasiliensium Pison. 204.* Pou-Kandle (fortè) *H. Malab. Park. 6.* White Mangrove *Barbadensibus* dicta.

**MANIHOT** *Indorum*, s. Yuca foliis Cannabinis, *C. B. P. Phytogr. Tab. 205. fig. 1.* Manihot *Theveti* Yuca & Cassavi, *J. B. Tom. 2. lib. 19. 794.* Hiuccas, s. Mandioca & quâ Cassavi fit, *Park. Theatr.* Manhiiba & Mandiiba *Brasiliensibus* cujus radix Mandihoca *Pison. & Marcgrav. Yucca Brasiliiana & Americana* Stellato folio mucronato *Montingij.* Manihot ab *Angolensibus* Nigritis Manihoca dicta *Ogilv. Afric. 557.* Hjucca. s. Mizmaitl *Nov. Hispan. Terentij apud Hernand. 378.* ubi fructus dicitur aromaticus, in uvam congestus majori *Serpentariæ* (si modo baccae essent rubræ) haud admodum dissimilis, ut *Icone* exhibetur.

**MARRUBIUM** aquaticum, s. aquatile foliis tenuius dissectis, *Morif Phytogr. Tab. 45. f. 1.* àn Marrubium palustre *Canadense* tenuius glabrum, *Schol. Bot. 60.* Lycopus foliis profundè incisis, *Turnesfort. Elem. Botan. Tom. 1. 159.*



Marrubium nigrum rotundifolium, C B P. 230. Marrubium nigrum *Hispanicum*, vel *Ocymastrum Valentinum Clusij* Park. Th. 45.

Marrubium *Hispanicum* frutescens rotundifolium tomentosum odore Stoechadis Breyn. Prodr. 2. 65. Marrubium *Hispanicum* odore Stœchados, Lob. Icon. 519. Hoc Marrubij genus pro synonymo proximè præcedenti malè adhibetur à C. Bauhino, ut rectè notat idem Cl. Breynius ibid. à Reverend. D. Wheeler accepimus.

Marrubium nigrum longifolium, C B P. 230. Herba venti *Monspeliensium* Lobel. Adv. 229. Herba Venti Parietaria Cordi Sideritidis genus, Hist. Lugd. 1120. Sideritis *Monspeliensium ejusd*, Sideritis *Persica* odorata Zanoni, Hist. Bot. 184. Tab. 70.

Marrubium album latifolium peregrinum, C B P. 230. Marrubium candidum folio subrotundo, J B. T. 3. 317. Marrubium *Hispanicum* candidum, Park. Th. 44.

Idem folio acutiore, Schol. Bot. 60. Marrubium *Hispanicum*, Pr. Alpini exot. 316.

Marrubium album angustifolium peregrinum. C B P. Marrubium album angustiore folio, J B. Tom. 3. Marrubium *Creticum*, Park. Th. 44. Marrubium *Creticum* angustiore folio, odore gratiore, Lob. Icon. 519.

Marrubium album minus elegans ex Monte Sipyli, Nepetæ Alpinæ ferè folio & facie, Hort. Oxon.

Marrubium album rotundifolium *Hispanicum* maximum, Schol. Botan. 60.

Marrubium album peregrinum brevibus & obtusis foliis. C B P. 230. An Marrubium album fatuum, P. Castelli in Cat. Plantar Messanensium,

- Marrubium album rotundifolium minus, crispatis foliis *Æthiopicum*, Phytogr. Tab. 306. fig. 2. An Marrubium album minus *Africanum* calyculis amplis, Breyn. Fascic. 24.

Marrubium Alysson dictum foliis profundè incisis, H. Leyd. Alyssum verticillatum foliis profundè incisis. C B P. 232. Alysson Galeni, Clus. Hist. Plant. Park. Theatr. 590.

Marrubio congener, s. Prasiodictamos major inodorus. Pseudodictamnus verticillatus inodorus. C B P. 222. Dictamnus adulterinum quibusdam, vel potiùs Gnaphalium Veterum, J B. T. 3. 255.

Marrubio congener, s. Prasiodictamos minor Alpinus. Pseudodictamnus Alpinus verticillatus minor. H R P 147.

Marrubio congener, s. Prasiodictamos *Hispanicus* folio rugosiore. Pseudodictamnus *Hispanicus* folio rugosiore, Schol. Bot. 61.

Marrubio congener, s. Prasiodictamos maximus acetabulis Moluccæ. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ. C B P. 223. Pseudodictamnus *Cydonie*, s. Dictamnus 2<sup>a</sup>. Theophrasti Pona.

MATRICARIA vulgari similis minor, petalis florum perexiguis. An Matricaria Japonica, flore minore albo simplici, Breyn. Prodr. 2. 66.

Matricaria bullatis floribus aureis, Parkinson. Theatr. 83. Matricaria flore aphylla H R P. 118.



*Matricaria* foliis florum fistulosis. H R P. Variat flore simplici & pleno, & interdum petalis marginalibus planis, discoidibus fistulosis.

*Matricaria Alpina Chamæmeli* foliis. C B P. 134. *Matricaria*, s. *Parthenium* Alpinum, *Clus. Hist.* 336. *Millefolium* Alpinum, J B. *Tom.* 3. l. 26. 139.

*Matricaria Japonica* maxima flore roseo, s. suaverubente pleno elegantissimo *Breyn. Prodr.* 66. *Kyckonophane Japonensibus* dicta. An fortè *Cacoxochitl*, *Nov. Hispaniæ, Ant. Recc. Hist. Mexic.* 372. Fortè etiam *Tsjetti-pu*, *Hort. Malab. Part.* 10. *Tab.* 44.

M E D I C A arborea, filiquâ falcatâ planâ, folio candicante. *Cytisus incanus* filiquis falcatis. C B P. 389. *Cytisus Galeni* creditus *Maranthæ* cornutus, *Park. Theatr.* *Cytisus* filiquâ incurvâ folio candicante, J B. *T.* 1. 366.

*Medica annua* filiquâ falcatâ latâ & compressâ, in circuitu spinulis dentata. *Medica lunata*, J B. *T.* 2. 386. *Trifolium* filiquâ falcatâ. C B P. 330. Fortè *Medica* fructu compresso circum oras dentato, *Raii Cat. Exterar.* 72. Fortè etiam *Medica* filiquis compressis viridibus, longitudine & latitudine filiquarum *Senæ Rauwolfio*, *Raii Cat. Stirp. Oriental.* 14.

*Medica major erectior* floribus purpurascens, J B. *T.* 2. 382. *Trifolium* filiquâ cornutâ, s. *Medica*. C B P. 330. *Medica sativa* filiquâ cornutâ magis tortili, *Morif. Hist.* 2. 158. *Fœnum Burgundiacum*, s. *Medica legitima*, *Park. Th. The true Sainct-foyne.*

*Medica frutescens* flore flavo *Clus. Park. Th.* *Medica sylvestris*, J B. *T.* 2. 383. *Trifolium luteum sylvestre* filiquâ cornutâ, s. *Medica frutescens*. C B P. *Medica sylvestris frutescens* filiquâ cornutâ tortili, *Morif.* 157.

*Medica pratensis lutea*, radice perenni fructu racemoso nigro non grata Jumentis. *Melilotus capsulis reni similibus in capitulum congestis*, *Elem. Bot. T.* 1. 325. *Melilotus lutea minima hirsuta procumbens*, spicâ breviori densissimè dispositâ, seminis pericarpio renali nigro, *Morif. Hist.* 2. 162. *Trifolium pratense luteum* capitulo brevior. C B P. 328. *Trifolij* genus *Medicæ* simile *Gesn. Hort.* *Trifolium agrarium*, *Dod. Edit. Lat.* 576. *Trifolium pratense luteum* mas, flore minore, semine multo, J B. *Tom.* 2. 380. *Trifolium luteum minimum*, *Park. Theatr.* 1112.

*Medica scutellata*, J B. *T.* 2. 384. *Trifolium cochleatum* fructu latiore. C B P. 329. *Medica orbiculata*, J B. *T.* 2. 384. *Trifolium cochleatum*, vel *scutellatum* fructu latiore, folio minuto obtuso. C B P. 329. & in *Prodr.* *Medica cochleata major* *Λικαρο* fructus capsulâ compressâ, orbiculatâ, nigrâ, plana, oris crispis, *Morif. Hist.* 2. 152.

*Medica orbiculata* *πολύκαρπ* fructu minore, *Raii Hist. Pl.* 962.

*Medica orbiculata* fructu lato, simplici volutâ, *Raii ibidem.*

*Medica orbiculata elegans*, orbiculis circum oras rugosis, *Raii ibidem.* *Medica cochleata major* *Λικαρο* fructus capsulâ compressâ, orbiculatâ, rugosâ, albâ, *Morif. Hist. Pl.* 152.

*Medica orbiculata minor spinosa*, simplici majore volutâ, *Raii, ubi supra.*

*Medica minor*, orbiculato compresso fructu, circum oras spinis molliusculis echinato. *Trifolium cochleatum* modiolis spinosis *Raii, Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 6.



- an Medica ciliaris annua, *ejusd. Raij, Cat. exterar. 179.* Trifolium fructu cochleato ciliare, *Bot. Monsp. 269.*
- Medica hirsuta echinis rigidioribus, *J.B. T. 2. 385.* Trifolium fructu compresso, spinis horrido. *C B P. ex sententiâ, D. Petr. Magnol. Bot. Monsp. 268.*
- Medica cochleata major  $\alpha\mu\alpha\epsilon\omega\theta$  fructus capsulâ turbinatâ planâ *Moris. Hist. 2. 153.* Medica doliata lævis, tornata major & minor lenis, *Parkinson. Th. 1116. Raij, Hist. Pl. 962.*
- Medica cochleata major  $\alpha\mu\alpha\epsilon\omega\theta$  fructus capsulâ turbinatâ rugosâ, *Moris. 153.* an Medica doliata, s. orbiculata, orbiculorum gyris circa margines utrinque rugosis, per maturitatem nigricantibus, *Raij Hist. Pl. 962.*
- Medica tornata perelegans, fructus capsulâ scrobiculis, & crebris tuberculis scabrâ. Medica *Catalonica* elegans, *Edvardo Morgano, Raij Hist. Pl. 962.*
- Medica doliata spinosa major  $\alpha\mu\alpha\epsilon\omega\theta$  *Raij Hist. Pl. 963.* Medica echinata oblongo fructu, s. doliaris, spinis rarioribus fructui appressis, *ejusd. Cat. Exterar. 179.*
- Medica doliata spinosa  $\pi\lambda\upsilon\alpha\epsilon\omega\theta$ , *Raij Hist. Pl. 964.* Medica tornata spinosa, *Park. Th. 1116.* Cujus Icon habetur 6<sup>a</sup> in Tabulâ. Cui folia sunt circa margines dentata, in acutos mucrones desinentia, subglauca, mediâ parte maculâ oblongâ luteo viridi notata.
- Medica spinosa  $\alpha\mu\alpha\epsilon\omega\theta$ , fructu ovali duro, spinis brevioribus & rigidioribus, *Raij Cat. Exterar. 179.* Hujus descript. vid. in *Hist. Pl. 963. & 964.* propè Messanam in Siciliâ, hanc speciem invenit Autor.
- Medica magna echinata, *Raij Hist. Pl. 963.* Medica magna turbinata, *J.B. Tom. 2. 385.* Medicæ majoris *Baticæ* spinosæ species altera, *Ger. emac. 1200.* Medica doliata echinata major, *Florent. Schuyl. Hort. Leyd. 51.* Trifolium cochleatum turbinatum, s. fructu compresso oblongo. *C B P.*
- Medica doliata echinata minor. Trifolium cochleatum turbinatum, s. fructu compresso minore, *Botan. Monsp. 268.* Figura superior Medicæ apud Icon. *Lobel. Part. 2. 37.* quæ est ad dexteram, huic nostræ optime convenit.
- Medica cochleata major  $\alpha\mu\alpha\epsilon\omega\theta$  spinosâ capsulâ, s. spinis longioribus sursum & deorsum tendentibus, *Moris. Hist. 2. 153.* Medica cochleata spinosa, echinis magnis utrinque turbinatis, cum spinulis reflexis, *Raij Hist. Pl. 962.* Medicæ majoris *Baticæ* species prima, spinulis intortis, *Ger. emac.*
- Medica echinata glabra, cum maculis nigricantibus, *J.B. T. 2. 384.* Trifolium cochleatum folio cordato maculato. *C B P.* Medica *Arabica Camerarij*, s. Trifolium cordatum, *Park.*
- Medica cordata  $\pi\alpha\lambda\upsilon\alpha\epsilon\omega\theta$  major maculata fructu mollioribus spinis echinato. an Medica folliculo spinoso, *Lob. Icon. Part. 2. 37.* Trifolium cochleatum fructu nigro hispido. *C B P. 329.*
- Medica cochleata spinosa major  $\alpha\mu\alpha\epsilon\omega\theta$ , s. capsulâ rotundiore majore, spinis paucioribus, & rigidioribus, *Moris. Hist. 2. 153.* an Medica foliis & semine Medicæ cordatæ echinatæ, echinis durioribus, *Raij Hist. Pl. 963.*
- Medica echinata magna  $\pi\alpha\lambda\upsilon\alpha\epsilon\omega\theta$ , foliis glabris, cauliculis procumbentibus nostras. Trifolium cochleatum polycarpon. *C B P.* Medica echinata magna hirsuta, *J.B. Tom. 2. 385.* Malè autem additur hirsuta, cum tota planta sit glabrâ; Atque etiam apud *J. Bauhinum*, nè unum quidem verbum de hirsutie dicitur in descriptione.

Medica



- Medica echinata hirsuta*, J. B. T. 2. 386. *Trifolium echinatum arvense*. C B P.  
*Tribulus terrestris minor repens*, Hist. Lugd. 514.
- Medica echinata minima*, J. B. *ibid.* *Trifolium echinatum arvense*, fructu minore C B P.
- Medica coronata Cherleri parva*, J. B. T. 2. 386. *Trifolium folio obtuso folliculis cordatis*. C B P. 329. Item *Trifolium folliculis Coronæ similibus*, *ejusd.* C B P. & in Prodr. 141. *Medica cum orbiculis laxis echinatis*, minoribus non extantibus spinulis, Raij Hist. Pl. 965. *Medica cochleata πολύκαρπῳ* annua capsulâ minimâ coronatâ, Moris. Hist. 2. 155.
- Medica Syriaca δικαρπῳ* laciniata, foliis & fructu spinosis. *Trifolium fructu echinato foliis elegantè dissectis*, Bot. Monsp. 271. *Trifolium echinatum luteum foliis laciniatis*, Dodart. Memoir. 123. *Trifolium cochleatum spinosum Syriacum foliis laciniatis*, Breyn. Cent. 1. 81.
- Medica marina Clusio, Park. Th.* *Trifolium cochleatum maritimum tomentosum*. C B P. 329. *Trifolium cochleatum maritimum*, s. *Medica marina*, J. B. T. 2. 383. *Medica cochleata πολύκαρπῳ* capsulâ spinosâ minore, perennis, incana, maritima, Moris. Hist. 2. 154.
- Medica cochleata πολύκαρπῳ* capsulâ spinosâ minore perennis, ciliaris, s. capsulis ciliaribus nigris, Moris. *ibid.* *Medica ciliaris Guilandini*, Raij Hist. Pl. 965.
- Medica maritima supina nostras*, foliis viridibus ad summos ramulos villosis. Fortè *Medicæ marinæ spinosæ species*, Gerard. *emac.* *Medica marina major & minor spinosâ*, Park. Theatr. *ibid.*
- MELAMPYRUM** angustifolium cristatum, spicâ quadratâ, floribus ex luteo. palleſcentibus nostras. *Melampyrum cristatum*, J. B. T. 3. lib. 30. 440. *Phytogr. Tab. 99. fig. 2.* An *Melampyrum luteum angustifolium*. C B P. 234. *Melampyrum purpurascens comâ*. C B P. *ibid.* *Melampyrum multis*, s. *Triticum Vaccinium*, J. B. T. 3. 439. *Cratægonon flore vario*, Park. Th.
- Melampyrum cærulea comâ*. C B P. *ibid.* *Melampyro affinis*, *Parietaria cærulea quorundam*, J. B. T. 3. 440. *Melampyrum quartum*, Park. Th. quoad Synonyma, *Cratægonon flore vario quoad Iconem.*
- Melampyrum Sylvaticum flore luteo*, s. *Satureia lutea sylvestris*, J. B. T. 3. 441. *Melampyrum luteum latifolium*. C B P. 234. *Cratægonum vulgare*, Park. Theatr.
- Melampyro affinis tetraphylla Gangetica* floribus inter folia sparsis, *Phytogr. Tab. 99. fig. 3.* An *Adel-Odagam*, H. Malab. Part. 9. *Hujus semen mellei coloris lucidum, singulare. nudum, grani triticei æmulum, insidet super basi foliorum cristatorum duplici serie, binas membranulas rigidiores; alteram alteri longiorem circumambientium, constructo.*
- Melampyro cognata Maderaspatana spinis horrida*, *Phytogr. Tab. 119. fig. 5.* An *Coletta-Veetla*, H. Malab. Part. 9. *Eryngium Zeylanicum* Febrifugum floribus luteis *Herbar. Viivi*, D. Herm. *Cingalensibus* Kathu-Karohiti. Fortè etiam huc pertinet *Bahel-Schulli*, H. Malab. Part. 2. *Genistæ spinosæ speciem facit Commelinus in Notis.* *Lycium Indicum* spinis quaternis ad singulorum foliorum ortum P. B P. 349.



MELANACRODRYON Arbor *Americana* spinosa, Prunifolia, baccas atramentarias proferens, quæ ad spinarum radices cincinnis exornatur, *Phytogr. Tab. 205. fig. 2.* Fortè Cuipouna *Brasilens.* *Pison. 178.* Fortè etiam Ibiraba *Brasiliana, Marcgr. lib. 3. cap. 19.* Inkwood & Ink-berry *Barbadensibus* dicta.

MELANOMMA & Melanoxylon Arbor Laurifolia nucifera gemmis nigricantibus *Americana, Phytogr. Tab. 205. fig. 3.* Andira (fortè) s. Angelina *Pison. Hist. Black-bud & Blackwood Barbadensibus* dicta.

MELIANTHOS *Africana major* foetida floribus atropurpureis, *Melanthus Africanus, H. Leyd. 414.* Pimpinella spicata maxima *Africana Barthol. Act. Hafn. Ann. 1673. Vol. 2. Pag. 58.*

Melanthos *Africana minor* foetida, floribus obsoleti coloris. *In Horto instructissimo, D. Uvedal*

MELILOTUS major odorata flore violaceo. Lotus hortensis odora. *C B P. 331.* Lotus sativa odorata annua flore cæruleo, *J B. T. 2. l. 17. 368.*

Melilotus *Officinarum Germaniæ. C B P.* Trifolium odoratum, s. Melilotus vulgaris flore luteo, *J B. Tom. 2. 370.*

Melilotus *Italica* folliculis rotundis. *C B P.* Melilotus magno semine rotundo, rugoso, *J B. T. 2. 371.* Melilotus lutea, seminis pericarpio magno, rugoso, rotundo, albo, *Morif. Hist. 2. 161.*

Melilotus lutea *Arabica* floribus & filiculis majoribus, ad summum caulem quasi in verticillas positis. An Melilotus lutea minor floribus & filiculis majoribus spicatum & rarò dispositis, *Morif. Hist. 2. 161.*

Melilotus *Indiæ Orientalis* erecta folliculis rotundis parvis, spicâ florum ex foliorum alis multiplici, *Phytogr. Tab. 45. fig. 4.*

Melilotus nova *Berardi, s. erecta* folliculis rotundis minor, *Raij Hist. Pl. 950.* Melilotus lutea minor, floribus & filiculis minoribus, spicatum & densè dispositis, *Morif. Hist. 2. 161.*

Melilotus angustifolia repens folliculis rotundis. *C B P.* Meliloto vulgari nostrati affinis folio minore & angustiore, *J B. Tom. 2. 371.* Melilotus lutea minima procumbens folio minore & angustiore, *Morif. ibid.*

Melilotus lutea minima procumbens foliis minoribus crenatis, *Phytogr. Tab. 45. fig. 8.*

Melilotus *Indiæ Orientalis* minima dispermos, folliculis in summitate aduncis, *Phytogr. Tab. 98. fig. 7.* An Melilotus minima *Syriaca* Nephel, s. Nephel-Ibenbaithar, & Malafesæ, *Breyn. Prodr. 2. 67.*

Melilotus *Syriaca, Adv. Lob. 386.* Melilotus corniculis reflexis major. *C B P.* Trifolium *Italicum, s. Melilotus Italica* corniculis incurvis, *J B. Tom. 2. 372.*

Melilotus *Aegyptia* Alchimelech dicta, *Prosp. Alpini, de Pl. Egypt. 124.* Melilotus corniculis reflexis minor. *C B P. 331.*

Melilotus *Syriaca, s. Chalepensis* major coronata, filiquis curvis biuncialibus, *Morif. Hist. 2. 163.*

Melilotus agraria minor floribus luteis conglomeratis. Trifolium pratense luteum capitulo Lupuli, vel agrarium. *C B P.* Trifolium pratense luteum foemina, (forte) flore pulchriore, s. Lupulino, *J B. Tom. 2. 381.*

Melilotus



*Melilotus agraria minima coronata*, capitulis laxioribus. *Trifolium luteum flore Lupulino minus*, *J B. ibid.* àn *Trifolium Lupulinum alterum minus*, *Raij Synops.* 135.

*Melilotus fruticosa candida major*, *Morif. Hist.* 2. 161. *Melilotus flore albo*, *Park. Theatr.*

*Melilotus Indica humilis erecta*, floribus exiguis odoratis albis, pericarpiis majoribus spicatim densius stipatis, *Phytogr. Tab.* 45. *fig.* 5. *Suendadi-pullu*, *Hort. Malab. Part.* 9. *Tab.* 40.

*Meliloti* (fortè) genus *Indianum*, s. *Trifolium Americanum* elatius holosericeum, summo folio bifido, suaveolens, *Phytogr. Tab.* 69. *fig.* 2.

MELISSA *hortensis*. *C B P.* 229. *Melissa vulgaris* odore Citri, *J B. Tom.* 3. lib. 28. 232.

*Melissa Romana hirsutior*, *Morif. Prælud.* 286. *Melissa sylvestris hirsutior minus odorata*, *Raij Hist. Pl.* 572. *Melissa Romana molliter hirsuta & graveolens.* *H R P.* 119. *Melissophylli sylvestris* genus, *Matth. Valgrif.* 827.

• *Melissa Jamaicana* odoratissima, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 3. *Melissæ species agrestis Brasiliensium Pisonis*, 242. *Erva Cidreira Lusitanis dicta.* *Citrango*, s. *Melissa Citrata Brasiliensis*, *Raij Hist. Pl.* 1332.

• *Melissophyllum citratum* ex *Insulis Fortunatis*, *Lingo-veha* ab *Insulanis* dictum, *Phytogr. Tab.* 306. *fig.* 4.

• *Melissa* (fortè) àn *Mentha viridis*, *Betonica* formâ, & odore aromatico, ex *Insulis Fortunatis*; *Polihomons Insulanis dicta*, *Phytogr. Tab.* 307. *fig.* 1. Fortè *Yxiayahual Chapaltepecensis*, s. *Nepeta Mexicana Hernand.* apud *Recc.* 224. An *Melissa* elatior foliis magnis dentatis glabris ad genicula binis, flores odoratos luteos patulos stamina bina quasi cornua protrudentes, in summitate caulium ramatim ferens, *D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.*

*Melissa Turcica* multis dicta, *J B. T.* 3. 234. *Melissa peregrina folio oblongo.* *C B P.* 229. *Variat flore albo & ceruleo.*

*Melissa Moluccana odorata.* *C B P.* *Molucca*, *J B. T.* 3. 234. *Melissa Molucca lævis*, s. *Syriaca lævis*, *Park. Th.*

*Melissa Moluccana foetida.* *C B P.* *Molucca asperior foetida*, *J B. T.* 3. 235. *Melissa Molucca asperior*, s. *Syriaca asperior*, *Park. Theatr. Vide Suppl. pa.* 401

MELO *Saccharinus Anguriæ folio*, *Virginianus*, fructu magno, cortice viridi, carne liquefcenti albo, vel incarnato, *D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.* *Vua Insulæ Maragnan. Ogilv. Americ. Jacq. Pisonis*, 263. De hujus fructu, & visu, & gustu, & olfactu suavissimo, vid. plura in *Garc. ab Hort. lib.* 2. cap. 20. *Bellon.* 136. *Mandest. Excerpt.* 33. Qui à *Moscovitis* *Arpus*, à *Turcis*, & *Tartariæ* *Indigenis* *Xarpus*, atque *Persis.* *Hinduanes* nuncupatur *Olear.* lib. 4. pag. 127.

MENIANTHES trifoliata palustris Antiscorbutica, floribus fimbriatis in spicam dispositis. *Trifolium fibrinum Tabernamontani & Germanorum*, *Raij Hist. Pl.* 1090. *Trifoliata palud sa*, *Morif. Hist.* 2. 149. *Menianthes palustris Dalechamp. Hist. Lugd.* 1020. *Trifolium palustre.* *C B P.* 327. *J B. T.* 2. 389.

MEN-



MENTHA hirsutior βερχύωλα τυφύλλο exotică, *Phytogr. Tab. 45. fig. 2.* à D:  
Doody accepimus.

Mentha *Maderensis* Insulæ, minùs odorata.

Mentha *Americana* Melissæ foliis graveolentibus. P B P. *Phytogr. Tab. 306. fig. 6.*

Mentha *Curassavica* inodora, crasso rugoso & succulento folio, radice fibrosâ. P B P.  
*Phytogr. Tab. 306. fig. 5.* Habetur etiam tuberosâ radice; in *Hort. Reg. Aut.*  
*Hamptoniens.*

Mentha *Arabica* spicata suaveolens, foliis longioribus incanis, spicâ minore.

Mentha sylvestris *Azorica* longioribus foliis incanis, spicâ longiore & crassiore.

Mentha *Canariensis* frutescens, foliis subtùs lanugine candidissimâ, villosis floribus  
glomeratis è sinu foliorum longioribus pediculis insidentibus, *Phytogr. Tab.*  
*307. fig. 2.*

Mentha *Canariensis*, minore folio subtùs incano, *ramosissimus*:

MERCURIALIS perennis maritima incana (Phyllon dicta) testiculata,  
*Moris. Hist. 2. 613.* Phyllon testiculatum. C B P. 122. Phyllon arrhenogonon  
folio incano *Monspessulanum*, J. B. T. 2. 981. Phyllon marificum, *Park. Th.*

Mercurialis perennis maritima (Phyllon dicta) spicata, *Moris. ibid.* Phyllon  
spicatum. C B P. *ibid.* Phyllon Theligonon folio incano *Monspessulanum*, J. B.  
*ibid.* Phyllon fœminificum, *Park. Th.*

Mercurialis *Zeylanica* tricoccos, cum acetabulis, *H. Leyd. app. 686.* Kupamenija  
*Zeylanensibus* dicta.

Mercurialis *Maderaspatensis* tricoccos acetabulis destituta, *Phytogr. Tab. 205. fig. 4.*  
Fortè Pee-Cupameni, *Hort. Malab. Part. 10.*

Mercurialis tricoccos Hermaphroditica, s. ad foliorum juncturas, ex foliolis crista-  
tis julifera simul & fructum ferens, D. Banister. *Phytogr. Tab. 99. fig. 4.* Inter  
hujus congenera, jure optimo accenseri potest Cupameni, *Hort. Malab. Part. 10.*  
*Tab. 81.*

MESPILUS vulgaris, J. B. T. 1. 69. Mespilus *Germanica* folio Laurino non  
ferrato, s. Mespilus sylvestris. C B P. 453.

Mespilus *Virginiana* Arbuti lanato folio. Sorbus *Virginiana* folio Arbuti, *Breyn.*  
*Prodr. 51.* H. Leyd. 578. Cujus in *Append. exhibetur Icon. 699.*

Mespilus Alni lanato folio major, H. Leyd. 424. Alni effigie lanato folio major.  
C B P. 452. Sorbus Alpina, J. B. Tom. 1. 65. Sorbus sylvestris Aria *Theophrasti*  
dicta, *Park. Th.* Hujus & altera varietas è Sueviâ, foliis laciniatis.

Mespilus Alni lanato folio minor, H. Leyd. *ibid.* Alni effigie lanato folio minor.  
C B P. Diospyros. J. B. Tom. 1. 75. Vitis Idæa tertia *Clus. Park. Th.*

Mespilus humilis folio Mali Cydoniæ rotundo non ferrato, H. Leyd. *ibid.* Cotonas-  
ter folio rotundo non ferrato. C B P. 452. Item Chamæmispilus *Cordi*, ejusd.  
C B P. *ibid.* Cotonaster, J. B. Tom. 1. 73. Vitis Idæa arborescens Mali Cotonæ  
vel Styrcis foliis, *Breyn. Prodr. 2. 105.*

Mespilus humilis subrotundis ferratis foliis supernè glabris & nervosis, subtus la-  
nugine tectis. Cotonaster folio oblongo ferrato. C B P. *ibid.* Chamæmispilus,  
J. B. T. 1. 72.

Mespilus



*Mespilus Africana* longioribus & tenuissimè crenatis foliis glabra. An *Mespilus* officulo lævi coloris spadicei Lata *Guinea*, J B. T. 1. 72. Pyro similis ex *Guinea* C B P. 439. Lata fructus exoticus 7. *Clus. Exot.* lib. 2. cap. 22.

*Mespilus Prunifolia Virginiana* non spinosa fructu nigricante, *Phytogr. Tab.* 46. fig. 2. *Rhamnus Virginiana* Prunifolia fructu nigro, officulo compresso, *Banist. Cat. Stirp. Virgin.* An *Mespilus*, s. *Sorbus torminalis Virginiana* latissimo folio, fructu nigro, *Schol. Bot.* 289. Fortè etiam *Mespilus spinosa*, s. *Oxyacantha Virginiana* nigra, *H. Leyd.* Si saltèm aliquandò inveniatur spinosa, & ubi magis domestica spinis careat, ut accidit in *Anthedone*, *Azarolo Cesalpin. Theophrasto* monente. Nostram autem unquam spinosam esse, mihi haud persuadere possum.

*Mespilus aculeata Pyrifolia denticulata* splendens, fructu insigni rutilo *Virginienfis*, *Phytogr. Tab.* 46. fig. 1. An *Mespilus Virginiana* colore rutilo. C B P. Hujus etiam Folia aliquando variant & senectute multum laciniata evadunt, ut in *Horto Nobiliss. Viri, D. Caroli Howard*, propè oppidum *Darkin* in agro *Surriensi* in unâ eâdemque Arbore, utriusque generis folia me observasse memini. àn *Oxyacanthus* quinque officulis, fructu magno inclusis, *Banist.*

*Mespilus spinosa Pyrifolia*, *H. Leyd.* *Oxyacantha Dioscoridis*, s. *Spina acuta Pyrifolio*. C B P. 454. *Pyracantha* quibusdam, J B. T. 1. 51.

*Mespilus Apij folio sylvestris* non spinosa, s. *Sorbus torminalis*. C B P. 454. *Sorbus torminalis* & *Cratægus Theophrasti*, J B. Tom. 1. 63.

*Mespilus Apij folio Virginiana* spinis horrida, fructu amplo coccineo, *Phytogr. Tab.* 46. fig. 4. *Mespilus Apij folio Indica*, *Schol. Botan.* 289. *Mespilus spinosa*, s. *Oxyacantha maxima Virginiana*, *H. Leyd.* 423. *Oxyacantha* officulis binis, fructu magno inclusis *Banister. Cat. Virgin.* *Oxyacantha Americana* Galli calcar dicta, *R. S. Mus. Raij Hist. Pl.* 1795. Hujus Arbor *Spina Glassemburiensis*, *Spina Christi* & *Spina Sancta* per errorem dici solita est. Fortè *Mespilus Virginiana Ind. Occid. Part.* 1.

*Mespilus Apij folio sylvestris spinosa*, s. *Oxyacantha*. C B P. *Oxyacantha vulgaris*, s. *Spinus albus*, J B. Tom. 1. 44. *variat interdum flore pleno*.

*Mespilus Virginiana Apij folio*, vulgari similis major, grandioribus spinis, *Phytogr. Tab.* 46. fig. 3. An Arbor *Americana Oxyacanthæ* similis *Clus. exot.* lib. 1. cap. 6. & J B. lib. 9. cap. 29. fol. 302.

*Mespilus Virginiana grossulariæ foliis*, fructu rubro minore, *Phytogr. Tab.* 100. fig. 1. àn *Oxyacanthus folio parvo subrotundo*, flore unico, thecâ foliaceâ incluso summitatibus ramulorum insidente *Banisteri*.

*Mespilus Apij folio laciniato*. C B P. 453. *Mespilus Aronia Veterum*, J B. Tom. 1. 67. *Mespilus Aronia*, s. *Neapolitana*, *Park. Th.* *Lazarole Italis* dicta ab *Arabico* Alzaror.

*Mespilus Virginiana* spinis longioribus rectis, foliis quodammodo auriculatis, *Phytogr. Tab.* 99. fig. 5.

**METHONICA** *Malabarorum Nienghala Zeylanensium*, *Mus. Zeyl. Phtogr. Tab.* 116. fig. 3. *Hort. Leyd. append.* 688. *Mendoni*, *H. Malab. Part.* 7. *Tab.* 57. *Lilium Zeylanicum superbum vulgo*.



MEUM foliis Anethi. *C B P.* 148. Meum *Athamanticum*, *Morif. Umbel.* 4.  
 Meum Alexiterium, *Pr. Alpin. exot.* 329. Meum vulgare, s. Radix Ursina,  
*J B. Tom.* 3. l. 27. 11.  
 Meum latifolium adulterinum. *C B P. ibid.* Meum alterum *Italicum* quibusd. *J B.*  
*Tom.* 3. 15.

MILIUM semine albo, nigro, aureo. *C B P.* 26. *J B. Tom.* 2. l. 18. 446.  
 Milium *Indicum* arundinaceo caule granis flavescentibus, *H. Leyd.* 425. Milium  
*Indicum* Sacchariferum altissimum semine ferrugineo, *Breyn. Prodr.* 2. Fru-  
 mentum *Indicum* quod Milium *Indicum* vocant, *Casp. Bauh. Theatr. Botan.* 488.  
 Milium *Indicum* arundinaceo caule granis nigris, *Cat. H. Leyd.* 426. Milium *In-*  
*dicum* Sacchariferum altissimum semine rotundo atro, *Breyn. Prodr.* 2. 72. Mi-  
 lium *Benghalense* semine majore nigro splendente, *H. Amst.* 233.  
 Milium *Indicum* arundinaceo caule semine fusco, glumis splendentibus atris.  
 Milium arundinaceum subrotundo semine Sorgo nominatum. *C B P.* 26. Sorghi  
*J B. Tom.* 2. lib. 18. 447.  
 Milium arundinaceum plano, alboque semine. *C B P.* Sorghi album, Milium *In-*  
*dicum*, Dora, *J B. Tom.* 2. 448.  
 Milium arundinaceum semine Lithospermi facie maximo durissimo, *H. Leyd.* Li-  
 thospermum arundinaceum (fortè) *Dioscoridis & Plinij.* *C B P.* 258. Lachry-  
 ma *Jobi* multis, s. Milium arundinaceum, *J B. Tom.* 2. 449. Fortè etiam Ca-  
 friconda, *H. Malab. Part.* 12, *Tab.* 70.  
 Milium arundinaceum semine Lithospermi facie maximo nigricante. An Milium  
 Solis, s. Lithospermum *Indicum Bontij*, lib. 6. 152. *Cl. Hermannus*, in *H. Leyd.*  
*App.* Huic *Tozcuilopilxochitl Hernandez.* idem facit, quæ Cannæ *Indicæ* spe-  
 ciem ritè nobis alibi proponitur.

MILLEFOLIUM maximum *Virginianum*, Umbellâ albâ. An Millefolium  
 maximum Umbellâ albâ. *C B P.* 140. Millefolium *Virginianum*, *Breyn. Prodr.*  
 2. 72. Millefolium *Canadense* elatius flore albo, *Schol. Botan.* 172. Millefolium  
*Novæ Angliæ* maximum floribus albis. *P B P.* 353. Fortè etiam Tlalquequet-  
 zal, s. Penna Terræ *Hernand. Hist. Mexic.* lib. 6. 194.  
 Millefolium vulgare purpureum majus & minus. *C B P.* 140.  
 Millefolium tomentosum luteum. *C B P.* 140. *J B. Tom.* 3. lib. 26. 131.  
 Millefolium Tanaceti foliis, flore albo *Morif. Phytogr. Tab.* 47. fig. 1.  
 Millefolium montanum purpureum Tanaceti folio, *Dodart. Memoir.* 101. *Ptarmi-*  
*ca Alpina* Tanaceti foliis flore purpureo, *Elem. Bot. Tab.* 1. 398.  
 Millefolium majus album odore Camphoræ, *H. Leyd.* Tanacetum minus album  
 odore Camphoræ, s. *Achillea Dioscoridis.* *C B P.* 132. *Achillea* Millefolia odo-  
 rata, *J B. Tom.* 3. lib. 26. 140.  
 Millefolium odoratum minus *Monspeliensium.* *H R P.* 125. *H R P.* 135. *Botan.*  
*Monsp.* 177. Millefolium odoratum minus album *Monspeliensium*, *Dodart. Me-*  
*moir.* 103.  
 Millefolium exoticum Abrotani fœminæ foliis tomentosis, *Phytogr. Tab.* 246. fig.  
 3. an Millefolium incanum *Creticum.* *C B P.* 140. Millefolium incanum *Creti-*  
*sum,*



cum, s. Millefolium Dioscoridis, ejusd. C. Bauhin. Prodr. 72. Stratiotes Millefolia Honor. Belli, Epist. 2. ad Clus. Millefolium Creticum, J B. Tom. 3. 139. Stratiotes Millefolia Cretica, Pr. Alpin. Exot. 84.

Millefolium Æthiopicum Ericæ foliis incanum, flore specioso, Phytogr. Tab. 308. ab Ornatissimo Viro, D. Alexandro Brown, accepimus.

Millefolium aquaticum umbellatum, capillaceo brevique folio. C B P. 141. Millefolium aquaticum Fœniculo simile Umbelliferum, J B. Tom. 3.

Millefolium palustre galericulatum, Ger. emac. Millefolium aquaticum flore luteo galericulato, J B. Tom. 3. lib. 38. Millefolium aquaticum lenticulatum. C B P. Lentibularia Rivini cum Icone.

Millefolium palustre galericulatum minus, flore minore, Phytogr. Tab. 99. fig. 6. Reverendus Vir & amicus noster singularis, D. Dodsworth, in agro Eboracensi, sponte natum invenit, & jampridem nobis benignè communicavit.

MIMOSA major frutescens spinosa ramulis communi pediculo in orbem coactis.

Mimosa spinosa 3<sup>a</sup>. s. foliolis Acaciæ angustioribus filiquis parvis echinatis, Breyn. Cent. 1. 40. Mimosa altera spinis horridiuscula, & sensitiva magis, HRP. 122. Mimosa, s. pudica ramulis & foliis sensilibus, Schol. Botan. 300. Caaeo, s. Herbæ vivæ 3 species, Marcgr. Juqueri aliis Caaeo 2<sup>a</sup>. Pisonis de Medicin. Brasl. 118. & in Histor. Nat. & Medic. Ind. Occid. 203. Herba Mimosa, Clus. in Not. ad Acoſt. cap. 56. Pinahuihuiztlis, s. Herba verecunda, Hernand. apud Recc. 123. Planta humilis (i. e.) The humble Plant. Hortulanis nostratibus vulgo.

Mimosa arborescens spinosa, frondibus orbicularibus latifolia, filiquis radiatis Onobrichydis modo articulatis. Mimosa spinosa prima, s. Brasiliana latifolia filiquis radiatis, Breyn. Cent. 1. 31. Juqueri-Omnano Brasiliensibus, Marcgr. 64. Juqueri aliis Caaeo, s. Herba Casta vel Mimosa prior Pisonis, de Medicin. Brasiliens. 117. quoad Descriptionem.

Mimosa spinosa frutescens filiquis longis latis & hirsutis, ex Indiâ Orientali, Phytogr. Tab. 307. Fortè Mimosa spinosa 2<sup>a</sup>. s. foliolis Acaciæ latioribus, filiquis longis hirsutis, Breyn. Cent. 1. 37. Caaeo, s. Herba viva prima, Marcgr. 73. Juqueri, aliis Caaeo, Herbæ castæ species prior, Pison. quoad Iconem in Hist. Natur. & Medic. Ind. Occident. 201. 202. ac Juqueri aliis Caaeo species prior quoad Iconem; & Posterior, quoad Descriptionem, ejusd. Pisonis de Medicinâ Brasiliensi, 118.

Mimosa spinosa de Pernambuco Jac. Zanon. Hist. Bot. 144. Herba Mimosa λεπτομακρονέγχο caulibus & filiquis spinosis, Moris. Hist. 2. 199.

Mimosa frutescens Americana alarum costis aculeatis, Phytogr. Tab. 307. fig. 5. Mimosa (fortè) s. Herba sensilis costâ spinosâ, Schol. Bot. 300.

Mimosa de Jamaica, Patavina, dicta. Jac. Zanon. 149. Æschynomene mitis prima, vel potius Herba casta Americana, foliolis Acaciæ latioribus, filiquis latis, compressis majoribus, Breyn. Cent. 1. 46. Herba Mimosa non spinosa πλατυκέγχο, s. Σερχυπλατύλοε de Jamaica; Patavina dicta. Moris. Hist. 2. 200. àn Malam-Todda-Vaddi, H. Malab. Part. 9. Tab. 21. Planta sensitiva (i. e.) The sensible Plant nostratibus dicta.



- Mimosa *Orientalis* non spinosa rarioribus ramis floribus spicatis, *Phytogr. Tab. 307. fig. 4.* à Niti Todda-Vaddi, *H. Malab. Part. 9. Tab. 20.* Fortè etiam *Æschynomene* mitis secunda, vel potius Herba casta *Zeylanica* filiquis latis compressis minoribus, *Breyn. Cent. 1. 47.* *Brachmenibus* Ladschini *Malaiis* verò Totta-Vaddi dicta.
- Mimosa *Americana* pinnis *Acaciæ* angustioribus sensu carentibus filiquis longis angustis, semine quadrangulari, *Breyn. Prodr. 2. 72.* Mimosa *Italica*, s. Herba viva, *Ambrosin. Phytol.* Mimosa spuria de *Pernambuca*, *Italica* dicta *Zanon. 151.* Herba Mimosa non spinosa λεωτομαυροέρωτο, s. spuria de *Pernambucâ*, *Morif. Hist. 2. 200.* *Securidaca* peregrina fortè *Pareffeaux Gallica* (i. e.) Planta sensibilis pigra, *Morif. Præhud. 307.* The noathful Sensitive nostratibus vulgò.
- Mimosa *Americana* pigra filiquis longis angustis allium olentibus, *Phytogr. Tab. 307. fig. 3.*
- Mimosa, s. *Æschynomene* mitis angustiori filiquâ, foliis perexiguus *Maderaspatana*, *Phytogr. Tab. 5. fig. 2.* *Æschynomene* foliis minimis nostra, *Raii Hist. Plant. Append.*
- Mimosa pumila *Maderaspatana* pinnis tenuissimis ad foliorum exortus innocuis spinulis obarmata, *Phytogr. Tab. 120. fig. 1.*
- Mimosa, s. *Æschynomene* mitis *Americana* foliolis brevibus longiore pedunculo infidentibus. Herba casta *Americana* supina, veluti spinulis exasperata foliolis *Acaciæ* latioribus, & brevioribus, *Breyn. Prodr.* Item *Æschynomene* mitis *Americana* foliolis *Acaciæ* brevioribus, *Breyn. Cent. 1. 48.* *Phytogr. Tab. 5. fig. 1.*
- Mimosa, s. *Æschynomene* mitis, pinnulis amplioribus, *Chamæfilicis* marinæ æmulis de *Tunquin.* Sub Ovali titulo recepimus, foliorum formâ *Tsjampangam*, *H. Malab. haud multum abludit.*
- Mimosa humilis, *Ind. Orient.* simpliciter pinnatis *Tamarindi* foliis, floribus coronariis flavis, lituris rubris elegantè striatis. Todda-Vaddi, *H. Malab. Part. 9. Tab. 19.* Totta-Vari (i. e.) Herba Mimosa *Malabariensium*, *Zanon. Hist. Bot. 199.* ab *Indigenis* Totta-Vari vel Totta-Pari (i. e.) *Tacta* clauditur. Hujus pictura exhibetur cum *Nellika* ad *Tab. 61.* eodem Autore. Herba viva *Acoftæ Hist. Lugd.* Herba sentiola (i. e.) sensifica *Lusitanis* *Linschot. Part. 4. Ind. Or. cap. 71.* Herba mimosa foliis *Fœnugræci* sylvestris. *CBP. 360.* à *Circumforaneis* illis *Jouques* appellatis Herba amoris, ab *Arabibus* & *Turcis* *Suluc*, & à *Persis* *Sulique* dicta.

MIRABILIS *Peruviana*, *Park. Th. Hachal Indorum*, s. *Admirabilis Peruviana Clusij.* *Solanum Mexiocanum* flore magno. *CBP. 168.* *Jasminum Mexiocanum*, s. *Flos Mexicanus* multis, *JB. T. 2. 814.* *Tlaquilin Mexicensibus* *Hernand. lib. 8. cap. 29.* Variat flore ex rubro luteo & albo tam virgatim quam punctatim mixto. *Andi-Malleri*, *H. Malab. Part. 10. Tab. 75.*

Mirabilis *Peruviana* flore minore, *Park. Th. Solanum Mexiocanum* flore parvo. *CBP. Atzoyatl*, s. *Mirabilis Mexicana Hernandez. lib. 5. cap. 47.* *Mirabilis Peruviana* minor, *Munting. 213.*

Mirabili *Peruviana* affinis tinctoria *Betæ* folio scandens, *Cochinensis*, flosculis puniceis, muscosis ex sinu foliorum spicatis, fructu intus cochleato, *Phytogr. Tab. 63. fig. 1.* *Solanum scandens Malabaricum* *Betæ* folio, *Hort. Amst. 330.* *Betæ baccifera*.



baccifera Aizoides rotundifolia *Zeylanica*, Breyn. Prodr. 2. 23. Basila Zanon. Hist. Bot. Basella, H. Malab. Part. 7. Tab. 24. Ubi sub *Bryoniæ* genere (minus apte) recenseri vellet Commelin. in Not. supra locum. Bintal Zeylanensibus, & *Cochinensibus* Brotho-Condolo nominatur. Succus ex Floribus, non ex Fructibus (ut vult Annotator) expressus, commodissime pro miniaturâ utitur; in H. Comptoniano apud Fulhamenses, cum floribus & fructu collegimus.

MOLY latifolium Liliflorum. C B P. 75. Moly Theophrasti magnum, J B. Tom. 2. 568. Moly Theophrasti, s. Homeri, Park. Th. Ornithogalum Indicum latis fol. floriferum sphaericum, colore Colossino aut albo, Moris. Hist. 2. 380.

Moly latifolium luteum, odore Allij primum. C P B. & secundum, ex sententiâ Raij Hist. Pl. 1123. Moly luteum Botanicorum, latifolium Allij odore, J B. T. 2. 562. Moly montanum latifolium flavo flore, Clus. Hist.

Moly latifolium palustre candidum, Allium vehementer redolens. Allium sylvestre latifolium. C B P. 74. Allium Ursinum bifolium Vernum sylvaticum, J B. Tom. 2. 569.

Moly angustifolium Umbellatum. C B P. 75. Moly Dioscoridis parvum quibusd. J B. T. 2. 568.

Moly minus, sive Allium sylvestre, roseo amplo flore, Botan. Monsp. 11. ubi Figuram hujus & descriptionem videsis.

Moly parvum caule triangulo. C B P. Moly parvum caule & foliis triangularibus, Parkinson.

Moly moschatum capillaceo folio. C B P. Moly moschatum, vel Zibettinum Monspeliense, Park. Th. Allium sylvestre perpusillum juncifolium moschatum, J B. Tom. 2.

MORGSA NI Syrorum, Rauwolfii Hist. Lugd. app. Capparis Portulacæ folio: C B P. 480. Capparis fabaginea, s. Peplios Lutetianorum, J B. Tom. 2. 66. Telephium Dioscoridis & Plinij, Column. ecphr. 132. Capparis fabago, s. leguminosa, Park. Th.

MORINGA Lentisci folio, fructu magno anguloso, in quo semina Ervi, J B. T. 1. lib. 12. 435. Mouringou, H. Malab. Part. 6. Tab. 11. Nux [Been Zeylanica filiquâ triangulâ, seminibus alatis, H. Leyd. app. 692. Katu Murungha Zeylanensium Mus. Zeyl. Moringeros Lusitanis. Balanus Myrepica filiquâ triangulari semine minore alato, Breyn. Prodr. 2. 22. Boa Keloort en Rhine. Arbor exotica Lentisci folio. C B P. 399. Coatlis (quam Alij Tlapolezpatlin, s. Medicinam sanguinis coccineam vocant) foliis Ciceris, vel Rutaceis; cujus lignum est Lignum Nephriticum Hernandez. apud Recc. lib. 4. c. 25. de Laet. Ind. Occid. lib. 5. cap. 3. Kircher. in Arte magn. lucis & umbræ. Huic propius accedere videtur.

MORUS nigra, J B T. 1. 118. Morus fructu nigro. C B P. 459. Morus nigr. vulgar. Park.

Morifolia Virginienfis arbor, Loti arboris instar ramosa, foliis amplissimis, Phytogr. Tab. 246. fig. 4. Morus Virginiana lactescens latissimo folio, H. Beaum. 30. Corylus.



rylus maxima, folio latissimo *Virginiana*, *H. Comptoniano*, *Raij Hist. Pl.* 1799.  
 àn *Quauhtlatzin*, s. *Arbor crepitans secunda Hernand. Hist. Mexic.* 88.  
*Morus alba*, *J B. ibid. descript.* *Morus fructu albo.* *C B P.* 459.

MOULLAVA, *Hort. Malab. Part. 6. Tab. 6.* Siliquosa *Indica* flore pentapetalo luteo, filiquis lenibus tetraspermis ferè, *Raij Hist. Pl.* 1752.

MUSCUS arboreus villosus, *J B. Tom. 3. 763.* Muscus arboreus: *Usnea Officinar. Germanor. C B P.* 361. Muscus arboreus vulgaris & *Quercinus*, *Parkinson. Theatr.* 1311.

• Muscus arboreus aurantiacus, staminibus tenuissimis, ex *Insulis Fortunatis*, *Phytogr. Tab. 309. fig. 1.* àn Muscus arboreus rutilans, *C B P. ibid.*

Muscus cinereus, è ramis Arborum dependens, *Canariensis*, ex staminibus crassioribus geniculatis, in tenuissimâ & longissimâ filâ ramulosus. Fortè Muscus capillaceus longissimus. *C B P.* 361. Muscus capillaceus cinerei coloris, è ramis hinc dependens, *Clus. Hist.* Tantâ copiâ inveniuntur hi musci apud *Virginieneses* iis præsertim locis, ubi in Maris accessu aquis abundant, ut Hiberno tempore Totas arbores quibus adnascuntur dejiciant, eo quod pabulum Vaccis & ovibus suis præbent gratissimum.

Idem colore viridi. An Muscus ex præaltis Arboribus ad Terram usque demissus, coloris viridis in cæruleum tendentis, quâ Regina in *Floridâ* cingitur, tenuibus staminibus catenularum instar invicem cohærentibus, *Part. 2. Americ. fig. 39.*

Muscus arboreus nodosus. *C B P.* 361. Muscus nodosus, s. geniculatus, *Park. Th. Dendrobryon geniculatum, s. nodosum, Fab. Column. ecphr. Part. 2. 83.*

Muscus caule rigido, adinstar fili *Chalybei.* *Meret. Pin.* 79.

Muscus arboreus ramosus, *J B. Tom. 3.* fortè etiam Muscus amarus *Absinthii* folio *ejusd. ibid.* *Foglio dirimato Imperati Hist. Nat. lib. 27. 651.* àn Mosco amaro *ejusd. ibid.* Muscus alter *Quernus*, latifolius coralloides ἀφύλλῳ *Column. ecphr.* 335.

Muscus arboreus leucomelanius, ramulis alterâ parte anthracinis, alterâ candidissimis, ex *Norvegiâ.* *Industiâ D. Petiver in Angliam* allatus est.

Muscus arboreus peltatus, & scutellaris, *J B. T. 3. 764.* Muscus arboreus cum orbiculis, *C B P.* 361. Muscus *Quercinus* foeniculaceus, *Park. Th.* Muscus ramos. floridus, *Tabern. Icon.* 808. Muscus *Quernus* fruticosus tricophyllos *Col. ecphr.* 333.

Muscus arboreus capitulis cavis. *C B P.* Muscus alter πλεῖστον κινδύνασιν ἀφύλλῳ *Col. ecphr.* 335.

Muscus arboreus pulmonarius, *C B P.* 361. Muscus pulmonarius, s. Lichen arborum, *Park. Th.* Lichen arboreus, s. *Pulmonaria arborea*, *J B. Tom. 759.* *Pulmonaria Tabern. Icon.* 536. Itèm Lichen arborum *ejusd.* 813.

Muscus *Islandicus Barthol. Aët. Med. Ann.* 1671. 1672. *Obs.* 66. *Sibbald. Hist. nat. Scotiæ.*

Muscus crustæ aut Lichenis modo arboribus adnascens cinereus, *Raij Hist. Pl.* 116. Lichen *Dioscoridis & Plinij secundus Column. ecphr.* 331. variat colore viridi, flavo & pullo.

Muscus



Muscus crustæ modo arboribus adnascens cinereus mollior, & in angustiores lacinias divisus, *Raij ibid.*

Muscus crustæ modo arboribus adnascens candidissimus, mollis & villosus, sub externo cortice repens.

Muscus arboreus supinus marginibus pilosis, *Raij Hist. Pl. 116.*

Muscus arboreus compactior villis duriusculis incrustatus.

Muscus tinctorius crustæ modo petris adnascens, *Raij ibid.* Lichen petræus purpureus *Derbiensis Park. Th. Vercelli Melitensibus, Joan. Francisc. Abela; in Melit. Insul. descript.* Nostratibus *Archol & Cork:* nec *Wallis* ignotum, quibus & *Kenkerig* nuncupatur. Est autem hic crustæ cuidam aut licheni similior quam plantæ, nec folia imitatur, ut Musci prædicti, est que pinguior visu, & tactu quam illi, ut monet *Idem Celeberr. Rajus.*

Muscus tubulosus ramosissimus, Fruticuli specie. *Raij Hist. Pl. 113.* Muscus coralloides, s. cornutus montanus. *C B P.* Muscus Corallinus montanus, *Park. Theatr.*

Muscus montanus fruticosior, segmentis majoribus nigris.

Muscus corniculatus, *J B. Tom. 3. 767. Park. Th. Raij. Synops. Stirp. Britan. 13.* àn Muscus terrestris ceranoides major & minor. *C B P. 361.*

Muscus Ceranoides albus fungosus apicibus nigris, *Phytogr. Tab. 205. fig. 6.*

Muscus Coralloides apicibus coccineis *Raij Hist. Pl. 113.* An Muscus terrestris coralloides erectus, cornibus rufescentibus *C B P. ibid.*

Muscus multiformiter pyxidatus, apicibus coccineis, *Dr. Plot. Hist. nat. agri Staffordiens.*

Muscus pyxidatus, *J B. T. 3. 767.* Muscus pyxioides terrestris. *C B P. 361.*

Muscus pyxioides saxatilis, *J B. C B P. & in Prodr. Descript. è corio terreo saxis instrato oritur.*

Muscus terrestris clavatus ceranoides *Mentzelij Pugil. Rarior.* Muscus coralloides Saxatilis Cervi cornua referens. *CBP. 361.*

Muscus terrestris ceranoides villosus. Muscus terrestris coralloides erectus incanus. *C B P.*

Muscus ceranoides fungosus, segmentis latioribus compressis eburneo nitens, *Phytogr. Tab. 47. fig. 2.* àn Fungus ramosus candidissimus ceranoides, s. digitatus minimus, *D. Plot. Hist. Nat. Stafford.*

Muscus clavatus ceranoides Gagateus nigredine splendens, *Phytogr. Tab. 47. fig. 3.*

Muscus terrestris latioribus foliis major, s. vulgaris, *Raij Hist. Pl. 122.* Muscus terrestris & hortensis, *J B. Tom. 3. 764.* Muscus palustris, *Dodon. Edit. Lat. 472.* Muscus terrestris vulgatissimus. *C B P. Park. Th. 1306.* sed perperam.

Muscus palustris terrestri similis, *Raij Hist. Pl. 122.* Hujus habetur Icon cum capitulis, in *Phytogr. Tab. 101. fig. 1.*

Muscus parvus stellaris. *C B P. Phytogr. Tab. 47. fig. 6.* Adianthi capitulis Muscus in Ericetis proveniens, *J B. Tom. 765. Lob. Icon. Part. 2. 243.*

Muscus montanus gracilis ramosus, viticulis longioribus glabris, *Phytogr. Tab. 47. fig. 4.* An Muscus ramosus erectus minor, *C. B. pin. & prodr.* fortè etià Muscus palustris Adiantho aureo affinis, scapis tenuibus, foliolis brevissimis, *Raij Hist. Pl. 124.*

Muscus Alpinus ramosior erectus, flagellis brevioribus, lanuginosus, *Phytogr. Tab. 47.*



- Tab. 47. fig. 5. An Muscus terrestris erectus ramosus major. *C B P. & Prodr.*  
 Muscus montanus, *Tabern. Icon.* 800. Fortè Muscus hirsutus capillaceus, *Meret. Pin.* 81. Fortè etià Muscus terrestris vulgari similis lanuginosus, *Raij Synops.*  
 Muscus aureus capillaris maximus Polytrichum scoparium, *J B. Tom.* 3. 761.  
 Muscus scoparius muscidorum, & udorum *Belgij & Frisæ, Orientalis* sectator, *Lobel. Icon.* 245.  
 Muscus aureus capillaris major. Adiantum aureum majus *Ger.* Polytrichum aureum majus, *C B P.* Polytrichum *Apuleij* & majus quibusdam, *J B. Tom.* 3. 760.  
 Muscus aureus, s. Adianthi majoris genus, foliis tenuissimis reflexis, *D. Doody.*  
 Muscus aureus capillaris medius, Adiantum, s. Polytrichum aureum medium *Raij Synops.* 19.  
 Muscus aureus capillaris medius alter; Adiantum aureum medium, foliis tenuissimis capitulis erectis acutis, *Bobart.* apud *Raij Synops.* append. 237.  
 Muscus trichoides medius capitulis Sphæricis, *Doodei ibid.* 243.  
 Muscus aureus capillaris palustris inter foliola folliculis rotundis (ex sententia *D. Doody*) quadripartitis, *Phytogr. Tab.* 48. fig. 1. Graminifolia palustris repens, vasculis granorum Piperis æmulis, *Raij Cat. Angl.* 153. *Pepper Moss.*  
 Muscus aureus capillaris minor vulgaris Polytrichum aureum minus *C B P.* Polytrichum *Apuleij* minus quorundam, *J B. T.* 3. 760. capsulis unguiculis avicularum similibus.  
 Muscus aureus capillaris minor *Norvegicus*, summo caule ad capitulum Scutigerus ejus exim capitula. Umbrella satis amplæ, elegantis phænicei coloris, Scutum quodammodo referentis medio, (convexâ parte) innituntur, ad *D. Petever*, ex *Norvegiâ* missa est.  
 Muscus aureus capillaris minor capitulis geminatis erectis mutuo incubitu adnatis. Adiantum aureum minus palustre capitulis erectis coronatis, *Sherard.* apud *Raij Synops.* app. 237.  
 Muscus trichoides minor foliis ad caulem convolutis, capitulis subrotundis reflexis *Doodei*, Adiantum aureum minus capitulis rotundis, *Bobarti* apud eund. *App.*  
 Muscus trichoides parvus foliis Musci vulgaris, capitulis longis acutis *Doodei*, ubi suprâ.  
 Muscus aureus capillaris, s. Adiantum aureum minus hirsutum, capitulis longis acutis *Bobarti ibidem.*  
 Muscus trichoides capillaceis foliis capitulis minoribus, *Doodei apud eund App.*  
 Muscus trichoides capitulis longis reflexis ejusd. *ibid.*  
 Muscus trichoides hirsutus, capitulis oblongis reflexis, pediculis brevibus infidentibus, ejusd. *ibidem.*  
 Muscus trichoides minor capitulis longissimis, ejusd. *ibid.*  
 Muscus trichoides humilior capitulis pyriformibus erectis, ejusd. *ibid.*  
 Muscus vulgaris flagellis, tenuibus foliis minimis, ejusd. *ibidem.*  
 Muscus terrestris vulgaris minor Adianthi aurei capitulis, *Raij Hist. Pl.* 122.  
 Muscus ex Cranio, *J B. T.* 3. 764. Muscus ex cranio humano, *Tabern. Icon.* 805. Usnea Chymistarum dicta, & Officinarum nostratium. Hujus pediculi ex sinu foliorum orti sunt.  
 Muscus polytrichoides purpureo argenteus minimus, pilis rigidioribus hirsutus. An Muscus saxatilis sericoides *H. Amst.* 238? Muscus



- Muscus croceus Saxigena holosericum referens, seu Byssus petræus *Raij Synops.* 18.  
 Muscus trichoides pediculis contortis *D. Sherard.*  
 Muscus trichoides parvus, capitulo racemoso nostras. à *D. Dare* primò inventus.  
 Muscus trichoides capitulo apodi, foliis latioribus & angustioribus *D. Doody.*  
 Muscus polytrichoides elatior, foliis angustis pellucidis & ferè membranaceis. *Phytogr. Tab. 44. fig. 7.*  
 Muscus polytrichoides angustifolius, pellucidus, ramosus. *Phytogr. Tab. 49. fig. 1.*  
 Muscus trichoides ramosus foliis longis lucidis, & veluti crispis *Doodei apud Synops. append. 243.*  
 Muscus polytrichoides humilior, foliis latis subrotundis *Phytogr. Tab. 45. fig. 7.*  
*Hic Muscus erigitur foliis alternis.*  
 Muscus Trichomanis facie, foliis utrinque rotundis splendentibus *Jungermann Cat. Altdorf. Raii Synops. 19.* an Muscus muralis platyphyllos *Bobarti.* apud *Synops. Rajan. append. 237.* est planta procumbens. foliis ex adverso sitis. Muscus Trichomanoides supinus nostras elegans.  
 Idem minor. Muscus terrestris minor cauliculis compressis *Doodei in Synops. append.*  
 Muscus Trichomanoides minor, foliolis ad summitatem bifidis. *D. Doody.*  
 Muscus polytrichoides pellucidus ferè, foliis denticulatis, ad margines veluti crispis. *Phytogr. Tab. 98. fig. 8.* Erigitur hic Muscus. An Muscus denticulatus erectus *Virginianus D. Banister.*  
 Muscus denticulatus minor, *C B P.* Muscus terrestris *Lusitanicus J B. Tom. 3. 765. & Anglicus.*  
 Muscus denticulatus major, *C B P.* 368. Muscus terrestris denticulatus *Lob. Icon. part. 2. 243.* Muscus pulcher parvus repens *J B. T. 3. 765.*  
 Muscus denticulatus lucens, Fluviatilis maximus, ad ramulorum apices Adianthi capitulis ornatus. Fontalis minor lucens *J B. T. 3. 778.* Muscus aquaticus terrestri vulgari similis, sed major *Raij Synops. 17.* Fortè Muscus aquaticus folio expanso. *C B. Prodr. 152.* Item Muscus saxatilis repens, comâ sparsâ latiore folio in aquis ejusd. *C B P. 362.*  
 Muscus denticulatus minor *Guianensis*, s. Planta muscosa & plumosa *Guianensis* per-elegans minor *Breyn. Cent. 1. 194. Videa Supple. pa. 401.*  
 Muscus Filicinus elegans s. *Βρύσσηλος Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 100. fig. 3.* Puttenjoory *Hottentottorum.* à *D. Sherard* accepimus.  
 Muscus Filicinus Adianthi aurei capitulis. Muscus filicinus. *J B. T. 3. 764.* Muscus filicinus major *C B P. 360.*  
 Muscus plumosus Cristam referens nostras, colore flavescentè.  
 Muscus Zeylanicus erectus, perpetuo virens, in Arboris proceritatem excrescens. *Phytogr. Tab. 47. fig. 9.* An *Quamiavatl.* s. Spica arboris *Hernandez. Hist. Mex. 258.*  
 Muscus erectus Abietiformis *Raij Hist. Pl. 121.* Muscus terrestris rectus *J B. Tom. 3. 767.* An Muscus Abietis facie *C B P. 360.* Qui tertius in *Prodromo 151.* aut potius Muscus erectus ramosus saturatè viridis ejusd. *C B P. ibid.*  
 Muscus erectus terrestris minor polyspermos *Raij Phytogr. Tab. 47. fig. 7.*  
 Muscus terrestris foliis retro reflexis *J B. Tom. 3.* Lycopodium elatius Abietiforme,



- julo singulari apode *Raij Synops.* 18. Fortè etiam *Lycopodium elatius Juniperinum*, clavis singularibus sine pediculis. *ejusd. Synops.* 16.
- Muscus terrestris repens, clavis singularibus foliosis erectis. *Raij Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 5. An Muscus ramosus repens velut spicatus. *C B. Prodr.* 151.
- Muscus rupestris repens *Virginianus* clavis foliosis erectis quadratis *Banist. Phytogr. Tab.* 100. *fig.* 2.
- Muscus terrestris repens à *Trago* pictus *J B. Tom.* 3. 766. Muscus terrestris repens. s. clavatus. *C B P. Lycopodium Park. Th.*
- Muscus terrestris repens pediculis foliaceis binis clavis in altum se erigentibus. *Phytogr. Tab.* 47. *fig.* 8. Muscus alius terrestris *Lycopodium Dodonæi Hist. Lugd.* 1325. *Qui à præcedenti plurimum differt, quamvis in Pinace suo C. Bauhinus, ab illo non separat. sed planè utrumque confundit. Plicaria & Cingularia Polonis.*
- Muscus clavatus foliis Cupressi *C B P.* 360. Muscus terrestris ramosus pulcher *J B. Tom.* 3. *Sabina sylvestris Tragi, seu Selaginis Plinianæ prima species Thalij Harcyn.* 115.
- Muscus Pelagicus pennatus rubens, ramulis numerosis mollibus, latiùs se spargentibus. *Phytogr. Tab.* 48. *fig.* 2. Muscus marinus rubeus pennatus nostras *Raij Hist. Pl.* 78. Item Muscus marinus purpureus parvus, foliis oblongis Millefolii ferè divisurâ *ejusd. Hist.* 79. An Muscus ruberrimus marinus *Mentzel. Pugil. Rarior.*
- MYAGRUM majus. s. sativum *Morif. Hist.* 2. 315. Myagrûm sativum *C B P.* 109. Myagrûm dictum Camelina *J B. Tom.* 2. 892.
- Myagrûm quartum s. sylvestre alterum *C B. Phytopin.* 173. Pseudo-Myagrûm, quod Myagrûm *Turcicum* ab Hortulanis appellatur *Camer. in epit. Mntth. pag.* 902. Myagrûm *Turcicum J B. Tom.* 2. 893.
- Myagrûm monospermum minus *C B P. Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 1. Myagro similis flore albo. *J B. Tom.* 2. 893.
- Myagrûm humile fruticosum, Rosa *Hierico* dictum. Myagrûm *Arabicum Zanoni. Hist. Bat.* 138. *Thlaspi Rosa de Hierico dictum Morif. Hist.* 2. 328. Rosa *Hierichontea* vulgò dicta *C B P.* 484. Rosa *Hiericho J B. Tom.* 2. 209.
- Idem minus. Rosa *Hierichontea sylvestris C B P. ibid.* Rosæ *Hiericonthis* sylvestris species *Rauwolf. Camer. Hort. Medic.* 147.
- MYOSOTIS foliis subrotundis, Herba *Indiæ Orientalis Phytogr. Tab.* 205. *fig.* 7.
- Myosotis Scorpioides hirsuta. *Park. Th.* Echium Scorpioides arvense *C B P.* 254. Scorpioides Solisequum flore minore *J B. Tom.* 3. 589. Anchusa Scorpioides hirsuta arvensis. *H. Leyd.* 38. Lithospermum arvense minus *Elem. Botan.* 113.
- Myosotis Scorpioides minor, flosculis luteis, *Park. Th.* Echium Scorpioides minus, flosculis luteis *C B P.* 254. An Chamæpitys folio non laciniato *J B. Tom.* 3. *lib.* 28. 297?
- MYRRHIS annua semine striato aspero brevi *Morif. Umb.* 44. Myrrhis sylvestris, seminibus asperis *C B P.* 160. Myrrhis sylvestris nova *Æquicolum Colum. Ecphr.* 110. Cicutariæ quodammodò similis, vel Chærephylo accedens. *J B. T. 3. l.* 27. 181.



*Myrrhis annua* semine rostrato striato aspero oblongo, nodosa *Morif. Phytogr. Tab.* 100. fig. 4. *Myrrhis sylv. Cretica* nodosa seminibus asperis *Raij Hist. Pl.* 432. *Seseli Crètense* nodosum *Park. Th.* 907.

*Myrrhis annua* semine striato lævi, tuberosa nodosa coniophyllon. *Morif. Umb.* 44. & 67. *Myrrhis Cicutaria Tabern. Phytogr. Tab.* 206. fig. 2. *Cicutaria bulbosa* *C B P.* 161. *Cicutaria odorata* bulbosa. *J B. Tom.* 3. 183. *Bulbocastanum* coniophyllon *Camerar. Hort. Med.* 31. *Cicutaria Pannonica* subhirsuta, caule nodoso *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 23. *Cicutaria Pannonia* *Clus. Hist.* 2. 200.

*Myrrhis perennis alba minor*, foliis hirsutis, semine striato aureo *Morif. Umb.* 44. & 66.

*Myrrhis perennis alba hirsutior*, cujus folia sunt tenuius dissecta. *Morif. Præ lud.* 289.

*Myrrhis perennis lutea* *Daucoides*, *Morif. Umb. & Præ lud. Phytogr. Tab.* 100. fig. 5.

*Myrrhis aquatica. s. palustris latifolia alba.* *Cicutaria latifolia hirsuta* *J B. Tom.* 3. 1. 27. 182. *Cicutaria palustris latifolia alba.* *C B P.* 161.

**M Y R T U S** communis *Italica* *C B P.* 468. Item *Myrtus sylvestris* foliis acutissimis *ejusd.* 469. *Myrtus Boetica sylvestris* *Park. Th.* 1454. *Myrtus vulgaris nigra & alba*, sylvestris & sativa. *J B. Tom.* 1. 510.

*Myrtus latifolia Belgica* *C B P.* 469. *Myrtus latifolia Belgica*, fortè *Romana* *J B. Tom.* 1. 512. *Myrtus latifolia vulgaris.* *Park. Th.* 1452.

*Myrtum flore pleno.* *Raij Hist. Pl.* 1503. *Myrtus flore pleno* *Cornuti de Pl. Canad.* 203.

*Myrtus Boetica latifolia domestica* *Clus. Hist.* 65. *J B. T.* 1. 511. *Myrtus latifolia Boetica 1a.* vel foliis *Laurinis* *C B P.* 469. *Myrtus latifolia maxima.* *Park. Th.* 1452.

*Eadem apicibus aureis.*

*Myrtus Aurantiæ* foliis dense stipatis. *Myrtus Boetica latifolia exotica* *Clus. Hist.* 65.

*Myrtus latifolia Boetica 2a.* vel foliis latis confertim nascentibus *C B P.* 469.

*Myrti Boeticæ latifoliæ* secundum genus *J B. Tom.* 1.

*Myrtus* foliis odore *Nucis Moschatæ*, cauliculis rubentibus, vulgò odore *Citri* *Schuyl. D. Herman. H. Leyd.* 434.

*Myrtus Zeylanica* odoratissima, baccis niveis monococcis; *Maranda Zeylanensibus* *H. Leyd. ibid.* *Ligustrum Ceylanicum* arborescens, *Myrti Laureæ* foliis. *Breyn. Prodr.* 75.

*Myrtus alba sylvestris Americana. s. Cambuy* 3<sup>a</sup>. *Species Pison.* 178.

*Myrtus Balsamica* folio *Mali Granatæ*, *H. Leyd. ibid.*

*Myrtus minor vulgaris* *C B P.* 469. *Myrtus Tarentina* *J B. T.* 1. 512. *Myrtus min. acuto fol.* *Park. Th.* *Myrtus tenuifolia Belgica* vulgò.

*Eadem foliis ex luteo variegatis.* *H. Leyd.* 434. variat etiam foliis argentatis.

*Myrtus minor rotundiore folio* *Park. Th.* 1454. *Myrtus foliis Buxi* *Schuyl. H. Leyd.* 49.

*Eadem platycaulos* foliis confertis summis ramis multiscissis. s. in plurimos ramulos divaricatis. àn *Myrtus foliis Buxi contortis* *H. Leyd.* 434. *The Palm-Myrtle* nostratibus dicta.



Myrtus foliis minimis & mucronatis *CBP.* Myrtus angustifolia minor *J.B.* ex mente *Hermanni.* An Myrtus domestica fructu albo *ejusd. J.B.* ut *Raio* videtur. *Hist. Pl.* 1503. Myrtus Rorismarini foliis *Florent. Schuyl. H. Leyd.* 49. Eadem foliis ex argenteo pictis.

MYRTUS *Brabantica s. Ælæagnus Cordi Gerard.* Rhus sylvestris s. Myrtus *Brabantica* vel *Anglica Park. Th.* 1452. Rhus Myrtifolia *Belgica CBP.* 414. Gale frutex odoratus *Septentrionalium Ælæagnus Cordo, Chamæleagnus Dodonæi J.B. T. 1. l. 8.* 225.

Myrtus *Brabanticæ accedens Africana* conifera *Phytogr. Tab.* 48. fig. 8. Arbor conifera odorata foliis Salicis rigidis levitèr serratis *Raij Hist. Pl.* 1800. Laurus serrata odora *Prom. Bon. Spei. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.* 333. ex *Americâ* quoque nobis allata est, & à nostratibus *Bermudensem* Insulam degentibus, *Laurus odora* vulgo nominatur, ut ab honestissimo viro *Jacobo Harloe* didicimus.

Eadem foliorum crenis crebrioribus, minùs odorata. An Laurus *Africana* serratis fol. *Bartholin. Act. Medic. Anni* 1673. *Obs.* 24. *Ælæagnus Virginiana* major *Banisteri?*

Myrtus *Brabanticæ* similis *Caroliniensis* baccata, fructu racemoso sessili monopyreno. *Phytogr. Tab.* 48. fig. 9. Fructum fert veluti Saccharo candidissimo incrustatum. Fortè *Ambulon Scaligeri Exercit.* 181. S. 24. de quâ itâ scribit. *Aruchet* Insula fert Arborem, cujus è Cortice exit fructus candidus, Saccharati specie & magnitudine *Coriandri*, *Ambulon* ei nomen est. *Ambulon arbor. J.B. Tom. 1.* 503. ex hujus baccis *Candelæ Viridiusculæ, tactæ manum non polluentes, extinctæque fætorem non emittentes à nostratibus parantur. Inde Candle-berry (i.e.)* *Lychnochrodryophoros ibi nuncupatur: Fortè Candle-wood & Candle-Tree* *Ogilv. Americ.* 348. Hujus pulchri sanè & perrari Arboris *Americani* generis, munificentia Illustris Viri *D. Gulielmi Cortene.* Compos factus sum. Cujus ramulus cum fructu ut per Microscopium apparuit eidem *Tabulæ* adpingitur.

Myrtus *Brabanticæ* affinis *Americana* foliorum laciniis *Asplenii* modo divisis, julifera simul & fructum ferens *Phytogr. Tab.* 100. fig. 6. *Cardiaca* (fortè) *Mulleriana Indica. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.* 320. Hujus semina singularia capsulis bivalvibus globum echinatum efformantibus includuntur. Orbiculis saltèm *Stellatis* stipiti adnatis, Huic nostræ quodammodo convenit *Holquahuil s. Arbor Chilli Mexicensibus Hernand. apud Recc. lib. 3. cap. 10.*

Eadem cum ramulo conis s. nucamentis onusto. *Phytogr. Tab.* 100. fig. 7.

## N.



AGAM *H. Malab. Part. 6. Tab.* 21. Siliquosa flore umbellato pentapetalo, siliquis digitalibus spadiceis monospermis ad unum florem pluribus *Raij Hist. Pl.* 1753. At (meo quidem arbitrato) malè ponitur intèr Siliquosas. An potius *Amygdalus amara* fructu aggregato, cujus ossiculum materiâ crassâ & fungosâ cum nucleo occultatur. *Coembura Ceylanensibus & aliquandò Samandra* vocitatur.

NARDUS



**NARDUS** *Americana* procerior foliis coevis *Phytogr. Tab. 101. fig. 2.* an *Valeriana Atriplicis folio Virginiana D. Banist. Cat. Mss. nond. edit. Quæ vulneraria est è præcipuis.* Huic proximè cognata est *Teripeti* vel *Tzipalitziti Nov. Hispan. Ant. Recc. 412.*

**NASTURTIIUM** aquaticum vulgare *Park. Th. Nasturtium aquaticum superum CBP. 104. Sisymbrium Cardamine s. Nasturtium aquaticum JB. Tom. 2. 884.*

*Nasturtium aquaticum foliis minoribus præcocius. Raij Synops. Stirp. Britan. 115.*

*Nasturtium aquaticum amarum. Park. Th. Nasturtium aquaticum majus, & amarum. CBP. Sisymbrium Cardamine, s. Nasturtium aquaticum flore majore elatius JB. T. 2. 885.*

*Nasturtium pratense majus, s. Cardamine latifolia Park. Th. Nasturtium pratense magno flore CBP. Iberis Fuschii s. Nasturtium pratense JB. Tom. 2. 889. Variat etiam flore multiplici.*

*Nasturtium pratense parvo flore. CBP. 104. Nasturtium pratense flosculis minimis Moris. Præhud. Botan. 290. Cardamine minor laciniatis foliis. Park. Th.*

*Nasturtium Bursæ pastoriæ folio Virginianum, flore albo siliquâ compressâ Phytogr. Tab. 101. fig. 4. Nasturtium insipidum Dentis Leonis folio minore. Banist. Cat. Stirp. Virg. in Hortulo verè Urbano D. Doody primò Observavimus. An Nasturtium Alpinum minus, foliis in Orbem sparsis CBP. 104. Cardamine Alpina media Clusio. Park. Th. An fortè Cardamine insipida Column. Ecphr. part. 2. 69.*

*Nasturtium Cardamine dictum impatiens. Sium minimum Noli me tangere dictum s. Impatiens Nasturtii sylvestris folio Park. Th. Sium minimum Pr. Alp. exot. 331. Sisymbrii Cardamines species quædam insipida JB. Tom. 2. 886.*

*Nasturtium Impatiens Cardamine altera hirsutior dictum Raio Hist. Pl. 815. Sisymbrium Cardamine hirsutum minus, flore albo. JB. Tom. 2. Nasturtium aquaticum minus. CBP.*

*Nasturtium Alpinum Bellidis folio minus CBP. 105. Sinapi pumilum Alpinum folio Bellidis Clusio JB. Raij Hist. Pl. 817. Plantula Cardamines alterius æmula Clus. Hist. Poster. 129. Park. Th. An Brassica Sylvestris minor, s. Turritis supina, folio Bellidis Moris.*

*Nasturtium petræum Cambro-britannicum Johnsoni Merc. Bot. part. ult. Phytogr. Tab. 101. fig. 3. Passim in excelsis rupibus Arvonie & Merviniæ (v. g.) Moelyn rhudh juxta Phestiniog y Clogwyn du y yr' Ardhu & Clogwyn y Garnedd prope Lhandberys invenit Plantarum Britannicarum sagacissimus Investigator D. Lwyde.*

*Nasturtium Impatiens luteum siliquis curtis Virginianum. Fortè Raphani aquatici species Banisteri. Cat. Stirp. Virgin. an Nasturtium montanum luteum CBP. 104. Sium alterum aquaticum luteum, vel Cardamine tenuifolium montanum Fab. Column.*

*Nasturtium montanum Asari folio Boccon. de Pl. Sicul. Tab. 3. Sisembro Alpino palustre rotundo foglio. Zanon. fig. 72.*

*Nasturtium Alpinum trifolium CBP. 104. Iberidi Fuschii affinis trifolia Cardamine JB. Tom. 2. 800.*

Nasturtium



*Nasturtium Africanum* floribus albis spicatis, & foliis ternis Christophorianæ facie  
P B P. *Phytogr. Tab.* 101. *fig.* 5. in *Hort. Reg. Hampton.* collegimus.

NASTURTIIUM vulgare s. tenuiter divisum *Morif. Hist.* 2. 300. *Nasturtium hortense* vulgatum C B P.

*Nasturtium latifolium Dioscorideum Joh. Bauhino* J B. *T.* 2. 913. *Nasturtium hortense latifolium* C B P. 103.

*Nasturtium crispum Joh. Bauhini* J B. *ibid.* *Nasturtium hortens. crispum latifol.*  
C B P. 104.

*Nasturtium Alpinum capsulâ Nasturtii hortensis* C B P. 105. *Nasturtium Alpinum capsulis Nasturtii vulgaris* *Johan. Bauhini.* J B. *Tom.* 2. 318.

*Nasturtium sylvestre Olyridis folio* C B P. 105. *Thlaspi angustifol.* *Fuchsi,* *Nasturtium sylvestre* J. B. *Tom.* 2. 914.

• *Nasturtium petræum annuum nostras,* an potius *Thlaspeôs* genus circâ *Bristoliam*  
*Phytogr. Tab.* 206. *fig.* 4. Fortè *Thlaspi montan. minimum Monspeliensium* folio laciniato J B. *Tom.* 2. 929.

*Nasturtium petræum foliis Bursæ pastoris.* C B P. 105. *Nasturtium petræum* *Tabern. Icon.* 451.

*Nasturtium minus alatis foliis nostras,* *Bursa pastoris minor foliis incisis & Thalii*  
C B P. 108. *Bursa pastoris parva,* folio glabro spisso J B. *Tom.* 2. 137. *Bursa pastoris minor foliis alatis costæ mediæ è regione adhærentibus,* uno impari extremum claudente *Morif. Hist.* 2. 305. *Pastoria bursa minima* *Lob. Icon.* 221.

*Nasturtiolum Alpinum tenuissimè divisum* J B. *Phytogr. Tab.* 204. *fig.* 5. C B P. 105.  
*Raij. Hist. Pl.* 826. Item *Nasturtiolum Alpinum folio alato ejusd.* *Raij. ibid.*  
*Cardamine Alpina tertia minima* *Clus. Hist.* 2. 128. *Thlaspi montanum Dalechamp. Hist. Lugd.* 1180.

*Nasturtium minimum Vernum,* foliis tantùm circâ radicem *Botan. Monspel.* 187.

*Nasturtium pumilum Vernum* C B P. 105. *Cardamine pusilla saxatilis, montana*  
*διποειδής. Column. ecphr.* 274.

*Nasturtium puwilum supinum Vernum* *Botan. Monspel.* 185.

*Nasturtium Alpinum minus Resedæ foliis* C B P. *Cardamine Alpina minor Resedæ foliis* *Park. Th.*

*Nasturtium sylvestre Erucae affine* C B P. *Nasturtium sylvestre* *Valentinum* *Clusio*  
J B. *T.* 2. 920.

*Nasturtio affinis monospermus capsulâ verrucosâ.* *Coronopus Ruellij* s. *Nasturtium verrucosum* J B. *Tom.* 2. 919. *Ambrosia campestris repens.* C B P. 138. *Nasturtium sylvestre capsulis cristatis* *Elem. Bot. Tom.* 1. 183.

NATI-SCHAMBU *H. Malab. part.* 1. *fig.* 18. *Jambos sylvatica fructu Cerasi* magnitudine; *Walgambu Cingalensium* *Hermann D. Seyn. Not. in Loc.*

NERIUM *Indicum angustifol.* floribus odoratis simplicibus. *H. Leyd.* 447. *Nerium Indicum angustifolium,* flore incarnato odorato simplici P B P. 356. *Fulmistica.* *Flos Mysticarum* vulgò. Fortè *Arbor violarum Indica* ex *Garcia* J B. *Tom.* 1. l. 1. 107. *Belutta Areli.* *H. Malab. part.* 9. *Tab.* 2.

*Nerium Indicum* flore rubescente pleno *Breyn. Prodr.* 2. 76. *Nerium Indicum latifolium*



- folium flore rubro & aliquando variegato odorato pleno. *H. Beaum.* 31. Tſiovan na-Areli *H. Malab. part. 9. Tab. 1.*
- Nerium Indicum* folio nonnihil mucronato *P B P.* 357. An Arbor *Indica* Nerii foliis splendentibus *Belgarum.*
- Nerium* (fortè) *Sirinamense*, sanguineis foliorum venis, & foliis *Cinamomi Parkinsoni* æmulis. An *Nerium Americanum* *Johnst. Dendrolog.* 389. *Quauhtlepatles* s. Arbor ignea *Hernandez.* 67. Arbor (fortè) Balsamifera nostra, àn *Nerio* affinis *Malabarica* summo folio mucronato? *Phytogr. Tab.* 269. *fig. 4.* Hâc Arbore haud prorsus abluere videtur.
- Nerium Americanum* maximum folio obtuso *P B P. Phytogr. Tab.* 207. *fig. 1.* An *Nerium Americanum* lactescens, longissimo folio, flore albo odoratissimo *H. Beaum.* 31.
- Nerio* affinis angustifolia lactescens, flore luteo *Americana* *Phytogr. Tab.* 207. *fig. 3.* *Yccotli* (fortè) *Novæ Hispaniæ Terentii.* apud *Recc. fol.* 443.
- NIARÆ* *H. Malab. Part. 5. Tab.* 27. similis è *Maderaspatan*; Arbor exotica *Ceratiæ* foliis corymbosa *Phytogr. Tab.* 49. *fig. 2.*
- NICOTIANA* major latifolia *CBP.* 169. *Nicotiana* major s. *Tabacum majus* *J B. T.* 3. 629. *Quauhilt Novæ Hisp. Terent.* apud *Recc.* 403.
- Nicotiana* major angustifolia *CBP.* 170. *Nicotian.* s. *Tabac.* angustiore folio *J B. T.* 3. 630.
- Nicotiana* minor & *Eysletens.* *CBP.* 170. *Priapeia* quibusdam *Nicotiana* minor *J B. ibid.* *Nicotiana* latifol. s. folio subrotundo minor, capsula rotundâ *Priapi* formâ, floribus luteis minoribus, foliis obscure virentibus glutinosis *Moris. Hist.* 2. 492. *Tobacco Anglicum* *Park. Th.* *Picielt* s. *Tabacum Hernand. Hist. Mex.* 173.
- NIGELLA* arvensis cornuta *CBP.* 145. *Melanthium sylvestre.* s. arvense *J B. Tom.* 3. 205.
- Nigella* latifolia flore majore simplici cæruleo *CBP.* *Nigella Hispanica* flore simplici *Park. Parad.* *Nigella Hispanica* flore amplo. *Ger. emac.*
- Nigella* angustifolia flore majore simplici cæruleo *CBP.* 145. *Melanthium* capite & flore majore *J B. Tom.* 3. 207. *variat etiam flore pleno.*
- Nigella* flore minore simplici candido *CBP.* *Melanthium* calyce & flore minore, semine nigro & luteo *J B. T.* 3. 208. *Nigella Romana* s. sativa *Park. Variat flore pleno.*
- Nigella Cretica* *CBP.* 146. *Melanthium* simplici flore *Creticum* *Clus. Hist.* *Nigella Cretica* in odore semine *Park.*
- Nigella Cretica* latifolia odorata *Park. Ponæ. Ital.* *Nigella alba* simplici flore *Prosp. Alpin. exot.* 261.
- Nigella Cretica* altera odorata tenuifolia *Park.* *Nigella Cretica* folio *Fœniculi* *CBP.* 146.
- NIL.* s. Anil sylvestre *Cynanchicæ* foliis *Bisnagarica* *Phytogr. Tab.* 101. *fig. 6.*
- NINZIN* s. *Zingin* & *Ginseng* radix genuina *Ind. Orient. Phytogr. Tab.* 101. *fig. 7.*  
Apud



Apud *Miscellan. Curios. German. decur. 2. Ann. 51. pag. 73.* sub hujus titulo plurimas Icones videsis inter quas *Ginseng. Cleyeri Japoniensis Terræ* alumna huic nostræ quam maximè accedit; Quàm *Ninzin Bontij* ab hac nostrâ plurimùm differt. Hujus radicem munere Amicissimi Viri *D. Gidley* accepimus, frondium effigiem ope & favore Cl. Viri *Dris Tancredi Robinson*, de hujus viribus vid. *Martin. Atl. Sinens. fol. 35.* Hujus insignis Plantæ accuratam delineationem *D. Philibertus Vernatti ex Indiâ Orientali* ad *Reg. Societ. Londinens.* pro Musæo suo instruendo dudùm transmisit.

**NIR-SCHULLI** *Hort. Malabaric.* accedens è *Cormandel*; *Gratiolæ* affinis *Ind. Or.* *Digitalis æmula* *Phytogr. Tab. 49. fig. 3.*

**NOEL-VALLI** *H. Malab. Part. 6. Tab. 22.* Frutex alatus filiquosus *Orchidis* floribus aliquatentis accedens, filiquâ isthmis distinctâ è *Maderaspatan.*

**NUMMULARIA** major rigidioribus & rariùs crenatis foliis, flore purpureo gemello. *Nummularia Norvegica* flore purpureo *Barthol. Act. Med. Anni 1673. Obs. 130.*

**NUX** *Juglans* *J. B. Tom. 1. 241.* *Nux Juglans vulgaris* *Park. Th. 1413.* *Nux Juglans s. Regia vulgaris* *CBP. 417.*

*Nux Juglans* fructu maximo *CBP.* *Nuces caballinæ* *Hist. Lugd. 320.* *Nostrates* *The French Walnut (i. e.) Juglandem Gallicam* vocant.

*Nux Juglans* folio serrato *CBP.* *Juglandis* genus alterum, teneriore & longiore *Clus. Hist.*

*Nux Juglans pyramidalis* s. fructu quasi in conum attenuato. à *Dre. Woodward* habuimus.

*Nux Juglans Virginiana* foliis vulgari similis, fructu subrotundo, cortice duriore lævi. *Nux Juglans alba Virginienfis* *Park. Th. 1414.* *Hæc est illa Nux quam nostrates vocant. The Pickery seu Pick-Pickery Nut;* Cujus nucleis lac conficiunt *Indi* quod vocant *Pickery milk.* *Non ex majoribus illis ut vult Casp. Bauhinus* ubi suprâ. Ex similitudine quam habet cum suo lacte *Juglandium*, *Indi* lac nostrum *Pickery* vocant, ut ab Insigni Botanico *D. Banistero, Celeberr. Raius* observatum reliquit.

• *Nux Juglans Virginiana* alba minor, fructu *Nucis moschatae* simili, cortice glabro, summo fastigio veluti in aculeum producto. *Phytogr. Tab. 309. fig. 2. a.* ad litteram *b. ejusd. Tab.* Hujus *Nucis* pictura ubi media pars exteriori putamine viridi tecta est exprimitur. An *Nux Juglans Americana* minor *PBP. 357.*

• *Nux Juglans Virginiana* alba, fructu parvo anguloso, cortice lævi. *Phytogr. Tab. 309. fig. 2. c.*

• *Nux Juglans* angulosa major, *Americana* fructu longiore, cortice albo lævi, summo vertice mucronato. *Phytog. 309. fig. 2.* Ubi hujus Arboris ramulus habetur, & ad lit. *d.* Fructus. An *Juglans* angulosa *Grevio Mus. Reg. Soc. Lond. Raij Hist. Pl. 1837.* *The edged Walnut. Nucleus valdè amarus est,* Patriam suam *Novam Angliam* agnoscit.

*Nux Juglans Virginiana* major, fructu rotundo, cortice crasso sulcato, tuberculis exasperato nigro. Fortè Fructus *Indicus* rotundus tuberculis exasperatus niger  
J. B.



- J. B. T. 1. 329. Nux Juglans nigra Virginienſis Park. Th. 1414. Nux Juglans Virginiana nigra H. Leyd. 452. ubi & Icon habetur. Huc etiam fortè ſpectat Nux Indica teſſellata perelegans J. B. Tom. 1. 400.*
- Nux Juglans Virginiana nigra, nucamentis cremoſynis, oblongo fructu, cortice duriore ſcabro. The Crimson or Scarlet Walnut noſtratibus dicta.*
- Nux Zeylanica Juglandis folio. P B P. 357.*
- Nux Juglandis folio minor ex Veracrucis Hort. Reg. Hampton. Phytogr. Tab. 246. fig. 5. Fortè Nux Juglandis folio Curaffavica foliis minoribus P B P. ibid.*
- Nux Bengalenſis Juglandi folia, fructu Orbiculari. Nux oleoſa Dhumba Zeylonenſibus dicta. Hujus Arboris ramulus cum fructu ex Inſula Barbadeſi nobis aliquando allatus eſt, Folia ſunt venuſtè venoſa, Iſtius Arboris quæ 3<sup>a</sup> inter Anonas (per conjecturam) in Phytogr. Tab. 135. exhibetur, valdè ſimilia, & fortè Arbor eadem eſt, Barbadeſibus noſtratibus Redwood (i. e.) Erythroxylum nuncupatur.*
- Nux Moſchata fructu rotundo. C B P. Phytogr. Tab. 209. fig. 1. Nux aromatica ſœmina J. B. Tom. 1. Nux Myriſtica Matthiol. Hujus fructus cortice denſo, ut in Juglandibus tegitur, cui alter tenuior reticulatus, rubescens ſubeſt, qui Macis dicitur.*
- Nux Myriſtica ſpuria s. Panem-palka H. Malab. Part. 4. Tab. 5. Nux Indica oblonga intrinſecus ſimilis Nuci Moſchatae J. B. Tom. 1. 399. Avellanæ Indicae genus oblongum Cluſ. exot. Arecae s. Avellanæ Indicae verſicoloris genus oblongum Park. Th. Palma cujus fructus oblongus Fauſel ſimilis C B P. malè autem Palmam vocat ut rectè animadvertit Cl. Raius Hiſt. Pl. 1524.*
- Nux Myriſtica ſylveſtris Ind. Orientalis fructu oblongo; An Cumine nuci ſimilis cinerei coloris J. B. Tom. 1. 334.*
- Nux Americana coſtâ foliorum appendicibus auſtâ. Phytogr. Tab. 207. fig. 4. Nux Americana foliis alatis bifidis; Knippa P B P. Hort. Beaum 31. Tackboom Belgarum. Fortè de Ingarum genere Braſilienſium Marcgr. & Piſonis.*
- Nux Portoricensis ampliſſimis foliis venoſis & lacte virentibus. Phytogr. Tab. 208. fig. 2. fortè Poerinfii H. Malab. Part. 4. Tab. 19. Saponaria Arbor Nuciprunifera tricoccus, Indiae Orientalis. Prunifera fructu racemoſo parvo, nucleo ſaponario Raij Hiſt. Pl. 1548.*
- Nucifraga s. Nux Ind. Orient. Arbuti fructus ſimilitudine. An fructus Frago ſimilis C B P. 466. Garnitre fructus parvus & ſubtilis Fragi ſimilitudine, qui globulorum vicem ſupplet. Linſchot. Part. 3. Ind. Or. 21. Fortè Jequitinguacu Laetii Ind. Occid. lib. 15. cap. 9. Arbor enim hæc eſt quæ Fructum fert Fragis ſimiles, quibus ſeminis loco continetur duriffima faba orbicularis nigra, & inſtar Thracii lapidis reſplendens amariffima; Cortice ſupplet egregiè vicem Saponis vid. Johnſt. Dendrolog. 66. Huic haud multum abſimilis eſt fructus Pongæ H. Malab. Part. 4. Tab. 35. (i. e.) Jaca minor ſylveſtris Malabarica Commel. in Not. quoad Iconem; Descriptione tamèn (plurimis ſeminibus) diſcrepat.*
- Eadem Indiae Orientalis fructu minore ſuſco.*
- Nuciprunifera arbor Americana, fructu ſaponario orbiculato monococco nigro Phytogr. Tab. 217. fig. 7. Quity Braſilienſ. Piſonis. Noces Saponariae non edules C B P. Saponariae Sphærulae arbor Filicifolia. J. B. Tom. 1. Fortè Nebo Arabum & Conar.*



- Persarum Ogilv. Asiæ. Part. 1. Arbor Mistecæ Provinciæ fructu Avellanæ simili Ovied. Hist. Amer. lib. 9. Monard. Simpl. Medic. cap. 65. Clus. exot. lib. 2. cap. 16. fruct. 16. J B. T. 1. lib. 3. cap. 53. de Laet. lib. 5. cap. 21. Johnst. Dendrolog. 114. Charapu arbor Mechuacanensis Nieremberg. Hist. nat. exot. lib. 15. cap. 94. Eadem fructu minore fusco, ex Insulâ Jamaicensi. An. Nux purgatrix similis Sphæ-  
rulæ Saponariæ fusca J B. T. 1. l. 3. cap. 52. de hac Clus. exot. lib. 2. cap. 16. Nux Zeylanica folio multifido digitato, flore merdam olente, Telabo Zeylanensium P B P. Phytogr. Tab. 208. fig. 3. Officulum sulcatum Fructus peregrini J B. Tom. 1. lib. 3. cap. 86. & 88. itidem Tom. 2. lib. 17. fol. 262. Hujus est Arboris fructus. An Maratatabiba Brasiliensibus Martgr. lib. 3. fol. 132. Matuni arbor in Sofala quæ stercus humanum adeò olet, ut vix ferri possit, undè ipsi nomen *Purches. Navigat.* à Telabo nostrâ, diversam putamus. Hujus autem ligni frustulum in Musæo Corteniano ab Americis oris allatum, dudum nos conspeximus. Habetur & in Indiâ Orientali.*
- Nux Malabarica sulcata mucilaginosâ fabacea D. Seyn. Notis in *H. Malab. Part. 1. Telabo Cingalensibus* ab illo perperam putata. Cavalam *Hort. Malab. Part. 1. fig. 49.* Arbor siliquosa Malabarica plurimis ad singulos flores lobis *Raij Hist. Pl. 1754.*
- Nuci-capsularis Arbor *Ind. Orient.* Baruce (fortè) fructus è pluribus nucibus, arboris Huræ J B. Tom. 1. 333. *Clus. exot. lib. 2. cap. 21.*
- Nux Vesicaria oleosa foliis umbilicatis ex Insulâ *Barbadensi Phytogr. Tab. 208. fig. 1.* Nux Zeylanica umbilicatis foliis *H. Beaumont.* Arbuscula exotica foliis umbilicatis nuculam nuculæ *Indicæ* sonoræ *J. Bauhini* similem ferens *Breyn. Prodr. 2.* Fructus pyriformis fuscus lævis striatus cum coronulâ in quo nucleus J B. Tom. 1. 317. qui idem est cum Nuculâ *Indicâ* globosâ sonora ejusd. *J. Bauhini ibidem.* Althæa arborea *Indica* folio umbilico rubente P B P. 307. *variat folio umbilico pallente. Jack in a Box nostratibus dicta. Variat etiam putamine externo striato punctato, & striato non punctato.*
- Nuci pomifera Arbor *Orientalis* Castanæ equinæ foliis, fructu longo corticoso crasso, tetragono, summo apice (Pomi in modum) umbilicato, nucleum nudum angulosum includente. Sieria Samstravadi *H. Malab. Part. 4. Tab. 7.* Jambos sylvestris Samstravadi dictus alter *Raij Hist. Pl. 1480.*
- NYMPHÆA lutea major C B P. 193. Nymphæa lutea J B. Tom. 3. 771. Nephthar luteum *Brunfelsii. Simpl. Pharmacor. Tom. 1. 38.*
- Nymphæa minor lutea J B. T. 3. 772. Nymphæa lutea minor parvo flore C B P. 194.
- Nymphæa lutea minor flore fimbriato C B P. J B. Tom. 3. 772.
- Eadem foliis purpureis maculis eleganter notatis.
- Nymphæa *Indica* minima flore flavo, Tsjeroca-citambel *H. Malab. Part. 11. Tab. 29. Quæ per incuriam Tabulæ 41. adponitur.*
- Nymphæa *Indica* minor, floribus cum petiolis ex foliorum pediculis prorumpentibus *Phytogr. Tab. 209. fig. 2.*
- Nymphæa alba J B. Tom. 3. Nymphæa alba major C B P. Aguapé *Brasiliensium Pison. 219.*



- Nymphæa Indica* foliis amplis, elegantè ad ambitum crenatis, subtùs fulvâ lanugine tectis, flore albo simplici, è *Maderaspatan*.
- Nymphæa Indica* crenata, flore pleno candido. Ambel. *H. Malab. Part. 11. Tab. 26.* Lotus *Nilotica Theophrasti lib. 4. de Hist. Pl. cap. 10.* Lotus *Ægyptia Prosp. Alpini. exot. 213.* *Nymphæa s. Nufar. Ægyptium Vesling. Observat. in Alpin. 42.*
- Nymphæa alba minor* *J B. Tom. 3. 778. C B P. 193.*
- Nymphæa Indica* minor longiorè folio, flore albo simplici è *Maderaspatan*.
- Nymphæa Indica* subrotundo folio minor, flore albo fimbriato. Nedel-ambel *H. Malab. Part. 11. Tab. 28.*
- Nymphæa alba minima* *C B P.* *Nymphæa minor s. Morsus Ranæ J B. Tom. 3. 773.*
- Nymphæa alba minima s. Morsus Ranæ* flore pleno odorato. *Cat. Cantabrig. 101.*
- Nymphæa minima Maderaspatana* foliis alas Papilionum referentibus. *Phytogr. Tab. 207. fig. 7.* Hùc fortè spectat Haij-alem-el-maovi (*i. e.*) Sempervivum aquaticum *Pr. Alpin. & Statiotes Ægyptia Dioscoridis Vesling. Not. in Alpin. de Pl. Ægypt. 44.*
- Nymphæa glandifera Indiæ* paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis spinosis flore roseo purpureo. *Nymphæa Maderaspatana Nasturtii Indici* scutato folio solidiori venis atris, pediculo spinulis asperato. *Phytog. Tab. 207. fig. 5.*
- Nymphæa* flore suave purpurascente *Japonica Breyn. Prodr. 2. 77.* *Nymphæa glandifera Batavica Favorum Justii Heurnii (i. e.) Faba Ægyptia Bod. à Stapel. Not. in Theophr. lib. 4. 445.* Colocasia vera s. Faba *Dioscoridis & Theophrasti* cujus radix Colocasia dicebatur *Park. Th. Colocasia Ægyptia vera Nicandri. Tamara H. Malab. Part. 11. Tab. 30.* Lien *Sinarum Lusitanis Fula de Golfon Ogilv. Chin. Tom. 2. 681.* flore purpureo.
- Idem flore albo inter *Delineationes nostras.* Lien *Sinensium* flore albo *Ogilv. ibid.* Bem-Tamara *H. Malab. Part. 11. Tab. 31.* *Nymphææ affinis Malabarica* folio & flore amplo colore candido *Commel. in Notis.* *Nymphæa Indica maxima PBP.* Nelumbo *Zeylanensibus* dicta. *Vide Suppl. Pa. 401.*
- Nymphæa glandifera Virginiana* lactescens, minori umbilicato folio, pediculo leni, flore amplo luteo pallecente. Fortè *Atatapalacatl Mexicensibus* seu Testa aquis imposita *Nierembergii lib. 14. 307.* Lien flore luteo in *Funcheusu Sinarum* regione peculiaris *Ogilv. ibid.*
- Nymphææ* congener *Alpina Anapodophyllon Canadense Morini.* Papaveri affinis montana *Aconitifolia, Ranunculi nemorensis radice. H. Leyd. 476.* Aconitum humile bifolium, s. *Aconitifolia* flore albo unico *Leucoidii* campanulato, fructu *Cynosbati Mentzelii Pugil. ravior.* *Ranunculi facie Planta peregrina H R P. 153.* *Dentaria monophyllos Anapodophyllon* quibusdam. *H R B. 66.* *Herbæ Paris affinis bifolia, Pomum Majale Londinensibus Raij Hist. Pl. 671.* Solanum pomiferum monophyllon umbilici folium in sex plus minus profundas lacinias divisum *D. Banist. Cat. Mss. Hæc (inquit) de sterilibus velim Plantæ enim fructiferæ, bina habent folia seu potius unicum in bina partitum, è cujus furcâ Flos extruditur patulus, ex senis petalis albis conflatus.*
- Nymphææ* congeneri *Anapodophyllon* dictæ accedens, polyphyllos. s. *Dracontii* similis *Herba Americana* pusilla. *Phytogr. Tab. 115. fig. 7.*



## O.



**CIMUM** maximum perenne utriusque *Indiæ* foliis Atriplicis, ingrati odoris graveolens. *Phytogr. Tab.* 308. Paxavac (fortè) vel Poxavac *Novæ Hispan. Terentii* apud *Recc.* 397. Fortè etiam Cattu-tirtava *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 86.

*Ocimum latifolium maculatum vel crispum CBP.* 225. *Ocimum Sancto-Mauritanum latum crispum maximum JB. Tom.* 3. 249. *Ocimum Indicum Park. Th.*

*Ocimum Caryophyllatum maximum. CBP.* 225. *Ocimum Ægyptium* longioribus foliis *Ribau* dictum *JB. Tom.* 3. 250.

*Ocimum viride foliis bullatis CBP. H. Leyd.* 455.

*Ocimum Melissophyllum Gangeticum* odoratissimum, seminibus nigris *Amaranthi nitentibus.* An Cottam *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 77. Fortè etiam Xicoxihoitl *Nov. Hisp. Ant. Recc.* 438. *Ocimum Benghalense PBP.*

*Ocimum Maderaspatanum* frutescens gratissimi odoris flore parvo, cauliculis villosis. *Phytogr. Tab.* 208. fig. 4. An *Ocimum* frutescens perenne flore parvo *Breyn. Prodr.* 2. *Ocimum Zeylanicum* perenne frutescens folio *Calaminthæ* nonnihil simili *PBP.* 358.

*Ocimum* odoratissimum calycibus ad verticillas deorsum tendentibus, absque petiolis è *Maderaspatan* *Phytogr. Tab.* 208. fig. 5. Fortè *Ocimum Ægyptium* odoratissimum, foliis longis pediculis innixis *Ambrosini Phytolog.* Soladi-tirtáva *H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 87. Huic generi Plantarum pertinet etiam Quauh-chian *Novæ Hispaniæ Terent.* apud *Recc.* 399. Item Huitxiqua *Michuacanensibus Hernand.* apud eundem *Recc.* 113. An *Basilicum Indicum* sylvestre *Zanon. Hist. Bot.* 25.

*Ocimum angustifolium* foliis serratis. *H. Leyd.* 456. *Ocimum minus angustifolium* foliis serratis *CBP.* *Ocimum minus angustifolium, Park. Th.*

*Ocimum minimum JB. T.* 3. 247. *CBP.* 226. *Ocimum vulgare minus Park. Th.*

*Ocimum Cormandelienae* valdè odoratum, *Hyssopi* foliis hirsutis pubescentibus.

**OENANTHE** aquatica minor *Juncoides trianthophoros.* *Oenanthe aquatica minor Park. Th.* Item *Oenanthe juncoides minima ejusd. Theatr.* 895.

*Oenanthe s. Filipendula Monspeffulana Apii folio JB. Tom.* 3. 190. *Oenanthe Apii fol. CBP.* 162.

*Oenanthe aquatica Pimpinellæ Saxifragæ divisurâ nostras. Phytogr. Tab.* 49. fig. 4.

*Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens JB. Tom.* 3. *Oenanthe Pastinacæ sylv. folio, semine Atriplicis CBP. Angliæ nostræ alumina est.*

*Oenanthe Millefolii aquatici foliis Moris. Umb.* 19. *Daucus pratensis Millefolii palustris folio CBP.* 150.

**OLEA** maxima *Hispanica CBP.* 472. *Oliva major subrotunda Botan. Monsp.* 189.

*Olea sylv. folio duro subtus incano CBP.* *Oleaster s. Olea sylvestr. JB. T.* 1. 21.

*Olea sylvestris s. Æthiopica foliis longioribus utrinque virentibus. Olea sylvestris Æthiopica Park. Th.*

*Olea*



*Olea sylvestr.* folio molli incano *C B P.* *Zizyphus Cappadocica* quibusd. *Olea Bohe-*  
*mica* *J B. Tom. 1. 27.* *Oleaster Cappadocicus Park. Theatr.*

*Olea sylvestris* argenteo folio *Zeylanica.* *Zizyphus argenteo Zeylanica* spinis carens  
*Walæmbilla Zeylanensibus* dicta *P B P. 386.* àn Arbor ferens folia argentea *Za-*  
*non. Hist. Bot. 24.*

*Olea Laurino* folio *Portoricensis*, summo margine crenato. *Phytogr. Tab. 206. fig. 6.*  
*Amygdali Brasiliæ* nomine à *Cl. Herm.* aliquando recepta fuit. Huc fortè spe-  
ctat *Kari-vetti H. Malab. Part. 4.*

*Olea Malabarica* Fraxineo folio è *Maderaspatan.* *Phytogr. Tab. 247. fig. 1.* Arbor  
*Indica* Fraxino similis, *Oleæ* fructu *C B P.* *Aria-bepou s. Nimbo Acostæ H. Ma-*  
*lab. Part. 4. Tab. 52.* *Nimbo* folio & fructu *Oleæ J B. Tom. 1. l. 6. cap. 8.* *Aza-*  
*dirachta Indica* foliis *Fraxini s. non ramosis* majoribus flore minore albo *Breyn.*  
*Prod. 2. 21.*

*Olea Malabarica* *Nimbo* dicta fructu rotundiore. *Kari-bepou s. Nimbo altera H.*  
*Malab. Part. 4. Tab. 53.* *Azadirachta Indica* foliis *Fraxini s. non ramosis* mino-  
ribus, flore parvo albo *Breyn. Prod. 2.*

*Olea sylvestris Barbadosum*, folio angusto pingui, leviter crenato *Phytogr. Tab. 209.*  
*fig. 3.* Hujus Arbor gummi instar *Elemi* (ut audio) fundit; Huc fortè referenda  
*Ytztacatzoyatl Novæ Hisp. Terent. apud Recc. 449.* nostra tamen Arbuscula est,  
non Herba.

**ONOBRYCHIS** foliis *Viciæ* fructu echinato major *C B P. 350.* *Polygalon-*  
*Gesneri J B. T. 2. 335.* *Saint foyne vulgo.*

*Onobrychis minor*, flore parvo purpureo filiquâ echinatâ, majoribus aculeis. *Raij*  
*Phytogr. Tab. 50. fig. 1.* *Onobrychis* fructu echinato minor *C B P.* Caput Galli-  
naceum minus *ejusd. in Prodr. 149.* àn *Onobrych. s. Caput gallinaceum minus*  
fructu maximo insigniter echinato *Læl. Triumf.*

*Onobrychis* flore cæruleo, filiculis hirsutis *s. asperis*, ad imum Platani pilulæ modo  
junctis *Moris. Hist. 2. 133.* *Glycyrrhiza* capite echinato *C B P. 352.* *Glycyrrhi-*  
*za Dioscoridis* echinata non repens *J B. Tom. 2. 327.*

*Onobrychis* semine clypeato aspero major *C B P.* *Astragalus Romanus s. Hedyssa-*  
*rum clypeatum, filiquâ asperâ J B.* *Onobrychis* major perennis filiculis articula-  
tis asperis clypeatis, rectâ junctis, flore ruberrimo *Moris. Hist. 2. 129.* *Variat*  
*etiam flore candido.*

*Onobrychis* major annua, filiculis articulatis asperis clypeatis, undulatim (*i. e.*) an-  
trorsum & retrorsum junctis, flore purpureo-rubente *Moris. Hist. 2. 130.*

*Onobrychis minor* foliolis cordatis, filiquis magnis asperis compressis veluti isthmo  
interceptis, floribus in globum congestis. *Phytogr. Tab. 50. fig. 2.* An *Onobry-*  
*chis* folio *Viciæ*, fructu echinato, major caulescens & ramosa *Schol. Botan. 244.*  
*Onobrych. semine clypeato aspero min. C B P. & Prod.*

*Onobrychis s. Hedyssarum clypeatum* *Alpinum* perenne, filiquâ glabrâ, flore albo.  
*Schol. Bot. 245.* *Onobrychis clypeata lævis C B P. & in Prod. à D. Sherard*  
habuimus.

*Onobrychis annua Zeylanica* *Mimosæ* foliis, filiquis articulatis asperis major *H.*  
*Leyd. 458.* *Securidaca clypeata* flore luteo, *Lentis* folio *Zeylanica. Breyn. Prodr. 46.*  
Mimosa



Mimosa non spinosa major, *Zeylanica* Breyn. Cent. 1. 51. *Dyahibala Cingalensis* dicta.

Eadem minor *H. Leyd.*

*Onobrychis Bisnagarica* Mimosæ foliis, filiquis ad unum solummodò latus dentatis, ex alis polyceratos. *Phytogr. Tab. 49. fig. 5.*

• *Onobrychis Orientalis* Mimosæ brevioribus foliis, falcatis & dentatis filiquis, ad fastigia ramulorum ortis. *Phytogr. Tab. 309.* An *Neli-Tali H. Malab. Part. 9. Tab. 18.* *Ferrum equinum majus Malabariense*, filiquis in summitate. *Commel. in Not.*

• *Onobrychis Americana* floribus spicatis, foliis ternis canescentibus, filiculis asperis. *Phytogr. Tab. 308.* *Trifolium Americanum* spicatum *Marcgr. Caapamonga 3<sup>a</sup> Pison. l. 4. c. 40. fol. 201.* *Lusitanis Erva d' Amor*, quòd filiculæ ejus articulatæ asperæ *Philanthropos* quasi, vestibis prætereuntium adhæreant. à quibusdam *Trevo* dicta.

• *Onobrychis major perennis Canadensis* triphylla, filiculis articulatis asperis triangularibus *Moris. Hist. 2. 130.* *Hedysarum triphyllum Canadense Cornut. 44.*

*Onobrychis Maderaspatana* diphyllis major filiculis clypeatis asperis. *Phytogr. Tab. 102. fig. 1.* Hujus notitia humaniss. æquè ac Clariss. viri *D. D. Frederici Stare* favori debemus.

• *Onobrychis Maderaspatana* diphyllis filiculis clypeatis hirsutis minor. *Phytogr. Tab. 246. fig. 6.*

*Onobrychis Gangetica* monophyllos, filiculis singularibus lævibus, falcatis per internodia discriminatis. *Phytogr. Tab. 50. fig. 3.*

**OPHIOGLOSSUM** *J. B. Tom. 3. 708.* *Ophioglossum vulgatum C B P. 187.* *Ophiogloss. s. Lingua Serpentina Park. Theatr. variat aliquando in bilingue & trilingue.*

*Ophioglossum moschatum Jamaicense* *Limonii* foliis in extremo sinuatis. *Vid. Arum.*

**OPHIOXYLUM** *Americanum*, foliis oblongis mucronatis, levitèr ferratis, *Bar-danæ* instar, subtùs lanuginosis *Phytogr. Tab. 210. fig. 1.* *Lignum colubrinum Barbadosum Snake-wood* illic nuncupatum. An *Poa del Cebra Lusitanis Angolensis* (i. e.) *Serpents-wood* dicta.

**OPHRIS** bifolia; *C B P. 87.* *Bifolium majus, s. Ophris major* quibusdam *J. B. Tom. 3. 533.*

• *Ophris bifolia minor palustris Phytogr. Tab. 247. fig. 2.* *Bifolium palustre Park. Th. Hujus exemplar amicissimus Vir & in rebus Botanicis exercitatissimus D. Samuel Dale Pharmacopæus & Medicus Braintriensis ad nos benignè transmissit.*

• *Ophris minima C B P.* *Bifolium minimum J. B. Tom. 3. lib. 31. 534.*

**ORCHIS** palmata Alpina angustifolia nigro flore *C B P.* *Palmata minor odoratissima purpurea. s. nigra J. B. Tom. 2. 778.*

• *Orchis palmata rubella, cum longis calcaribus rubellis J. B. T. 2. 778.* *Orchis palmata minor calcaribus oblongis C B P. 85.* Cui & eandem suspicatur *J. Baubinus* *Orchidem palmatam angustifoliam minorem C B P. ibid.* ut rectè notat *Cl. Raius Hist. Pl. 1224.* Orchis



- Orchis palmata minor flore luteo viridi Raij Hist. Pl. 1224. An Orchis palmata flore viridi. C B P. Park. Th. 1359. An Orchis palmata Batrachites, vel Myodes ejusd. Th. 1357.*
- Orchis pusilla alba odorat, radice palmatâ, Raij Synops. Stirp. Brit. 173. Walliam agnoscit Patriam.*
- Orchis palmata elegans lutea, cum longis calcaribus luteis Banisteri.*
- Orchis palmata lutea minor, nullis calcaribus, floribus appensis Banisteri.*
- Orchis Lilifolius minor Sabuletorum Zelandiæ & Bataviæ J B. Tom. 2. 770. Icon autem sub alterius titulo transposita est. Pseudo-Orchis bifolia palustris Raij Hist. Pl. 1226. Chamæ-Orchis latifolia Zelandica Park. Th. 1354.*
- Orchis purpurea spicâ congestâ pyramidali Raij Hist. Pl. 1215. An Orchis Batavica 6<sup>a</sup>. Clus. Hist. an Cynosorchis militaris spicâ rubente conglomeratâ Park. Th.*
- Orchis fœtida 3<sup>a</sup> s. odore hirci minor C B P. Tragorchis minor flore fuliginoso J B. 764. hæc potiùs Cimicis odorem refert, & figuram, undè Tragorchis minor & verior Gemmæ s. Coriosmites vel Coriophora flore instar Cimicum Lob. Hist. Lugd. 1558.*
- Orchis odore hirci longiore angustioreque folio C B P. 82. Orchis Saurodes vel Scincophoros lacertarum æmulatione Gemmæ Hist. Lugd. 1553.*
- Orchis parvis floribus, multis punctis notatis, an Clusio. Orchis Pannonica 4<sup>a</sup>. J B. 765. Cynosorchis militaris pratensis humilior. C B P. 83.*
- Orchis odorata moschata s. Monorchis C B P. Orchis pusilla odorata Park. Th. 1354. Orchis parva Autumnalis lutea J B. Tom. 2. 768.*
- Orchis s. Triorchis lutea altera, nonnihil hirsuta J B. 769. Hyacinthus Orchioïdes trifolius minor Europæus hirsutus flore luteo Breyn. Prodr. 2. 57.*
- Orchis spiralis alba odorata. J B. ibid. Triorchis alba odorata minor, atque etiam major. C B P.*
- Orchis Hermaphroditica Virginiana flore minore, calcari longiori D. Banister.*
- Orchis flore nudi hominis effigiem repræsentans fœm. C B P. 82. Orchis Anthrophora Oreades Column. ecphr. 318. à D. Dale in Essexia Angliæ nostræ Provinciâ nuper inventa est.*
- Orchis galea & alis ferè cinereis. J B. Tom. 2. 757. Cynosorchis latifolia hiantе cucullo minor C B P. The Man Orchis.*
- Orchis Zoopora Cercopithecum referens Oreades Column. Orchis floris Simiam referens C B P.*
- Orchis Myodes galea & alis herbidis J B. 757. Orchis Serapias Muscæ corpus referens minor, vel galeâ & alis herbidis C B P. 83.*
- Orchis Fuciflora galeâ & alis purpurascens J B. Orchis Fucum referens major, foliolis superioribus candidis & purpurascens C B P. The Bee Flower.*
- Orchis s. Testiculus Sphegodes hirsuto flore J B. Orchis Serapias Fucum referens, colore rubiginoso C B P. The Dumble-Bee Satyrion. Orchis Apem referens Lusitanica Breyn. Cent. 1. 98.*
- Orchis alba calcari oblongo. J B. T. 2. 771. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo C B P. Butterfly Satyrion. Orchis Ornithophora Ger. Icon.*
- Orchis muscam referens major C B P. 83. Orchis Myodes flore grandiusculo. J B. T. 2. 768. Orchis Myodes altera, folio læviore & flore grandiusculo. Lob. Icon. 182.*



Orchis Scarabæum exprimens *Breyn. Cent. 1. Icon. 45.*

Orchis araneam referens C B P. Orchis Andrachnitis. *Lob. Icon. 185.*

ORIGANUM sylv. Cunila bubula *Plinii* C B P. 223. Origanum vulgare spontaneum *J B. T. 3. 236. variat flore albo & parpureo.*

Origanum *Maderense* nostrati similè odoratus capitulis albicantibus.

Origanum glabrum, floribus parvis rubentibus *Virginianum Banisteri.*

Origanum *Heracleoticum Ruellii* s. Majorana major, *J B. T. 3. 237.* Majorana sylvestr. perennis C B P. 224. Majorana latifolia s. major. *Anglica Park. Th.* Item Majorana latifolia aurea *ejusd.* Pot ~~Majorana~~ nostratibus dicta.

Origanum *Monspeliense* pulchrum *Camerarii* *J B. Tom. 3. 238.* Origanum folio subrotundo C B P. 223. Origanum Onites *Gallo-provinciæ* minus *Adversarior.*

Origanum *Heracleoticum*, Cunila gallinacea *Plinii* C B P. Origanum *Heracleoticum* verius *Park. Th. 15.* fortè etiam Origanum Onites floribus albicantibus C B P.

Origanum *Heracleoticum Matthioli*, aliis fortè *Creticum* *J B. T. 3. 237.* Majorana hortensis odorata perennis, capitulis non spicatis, in Hortis *Anglorum* satis frequens *Raij Hist. Pl. 539.*

Origanum *Creticum* *J B. T. 3.* Origanum Onites & *Matthioli* C B P. Item Origanum *Creticum* *ejusd.* Origanum Onites *Matthioli* *Park. Th. 15.* Origanum *Smyrnæum Wheleri Itinerar.*

ORLEANNA s. Orellana folliculis lappaceis *H. Leyd. 464. Phytogr. Tab. 209. fig. 4.* Urucu *Brasiliensium Pison. lib. 4. 133.* Achiotl s. Medicina tingendo apta *Hernand. Hist. Mexic. 74.* Nota & Anota *Nostratibus* vulgo. Hujus fructus est Daburi folliculus *Americanus* ad Daturam accedens semine rubro *J B. T. 1. l. 12. 439.* Byxa *Americanorum Oviedi. Casp. Baubino & Clusio.* Arbor finium *Regundorum* *Jul. Scalig. lib. exoticor. Exercit. 6.* Arbor *Mexic.* fructu Castaneæ cocci-fera *ejusd.*

ORNITHOGALUM luteum parvum *Virginianum* foliis gramineis hirsutis *Banisteri Cat. Stirp. Virgin.*

Ornithogalum altissimùm spicâ longâ gracili, floribus ochroleucis. An Ornithogalum spicatum flore luteo pallecente & viridi *Lusitanum Grislei.*

Ornithogalum *Africanum* luteum odoratum foliis cepaceis, radice tuberosâ. *H. Leyd. 466.*

Ornithogalum *Indicum* spicatum, flore lacteo magno, folio cepæ fistuloso nostrum *Raij Hist. Pl. App. 1905.*

Ornithogalum spicatum album planifolium majus *Africanum.*

Ornithogalum spicatum minus album, foliis nervosis *Africanum* *Phytogr. Tab. 310. fig. 1.*

Ornithogalum *Virginianum* parvum umbellatum, flosculis ex albo viridiusculis *Banisteri.*

Ornithogalo affinis *Virginiana* flore purpureo pentapetaloide *Banisteri. Phytogr. Tab. 102. fig. 3.*

ORNITHOPODIUM maximum villosum. s. Ornithopod. majus è *Maderaspatan* foliis lanugine argentatis *Phytogr. Tab. 52. fig. 1.* Ornitho-



*Ornithopodium* radice tuberculis nodosâ *CBP.* 350. Item *Ornithopodium* majus & minus *ejusd. ibid.* *Ornithopod.* flore flavescente *J B. T. 2.* 350. & *Ornithopod.* tuberosum *Dalechampii ejusd.* 351. ex sententiâ *Cl. Raii* cui & nos libentè suffragamur.

*Ornithopodium* ἀνγκέρατον *Moris. Hist. 2.* 125. *Ornithopodio* similis hirsuta *Scorpioides CBP.* 350. *Scorpioides* leguminosa *J B. Tom. 2.* 349.

*Ornithopodium* minimum δικέρατον s. ὀλιγονκέρατον *Moris. Hist. 2.* 125. Item *Scorpioides Viciæ* foliis minima *ejusd.* 128. *Securidaca* minor lutea *HRB.* 188. & 308. *Scorpioides* leguminosa altera *J B. T. 2.* 350. An *Ornithopodium* pusillum *Penæ Hist. Lugd.* 487.

OROBANCHE major Garyophyllum olens *CBP.* 87. *Orobanche* flore majore *J B. T. 2.* 780.

*Orobanche* Verbaſculi odore *D. Plot. Phytogr. Tab.* 209. fig. 5. An *Orobanche* flore minore *J B.* 781.

*Orobanche* ramosa *CBP.* 88. *Orobanche* minor purpureis floribus, s. ramosa *J B.* 781.

*Orobanche Virginiana* flore pentapetalo cernuo *Banisteri Phytogr. Tab.* 209. fig. 7.

*Orobanche Virginiana* radice fibrosâ summo caule foliis subrotundis *Phytogr. Tab.* 209. fig. 6.

*Orobanchæ* quæ *Hypocistis* dicitur *Raij Hist. Pl.* 1228. *Hypocistis* *Park. J B. CBP.* & aliorum.

*Orobanchæ* radice coralloide *CBP.* *Dentaria* ἀρυλλῶ 3<sup>a</sup>. *Clus. Hist. poster.* 120.

*Orobanchæ* verna, radice dentatâ *Virginienſis Banisteri. Phytogr. Tab.* 211. fig. 2.

*Orobanchæ* Autumnalis *Virginiana* radice dentatâ *Banisteri Phytogr. Tab.* 211. fig. 1.

*Radicem habet proximè præcedenti similem, caulem verò (ut Solanum magnum racemosum) splendidè rubellum, flosculi minores, magis pendentes, minùsque aperti sunt, senis constantes petalis quinque rubellis alter albus est, non omninò maculatus & hæc tantùm (ut in alterâ) à vasculo seminali lutescit. Octobr. medio in Virginia floruit.*

OROBUS sativus s. *Ervum* semine anguloso siliquis inter grana & grana junctis *Moris. Hist. 2.* 74. *Orobis* siliquis articulatis semine majore *CBP.* 346. *Herba Judaica Avicen. Tom. 1. lib. 2.* 317. *Barbadensibus Anglis Jews-Pease* nuncupatur.

*Orobis* semine minore *CBP.* *Orobis Creticus* semine minore *Moris. ibid.* *Kabli-boet Bengalenſibus* dicta.

*Orobis* sylvaticus *Viciæ* foliis *CBP.* 352. *Orobis* sylvaticus *Viciæ* foliis, siliquis propendentibus, floribus purpureis. *Moris. Hist. 2.* 78. *Astragalus* major *Fuchſio J B. T. 2.* 334

*Orobis* Sylvaticus nostras *Raij Cat. Angl.* 219. & *Hist. Pl. append.* 1892.

*Orobis Zeylanicus* glaber, flore rubro *P B P.* 359.

*Orobis* sylvaticus purpureus Vernus *CBP.* *Galega Nemorenſis Verna J B. T. 2.* 343.

*Orobis Pannonicus* primus. *Clus. Hist. poster.* 230. *Orobis* Sylvatic. perennis Vernus siliquis erectis flore purpureo *Moris. Hist. 2.* 93.



Orobus *Venetus Clusii. Hist. poster. 232.* Orobus latifolius parvo flore purpureo *C B P.* Galegæ Nemorensi Vernæ similis multiflora, flore purpureo *J B. Tom. 2. 345. variat interdum floribus albis.*

Orobus *Pyrænaicus* latifolius nervosus, *Schol. Bot. Phytogr. Tab. 210. fig. 2.*

Orobus sylvestris angustifolius Asphodeli radice *C B P.* Orobus *Pannonicus* tertius. *Clus. Hist. poster. 231. apud exsiccatas D. Cortene diversis in locis Observavimus.*

Orobus Sylvaticus filiquis propendentibus tuberosâ radice *Moris. Hist. 97.* Astragalus sylvatic. foliis oblongis glabris. *C B P.* Astragaloides s. Astragalus sylvaticus, Astragalo magno *Fuchsi*, vel Chamæbalano leguminosæ affinis planta. *J B.*

Orobus *Americanus* luteus filiquis incanis *Breyn. Cent. 1. 75. penitus autem hirsuta est ac incana.*

Orobo *Americano* luteo *Breynii* similis ex *Chinâ*; cujus folia sunt glabra.

Orobus *Americanus* villosus & incanus floribus ex purpureo incarnatis *P B P.* àn Orobus *Zeylanicus* incanus filiquis pendentibus torosis *Breyn. Prodr. 2. 80. quem ut ipse dicit, nomine Astragali Zeylanici Hermannò in Horto Fageliano collegit.*

Orobus (fortè) àn Astragalus oxytriphyllos? (*Cytisus Rivino dicta*) floribus *Apios Americani.*

ORYZA *Italica* ad differentiam *Germanicæ C B P. 24.* Oryza *J B. Tom. 2. lib. 18. 451.*

OXYS purpurea *Virginiana* radice Liliî more nucleata, capitulis postquam defluerit bulbillis, ut in Allio corvino conflatis. *Phytogr. Tab. 102. fig. 4.* Trifolium acetosissimum, radice parvâ rotundâ Liliî more imbricata *Banist. Cat. Mss.*

Oxys *Virginiana* s. Trifolium acetosissimum rubrum, caule parvo aphylo, foliis crassis & succulentis *Banisteri Cat. Mss.*

Oxys bulbosa *Africana* angustifolia, flore rubro obsoleto amplo *Breyn. Prodr. 2. 80.*

Oxys bulbosa *Africana* rotundifolia, flore purpureo amplo. *Breyn. ibid.* Oxys affinis Planta bulbosa *Africana*, flore purpureo magno. *Ejusd. in Cent. 1.*

Oxys *Africana* folio & flore parvo albente, radice Asphodeli *P B P. 360.* Trifolium bulbosum flore albo *Prom. Bon. Spei. Bod. à Stapel. Not. in Theophr.*

Oxys bulbosa *Africana* folio cordato parvo, luteo umbellato flore *Breyn. ibid. Hujus folia sunt insigniter pilosa.*

Oxys lutea *J B. T. 2. 387.* Trifolium acetosum corniculatum *C B P. 330.* Oxys flore luteo. *Clus. Hist.*

Oxys s. Trifolium acetosum corniculatum majus rectum. s. *Virginianum Moris. H. Leyd. An Herba Joannis Infantis Monard? Clus. in Monard. 311.*

Oxys s. Trifolium acetosum corniculatum surrectum rubrum s. *Americanum.* Xoxocoyol-Hoihoilan *Novæ Hispaniæ Terent. apud Recc. 440.*



P.



AI-PAROEIA s. Couradi *H. Malab. Part. 5. Tab. 46.* Frutex baccifer *Malabaricus*, fructu plano rotundo piloso tetrapyreno *Raij Hist. Pl. 1624. Phytogr. Tab. 50. fig. 4.*

PALIURUS Jujubinis foliis fructu petaloide. Paliurus s. Rhamnus 3. *Dioscoridis Park. Th.* Rhamnus s. Paliurus folio Jujubino *J B. Tom. 1. 35.* Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso *C B P. 477.*

PALMA coccifera figura ovali *C B P. 509.* Nux Indica ad Venena celebris. s. Coccus de *Maldivâ J B. Tom. 1. 384.* quibusdam Tavercare. Hujus Cocci quæ de mari in litus ejiciuntur nunc bini conjunctim, interdum verò singuli separatim, solummodò nobis cognitæ, folia autem à nemine adhuc visa sunt.

Palma Indica coccifera angulosa *C B P. 508.* Palma Indica nucifera *J B. Tom. 1. 375.* Jansiat Indi (i. e.) Nux Indica *Avicennæ.* Palma s. Nucifera arbor Indica quæ Arabibus Maron, Indis Tengamaran, & Lanha, at Nux Arabibus Harel, Indis Tenga, Lusitanis Coquo *Linschot. Part. 4. Ind. Orient. cap. 12. fig. 11.* Tenga *H. Malab. Part. 1. fig. 1.* &c. Inaja-Guacuiba *Brasilens. Marcgr. 138.* Cocoeiro *Pison. 130.* Coyolli *Mexicanis Hernand. apud Recc. 71.* Polghaha *Zeylanensibus. Coco's vulgo.* Indi harum Arborum domini, non minùs emolumentum ab eis percipiunt quàm Europæi è pecore, nam singulæ pleraque ad vitam necessaria præstant; Supellectilem, vestitum, cibos & liquoris potabilis abundè, eumque pro potu familiari usurpant, quem linguâ vernaculâ Toddy & Suram vocant, ideoque hujus Arbor Suraboom ab Hollandis nuncupatur, ex hoc latice insolato Acetum, ex eodem decocto Saccharum faciunt; Spiritus quoque vinosos destillando eliciunt; Iste potus recens ex Arbore depromptus ori suavis est, stomacho gratus, calidisque hepatis, & renum affectibus utilissimus, ejus beneficio Seres longævi fuisse perhibentur.

Palma coccifera minor, fructu racemoso ovi gallinacei magnitudine, & figurâ. Inaja *Brasilianis, Pindova Lusitanis vulgo, Pison. 125.* Pindobá *Brasilensibus Marcgr. 133.* An Nux Indica minor *J B. Tom. 1. 384.*

Palma Arecifera nucleo versicolore, Nuci moschatae simili. *P B P. 361.* Palma cujus fructus sessilis Fausel dicitur *C B P. 510.* Fausel s. Areca Palmæ foliis *J B. T. 1. 389.* Item Arechæ arboris Fructus Cofolo ejusd. *Tom. 1. 374.* Areca s. Fausel s. Avellana Indiana versicolor *Park. Th. Caunga H. Malab. Part. 1 fol. 9.* An Palma Bahei-Coyolli *Mexicanis. Hernandez apud Recc. 75.* Puwakghaha *Zeylanensibus dictâ. Icon habetur in Phytogr. Tab. 309. fig. 4.*

Palma Americana Farinifera, & Papyrifera excelsissima, fructu parvo racemoso rotundo nucleo instar Nucis Moschatae variegato. Palma nobilis s. Regalis Jamaicensis & Barbadiensis, *Raij Hist. Pl. 1361.* Palma Americana non spinosa Regia dicta, fructibus exiguis racemosis, arctissimè in Uvam compactis. *H. Beaumont. 32. Palmiste Franc. D. Rockfort. Hist. des Amillis 61.* Hujus Arboris



summum fastigium in caput orbiculatum instar Brassicæ capitatæ membranaceis tegminibus conflatum extuberat, in cujus Meditullio Farina præparatur, ex quâ panes conficiunt; atque ex hujus Brassicarii capitis involucro interiori, tenuissima membrana sunt decerpta, quibus omnis generis scriptura perindè atque vulgari papyro excipi queat. An Papyrus ex Arbore vastâ in regno Fanfur. Paul. Venet. Arbor farinifera Clus. exot. lib. 1. cap. 3. & 16. Palmam referens Arbor farinifera C B P. 508. Zagu Ferdinand. Lopez. Sagu Pigafettæ. & add. Clus. Cur. poster. An fortè Papyracea arbor amplissimis & tenuissimis fol. Nicol. Costini apud J B. T. 1. fol. 375. Papyrus (fortè) arborea tenuissima ex Java ejusd. J B. ibidem. Arbor Pergamenifera & Xagua Martyris Nieremb. Hist. Exot. 327. Palma Brasiliensis 8<sup>a</sup>. Iraiba dicta Pison. 129. àn Yri Lerii? (i. e.) Palma Americana fructu racemoso C B P. 507. Cabbage-Tree & Palmetto Royal nostratibus dicta. Cui fructus Uvarum formâ & magnitudine, qui putamine membraneo satis tenui, cineraceo colore tegitur, fungosâ quâdam materiâ suffulto, quâ nucleus includebatur lævi & reticulatâ; ipse etiam nucleus fere orbicularis, necnon Arecæ instar intus versicolor.

Palma Javanensis longissimo folio C B P. 509. Palmæ Indicæ genus Lantor dictum J B. Tom. 1. 373. Hujus folia quæ Arundinis speciem quodammodò ferunt viri longitudinem æquant; quibus Indi inscribunt res memorabiles. An Papyracea arbor Tal. in Provincia Magni J B. Tom. 1. 374.

Palma farinifera Japonica Breyn. Prodr. 2. Palma prunifera Japonica H. Leyd. 472. Palma Japonica spinosis pediculis Polypodii folio P B P. Todda-panna H. Malab. Part. 3. Palma vinifera vulgò. Soteetsou Japonensibus dicta.

Palma sylvestris Malabarica folio acuto, fructu Prunifacie Commelin. Katou-Indel H. Malab. Part. 3. fol. 15. àn Arbor exotica fructu Dactylis simili C B P. 508. An Fructus Ponticæ nucis magnitudine s. quartus. Clus. exot. lib. 2. cap. 29. Fructus Avellanæ magnitudine, putamine velut in duas partes diviso C B P. Fortè etiam Palma Elephantis Acoftæ J B. T. 1. 376.

Palma Americana foliis Polygonati brevioribus leviter ferratis & nonnihil spinosis trunco crasso. Breyn. Phytogr. Tab. 103. fig. 2. & Tab. 309. fig. 5. Palma Americana non spinosa, crassis rigidisque foliis, caudice scabro in caput protuberante. P B P. 361.

Palma (fortè) s. Phænico-Scorpiuros, aut Heliotropium Palmites spinosum Polygonati angustis foliis Maderaspatana. Phytogr. Tab. 106. fig. 1. & 2. Huc fortè pertinet Atitara Brasiliensibus Marcgr. 64. àn huic etiam quodammodò convenit Tsjeru-Tsjurel H. Malab. Part. 12. Tab. 64. alio nomine Rottang. dicta; Quæ est de Arundinum genere, seriùs cogitandum propono.

Palma Americana pediculis & foliorum carinis, rarioribus, at longissimis spinis aculeata, summis apicibus leviter ferratis. Palmæ Dactyliferæ species Indiana, Birli Lusitanis Zanon. 159. Schunda-pana H. Malab. Part. 1. fol. 15. D. Syen figuram illam quam Chamæriphes nomine exhibet Clusius exot. lib. 4. cap. 12. nihil aliud esse suspicatur quam racemum, aut fasciam cui adhæsērunt hujus arboris fructus. Not. in H. M. An Palma maj. Dactylifera & Vinifera Guiniensis Fr. Penino J B. T. 1. 369. Fortè Marajaiba Brasiliensibus. s. Palma 10<sup>a</sup> Pison. 129. An Quaucoyolli Mexicanis Hernand. apud Recc. 401? Palma Surinamensis Sagittaria s. folio



- folio Polygonati longiore, validissimis spinis & longissimis horrido. Breyn. Prodr. 2. 82.
- Palma humilis ex Insula *Macasariâ Ind. Orient.* nucleo plerumque gemello, Nucis Moschatae instar versicolore. Kittoel *Zeylanensibus* dicta. à præcedenti haud multum diversa est.
- Palma *Americana* spinosa *C B P.* 507. *Phytogr. Tab.* 103. fig. 1. Palma Hayri *Park. Tb.* Palmæ facie Hairi *J B. T.* 1. 393. Palma *Brasilens.* 6<sup>a</sup> s. Ayri *Pison.* 129. Palmistæ Epineus *D. Rochfort.* 60. Macou arbor *Barbadensium Ligonis. Hist. Barb.* Hujus arboris lignum marmoris nigro simile, Ferri modo in aquâ fundum petit; Exindè Ebeni speciem esse quidam autumant; plurimas hæc Arbusculas Insulâ *Jamaicensi* allatas, in *H. Comptoniano* aliquandò conspeximus.
- Palma *Jamaicensis* non spinosa humilis, Bambu foliis Arundinum ritu incisus *Phytogr. Tab.* 51. fig. 1.
- Palma dactylifera major vulgaris *Jonst. Dendrolog. lib.* 2. Palmá *J B. T.* 1. 351. Palma major *C B P.* 506. Palma dactylifera major & Dactylus vulgo *P B P.* 360. Maha-Indi, & Indi *Zeylanensibus.*
- Palma dactylifera minor humilis, sylvestris, fructu minore; Hin-Indi *Zeylanensibus* dicta *P B P.*
- Palma humilis *Hispanica* non spinosa *J B. T.* 1. 369. Palma folio plicatili. s. flabelliformi humilis *Raij Hist. Pl.* 1369. The Dwarfè *Palme.*
- Palma humilis s. Chamæripes spinosa ex Insulis *Balearibus.* Palma humilis spinosa *J B. Tom.* 1. 370.
- Palma *Barbadensis* non spinosa, folio plicatili. s. flabelliformi; Fructus ossiculo nigro. An Palma *Americana* non spinosa Chamæryphes foliis & facie *H. Beaum.* 32. An Palma 3<sup>a</sup> species Latinier dicta *Rochfortii Hist. nat. Insul. Antil.* 64. Fortè etiam Palma *Indica* sylvestr. vulgo, *Palma brava*, cujus folia deserviunt pro flabellis. *Zanon.* 27. *Palmetto Barbadensibus* dicta. An Carana-iba altera *Pisonis.* 126.
- Palma humilis s. Chamæripes *Curassavica* Prunifera spinosa, nucleo extus elegantèr variegato. Fortè Carana-iba & Anachecariri *Brasilensium Pison.* 126.
- Palma *Barbadensis* folio plicatili magno subtus molli & argenteo. An Carimpana *H. Malab. Part.* 1. fig. 9. Palma coccifera folio plicatili flabelliformi fœmina. *Raij Hist. Pl.* 1366. *Lusitanis* Palmeira brava fœmina.
- Palma montana folio plicatili flabelliformi maximo, semel tantum frugifera, *Raij Hist. Pl.* 1367. Codda-panna s. Palma montana *Malabarica H. Malab. Part.* 3. pag. 1. Talagas Talagaija & Talipot *Cingalensibus* dicta.
- Palma prunifera foliis Juccæ, fructu racemoso Cerasi-formi, ossiculo duro cinereo, Pisi magnitudine, Lachrymam Sanguis Draconis dictam fundens *H. Amst.* 260. *H. Beaum.* 33. Draco arbor *Clus. J B. C B P. Park. Tb.* &c.
- Palma manicam *Hippocraticam* referens *C B P.* 507. Palma Saccifera *Clusii exot. lib.* 1. cap. 2. An hæc Planta in *Americæ* Insulis nasci dicta sit genuina Palma, multum dubitat Excellentiss. *Raius Hist. Pl.* 1370. cum nulla pars describitur ab Autoribus præter folliculum s. fructus thecam.
- Palmae affinis Arbor conifera *Mascatenfis*, longissimo folio tribus ordinibus spinarum munito. Kaida *H. Malab. Part.* 2. pag. 1. Frutex *Indicus* fructu aggregato conoide



- conoide Kaida dictus. *Raij Hist. Pl.* 1442. hujus exemplar à D<sup>no</sup> *Alexandro Brown* accepimus.
- Palma-pinus s. Conifera *Advers.* 450. *J B. Tom.* 1. 398. Palma conifera ex *Guineâ* squamis ad pediculum conversis *C B P.* 510.
- Palma conifera squamis sursùm conversis *C B P. ibid.* Fructus peregrinus Abiegnæ nuci persimilis *Clus. exot. lib. 2. cap. 3. J B. Tom.* 1. 398.
- Palma-pinus maritima *Barbadensis* & *Jamaicensis*, fructu orbiculari pomiformi, squamato putamine tecto. *Sphæricæ rotunditatis est hujus fructus uncias ferè novem ambitu comprehendens, triplici cortice gaudens primum habet externum pulvinatum viridem Juglandis crassitudine superantem, tuberculis squamosis levitèr mucronatis undique oblitum; Alterum substratum corticem habebat durum tenuissimum, pænè instar putaminis Ovi, fuscâ tectum epidermide lævem & perpolitum; Tertium autem nigricantem crassiorem solidum & rugosum; Ossiculum Juglandis nigræ Virginianæ magnitudine & sulcis insignitum in se continere per fructus sedem quæ nonnihil aperta & hians erat, perhibere licebat.* An Fructus peregrinus squamosus tertius *Clus. exot. lib. 2. cap. 3. Perrarum hunc Fructum externo cortice denudatum habuimus ex Insulâ Barbados nomine The Sea-Apple (i. e.) Pomum maritimum: Quem exindè admirabilem ejus externum involucrum adhuc retinentem, Insulâ Jamaicæ à se collectum, amicè nobis ostendebat D. D. Hans Sloane.*
- Palma-pinus Amygdaloides ex *Insulâ Barbadosi.* Amygdalus *Granatensis de Laet. Ind. Occid. lib. 9. cap. 4. Jonston Dendrolog. Tab.* 42. Amygdala *Guianensis Clus. exot. lib. 2. cap. 6. àn Palma Amygdaloides Virginiana. P B P.* 361.
- Palma-pinus peregrina coccifera, nucibus amplis Pyritormibus, furculis velut in racemum rariorem appensis. *Mus. Cortenian.*
- PANAX Pastinacæ folio, àn *Syriacum Theophrasti. C B P.* 156. Item Panax costinum ejusd. *C B P.* ex sententiâ Fratris, & D. *Raij Hist. Pl.* 410. Panax Heracleum alterum s. peregrinum *Dodonæi Park. Th.* Itémque Panax Costinum, s. Pseudo-costus *Matthioli ejusd. Sphondylion vel potiùs Pastinacæ Germanicæ affinis Panax vel Pseudo-costus flore luteo J B. Tom.* 3. 156.
- PANICUM *Germanicum* s. paniculâ minore *C B P.* 27. Panicum vulgare *J B. Tom.* 2. 440.
- Panicum *Indicum* paniculâ villosâ *Parkinsono Raij Hist. Pl.* 1247. Panicum spicâ divulsâ *J B. T.* 2. 440. Panicum *Italicum* s. paniculâ majore *C B P.* 27.
- Panicum *Indicum* spicâ longissimâ *C B P.* Panicum *Americanum* sesquipedali spicâ *J B. Tom.* 2. 442.
- PAPAYER vulgare cujus capitula foraminibus hiant, semine incano *ἀγρότιον Dioscoridi C B P.* 170. Papaver capitatum vulgare s. spontaneum simplex semine incano, vigens in segetibus *Moris. Hist.* 2. 274.
- Papaver sativum *J B. T.* 3. 390. *Hujus aliquammultæ sunt seu species seu varietates, quæ ad duo genera ab Eruditiss. Raio reducuntur; Alterum*
- Papaver sativum petalis circâ margines æqualibus, unguibus coloratis, capitulis clausis *Raij Hist. Pl.* 853. Hoc genus vel est semine albo (*Amfleon Bengalensibus dictum*) vel semine nigro, quorum utrumque tum flores colore, tum petalorum multiplicitate variat. Alterum, Papaver



Papaver sativum petalis laciniatis unguibus albis, capitibus ad opercula per maturitatem foraminulis hiantibus *Raij ibid.* Hoc etiam genus semine albo vel nigro, floribus simplicibus vel plenis, utrisque vel albis vel purpureis, vel pulchrè rubentibus, & penè coccineis, vel ex diversis coloribus mixtis variat.

Papaver erraticum majus *σολας Dioscoride Theophrasto & Plinio C B P.* 171. Papaver erraticum rubrum campestre *J B. Tom. 3.* 395. Papaver laciniato folio, capitulo breviori glabro annuum, Rhoëas dictum *Raij Synops.* 121. variat florum unguibus albis, flore candido, flore phœniceo pleno, & flore pleno unguibus albis. Papaver laciniato folio, capitulo hispido longiore *Raij Synops.* Argemone capitulo longiore spinoso *J B. Tom. 3.* 396. Papaver Argemone dictum capitulo tenuiore longiore hirsuto *Morif. Hist. 2.* 278.

Papaver laciniato folio, capitulo hispido rotundiore. *Raij Synops.* Argemone capitulo breviori hispido. *J B.* Argemone capitulo torulo *Ger. emac.*

Papaver laciniato folio, capitulo longiore glabro *Raij ibid.* Argemone capitulo longiore glabro *Morif.*

Papaver luteum perenne laciniato folio *Cambro-britannicum Raij Synops.* Papaver erraticum *Pyrænaicum* flore flavo *C B P.* 171. Argemone *Cambro-britannica* lutea *Park. Th.*

Papaver Argemone dictum flore flavo perpusillum *Phytogr. Tab. 247. fig. 3.* Cui flos more omnium hujus farinæ quatuor solummodo petalis constructus est, quantumvis per errorem à pictore quinque foliolis in Icone exhibetur. Argemone Alpina *Coriandri folio C B P.* 172. Argemone lutea *Ponæ.*

Papaver spinosum *J B. T. 3.* 397. Papaver spinos. *American. Park. Th.* Papaver spinosum luteum foliis albis venis notatis *Morif. Hist. 2.* 277. Ficus infernalis *Ita-lorum*, àn Glaucium *Dioscoridis Raij Hist. Pl.* 856. Chicallotl *Mexicensibus s. Spina Hernand.* apud *Recc.* 215. The Purging-Chistle (i. e.) Carduus purgans nostratibus dicta.

PAP A V E R corniculatum luteum *J B. Tom. 3.* 398. Papaver corniculatum luteum *νεογπτες Dioscoridis & Theophrasti sylvestr. Ceratites Plinii C B P.* 171.

Papaver corniculatum phoeniceum glabrum & hirsutum *C B P.* Papaver corniculat. rubrum *Park.*

Papaver corniculatum rubrum minus ex Insulis *Fortunatis.* Mahopola *Insulanis* dictum.

Papaver corniculatum violaceum *J B. T. 3.* 399. Papaver corniculatum flore violaceo *Park. Th.*

Papaver corniculatum Hormini folio nostrum *Raij Hist. Pl. append.* 1877.

Papaver corniculatum luteum, Chelidonium dictum *Raij Synops.* 122. Chelidonium majus vulgare *C B P.* 144. Chelidonia *J B. Tom. 3.* 482.

Papaver corniculatum Chelidonia dictum foliis & floribus laciniatis. Chelidonium folio laciniato *J B. Tom. 3.* 483. Chelidonium majus, foliis quernis *C B P.* 144. Chelidonium majus laciniato flore, & foliis quernis *Morif. Hist. 2.* 257.

Papav. corniculat. Chelidonia dict. flore & foliis minutissimè laciniatis. Chelidonium majus floribus & foliis tenuissimè dissectis *Fumariæ Myconi* instar *Morif. Hist. 2.* 258. Chelidonium majus flore & foliis minutissimè laciniatis *H R P.* 49. Othonna vera *Dioscoridis Zanon. Hist. Bot.* 154. Papaver



- Papaver corniculatum s. Chelidonium humile, cauliculo nudo, flore albo stellato. Chelidonium maximum ἀκωλον Canadense Cornuti. 212. Park. Th. Item Ranunculus Virginienſis albus ejusd. Park. Th. 327. Primo vere erumpit Flos, & ſubindè Folium unum vel alterum Fici more incifum, Tota planta luteo turgēt ſucco, ad tingendum apto, calida eſt & amara; Pocan Indigenis dicta & à Veterinariis noſtratibus haud inepte Curcuma vocatur.
- Papaver corniculatum acre quinquefolium Americanum flore carneo majus ſpinolum. Pentaphyllum peregrinum ſiliquoſum bivalve majus Morif. Hiſt. 2. 288. Tareriaya Braſilienſibus; àn Fraxinella ſiliquoſa; àn quinquefolium folio (flore) Caprifolii Marcgr. 33. Sinapiſtrum Ægyptium heptaphyllum flore carneo majus ſpinolum. H. Leyd. 564.
- Papaver corniculatum acre quinquefolium Ægyptiacum minus flore carneo non ſpinolum. Sinapiſtrum Indicum pentaphyllum flore carneo minus non ſpinolum H. Leyd. ibid. Pentaphyll. peregrin. ſiliquof. bivalve minus Morif. ibid. Quinquefolium Lupini folio C B P. 326. Item Lupinus peregrinus pentaphyllos ejusd. 348. Pentaphyllum ſiliquof. Arabicum Park. Th. Quinquefolium ſiliquoſum Pr. Alpin. exot. 322. Lupinus ſylveſtris Ægyptius Veſling. Obſ. in Alpin. 69. Caara-Veela H. Malab. Part. 9. Tab. 24.
- Papaver corniculatum acre triphyllon Indicum floribus luteis viſcoſum, Ranmaniffa Cochinenſibus dictum. Sinapiſtrum Indicum triphyllum H. Leyd. ibid. Micambe Angolenſibus (ut videtur ex Africâ in Braſiliam translata) Marcgr. 10. Aria-Veela H. Malab. Part. 9. Tab. 23. An Lotus ſylveſtris ex Codice Cæſareo ꝑ B. T. 2. 373. An Zazalic-Coapitlanenſis s. Trifolium ſpicatum Mexicanum Hernandez. apud Recc. 284. Fortè etiam Memeya de Tepoztlan ejusd. apud eund. 384.
- Papaver corniculatum acre triphyllon Luſitanicum anguſtiſſimis foliis, flore rubro. Sinapiſtrum Luſitanic triphyllum flore rubro ſiliquis corniculatis H. Leyd. 566. Trifolium Luſitanicum corniculatum flore rubro Park. Th. 1103. & 1687. Fortè etiam Xoxonazatic Nov. Hiſp Terent. apud Recc. 440.
- Papaver corniculatum acre triphyllon Indicum tenuiſſimis foliis è Maderaspatan. Sinapiſtrum tale Phytogr. Tab. 224. fig. 3.
- Papaver corniculatum acre diphyllon Indicum radiatis ſiliquis ad ſinus foliorum ex adverſo binis. Sinapiſtrum tale Phytogr. Tab. 60. fig. 5. Aſclepiadi affinis ſiliquis foliaceis pappis deſtitutis noſtra D. Raij Hiſt. Pl. append. 1903.
- Papaver corniculatum acre diphyllon Indicum, ſiliquis ad alas ex uno pediculo binis. Sinapiſtrum tale Phytogr. Tab. 119. fig. 7. Cupa-Veela H. Malab. Part. 9. Tab. 33.
- Papaver corniculatum acre ſingulari folio Malabaricum. Tſjeru-Veela H. Malab. Part. 9. Tab. 34.

PARIETARIA latifolia major & procerior. Hort. Med. Chelſeiani.

Parietaria minor Ocimi folio C B P. 121. Parietaria exigua vel prima Tragi. lib. 1. 193.

Parietaria Sicula Alſines folio Boccon. de Pl. Sicul. 47.

Parietariæ affinis Cynocrambe dicta floribus muſcoſis. Alſine Parietariæ foliis, C B. phytopin. 481. Item Cynocrambe Dioſcoridis ejusd. C B. Pinac. 122. Alſine fœtida Fab. Column. Dioſcoridea ꝑ B. Tom. 3. 365. Alſines facie Planta nova Column. Phytobasan. Part. 2. 28. Cynocrambe legitima Ponæ, Cynocrambe legitima Dioſcoridis Park. Th.

Parietariæ



Parietariæ similis Herba *Indiæ Orientalis*.

**PARONYCHIA** Myosotis major, Veronicæ folio loculo sublongo. Bursa pastoris major hirsuta, capsula oblongâ *Morif. Hist.* 2. 305. Bursa pastoris major loculo oblongo *C B P.* 108. Bursæ pastoris sublongo loculo affinis pulchra planta *J B. T.* 2. 938. Thlaspi Veronicæ folio. *Park. Th.* Draba minima muralis discoides *Column. ecphr.* 274.

Paronychia Myosotis minor caule aphylo. Paronychia vulgaris Alsines folio *Park. Th.* Bursa pastoris minor loculo oblongo *C B P.* *Morif. Hist.* 305. Item Bursa pastoris minor foliis trifidis, aliquando multifidis, florum petalis bifidis, loculo oblongo *ejusd.* 306. Bursa pastoria minima oblongis filiquis verna, loculo oblongo. *J B. Tom.* 2. 937.

Paronychia Myosotis montana, caule folioso. Bursa pastoris Alpina hirsuta *C B P.* 108. & *Prodr.* 51. Bursa pastoris Alpina minor hirsuta, foliis infimis integris, ad genicula verò crenatis, loculo oblongo. *Morif. Hist.* 2. 306.

Paronychia Myosotis *Virginiana*, foliis subrotundis. *Phytogr. Tab.* 51. fig. 5. Nasturtium Myosotis insipidum *Banist.* à D. Bobart communicatum. à Paronychia Buglossæ folio. *ejusd. Cat. Stirp. Virgin.*

Paronychia Myosotis lutea, angustis foliis ad terram confertissimis, stelliformiter aggestis. Sedum Alpinum hirsutum luteum *C B P.* 284. Sedum petræum montanum luteum. *Park. Th.* Phyllon Thelygonon *Dalechamptio J B. Tom.* 3. 762. Leucoium luteum aizoides montanum *Column. ecphr. Part. alter.* 62.

**PASSERINA** Linariæ folio *Adversarior.* Passerina *Lobelio J B. Tom.* 3. 455. Lithospermum Linariæ folio *Monspeliacum C B P.* Linum foliis asperis umbellatum luteum *D. Magnol. Bot. Monsp.* 164.

Passerina *Tragi Camerar. Hort. Medic.* 118. Lithospermum Linariæ folio *Germanicum. C B P.* 259. Thymelæa Linariæ folio vulgaris *Turnefort. Elem. Botan. T. I.* 468.

Passerina minor Saxatilis *quibusdam*, Chamælinum stellatum. *Park. Th.* Linum minimum stellatum. *C B P.* 214. & in *Prodr.*

**PASSIFLORA** *Frid. Cæs. in Tab. Phytosophic.* apud *Hernand.* 935. Clematis Passiflora pentaphylla, flore cæruleo punctato. *Munting. Prax.* 421. Clematis pentaphylla flore roseo clavato *Morif. Hist.* 2. 6. Murucua prima *Pison.* 247. Murucua secunda s. maliformis *Marcgravia Raij Hist.* 650. Cucumis Flos Passionis dictus pentaphyllus, flore clavato *H. Leyd.* 205. Clematis quinque folia *Americana, s. Flos Passionis Ic. Roberti.*

Eadem foliis latioribus citiùs florens. Cucumis Flos Passionis dictus pentaphyllus foliis latioribus *H. Leyd.* 205. Floret paulò maturiùs superiori, eam ob causam nostratibus magis expetitur.

Passiflora foliis crenatis tripartitò divisis. Clematis trifolia, flore roseo clavato *C B P.* 301. Granadilla *Hispanis*, Flos Passionis *Ital.* *Column. Not. in Hernand.* 888. Clematis Passiflora, flore roseo triphylla. *Munting. Prax.* 423. Clematis Passionalis triphyllus, flore roseo *Morif. Hist.* 2. 7. Maracoc s. Clematis *Virginiana Park.* Murucua tertia *Pison.* 249. Murucua tertia. Maliformis alia *Marcgravia. Raij Hist.* 649. Cucumis Flos Passionis dictus trifolius, flore clavato, *H. Leyd.* 205.



Maracot *Indicum Aldini*. *H. Farnes.* 50. Balsamina *Indica* repens pomifera *Francisc. de Honuphriis.* pag. 5.

Passiflora Hepaticæ nobilis folio parvo non crenato, flore ex luteo viridante. Clematis Passionalis triphyllus, flore luteo *Moris. Hist.* 6. Clematis Passiflora, flore luteo *Muntingii Prax.* 422. Granadilla pumila flore parvo luteo *D. Alex. Balam. Cat. H. Pat. à Turre.* 55. Cucumis Flos Passionis dictus, hederaceo folio, flore ex luteo viridanti. *H. Leyd.* 205. Murucuiæ species foliis Hederæ scandentis *Marcgravius Raij Hist.* 650. Clematis s. Flos Passionalis flore viridi. *HRP.* Clematis s. Flos Passionis, flore luteo *Bellucci H. Pisan.* 18.

Passiflora non crenata *Americana* triphylla ex *Codice Bentingiano Phytogr. Tab.* 212. fig. 1. àn Clematis Passionalis flore albo *Schol. Bot.* 137. àn Clematidis *Indica* flore minimo pallido *Plumier. Tab.* 88.

Passifloræ affinis Hederæ folio *Americana*, Nhandir-Oba *Brasilienſium Piſonis Phytogr. Tab.* 210. fig. 4. àn Planta scandens hederaceis foliis *Zeylanic. Breyn. Ephem. Germ. Ann.* 4 & 5. *Obs.* 13. Fortè Hederæ foliis *Guineensis* fruticosa scandens capreolis *H. Beaum.* 24. Clematidis *Indica* folio hederaceo major, fructu Olivæ formi *Carol. Plumier. Tab.* 84. *Juy-But* nostratibus dicta.

Passiflora s. Flos Passionis *Curassavicus*, folio glabro trilobato & angusto, flore flavesciente omnium minimo. *Phytogr. Tab.* 210. fig. 3. An Flos Passionis trifido folio, flore minimo pentapetalo viridi, fructu minimo nigro molli *Breyn. Prodr.* 2. 47. Clematis s. Flos Passionalis Hederæ folio floribus parvis herbaceis, fructu minimo (quando maturus) nigro *Banist. Cat. Stirp. Virgin. apud Raij Hist. app.*

Passiflora *Americana* folio bisulco, fructu minimo per maturitatem nigricante. Ferum equinum Volubile *Munting.* Coanenepilli s. Contrayerva *Hernandez. apud Recc.* 301.

Passiflora Naviformibus foliis *Americana*. Clematidis (fortè) *Indica* flore puniceo, folio lunato *Plumier Tab.* 87. Tzinacanatlapatli *Nov. Hispaniæ Terentii* apud *Recc.* 435.

Passiflora arborea Laurinis foliis *Americana Phytogr. Tab.* 211. fig. 3. Murucuiæ 4. s. Pyriformis altera *Marcgravius Raij Hist.* 650. Clematidis *Indica* fructu Citriformi foliis oblongis *Plumier. Tab.* 80. Fortè etiam Quauh-chichec-patlis *Novæ Hispaniæ Terentii* apud *Reccum* 400. Hujus fructus nostratibus *Uinegar-Pear* vulgò.

Passiflora *Americana* breviori folio & flore minore. Murucuiæ *Brasilienſium* 5. s. Murucuiæ-miri *Piſonis. lib.* 4.c.60. Clematidis *Indica* alia flore minore pallido *Plumier. Tab.* 89.

Passiflora Laurinis foliis polyanthos *Americana*. Clematidis *Indica* polyanthos odoratissima *Plumier. Tab.* 90.

Passiflora Vesicaria Hederacea, foliis lanuginosis odore tetro, filamentis florum ex albo & purpureo variegatis. *Phytogr. Tab.* 104. fig. 1. Hedera Murucuiæ species vesicaria lanuginosa, odoris gravis *Marcgr.* 73. Flos Passionis *Curassavicus* Hederæ hirsuto folio, flore purpureo variegato *PBP.* Clematidis *Indica* hirsuta foetida *Caroli Plumier. Tab.* 86.

Passiflora Vesicaria, lanuginoso longiore folio, flore candido. Flos Passionis *Curassavicus* Hederæ hirsuto folio, flore albo. *PBP.* Flos Passionis Althææ folio lanuginoso longiore



longiore foetidus, flore decapetalo, & filamentis niveis, fructu vesicario *Breyn. Prodr. 2.*

**PASSIFLORA** spuria Bryonoides quinquifido folio *Malabarensis*. Modecca *H. Malab. part. 8. Tab. 20.* Flos Passionis spurius *Malabaricus* quinquifido folio sive spinosus, fructu rotundo *Breyn. Prodr. 2. 48.*

*Passiflora* spuria Bryonoides *Malabarensis* folio trifido & quinquifido. Pal-Modecca s. Modecca altera *H. Malab. part. 8.* Flos Passionis spurius *Malabaricus* quinquifido folio, fructu rotundo secundus *Breyn. ibid.*

*Passiflora* spuria Bryonoides *Malabarensis* foliis variè scissis, fructu diverso. Flos Passionis spurius *Malabaricus* tertius, fructu vario *Breyn. Prodr. 2. 49.* Motta Modecca *H. Malab. part. 8. Tab. 22.* Huic generi Plantarum referatur fortè Cocoztamatl s. Tamatli luteum, vel Urinaria mirabilis *Hernand. apud Recc. 118.* *Observandum est quod folia omnium specierum Modeccæ & unius cujusque species quam maximè inter se invicem differant, in uno enim eodemque ramo invenies quæ non omninò, & quæ tèr quater, quinquiesve sunt divisa, Ita ut solum discrimen sit in floribus, & fructibus, ut rectè monet Commelinus Not. supr. loc.*

**PASTINACA** tenuifolia sylvestris lucida *Moris. Umbel. 31. & 65.* Pastinaca tenuifolia marina foliis obscure vitentibus & quasi lucidis. *Bot. Monsp. 199.*

*Pastinaca* tenuifolia sylvestr. radice & umbellâ luteâ *Moris. Umbel. HRP. 137.*

*Pastinaca* tenuifolia *Cretica* radiis Umbellæ Gingidii longioribus. *Moris. Umbel. Raij Hist. 465.*

*Pastinaca* sylvestris tenuifolia Umbellâ majore *CBP.* Pastin. sylv. Daucoides *Apula Column. Raij Hist. Pl. 466.*

**PAVATE** *Park. Th. Christoph. Acost. Arom. cap. 14.* additque Vasaveli etiam nuncupari. Pavetta s. Malleamothe *H. Malab. part. 5. Tab. 10.* Arbor *Malabarensium* fructu Lentisci *CBP. & Joan. Nieuhof. Itinerar. fol. 167. vid. Phytogr. Tab. 147. fig. 1.*

**PEDICULARIS** *Virginiana* Filicis folio, flore ochroleuco.

*Pedicularis* Alpina major albida, radice Oenantes, s. Asphodeli. *Pedicularis* bulbosa *J B. Tom. 3. 438.* Filipendula montana flore *Pediculariæ CBP. 163.*

• *Pedicularis Æthiopica* Rutæ caninæ aspero & valdè fragili folio *Phytogr. Tab. 310. fig. 2.* àn Euphrasia aspero & valdè fragili folio, montana perennis *Grisleii. Virid. Lusit.* Antirrhinum album ferrato folio *J B. T. 3. 437.* pariter ac Crista Galli spicata flore luteo magno *Messanensis Raij* huic nostræ accenseri debent.

*Pedicularis* s. Cristæ Galli affinis *Virginiana*, Ajugæ multifido folio, apicibus coccineis, floribus pallidis in spicam congestis. *Phytogr. Tab. 102. fig. 5.* Euphrasia *Virginiana* comis coccineis flore albido, thecâ foliaceâ incluso *Banisteri.* Fortè etiam Digitalis parva comis coccineis, foliis tenuius dissectis, thecis florum foliaceis ejusd. *Cat. Stirp. Virginian.*

*Pediculari* congener Alpina, Hederæ terrestris facie, utriculis amplis vasculum seminale cludentibus. Asarina *Lobelio Hist. Lugd. 915.* Hedera saxatilis magno flore. *CBP. 306.* Huc spectat Kakapu *H. Malab. Part. 9. Tab. 53.*

*Buchan  
african*

*Barkia  
coccinea*



PEE-PONNAGAM *H. Malab. Part. 5. Tab. 24.* Arbuscula baccifera *Indica* fructu cum quadripartito in vertice umbilico, quadricapsulari. *Raij Hist. Pl. 1495.*

PENTABLASTOS s. Quinque-Virgula Arbor *Barbadensis*. Five Sprig-Tree *nostratibus* dicta.

PENTAPHYLLOIDES fruticosum Alpinum, argenteis foliis, flore purpureo, trifoliatum *Phytogr. Tab. 210. fig. 6.* Trifolium argenteum Alpinum *Pona. Ital.* Trifolium Alpinum argenteum Persici flore *C B P.*

Pentaphylloides majus erectum flore luteo ternis foliis *Fragariæ* instar hirsutis. *Morif. Hist. 193.* Trifolium *Fragariæ* foliis flore luteo *Berardi. H. Jonquet.*

Pentaphylloides minus erectum luteo flore, foliis *Fragariæ* ternis. Trifolium *Norvegicum* majus surrectum, foliis crenatis flore luteo non descript. *Barthol. Act. Hafn. Ann. 1673. Obs. 130.* An Quinquefolium Alpinum *Fragariæ* facie *Schol. Botan. 232.*

Pentaphylloides minus repens, flore albo, foliis *Fragariæ* ternis. *Fragaria sterilis C B P. 327.* *Fragaria* non fragifera, vel non vesca *J B. T. 2. 395.*

Pentaphylloides fruticosum minimum procumbens, flore luteo, foliis sericeis *Fragariæ* ternis. *Phytogr. Tab. 212. fig. 3.* *Fragariæ* affinis sericea incana. *C B P. 327.* & in *Prodr. 139.* Item *Fragaria* flore luteo *ejusd. in Pinac. ibid.* Incana Pentaphylli effigie, àn *Leucas Dioscoridis Adversarior.* Pentaphylli effigies *Leucas* quibusd. *J B. T. 2. 404.* *Fragariæ* affinis Planta non scripta *Sibbald. Scot. Illustrat. Tab. 6. No. 1.* Pentaphylloides pumila foliis ternis ad extremitates trifidis *Raij Synops. 91.*

Pentaphylloides majus erectum flore albo foliis alatis & hirsutis *Morif. Hist. 192.*

Pentaphylloides erectum *J B. T. 2. 402.* Quinquefolium *Fragiferum C B P. 326.*

Pentaphyllum rectum *Agrimoniæ* fol. *Wheleri Itiner.* Pentaphylloides *Cambro-britannicum Ulmarie* foliis *Bobarti.*

Pentaphylloides minus supinum s. procumbens foliis alatis *Potentillæ* facie. Pentaphylloides supinum *J B. T. 2. 402.* Quinquefolio *Fragifero* adfinis *C B P. 326.*

Pentaphylloides minus supinum s. procumbens foliis alatis argenteis & serratis flore luteo *Morif. Hist. 193.* *Potentilla* s. *Argentina J B. T. 2. 406.* Anserina vulgò.

Pentaphylloides rectum fruticosum *Eboracense Morif. ibid.* Pentaphylloides fruticosum *Raij Hist. 616.*

Pentaphylloides erectum luteum Quinquefolium *Alchimillæ Alpinæ* effigie, foliis summo apice tridentatis. *Phytogr. Tab. 210. fig. 5.* àn Pentaphyllum rectum *J B. Tom. 2. 398.*

PENTAPHYLLUM vel potius Heptaphyllum flore rubro *J B. T. 2. 401.* Quinquefolium palustre rubrum *C B P.*

Pentaphyllum palustre rubrum crassis & villosis foliis *Suecicum & Hibernicum Phytogr. 212. fig. 2.* Hujus Exemplar ex *Sueviâ* sibi allatum nobis dedit Reverend. *D. Stonestreet.* Quod etiam Ornatissimus Vir *D. Gideon Bonavert* ex *Hiberniâ* (quâ invenit) rediens, nobis amicissimè communicavit.

Pentaphyllum s. potius Heptaphyllum majus luteum montanum flore majore *Morif. Hist. 188.* Pentaphyllum rectum majus *J B. T. 2. 400.* Quinquefolium rectum luteum. *C B P.* Pentaphyllum



- Pentaphyllum s. Heptaphyllum majus erectum flore amplo pallidè luteo. Pentaphyllum s. Heptaphyllum albo-pallidum s. flore ochroleuco, petalis singulis cordatis *Moris. Hist.* 188. Quinquefolium rectum subluteum. *C B P.* 325.
- Pentaphyllum s. Heptaphyllum majus erectum tenuifolium, oris elegantè & profundè ferratis, flore minore. An Quinquefolium Canadense erectum *Moris. Præ-lud.* 168. & 298. fortè etiam Quinquefolium rectum luteum *Monspeliens. Raij Hist.* 613.
- Pentaphyllum s. Heptaphyllum majus erectum, foliis hirsutie pubescentibus, flore luteo. Quinquefolium montanum luteum erectum hirsutum *C B P.* 325? Pentaphyllum rectum majus tenuius, villosius, *Pannonicum.* *J B. Tom.* 2. 401?
- Pentaphyllum erectum foliis profundè sectis, subtùs argenteis, flore luteo *J B. T.* 2. 401. Quinquefolium erectum folio argenteo *C B P.* 325. Hujus & major varietas datur ut sæpiùs in *Angliâ* nobis occurrit, fortè
- Pentaphylli minoris major species, folio subtùs albicante. *J B. Tom.* 2. lib. 17. fol. 400.
- Pentaphyllum album 1. *Clusii.* *J B. T.* 2. 403. Quinquefolium album majus alterum *C B P.* 325. Pentaphyllum minus rectum subtùs incanum flore albo *Moris. Hist.* 189.
- Pentaphyllum minus erectum hirsutum, flore albo *Moris. ibid.* Quinquefolium album minus alterum *C B P.* Quinquefol. 2. minus flore albo *Clusii. Hist. poster.* 105.
- Pentaphyllum s. Quinquefolium *Pyrænaicum* flore albo, folio Tormentillæ sericeæ. *Schol. Bot.* 231. An Pentaphyllum foliis supernè & infernè incanis *J B. T.* 2. 403. Fortè etiam Pentaphyllum Alpinum argenteum flore albo *Raij Hist. Pl.* 614.
- Pentaphyllum Alpinum minus supinum, foliis tenuioribus, altiùs ferratis glabris, cauculo purpurascete *Phytogr. Tab.* 106. fig. 7. Neminem existimare velim hoc meum idem esse cùm Pentaphylloide supino, cujus Iconem & Historiam *Joan. Bauhinus* exhibet *Tom.* 2. 402. Nam illud etiam jam olim in *Horto Med. Edvardi Morgani* frequens conspeximus, Potentillæ *Fuchsi* propiùs accedit quàm Pentaphyllo, tametsi (ut & nostra) neque incana sit planta, neque repat, sed humi duntaxat diffusa sit. Hujus exemplar amicissimus vir, & apud *Londinenses* Pharmacopœus peritissimus D. *Philippus Schrickensfauchs Germanus* nobis concessit.
- Pentaphyllum minus magis villosum, flore aureo, foliis altiùs ferratis *Moris. Hist.* 190. Quinquefolium minus repens aureum *C B P.* Quinquefolii 4<sup>i</sup>. 2a. Species *Clus. Hist. post.* 106. Pentaphyllum parvum hirsutum *J B. Tom.* 2. 399.
- Pentaphyllum s. Quinquefolium vulgare repens *J B. Tom.* 2. 397. Quinquefol. majus repens. *C B P.*
- Pentaphyllum Alpinum splendens aureo flore *J B. T.* 2. 398. Quinquefolium minus repens Alpinum aureum *C B P.* 325. Pentaphyllum minus incanum Alpinum flore aureo, radículas in terram demittens. *Moris. Hist.* 189.
- Pentaphyllum minus lanuginosum luteum trifoliatum, radículis reptatricibus ex cauliculorum nodis. Pentaphyllum minus molli lanugine pubescens, flore luteo *J B. T.* 2. 399. Quinquefolium repens minus, lanuginosum luteum *C B P.* Quinquefolii 4<sup>i</sup>. 1a. species *Clusii Hist.*
- Pentaphyllum aureum minus sylvaticum nostras, foliis tripartito divisis ex cauliculorum geniculis radicescens; sub exitum Autumni floret hoc Pentaphylli genus. An Quinquefolium Alpinum repens serotinum *Moris. Præ-lud.* 298.



Pentaphyllum minus viride flore aureo tetrapetalo radículas in terram ex geniculis demittens *Moris. Hist.* 190. Tormentilla reptans alata, foliis profundius serratis *D. Plot. Hist. Nat. Oxon. Raij Synops.* 91.

Pentaphyllum aut potiùs Heptaphyllum flore aureo tetrapetalo Tormentilla dicta *Moris. ibid.* Tormentilla sylvestris, & Alpina vulgaris major *C B P.* 326. *Variat interdum flore pentapetalo; & floribus duplici serie petalorum.*

PEPO vulgaris *Raij Hist. Pl.* 639. Cucurbita major rotunda flore luteo folio aspero *C B P.* 312. Cucurbita foliis asperis s. Zucha flore luteo *J B. T.* 2. 218. Bela Schora *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 1.

Pepo *Indicus* compressus maximus *Lobelio Moris. Hist.* 25. Cucurbita aspera folio non fisso, fructu albo maximo sessili *J B. Tom.* 2. 221. Schakeri-Schora *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 2.

Pepo oblongus *C B P.* *Moris. Hist.* 26. Cumbulam *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 3.

Pepo s. Melopepo latus clypeiformis absque capreolis. *Moris. Hist.* 39. Cucurbita clypeiformis s. *Siciliana*, Melopepo latus à nonnullis vocata *J B. T.* 2. 224.

Pepo clypeatus minor *Moris. Hist.* 26. Cucurbita capitata *Tabernæm.* s. Clypeiformis *J B. T.* 2. 225.

Pepo *Virginianus* clypeiformis, torulis & fulcis à pediculo ad umbilicum productis. *Moris. Hist.* 40. *Simuels* nostratibus dictus.

Pepo minor verrucosus *Moris. ibid.* Cucurbita verrucosa. *C B P.* *J B. Tom.* 2. 222. Macock. *vulgò.*

Pepo pyriformis *Moris. ibid.* àn Cucurbita aspera pyriformis parva alba *J B. T.* 2. 223. Cucurbita alba & viridis variegata. à *Turre H. Patav.* 38.

Pepo amarus s. Colocynthis pyriformis *C B P.* 313. Caipa-Schora *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 5.

Pepo rotundus cortice duro lineis striatis, ex albo & viridi maculatis, affecto. Pepo pomiformis *Moris. ibid.* Colocynthis pomiformis cortice maculato *C B P.* 314.

Pepo rotundus Arantii magnitudine, formâ, & colore, cortice duro. Pepo rotundus Arantii formâ *C B P.* 311.

Pepo *Indicus* reticulatus seminibus albis major *H. Leyd.* 482. Cucumis rectiùs Pepo *Ægyptius* reticulatus s. Luffa *Arabum Veslingii.* *Raij Hist. Pl.* 641. Wæthakolu *Zeylanensibus* dicta.

Pepo *Indicus* reticulatus seminibus albis minor *H. Leyd.* Tittawætha *Zeylanensium.*

Pepo *Indicus* reticulatus seminibus nigris minor. *H. Leyd.* 362.

PERFOLIATA annua longioribus foliis *J B. T.* 3. 198. Perfoliata minor ramis inflexis. *C B P.* 277.

Perfoliata Alpina angustifolia major, s. folio anguloso. *C B P.* 277. & in *Prodr.* 129.

Perfoliata Alpina magna longifolia *J B. T.* 3. 199. Perfoliata Alpina angustifolia media quæ 3<sup>a</sup> in *Prodr.* *C B P.* 279. àn Perfoliata longifolia *Dalechampii Hist. Lugd.* 1321.

Perfoliata Alpina angustifolia minor, quæ 4<sup>a</sup> in *Prodr.* *C B P.* *Phytogr. Tab.* 50. *fig.* 5. An Perfoliata minor foliis gramineis *J B. T.* 3. 199.



Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio *CBP. Phytogr. Tab. 50. fig. 6.* Perfoliatum angustifol. montan. *Colum. ecphr. 247.* Auriculæ leporis affinis, Odonitidis lutea *Valerandi & Dalechampii J B. Tom. 3. 201.*

Perfoliata Alpina angustifolia minima *CBP. 277.* vel Bupleurum angustifolium *Pyrænaicum* in *Prodr. descriptum. 129.* àn Seseli *Æthiopicum* parvum foliis gramineis *Andr. Cæsalpin.*

**PERICLYMENUM** hirsutum foliis Quernis ex albo viridi & luteo elegantèr adumbratis *Phytogr. Tab. 213. fig. 1.* Periclymenum perfoliatum folio variegato *D. Maresant. H. Leyd. append. 692.* Periclymen. fol. sinuatis, variegatis & hirsutis *Raij Hist. app. in H. Comptoniano* colitur.

Periclymenum perfoliatum *Virginianum* semper virens & florens. *H. Leyd. 484.* Periclymen. perfoliatum inodorum *ἄνιστον D. Banister.* An Zazapilot-Xochitl *Mexicensibus Hernand. apud Recc. 120.*

Periclymeni similis Myrtifolia Arbor *Maderaspatensis Phytogr. Tab. 211. fig. 4.*

Periclymenum *Americanum* è cujus radice fit Atramentum *Phytogr. Tab. 212. fig. 4.* Lauri facie *Curassavica* è cujus radice Atramentum conficiunt *Americani. P B P. 345.* Pada-vara (fortè) *H. Malab. Part. 7. Tab. 27.*

Periclymenum surrectum Persicæ foliis *Maderaspatanum Phytogr. Tab. 212. fig. 5.* Hujus (fortè) generis est illa Periclymeni species scandens, & in corticibus Arborum radices emittens Itti-Canni *Malabarensibus* dicta. *H. Malab. Part. 7. Tab. 29.*

Periclymenum *Zeylanicum* herbaceum foliis variegatis, diversi-coloribus maculis ornatis *P B P. 363.* Clematis *Indica* folio Persicæ fructu Periclymeni *CBP. 301.* Lignum Colubrinum *Garcia.* Periclymenum *Sinense* Variegatum, flore sanguineo amplo. *Breyn. Prodr. 2. 82.* Tsjudemaram *H. Malab. Part. 6. Tab. 60.* Eka-werija *Zeylanens. Sinensibus* verò Mumu dicta.

Periclymenum herbaceum rectum *Virginianum* Dr. *Tinkars-weed* vulgò vocatum *Phytogr. Tab. 104. fig. 2.*

Periclymenum rectum Androsæmi foliis *Virginianum.*

Periclymenum Alpinum rectum longiori folio molli.

Periclymenum rectum fructu rubro *Park. Th. 1462.* Periclymenum rectum fructu *J B. T. 2. 107.* Chamæcerasus Dumetorum fructu gemino rubro *CBP. 451.* Sub hoc titulo, *Cotonaster Gesneri* apud *Collectaneas Patavinas* Gravissimi Senis *D. D. More* invenimus.

Periclymenum rectum fructu majore gemello singulis pediculis adnato. Periclymenum rectum fructu rubro singulari majore *Park. Th. 1463.* sed perperam, nam geminum obtinet fructum, nisi ex accidenti in unum coalescant ut rectè notat *Cl. Raius Hist. Pl. 1492.* Chamæcerasus *Gesneri* vel Chamæpericlymenum quoddam Alpinum *J B. T. 2. 107.* Chamæcerasus Alpina fructu rubro gemino, duobus punctis notato *CBP. 451.* Xylosteum nonnullis, quasi lignum osseum ob ligni duritiem dicitur.

Periclymenum s. Chamæcerasus *Pyrænaica* Oleæ folio fructu gemino rubro grossulariæ simili. *Schol. Botan. 288.*

Periclymenum rectum fructu cæruleo *J B. T. 2. 106.* Chamæcerasus montana fructu singulari cæruleo. *CBP. ibid.*



*Periclymenum parvum Prutenicum Clusio J B. Tom. 2. 108. Chamæpericlymenum. Park. Th.*

*Periclymenum parvum Brasilianum Alexipharmacum. Ipecacuanha altera Pisonis. 231. Herba Paris Brasiliana polycoccus Raij Hist. Pl. 669.*

*Periclymenum humilius sexatile, folio Aceris ferrato. Chamæcerasus folio Aceris. C B P. 451. Chamæcerasus Montis Generosi Hist. Lugd. 201.*

*Periclymeno recto accedens Arbuscula Virginiana siliquosa. Phytogr. Tab. 103. fig. 3.*

**PERIN-CURIGIL** *H. Malab. Part. 6. Tab. 24. Siliquosa Malabarica pentapetala, filiquis tomentosis. Raij Hist. Pl. 1750. Fortè Oregioella s. Fructus peregrinus 12. Clus. exot. l. 2. c. 16.*

**PERIN-PANEL** *H. Malab. Part. 5. Tab. 15. Frutex Indicus baccifer floribus racemosis, fructu oblongo tetrapyreno. Raij Hist. Pl. 1625.*

**PERSEA** *Græcorum fructu Pyri aut Mali magnitudine, in Perside noxia, vesca in Ægypto. Galen. 2. κατὰ τὸν πρῶτον Allabuch Arabum Avicen. lib. Tract. 2. cap. 22. An Perlea Clusii. Hist. 3? Hujus Persæ specimen curiosè asservatum ab Ornatissimo Viro D. Sherard primò nobis oblatum fuit, cujus folia sunt Pishaminis, aut potius Beneviferæ nostræ admodum similia, & valdè aromatica; ex quo diversum ut arbitror à Lauro Americanâ Aldini hic apponimus; quam solo Valentino regno unicam Arborem vidit Cl. Clusius. in Monasterio D. Virginis cui cognomen de Jesu, primo ab urbe Valentiâ lapide, ex Americâ ut ferebatur eò delatam.*

*Persæ Arboris similis Indiæ Orientalis.*

**PERSICARIA** *major amphibia radice perenni. Persicaria Salicis folio perennis H. Leyd. 488. Patamogeiton Salicis folio C B P. 193. Potamogiton s. Fontalis Persicariæ foliis J B. T. 3. 777. Persicaria longissimo & angusto folio. s. Persicar. foliis Salicinis Merrett. Plin. 93. An Persicaria acida peculiaris Cat. Altdorf.*

*Persicaria mitis maculis ferrum equinum referentibus Schol. Botan. 7.*

*Persicaria minor C B P. 101. Persicaria pusilla repens Lobel. Ger. emac. Park. Th. &c.*

*Persicaria fruticosa Virginiana maculosa flore carneo Park. Th. 857.*

*Persicaria Americana angustiori folio hirsuta, floribus albis. Potinzoba Brasiliensium. s. Persicaria Americana Pisonis. 221. Pulgera Lusitanis.*

*Persicaria Maderaspatana longiore folio hirsuta Phytogr. Tab. 210. fig. 7. Fortè Bellutta-Modela-muccu H. Malab. Part. 10. An potius Schovanna-mudela-muccu ejusd. H. Malab. Part. 12. Tab. 77.*

**PETASITES** *albus anguloso folio. J B. T. 3. 568. Petasites minor C B P. 197.*

*Petasites minor folio Tussilaginis H R B. Phytogr. Tab. 212. fig. 7. Petasites minor alter Tussilaginis folio. H R P. 139.*

**PEUCEDANUM** *Germanicum C B P. 159. Peucedanum minus Germanicum J B. T. 3. 36.*

*Peucedanum majus Italicum C B P. J B. Park. Raij. Moris. &c.*

*Peucedanum minus foliis lobatis angustis Moris. Præ lud. 156. & 293. Peucedanum Gallicum, foliis rarioribus & brevioribus H R P. 139.*

Peucedanum



Peucedanum caule tortuoso Fœniculi foliis, umbellâ globosâ. *Schol. Bot.* 171.

Peucedani folio Planta *Maderensis*. An Planta fruticescens *Africana* perrara foliis Peucedani floribus conglomeratis Herbæ castæ *Americanæ* nonnihil similibus *Breyn. Fascicul. Rarior.* 25.

PHALANGIUM *Allobrogicum* magno flore Lili. *Morif. Hist.* 2. 333. Phalang. fl. Lili *J B. T.* 2. 636.

Phalangium pulchrius non ramosum *J B. T.* 2. 635. Phalang. parvo flore non ramosum *C B P.* 29.

Phalangium parvo flore ramosum *C B P.* Phalang. parvo flore, quibusd. ramosius *J B. ibid.*

Phalangium *Americanum* ramosum floribus rubris & cæruleis. *D. Banist. Cat. Virgin.*

Phalangium ramos. floribus albis ad fundum viridibus *Banist.*

Phalangium parvum non ramosum floribus albis ad caulem spicatum sessilibus. *Banister. ibidem.*

Phalangium parvo flore ramosum, foliis fistulosis annum *H. Leyd.* 490. Phalangium *Cretæ Salonenfis Adversarior.* Asphodelus minor folio fistuloso *J B. T.* 2. 631.

Phalangium album ramosum minimum gramineis foliis ex *Arabia felice. Phytogr. Tab.* 311. fig. 1. à D<sup>no</sup> *Alexandro Brown* accepimus.

PHALARIS major semine nigro *C B P.* 28. *J B. Tom.* 2. 443.

Phalaris major distachyophoros, ab eodem exortu spicâ gemellâ.

Phalaris altitudine bicubitalis, spicâ prolixâ graciliori. An Phalaris bulbosa semine albo perennis *Park. Th.* 1163.

PHASEOLUS vulgaris *Park. Th.* Smilax hortensis *J B. T.* 2. 255. Phaseolus albus *Ger.*

Phaseolus *Americanus* vulgari similis fructu majore albo, circa hilum valdè sinuato. Smilax hortensis s. Phaseolus major *C B P.* 339. *The Dutch Kidney-Bean.*

Phaseolus peregrinus albus, fructu minore compresso. Smilax hortensis minor *C B P.*

Phaseolus peregrinus Hortensi affinis, fructu tumidiore minore niveo *C B P.* 340.

Phaseolus peregrinus secundus s. Phaseol. de *Guatemala Clus. Hist.* 2. 222. *The Egg Bean* nostratibus. Phaseolus hortensis fructu albo minore Oviformi Veneris dictus *Hofm. Cat. Altd.*

Phaseolus peregrinus fructu tumidiore minore versicolore *Morif. Hist.* 2. 69.

Phaseolus tumidus minimus niveus, siliquâ brevi *Virginianus Raij Hist. Pl.* 885.

Phaseolus *American.* Hortensi affinis fructu minore rubro *Callavance Jamaicensibus* dictus.

Phaseolus niger *J B. T.* 2. 258. Phaseolus *Æthiopicus* lobis flavescentibus, fructu nigro *C B P.* 341. Phaseolus peregrinus 14<sup>us</sup> *Clus Hist. poster.* 226.

Phaseolus nigricans eleatur hylo prominente *J B. Tom.* 260.

Phaseolus puniceo flore *Cornuti* 184. Phaseolus *Indicus* flore coccineo s. puniceo *Morif. Hist.* 2. 69. Phaseolus flore coccineo *Park Th.* fructu purpureo nigris ductibus & lituris vario.

Idem floribus & fructu candidissimis. à D<sup>no</sup> *Gidley* primò accepimus.

Phaseolus minor *Americanus* lobis & fructu exalbidis purpurascens lituris insignitis.



- Phaseolus minor ex *Guineâ*, semine spadiceo sanguineis guttis maculato.
- Phaseolus vulgaris *Italicus* humilis s. minor albus cum Orbita nigricante *J.B. T. 2. 258.* Smilax filiquâ fursùm rigente, vel Phaseolus parvus *Italicus C B P. 339.*
- Phaseolus *Indicus* fructu striato albo minore nigra maculâ insignito. Phaseolus niveus minor, circâ hilum nigrâ maculâ insignitus, *J.B. Tom. 2. 260.* Phaseolus peregrinus minore fructu albo, nigrâ maculâ insignito *C B P. 340.* Phaseolus peregrinus 4<sup>us</sup> *Clus. Hist. post. 224.* Bonavische quibusdam dictus, sed perperam.
- Phaseolus *Indicus* flore amplo cæruleo siliquis erectis gemellis, fructu parvo rufescente. Paërou *H. Malab. Part. 8. Tab. 41.* àn Phaseol. minim. fructu rubr. siliquis longiss. erectis. *Morif.*
- Phaseolus minimus fructu viridi exiguo ovato. *Morif. Hist. 2. 70.* Fortè Putaja Paëru *H. Malab. Part. 8. Tab. 37.*
- Phaseolus peregrinus Anagyridis fructui similis colore rubescente *C B P. 340.* Smilax hortensis s. Phaseolus Anagyridi similis ferè, colore rubescente *J.B. Tom. 2. 261.* Phaseolus peregrinus tertius *Clus. Hist.*
- Phaseolus peregrinus Anagyridi fructui similis ex nigro subvirescens *C B P.* Phaseolus Laburni fructu, ex nigro subvirescente, s. *Ægyptius* flore luteo *J.B. T. 2. 262.*
- Phaseolus subhirsutus *Americanus* exitiosus, siliquis longis cauliculis insidentibus. *Phytogr. Tab. 214. fig. 2.* Fortè Guaiana-Timbo *Brasilienfibus Pison. 249.* *Barbadosibus Kil-wench* & quibusdam *Fuddle-fish.* Nuncupatur.
- Phaseolus erectus hirsutus caule quinquangulari auriculato flore viridi lutescente filiquâ in rostrum incurvam desinente. Mungo s. Phaseolus Orthocaulis *Column. Annotat. in res Medic. Nov. Hisp. Recc. 887.* Fructus niger Coriandro similis *C B P. 413.* è *Carolinâ* accepimus.
- Phaseolus hirsutus flexicaulis, Mungo affinis è *Maderaspatan*, caule tereti; sub nomine *Coliæ* recepi.
- Phaseolus *Americanus* Mungo affinis flexicaulis, flore obsolete-purpureo, siliquis copulatis in summitate aduncis. Fortè Phaseolus latâ filiquâ fructu exiguo nigro, umbilico candido *J.B. Tom. 2. 261.* Guandû *Brasilienfium Pison. 252.*
- Phaseolus *Africanus* perennis Asphaltites siliquis inflatis, flore amplo flavescente. Phaseolus *Africanus* hirsutus bituminosus, siliquis bullatis, flore flavo, *H. Leyd. 492.* Ononis Natrix dicta scandens s. Phaseloides bituminosa flore luteo *Cap. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2. 78.*
- Phaseolus *Malabariensis* Utriculatus monospermos Tsjeria-Cametti-Valli *H. Malab. dictus. Part. 8. Tab. 46.*
- Phaseolus parvus spicatus *Maderaspatensis*, cordatis & incanis foliis, filiquâ utriculatâ nigrâ. *Phytogr. Tab. 52. fig. 2.*
- Phaseolus minimus *Maderaspatanus*, floribus miniatis Meliloti ad instar spicatis. *Phytogr. Tab. 51. fig. 4.*
- Phaseolus *Orientalis* Anagyridis folio, filiquâ falcata glabra. *Phytogr. Tab. 51. fig. 3.*
- Phaseolus minor *Bisnagaricus* foliis argenteo villosis, siliquis torosis brevibus spadiceâ hirsutie pubescentibus, fructu parvo Scaraboide nigro. *Phytogr. Tab. 52. fig. 3.*
- Phaseol. *Zeylanic.* salviæ foliis subrotund. mollibus & hirsutis *P B P. 364.* Item Orob. Phaseolodes *Zeylanicus* foliis Salviæ rotundis incanis subhirsutis *ejusd. P B P. 359.* An Nirpulari. *H. Malab. Part. 9. Tab. 36.*



- Phaseolus Canadensis* minimus Siliquam Terrâ condens *H R P.* 140. *Arachidna*  
*Phaseolodes Americana* *P B P.* 314. Mandubi de *Angola* *Marcgr.* 43.  
*Phaseolus unifolius Occidentalis*, Afari venoso folio dispermos. *Phytogr. Tab.* 105.  
*fig. 1. Orobis Americanus* Afari folio singulari *P B P.* 359. in *H R H.* enutritum  
 Observabimus.  
*Phaseolus unifolius Orientalis*, summo folio sinuato monospermos. *Phytogr. Tab.* 105.  
*fig. 2. an Phaseolus minimus perennis Americanus* flore luteo Meliloti, foliis Afari  
 lanuginosis solitariis *Breyn. Prodr.* 2.  
*Phaseolus lato striato* s. radiato semine *J B. T.* 2. 267. *Phaseol. peregr. Hortensi*  
*affinis*, semine lato albo multis nigris venis striato *C B P.* 340. *Phaseolus peregr.*  
*Purkircherianus* 1<sup>us</sup> *Clus. Hist.* 2. 222. *Okindiger Virginienfium*, Part. 7.  
*Ind. Occid.*  
*Phaseolus Americanus* longissimis & angustis foliis, forte *Phaseolus peregrinus* 6<sup>us</sup> *Clus.*  
*Hist. poster.* 225.  
*Phaseolus peregrinus*, lobo & fructu nigro *C B P.* *Phaseol. peregr.* 10<sup>us</sup> *Clus. Hist.* 225.  
*Phaseolus peregrinus fructu variegato* *C B P.* *Phaseol. peregr.* 11<sup>us</sup> *Clus.* 226.  
*Phaseolus peregrinus*, fructu subrubente striis purpureis radiato. An *Phaseol. pe-*  
*regr.* 12<sup>us</sup> *Clus.* *Phaseoli lati coloris tegularum cum striis per medium nigris*  
*J B. T.* 2. 269.  
*Phaseolus Æthiopicus* lobis nigris venis asperfis, fructu atrosplendente *C B P.* 340.  
*Phaseolus peregrinus* 13<sup>us</sup> *Clus.* 226. An *Phaseoli tumidi nigri splendentes* *J B.*  
*T.* 2. 258.  
*Phaseolus Maderaspatensis* semine, majore nigro obscuro, hilo ampliore albido. *Gua-*  
*rumbee* fortè *Brasilienfium* *Pison.* 252.  
*Phaseolus Zeylanenfis* semine duro fusco lituris spadiceis variegato. An *Phaseolus pere-*  
*grinus* 16<sup>us</sup> *Clus. Hist.* 2. 226. *Phaseolus Guinenfis* fructu fusco spadiceo *C B P.* 341.  
*Phaseolus teneri folius*, fructu coccineo. ex *Insulis Fortunatis.* à D.D. *Uvedal accepimus.*  
*Phaseolus Ægyptiacus* nigro semine *C B P.* 341. *Phaseolus Lablab Alpino* *J B.*  
*Tom.* 2. 271. *Cumandatia Brasilienfium* *Pison.* 251.  
*Phaseolus Ægyptiacus* semine rufo *C B P.* *Phaseolus Lablab spadiceus*, hilo longo  
 albo *J B. Tom.* 2. *ibid.*  
*Phaseolus Jamaicensis* & *Barbadensis* *Ægyptiaco* similis, semine ex toto eburnei ni-  
 toris. *Bonavische* nostratibus vulgò.  
*Phaseolus Maderaspatanus* *Laplab* effigie, flore parvo ochroleucho, siliquis falcatis  
 gemellis *Phytogr. Tab.* 213. *fig. 4.*  
*Phaseolus Canadensis* purpureus minor, radice vivaci *Schol. Bot.* 149.  
*Phaseolus Barbadensis* fruticosus Septennii durationis. *The Seven Years Pea, &*  
*The Shrub Pea* *Nostratibus* vulgò.  
*Phaseolus* flore amplo peltato, siliquis nigris & angulosis. *Plumier. Fol.* 94. *Tab. ult.*  
*Phaseolus Americanus* perennis flore cochleato odorato, seminibus fuscis orbiculatis,  
*Caracalla* dictus *H. Leyd.* 494. *Phaseolus Indicus* cochleato flore *Trionfetti Obs.* 92.  
*Phaseolo affinis folio Terebinthi duritie*, *Brasiliana* flore purpureo maximo. *Plan-*  
*ta leguminosa Brasiliana* *Phaseoli facie* flore purpureo maximo *Breyn. Cent.* 1. 78.  
*Phaseolus Indicus* trifoliatus sylvestr. flore purpurascente fructu majore *Commelin. Not.*  
 in *A.M. Katu-paeru H. Malab. Part* 8. *Tab.* 42.



- Phaseolus maritimus* purgans, radice vivaci, foliis crassis subrotundis *Bisnagaricus*. *Phytogr. Tab. 51. fig. 2.* *Phaseolus maritimus Indicus* perennis trifolius subrotundus, filiquâ longâ, fabâ fuscâ oblongâ *H. Amstelod. 276.* *Phaseolus Brasiliensis Florileg. de Bry. edit. per Matth. Merian.* *Phaseolus H. Mænofrancfurtensis* foliis densis subrotundis, amplis. *Phaseolus Brasiliensis Ferrar. Florileg. Katu-tsjaudi H. Malab. Part 8. Tab. 43.*
- Phaseolus Indicus* maritimus perennis, foliis crassis subrotundis minor *P B P. 364.* An Katabaramareca *H. Malab. Part. 8. Tab. 45.*
- Phaseolus Nevissensis* foliis multangulis, tuberosâ radice esculentâ. *Phytogr. Tab. 52. fig. 4.* *Phaseolus perennis Martinianus* radice tuberosâ esculentâ, anguloso crenato folio *P B P. 364.* Fortè Xicama *Nov. Hispan Terentii* apud *Recc. 309.* à nostratibus, **The Turnip Tree** vocatur.
- Phaseolus Maderaspatanus*, foliis glabris trilobatis, floribus exiguis, longis petiolis ex eodem puncto gemellis. *Phytogr. Tab. 214. fig. 3.*
- Phaseolus Maderaspatanus* cauliculis pilosis scandens, Passifloræ modo trilobatus; sub Trifolii talis titulo, in *Phytogr.* exhibetur. *Tab. 120. fig. 7.*
- Phaseolus tuberosus. Capitis Bon. Spei. Phytogr. Tab. 102. fig. 6.* sub *Batatas Capensis* trifoliatæ titulo accepimus. Fortè Tlatlahqui *Nov. Hispan. Terentii* apud *Recc. 427.*
- Phaseolus erectus Barbadosensis*, fructu spadiceo ruffo glabro, filiquis magnis gladiatis. **Tree-Bean** nostratibus dictus. *Phaseolus* (fortè) *Brasilianus* cum suo lobo *Clusii exot. lib. 3. cap. 12.*
- Phaseolus Indicus* filiquâ magnâ falcatâ quaternis in dorso nervis, cum eminentiis plurimis verrucosis secundum longitudinem insignita, fructu amplo niveo hilo croceo, Fortè Baramareca *H. Malab. Part. 8. Tab. 44.*
- Phaseolus Indicus* filiquâ cartilagineâ rugosâ fuscâ, duplici cristâ sinuosâ donatus *H. Amstelod. 276.* Lobus cartilagineus ex *Insula Mauriti Clus. exot. lib. 3. cap. 10.*
- Phaseolus Americanus* foliis molli lanugine obsitis, filiquis plurimis hirsutis pungentibus, semine fusco punctato, *Phytogr. Tab. 214. fig. 1.* *Phaseolus pruritum excitans* hirsutis filiquarum *Ger. emac. Conhage* vulgo.
- Phaseolus Orientalis* pruritum excitans hirsutis filiquarum, fructu nigro splendente. *Phaseolus* filiquâ hirsutâ *Park. Th. Nai-corana H. Malab. Part. 8. Tab. 35.*
- Phaseolus Americanus* frutescens, foliis glabris, lobis pluribus villosis pungentibus, fructu orbiculari plano, hilo nigro tanquam annulo totum ferè ambiente *Phytogr. Tab. 213. fig. 2.* *Phaseolus* filiquis latis hispidis & rugosis fructu nigro *Plumier. Description des Plantes de L' Amerique. Macuna Brasiliensibus Marcgr. & Pison, 307.* *Phaseolus Brasilianus* Macouna dictus *Clus. ad Monardem* Item *Phaseolus Nigritarum* 1<sup>us</sup> ejusd. *exot. lib. 3. cap. 11.* *Phaseolus Nigritarum* colore fusco *J B. Tom. 2. 272.* Item *Phaseolus Brasilianus* multis, spadiceus magnus, cum magno hilo nigro plurimum ambiente ejusd. *J B. Tom. 2. 271.*
- Phaseolus Indiæ Orientalis*, filiquis plurimis hirsutis pungentibus, fabâ magna Ostream referente. fortè Kakuvali *H. Malab. Part. 8. Tab. 36.* *Phaseolus Macounæ* S. *Phaseolo Brasiliano* similis *J B. T. 2. 277.* Fructus peregrinus 11<sup>us</sup> *Clus. exot. lib.*



*lib. 2. cap. 30.* Quique *Maximiliano 2° Cæsari ex Hispaniis* missus fuerat *Haba de India mui larga* (i.e.) *Fabæ Indicæ prelongæ* appellatione. *Mucuna-Guazu Brasiliensibus Pison Hist.nat. & medic. Utriusque Ind. 307.* fortè etiam *Phaseolus peregrinus magnus, coloris castaneæ cum magno hilo lævis* *J B. Tom. 2. 274.* *Phaseolus 3<sup>ius</sup> Nigritarum Clus. lib. 3. Cap. 11.*

*Phaseolus erectus incanus, siliquis torosis, Kayan dictus. Phytogr. Tab. 213. fig. 3.* *Cajan Arbor Indica foliis Trifolii bituminosi, siliquis Orobi Breyn. Prodr. P. 20.* *Thora Paërou, H. Malab. Part. 6. Tab. 13.* *Anagyris Indica leguminosa siliquis torosis P B P. 311.* Fortè *Arbor trifolia Indica* *J B. T. 2. 368.* An *Yztactlalamatl. Nov. Hisp. Terent. apud Recc. 452.* *Huc etiam fortè spectat Tlalamatl. Mexicanisibus S. Arbor. Vomitoria Hernand. apud eund. Recc. 70.* *Hujus autem nominis alia planta, ab hac longè diversa exhibetur fol. 420. & fol. 452.* sub *Synonymo vocabulo eadem iterum repetitur, Kajan. s. Katsjan Zeylanensibus, Lak-Goetum Chinenibus & à Barbadosibus nostratibus Pigeon-Pea, (i.e.) Pisum Columbarium nominatur. Kadjang Ogilveij.*

*Phaseolus arboreus è Maderaspatán folio parvo glabro, floribus binis venustè rubellis. Phytogr. Tab. 213. fig. 6. ex Viridario Sicco du. Boissiano impetravimus.*

*Phaseolus arboreus è Maderaspatán folio parvo molli & incano, flore unico coccineo Phytogr. Tab. 213. fig. 5.*

*Phaseolus arboreus incanus monospermos, siliquis lentiformibus Madaraspatanus Phytogr. Tab. 119. fig. 6.*

*Phaseolis accedens Frutex Japhnapatenfis spinosus, fructu ovali, nigris & cinereis punctis elegantè guttato P B P. Phytogr. Tab. 52. fig. 5. Phaseolus Americanus spinosus, folio parvo rhomboide noster Raij Hist. Pl. append. 1889.*

*Phaseolis accedens Coral arbor spinosa Orientalis fructu obscurè rubente. Siliqua sylvestr. spinosa Arbor Indica C B P. 402. Arbor Fabifera Boa-Tsinking dicta Bontii 134. Coral arbor siliquosa J B. Tom. 1. 426. Arbuscula Corallii Ferr. Flor. 381. Mouricou H. Malab. Part. 5. Tab. 7. Erabudu Zeylanensibus Tabori Gentilibus Maderaspatanis.*

*Eadem semine miniato, hilo nigro notato P B P. 327. Tuinamituba Marcgr. 138.*

*Phaseolis accedens Arbor spinosa, Coral Americana maxima. Coral arbor Americana maxima H. Leyd. 189. variat interdum spinis nigricantibus.*

*Phaseolis accedens Arbor non spinosa Coral dicta, fructu rubro instar Corallii expositi splendente. Coral arbor Americana non spinosa seminibus rubris P B P. 327.*

*Phaseolis accedens Utriusque Indiæ Coral angustifolia spinosissima, fructu tenuiore atronitente. An Macayxtli Mexiocanum Hernandez apud Rec 382. fortè etiam Laburnum spinosum Americanum Munting. lib. 1. c. 43. Coral arbor siliquosa minor spinis, & seminibus nigricantibus H. Leyd. 189. Jacerabudu Zeylanensibus: ex Insulâ Jamaica ex Insulâ Zeylan, nec non è Regno Bengalensi, hujus Fabæ ad nos allatæ sunt, quibus satis in H R H. in Arbusculas bicubitales & tricubitales enutrivimus.*

*Phaseolis accedens Coral arbor polyphyllus, foliis durioribus glabris, non spinosa, sub falso titulo exhibetur hujus Icon in Phytogr. Tab. 214. fig. 4.*

*Phaseolis accedens Arbor Indica Coral dicta polyphyllus non spinosa, foliis mollibus subhirsutis.*



subhirsutis. *Phytogr. Tab.* 104. *fig.* 3. An Yztacpatli 8. Nov. *Hisp. Terent* apud *Recc.* 451. Badu-Karanse *Bengalenſium*.

- Phaseolis accedens *Malabarica* alatis foliis glabris monospermos, filiquâ latiore brevi. *Phytogr. Tab.* 310. *fig.* 3. ad oras *Malabaricas* collegit Ornatiff. Vir D. *Alexand. Brown* & nobis communicavit. Pungam (fortè) s. Minari *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 3. Crista pavonis monospermos 3. s. Arbor Vespertilionis maxima *Indica* Juglandis folio majore, floribus spicatis albicantibus odoratis, filiquâ nonnihil falcata, semine renali latissimo. *Breyn. Prodr.* 2. 39. Hujus fructus delineationem sub Fabæ specie tanquam semen exhibet *Clusius exot. lib.* 3. *cap.* 13. ex sententiâ *Commelin. Not. in H. Malab.*

Phaseolis accedens alatis foliis monospermos, Arbor *Indica* spinosa. Bankaretti *H. Malab. Part.* 6. *Tab.* 20. Crista pavonis monospermos 1. s. Arbor Vespertilionis Juglandis folio minore spinosissima, flore viridi-luteo ad foliorum alas, semine & filiquâ villosâ, *Breyn. Prodr.* 2. *ibid.*

Phaseolus arboreus tetraphyllos *Zeylanicus Horti Regij Aulæ Hampton. Phytogr. Tab.* 211. *fig.* 5.

Phaseolus *Indicus* cæruleus, Glycyrrhizæ foliis alatis, flore amplo clitorio. Flos Clitoridis *Ternatensibus Breyn. Cent.* 1. 76. sub titulo Cruock ab Insula *Javâ* accepimus. Catarodû *Zeylanensium*.

Phaseolus alatus *Ternatensium* floribus albis. Schanga. Cuspi *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 38.

Phaseolus arboreſcens alatus & volubilis major *Orientalis*, fructu coccineo hilo nigro notato *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 5. Phaseolus *Indicus* ruber *Bontij.* 136. Pisum *Indicum* minus coccineum *C B P.* 343. Abrus *Alpin. de Pl. Ægypt.* 76. Arachus *Indic. s. Africanus Park. Th.* Glycyrrhiza *Indica* filiquis. & seminibus Pisi coccineis hilo nigro notatis *P B P.* 337. Konni *H. Malab. Part.* 8. *Tab.* 39. *Variat hæc species fructu toto nigro, Ochroleuco, & aliquandò immaculato candore.*

Phaseolus alatus minor *Americanus* Glycyrrhizæ sapore, filiquis Orobi, seminibus nigris hilo coccineo notatis. Liquorice Tree, (i.e.) Glycyrrhiza arbor *Jamaicensibus*, & ejus semina *Monkey-Berries. Barbadiensibus* nuncupantur. Hujus filiquarum pictura habetur in *Phytogr. Tab.* 214. *fig.* 6. *Viciæ foliis.*

Phaseolus alatus *Americanus* Tiliæ foliis, Orobi filiquis dispermos, seminibus parvis nigris, hilo coccineo distinctis. *Barbadiensibus* Colonis Bread and Cheese nominatur.

Phaseolus peregrinus ex rubro & nigro distinctus. *C B P.* Pisum *Americanum* aliud magnum bicolor, coccineum & nigrum simul, s. Phaseolus bicolor Anacock dictus *J B. Tom.* 2. 265. Phaseolus *Ægyptius Park. Th.* Phaseolus *Indicus* major bicolor. *ejusd. C B P.* 341. Phaseolus peregrinus *Indicus Clus. Hist. post.* 227. Anacock *ejusd. exot. lib.* 3. *cap.* 13. Phaseolus *Indicus* ruber durissimus cum nigrâ maculâ *Lobelij.*

Phaseolus totus ruber Anacock accedens *J B. Tom.* 2. 265. Phaseoli *Indici* rubri durissimi genus alterum sine maculâ *Lobelij.* An fructus subrotundus durus eleganter rubens *C B P.* 404.

Phaseolus alatus arbor *Indica*, fructu coccineo ferè orbiculari medio utrinque tumido. Crista Pavonis Glycyrrhizæ folio maxima *Indica*, flore subluteo minimo spicato, filiquis



filiquis angustis ubi semina occultantur protuberantibus, semine orbiculato compresso sanguineo *Breyn. Prodr.* 2. 38. *Mandathia* s. *Maru Mus. Zeyl. Mangili Cingalensium.* *Mandsjadi H. Malab. Part. 6. Tab. 14.* *Phaseolus alatus arboreus fructu orbiculato compresso coccineo H. Leyd.* 495.

*Phaseolus alatus Arbor Indica*, validissimis aculeis horrida dispermos; filiquis latis valdè compressis, semine parvo lunulato. *Ana-Mullu H. Malab. Part. 8. Tab. 40.*

*Phaseolus Utriusque Indiae* arboreus, alatis foliis, fructu magno cordiformi, lobis longissimis nodosis, plerumque intortis. *Phaseolus alatus Indicus* fructu fusco maximo, lobis latissimis & longissimis, *H. Leyd.* 494. *Puswæl Zeylanensibus Mus. Zeyl. Perim-kakuvalli, H. Malab. Part. 8. Tab. 32, 33, 34.* *Lens Phaseolô des maxima Indica*, Cassiæ foliis, semine maximo cordiformi *Breyn. Prodr.* 2. 63. *Phaseoli Novi Orbis* s. *Fabæ purgatricis latissimæ* variatio longior. *J B. Tom. 2.* 277. Hujus flores utut parvi pentapetali plani, & in spicam dispositi uniformes, à communi formâ florum fabaceorum recedentes, dant filiquas illas prægrandes, longitudinem quinque, sex, septemvè pedum, latitudinem palmæ adequantes, rectas, vel passim flexuosè annularitèr, aliisvè modis intortas. Fortè *Arbor Indica* Anonymos 3<sup>a</sup>. *Theophr. lib. 4. cap. 5. Cui fructus longus, nec rectus sed contortus aut flexuosus. Hic in ventre morsum excitat, atque dysenteriam, ob id Alexander ne quis manderet edicto cavit.* *Lienes fortè Rochfort. des Antill. lib. 1. cap. 11.*

Idem minor *P B P.* 365. *Phaseolus Novi Orbis* s. *Faba purgatrix latissima*, *Cordis figurâ. J B. Tom. 2. Phytogr. Tab. 211. fig. 6.* Item *Lobus Brasilianus* ingens filiquæ *Acaciæ* formâ ejusd. *J B. Tom. 1. Lib. 12. 438.* *Phaseolus major*, *Fabæ purgatricis* nomine missus; *Cor Divi Thomæ* quibuldâ *Clus. Comm. ad Monardem* 335. *Lobus Brasilianus* ingens ejusd. *exotic. lib. 3. cap. 1.* *Faba purgatrix latissima*, ex *Insulâ Divi Thomæ C B P.* 338. Item *Arbor filiquosa Juglandis folio Brasiliana*, lobo longissimo, *Acaciæ* filiquæ instar distincto. ejusd. *C B P.* 404.

*Phaseolis* (fortè) accedens filiquâ breviorē crassâ, fructu subrotundo grandi, *Cordis figurâ.* *Phaseolis accedens Frutex Indicus* lobis & fabis cordiformibus maximis. *P B P.* 365. *Cor S<sup>ti</sup> Thomæ.* s. *Lobus crassus* ex *Insulâ S. Thomæ. Clusij exot. lib. cap. 8. An hæc planta sit trifoliata, vel plurimis foliis alata nondum constat, Nobis enim nil nisi Fructus adsunt.*

**PHILLYREA** latifolia lævis *C B P.* 476. *Phillyrea arbor Lobelio J B. Tom. 1.* 540

*Phillyrea folio levitèr ferrato C B P.* *Phillyrea folio Alaterni J B.* 541.

*Phillyrea latifolia spinosa*, s. prima *Clusii C B P.* *Phillyrea folio Ilcis J B. Ibid.*

• *Phillyrea latifolia spinosa triphyllus*, s. foliis ternis circa caulem ambientibus. *Phytogr. Tab. 310. fig. 4.*

*Phillyrea folio Ligustri C B P.* *Phillyrea latiusculo folio J B. Phillyr. 3<sup>a</sup> Clus. Hist.* 52.

• *Phillyrea Oleæ Ephesiæ folio. H. Med. Chelseian. Phytogr. Tab. 310. fig. 5.*

*Phillyrea angustifolia J B. Tom. 1.* 538. *Phillyrea angustifolia 1<sup>a</sup>. & 2<sup>a</sup>. C B P.* *Phillyrea 4<sup>a</sup>. & 5<sup>a</sup>. Clus. ibid.*

*Phillyrea minima Bux, minoris folio Hort. Oxon.*

**PHYLLANTHOS** Americana sinuosis foliis longis crassis, & carnosiss *Opuntia* in



- in modum florigera *Phytogr. Tab. 247. fig. 5.* Opuntiae fortè affinis Sirinamensis è foliorum crenis novà folia producens *H. Beaum. 19. ubi pro nondum descript. ponitur.* Nepalxoch-Cuez-Alticquizi *Mexicensibus Joan. Terent. apud Recc. 392.* Canambaya fortè *Brasilienfis Marcgr. fol. 78. huc pertinet.* de Chrysanthemorum genere Planta peculiaris Nobis videtur.
- Phyteuôdes *Americanum* flore albo tetrapetalo, staminibus referto, foliis & ramulis per intervalla ternis sapore dulci. *Jamaicensibus Sweetweed* dictum. *Phytogr. Tab. 215. fig. 1.* fortè Tupeicava *Brasilienf. s. Scoparia Pison. lib. 4. 246.* Balourinha *Lusitanis.* totâ planta suavitas inest gustui acceptissima.
- Pilosella minima Gnaphalii montani lanosis foliis, flore aureo, nond. desc. *Phytogr. Tab. 52. fig. 6.*
- PIMPINELLA maxima *Canadensis* spicâ longiori albâ *Cornut. 175.*
- Pimpinella *Africana* maxim. folio rigido splendente, spicâ longiore rubrâ. Pimpinella *African. max. sælicida Raij. Hist. app. 1867.* An Pimpinella *Canadensis*, spicâ longiori rubrâ *Morif. Umb. 57.* Pimpinella max. spicâ longâ rubrâ *ejusd. Prælod. 294.*
- Pimpinella Sanguisorba major *C B P. 160.* Sanguisorba maj. fl. spadiceo *J B. T. 3. 120.*
- Pimpinella Sanguisorba maj. *Canadensis Morif. Umb. 57.* Pimpinella Sanguisorba elegantius laciniata. *Schol. Botan. 155.* An Pimpinella *Hispanica* maj. altera conglomerato flore *ejusd. ibid.* Hujus folia sunt magis elegantè & profundius incisa.
- Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta *C B P. 160.* Sanguisorba minor *J B. Tom. 3. 113.*
- Pimpinella Sanguisorba minor lævis *C B P.* Pimpinella vulgaris s. minor *Park. Th.*
- Pimpinella *Tingitana* semine rugoso. Pimpinella Sanguisorba minor semine majore & crassiore. *Bot. Monsp. 205. Capsulas habet seminales Pimpinellæ spinosæ fructus haud multum minores.*
- Pimpinella Sanguisorba rupestris minima, radice magrâ *Phytogr. Tab. 103. fig. 4.* Hujus folia Pimpinellæ spinosæ foliolis haud majora à Cl. D. *Turnefortio* in *Hispaniâ* collecta fuit, & à D. *Sherard* amicissimè nobis communicata est. An Pimpinella minor altera rotundo splendente folio *Lusitana Grisley.*
- Pimpinella Agrimoniae foliis & odore s. Agrimonoides seminibus striatis. Pimpinella Agrimonoides *Morif. Umb. 57.* Pimpinella Agrimonoides *Bocc. de Pl. Sicul. 57.* cum Icon. *Tab. 30* Pimpinella Agrimonoides odorata *H R P. 141.*
- Pinguicula *Gesnero J B. T. 3. 546.* Sanicula montana flore calcari donato. *C B P.*
- Pinguicula s. Sanicula *Eboracensis Park. Th.*
- Pinguicula flore albo minore calcari brevissimo *Raij. Hist. Pl. 752.*
- Pinguicula *Cornubiensis* flore minore carneo *Raij. Hist. Pl. ibid.*
- PINUS sativa *C B P. 491.* Pinus officulis duris, foliis longis *J B. Tom. 1. 248.*
- Pinus Urbana s. domestica *Park. Th.*
- Pinus Sylvestr. *C B P.* Pinaster s. Pinus sylvestris *Hispanicus* major *Clusio J B. T. 1. 255. (i. e.)* Pinus maritima altera *Matthioli C B P. 492.* Pinaster (fortè) *Austriacus* major albus & niger *ejusd. ibid.* Fortè etiam Pinus sylvestris vulgaris *Genevensis* & Tæda *J B. Tom. 1. 253.* Habetur in Viridariis nostris frequens in *Angliâ* & ab hortulanis vulgò *The Mountain Pine* (i. e.) Pinus montana dicitur.
- Pinus maritima major *C B P. 492.* Pinus sylvestris maritima, conis firmitè ramis adhærentibus *J B. Tom. 1. 245.*
- Pinus



*Pinus Hispanica* Laricis aut Cedri *Palestinæ* facie setis brevioribus, per intervalla confertis. An *Pinus maritima Theophrasti Lobelio* *J.B.* 258.

*Pinus sylvestris* foliis brevibus glaucis, conis parvis albescentibus *Raij Hist. Pl.* 1401.

*Abies Scotica* perperam nostratibus dicta. *The Scotch Fir.*

*Pinus Hierosolymitana* prælongis & tenuissimis viridibus setis. An *Picea Montis Athos Bellonij lib.* 1. *Obs.* 43. Hujus strobili exigui graciles & lignosi ex *Asia* ad Reverendiss. D. D. *Henricum Compton* Episcopum *Londinensem* jam olim transmissi sunt è cujus seminibus curâ & industria D. *Georgij London* plurimæ arbores sunt enatæ, quæ Horto *Comptoniano* vel hodierno tempore summum præbent Ornamentum.

*Pinus Virginiana* Conis longis non (ut in vulgari) echinatis. *D. Banister.*

*Pinus Virginiana* prælongis foliis tenuioribus, cono echinato gracili.

*Pinus Virginiana* tenuifolia tripilis s. ternis plerumque ex uno folliculo setis, strobilis majoribus. *The Frankincense-Tree* (i. e.) Arbor Thurifera nostratibus vulgò.

*Pinus Virginiana* binis brevioribus & crassioribus setis, minori cono, singulis squamarum capitibus aculeo donatis. *Abieti Scotiæ* vulgò dictæ hæud absimilis ex *Virginia*.

*PIPER* rotundum nigrum similiter ac album *C.B.P.* 411. *Piper enim album, nihil aliud esse quàm nigrum antè insolationem decorticatum, Cl. Piso in Mantiss. Aromat. nobis certum reddidit.*

*Piper ignobile Canari Malabaræis* dictum *Pison. Mantiss.* 182. *Piper inane C.B.P.* 412. *Piper Canarinum Linschot. Part. 4. Ind. Or. cap.* 18. *Piper Canarinum à Canarâ loco natali dictum Raij Hist. Pl.* 1344.

*Piper longum Pistolochiæ* foliis absq. pediculis *Maderaspatanum Phytogr. Tab.* 104. *fig. 4.* *Piper longum Javanense* Incolis Chiabæ dictum *Linschot. Part. 4. Ind. Or. fig. 20.* *Piper longum Orientale C.B.P.* 412. Fortè *Tlatlancuaye Mexicensibus* *Piperis longi Planta Hernand. apud Recc.* 126. *Pimpilim Bengalensium Pison. Mantiss.* 182. *Kepul Indorum.*

*Piper Frutex Americ.* spicâ longâ gracili. *Phytogr. Tab.* 215. *fig. 2.* Planta Julifera aromatica in uliginosis crescens locis. *D. Banist. Nhandu Brasiliensium Pison.* 197. *Piper caudatum s. Nhandu Marcgr.* 75. *Mecaxochitl Mexicensibus Hernandez. apud Recc.* 144. *Piper longum minus Beninense Terræ Nigritarum Ogilv. Afric.* 471. *Amalago H. Malab. Part. 7.* *Piper ex Floridâ J.B. Tom. 2.* Planta peregrina *Clusij. exot. lib. 4. c.* 11. *Piper longum angustiss. ex Floridâ C.B.P.* Item *Piper longum Occidentale* dimidii pedis longitudine ejusd. *ibid.* *Piper longum Monardis.* *Piperis longi genus ex Carthagine Fragos. Pimienta dos Indios à Lusitanis vulgò.* *Betys fœmina julis gracilibus & exiguis, botrorum modo congestis. Pison.* 196. *Saururus (fortè) arborefc. fructu adunco Plumier. Descr. Pl. l' Amerique, fol.* 58. *Tab.* 77.

*PISTACHIA J.B. T. 1.* 275. *Pistachia peregrina* fructu racemoso, s. *Terebinthus Indica Theophrasti C.B.P.* 401.

*Pistachiæ* formâ *Nucula Barbadosis* minor nucleo viridi & impensè amaro.

*Pistachiæ* specie *Nucula ex Indiâ Orientali.* *Nucula exotica Pistachii specie J.B. Tom. 1.* 290.



*Pistachia sylvestris* C B P. 401. *Staphylodendron sylvestre* & vulgare *Hort. Leyd.* 582.  
*Pistachia Virginiana sylvestris trifolia* H. Blesf. 295. *Staphylodendron Virginianum*  
*trifoliat.* H. Leyd. *ibid.*

*Pistachia Virginiana nigra* Coryli foliis D. Banister.

- *Pistachia Africana* s. *Staphylodendron Æthiopicum* Μονολαπικαλλώομενο φύλλον  
 singulari hirsuto folio nitente, *Phytogr. Tab.* 63. fig. 4. *Staphylodendron Africanum*  
 sempervirens foliis splendentibus H. Amstelod. *Staphylodendron Afric.* folio lucido  
 P B P. An Arbor lucens fructibus Halicacabi D. Hermans. Halicacabum arbo-  
 rescens Breyn. Cent. 1. 180. Hujus melior Icon exhibetur *Phytogr. Tab.* 317. fig. 5.  
*nond. edit.*

PISUM *Bengalense* minus cortice duriore H. Amstelod. 280. An *Pisa Virginiana*  
*sylvestria* C B P. 342. *Pisa parva viridia* J B. Tom. 2. 298. *Pisum peregrinum*  
*Cæsalpini.*

*Pisum spontaneum Virginienſe* purpureum D. Banister. *Cat. stirp. Virginienſis.*

- P L A N T A baccifera scandens, Epidendros *Maderaspatana*, geniculato & qua-  
 dripinnato caule, flosculis exiguis ad genicula capreolis donata. *Phytogr. Tab.* 310.  
 fig. 6. Fortè *Tsjangolam-Parendi* H. Malab. Part. 7. Tab. 41.

*Planta filiquosa bivalvis unicapſularis*, filiquis in plurimos ramulos falcatos diffusis,  
*Crithmi marini* segmenta quodammodo mentientibus *Phytogr. Tab.* 215. fig. 3.  
 An fortè *Xiyopatli* Nov. Hispan. *Terentii* apud Recc. 438.

P L A N T A G O, maxima *Hispanica* quam *Hispani* caulescentem vocant *Cornut de*  
*Pl. Canad.* 162. *Planta* tota glabra est.

*Plantago latifolia rosea* flore expanso C B P. & J B. Tom. 3. 503. Itè *Plantago*  
*latifolia rosea*, floribus quasi in spicâ dispositis ejusd. C B P. 189.

*Plantago major* paniculâ sparsâ J B. *Plantago latifolia* spicâ multiplici sparsâ C B P.

*Plantago angustifolia major* caulium summitate foliosâ C B P. J B. T. 3. 505. Item  
*Plantago angustifolia prolifera* ejusd. C B P. 189.

*Plantago angustifolia minor* summo caule folioso, s. prolifera nostras. *Hanc speciem*  
 D. Newton invenit in *Insula Thanet* & nobis communicavit.

*Plantago angustifolia Alpina* J B. T. 3. 506. *Holosteum hirsutum nigricans* C B P. 189.

*Plantago argentea angustifolia* è rupe *Victoriæ* Schol. Bot. 35.

*Plantago quinque nervia* cum globulis albis pilosis J B. T. 3. 504. *Plantago angusti-*  
*folia paniculis Lagopi* C B P. *Planta peregrina*, *Plantagini acutæ* similis quæ Græ-  
 cis Κατανάγυν dicitur *Rauwolf. Herbar. Viv.* *Planta rara Plantagini* longè similis  
*Rauwolfii Hist. Lugd. append.* 21. An *Leontopodium Creticum* aliud *Clus. Hist.*  
 (i. e.) *Plantagini angustifoliæ* similis *Habbures* J B. Tom. 3. 507. *Hares-*  
*foot, Plantain.*

*Plantago Virginiana* Pilosellæ foliis angustis radice turbinatâ. *Plantago Myosotis*  
*trinervia hirsuta Caroliniana* Raij *Hist. Pl. append.* 1889. *House-eat Plantain.*

Eadem latifolia.

*Plantago angustifolia minor* spicâ hirsutâ albâ, foliis ex atrovirentibus valdè villosis  
 J B. Tom. 3. 506.

*Plantago Coronopus* dicta sativus in Acetariis, utilis. *Coronopus hortensis* C B P.



190. *Coronopus* s. *Cornu cervinum* vulgò, spicâ *Plantaginis* *J.B. Tom. 3. 509.* *Coronopus minimus tenuifolius maritimus* *Col. ecphr. 258.* *Coronopus maritimus tenuifolius lævis* *C.B.P. 191.* Item *Coronopus tenuifolius laciniatus Neapolitanus* *Col. Ecphr. Part. 2. 71.* Item *Coronopus maritimus minimus hirsutus* *C.B. Prodr. descript. Suspicor hastres Plantulas non differre specie à Coronopo vulgari, sed ratione loci tantum; Observavit enim Cl. Rajus sicut & nos sæpenumerò, in maritimis & humidioribus locis provenientem foliis lævibus variare, & in solis sterilioribus montanis adeo laciniatam & hirsutam, ut sibi ipsi valdè dissimilem hæud rarò videretur.*

*Plantago marina* *Gerard.* *Coronopus maritima major* *C.B.P.* *Coronopus maritima nostras* *J.B.*

*Plantago Coronopus dicta maritima* brevi latoque & dentato folio pilosa *Phytogr. Tab. 103. fig. 5.* *Plantagini affinis Bipinella Siciliae herbula* *J.B. Tom. 3.* *Coronopus maritimus Prochytae Insulae Columnae ecphr. 258.* Non autè est *Coronopus maritima* nostras, nec ei multùm similis ut rerum omnium *Naturalium Vir peritissimus*, & *Botanices Scientiæ summus arbiter*, & *Præsidium singulare* *D. Joan. Rajus rectè pronunciat* *Cat. Exter. quamvis Casp. Bauhinus eandem faciat.* *Plantago Apula bulbosa* *Park.* *Plantago Apula laciniata bulbosa* *Fab. Col.* *Plantago pilosa bulbosa* *C.B.P.* *Huic nostræ persimilis est, & fortè eadem.*

*Plantago montana* *Holosteum dicta tomentosa.* *Holosteum Plantagini simile* *J.B. Tom. 3. 508.* *Holosteum hirsutum albicans majus* *C.B.P.* *Holosteum Salmanticum majus* *Clus. Hist.*

*Plantago Holosteum dicta* s. *Coronopus serpentina* foliis *Vetonicæ* angustis, spicâ *Rubiæ* gracili : *Phytogr. Tab. 37. fig. 4.* An *Holosteum* strictissimo folio minus *C.B.P.* *Serpentina omnium minima* *Lob. Icon.* *Holosteum nobis hic allatum, optimè convenit cum descriptione Plantæ quam* *Joan. Bauhinus Hist. T. 3. 511.* Pro *Coronopo* *Serpentaria* omnium minima proposuit, quâ tamèn foliola cauliculis adnexa non concedet.

*Plantago Serpentina Massiolotica* densissimo foliorum stipatu luxurians ; an *Coronopi* & *Sedi montani* media *Planta Massiliensium* *Lobel.* *Coronopus Massiliensis Lobelij* *Serpentinæ* fortè varietas *J.B. Tom. 3. 510.* Fortè etiam *Coronopus maritimus Rainaudeti ejusd.* *J.B. 511.*

*Plantago caulifera Psyllium dicta majus erectum.* *Psyllium vulgare* *Park. Th.*

*Plantago caulifera Psyllium dicta* foliis laciniatis. *Psyllium Dioscoridis*, vel *Indicum crenatis foliis* *J.B. T. 3. 514. C.B.P. 191.* & in *Prodr.* *Psyllium Siculum* laciniatis foliis *Boccon. 8.* *Psyllium è Monte Baldo* foliis *Coronopi Calceolarij in Musæo.*

*Plantago caulifera supina sempervirens.* *Psyllium majus supinum* *C.B.P. 191. J.B. T. 3. 513.* *Psyllium majus sempervirens* *Park. Th.*

**PLANTAGINIS** *Stellatæ* foliis *Indiana* florum spicâ ex utriculo caulis erumpente *Phytogr. Tab. 215. fig. 4.* *Carim-gola* *H. Malab. Part. 11. Tab. 44* fortè etiam huc pertinet *Naru-kila ejusd. H. Malab.* *Plantaginis aquaticæ* foliis floribus glomeratis, ex hiatu aperto caulis, quasi ex utriculo prodeuntibus.

**PLATANUS** *Orientalis* pilulis amplioribus *H. Leyd. 499.* *Platanus Orientalis Vera* *Park. aliis Autoribus simpliciter Platanus dicitur.*



Platanus *Novi Orbis*, foliis Vespertilionum alas referentibus, globulis parvis. Platanus *Occidentalis*, aut *Virginienfis* Park. Th. 1427. Platanus *Occidentalis* pilulis minoribus H. Leyd.

PLUMBAGO (fortè) *Americana* ex conjecturâ D. Sherard. *Phytogr. Tab.* 312. fig. 1. Hort. Fagelian alumna

PNEUMATOXYLUM Arbor baccifera calyculata, tetrapyrene, alatis foliis *Americana*; *Barbadensibus* Spirit-wood vocata. *Phytogr. Tab.* 215. fig. 5.

POLIUM montan. album C B P. 221. Polium montan. 1. *Clus. Hist.* Polium montan. *Monspeliac. Park.*

Polium maritimum erectum *Monspeliacum* C B P. Polium *Monspessulanum* J B. T. 3. 299. àn Polium *Venetum* ejusd. J B. *ibid.* Polium montanum minus Park. Th. Epitheta hujus & præcedentis speciei apud *Parkinsonum* immutata videntur ut rectè notavit *Rajus Hist. Pl.* 524.

Polium maritimum supinum *Venetum* C B P. Polium candidum tenellum tomentosum, flore purpureo & albo J B. T. 3. 300. Polium 5<sup>m</sup>. purpureo flore *Clusij.* An Polium rubrum majus, flore dilutiore *Moris. Prælud.* 295. Polium purpureum folio *Chamædryos* incanum.

Polium montan. repens C B P. Polium montan. supinum minimum Park. Polium montan. 8<sup>m</sup>. *Clus. Hist.*

Polium angustifolium *Creticum* C B P. Park. Th. Polium erectum *Creticum*, & fortè frutescens *Dioscoridis Ponæ.* An Polium montanum tenuifolium erectum *Grisleij.*

Polium montan. luteum C P B. 220. Polium montanum vulgare Park. Th.

Polium latifolium incanum *Creticum* C B P. & in Prodr.

Polium montanum Lavandulæ folio C B P. 220. Polium Lavandulæ folio, flore albo Gerard. An Polium *Rorismarini* folio *Wheleri Itiner.* Fortè etiam *Rosmarinum Stæchadis* facie *Prosp. Alpin. exot.* 102.

POLYGALA major C B P. Polygala major 1<sup>a</sup>. *Clusij. Hist.* Polygala vulgaris major J B. Tom. 3. 387.

Polygala acutioribus foliis *Monspeliaca* C B P. 215. Onobrychis 3<sup>a</sup>. *Hist. Lugd.* 491.

Polygala annua erecta angustifolia, floribus coloris obsoleti, carneis lineis virgatis Bot. *Monspel.* 208. Polygala vulgaris coloris obsoleti foliis angustiss. J B. T. 3. 388. ubi nimis angusta folia pinguntur, nec rectè Polygalam vulgarem vocat J B. rara enim & à paucis Botanicis nota.

Polygala rubra *Virginiana* spicâ parvâ compactâ *Banisteri.*

Polygala spicata rubra major, foliis & caulibus cærulescentibus *Banisteri.*

Polygala frutescens *Capitis Bon. Spei Breyn. Cent.* 1. 107. Polygala *Africana* frutescens angustifolia & minor P B P. 366. An *Coztic-Xihuitl Nov. Hispaniæ Terent.* apud *Recc.* 303.

Polygala *Africana* glabra, floris galeâ binis cristis fimbriatis ornatâ, ex involucro magno dipetalo erumpente *Phytogr. Tab.* 53. fig. 2. Polygala *Africana* frutescens latifolia & major P B P. Polygala major frutescens *Myrtifolia* flore purpurascente *Capitis Bon. Spei Breyn. Prodr.* 2. 84.

Eadem foliis admodum hirsutis.



*Polygala* s. *Flos Ambervalis Virginiana* floribus luteis in caput oblongum congestis *Banisteri*.

*Polygala* quadrifolia s. cruciata floribus ex viridi-rubentibus in globum compactis *Virginiana Banisteri*.

*Polygala* quadrifolia minor *Virginiana* spicâ parvâ rubenti. D. *Banister*.

*Polygala* filiculosa folio brevi rotundo Myrti instar *Morif. Hist.* 2. 327. *Polygalæ* affinis *CBP.* 215. *Chamæmyrsine* quorundam *Hist. Lugd.* 1175.

*Polygala* frutescens major folio Buxi *Mentzel. Pugil.* *Astragalus* humilis Buxifolius *H. Leyd.* 74. *Polygala* Astragaloides vulgaris Buxi folio *Breyn. Prodr.* 2. 84. *Chamæbuxus* flore Coluteæ *CBP.* 471. *Chamæbuxus* s. *Chamæpyxos* quibusdam *J.B. T.* 1. 5. 24. *Anonymos* flore Coluteæ *Clus. Hist.* Myrto-Genista quibusdam *Raij Hist. Pl.* 1732. *Colutea* humilis Buxifoliis *Morif. Præhud.* 56.

POLYGONATUM majus vulgari simile *J.B. Tom.* 3. 529. *Polygonatum* latifolium maximum. *CBP.* 303. An *Polygonatum* Hellebori albi folio, caule purpurascente D. *Bobart. Raij Synops. edit. ult.* 148.

*Polygonatum* floribus ex singularibus pediculis *J.B. T.* 3. 529. *Polygonatum* latifolium flore majore odore *CBP.* *Polygonatum* latifol. 2<sup>m</sup>. *Clus. Hist.* 276.

*Polygonatum* latifolium flore pleno odorato. Sigillum Salomonis flore pleno *Dodart. Mem.* 115.

*Polygonatum* latifolium minus flore majore *CBP.* 313. Est 1<sup>um</sup>. in *Prodromo*.

*Polygonatum* humile *Anglicum* *Raij Synops. stirp. Britan. ibid.*

*Polygonatum* latifolium ramosum *J.B.* *Polygonatum* latifolium 4<sup>m</sup>. ramosum mollioribus foliis *Clus. Hist.* 276.

*Polygonatum* ramosum flore luteo majus *Americanum* *Cornut. de Pl. Canad.* 38. Sigillum *Indicum* flore luteo *Stapelii Not. in Theophr.* 1067.

*Polygonatum* perfoliatum minus *Virginianum* folio subrotundo brevi. An *Polygonatum* perfoliatum flore ochroleuco, capsulâ trigonali D. *Banist. Cat. Stirp. Virg.*

*Polygonatum* minus angustiore fol. perfoliatum ex *Virginia*. An *Polygonat.* ramos. capsulâ prismali D. *Banister*.

*Polygonatum* angustifolium *J.B.* *Polygonat.* angustifolium non ramosum *CBP.*

*Polygonatum* angustifolium ramosum *J.B. CBP.* *Polygonum* 6<sup>m</sup>. angustifolium 2<sup>m</sup>. *Clus Hist.* 277.

*Polygonatum* spicatum sterile *Canadense.* *Cornut.* 31. *Polygonatum Virginianum* *Park. Th.*

*Polygonatum Canadense* spicatum fertile *Cornuti* 33. *Monophyllum* majus *Virginianum* *Polygonati* foliis & facie *Breyn. Prodr.* 2. 74. *Smilax* spicata *Polygonati* folio *Elem. Bot. Tom.* 1. 512.

*Polygonatum Canadense* racemosum *Cornuti* 36. *Smilax* racemosa *Polygonati* folio *Elem. Botan.* *Lilium convallium Virginianum*, *Polygonati* foliis racemosum *H. Leyd.* 376.

• *Polygonatum* racemosum *Americanum*, Ellebori albi foliis amplissimis *Phytogr. Tab.* 311. fig. 2.

POLYGONUM vulgare nostras angustissimo Graminis folio. An *Polygonum* oblongo angustoque folio *CBP.*

*Poligonum*



- Polygonum erectum* lignosum *Rorismarinæ* foliis *Virginianum* D. Banister è foliorum sinu erumpunt flosculi albi, quibus evanidis succedit semen triquetrum nigrum unicuique unicum.
- Polygonum marinum* *J.B. Tom. 3. 375.* *Polygon. marinum majus* *Park. Tb.* *Polygonum maritimum latifolium* *C.B.P. 281.* *Polygonum maritim. latifolium arborescens* *Elem. Bot. Tom. 1. 411.*
- Polygonum maritimum* longius radicatum nostras *Serpylli folio circinato crasso* nitente *Phytogr. Tab. 53. fig. 3.* An *Polygonum minus lentifolium* *C.B.P. & Prodr.* *Polygonum minus Monspeliensium* *Park. Huic proximè conveniret, Polygonum Herniariæ foliis & facie peramplâ radice Astragaliti. Adv. si hæc Herbula non esset tota incana, nostra autem glabritie splendet. Fortè Herniaria marina Lusitanica Griseii, fortè etiam Polygon. maritim. repens Lusitanicum rotundifolium Elem. Bot. Tom. 1. 411.*
- Polygonum minus procumbens niveum*, facie *Glaucis exiguæ* *Phytogr. Tab. 52. fig. 7.* *Polygala repens nivea* *C.B.P. 215.* *Polygala repens Nuperorum.* *Obs. & Icon. Lobel.*
- Polygonum minus candicans supinum* *Botan. Monsp. 209.* *Paronychia Hispanica Clusij* s. *Anthyllis nivea* *J.B. T. 3. 374.* *Paronychia Hispanica Clus. Hist. posterior. 182.*
- Polygonum minus candicans capitulis surrectis* *Botan. Monsp.* *Polygonum montanum minimum niveum & sericeum Adversar.*
- Polygonum minus* s. *Millegrana major* *C.B.P.* *Herniaria* *J.B. Tom. 3. 378.* *Herniaria glabra* *Morif. Hist. 2. 593.*
- Polygonum minus* s. *Millegrana major hirsuta* *C.B.P.* *Herniaria hirsuta* *J.B. Tom. 3. 378.* *Herniaria hirsuta segetum annua Griseij.*
- Polygonum minus* s. *Herniaria fruticosa*, viticulis lignosis *C.B.P.* *Polygonum Herniariæ folio & facie, peramplâ radice Astragaliti Adversar.*
- Polygonum Iluense* capitulis ad genicula echinatis *Paul. Boccon. de Pl. Sicul. 40.*
- Polygonum parvum* flore albo verticillato *J.B. Tom. 3. 378.* Extra scopum jaculatur *D.J. Rajus* cum hanc ad *Polygalam* repentem *Nuperorum* *Lob. refert Raij Synops. 40.*
- Polygonum minimum muscosum* *Boccon. 56. majori Mense plurimum vidit in satis luci Gramuntij* *D. Magnol. modò viride est, aliquando purpurascit. Fortè Polygoni genus Herniariæ ex Candiâ nomine receptum C.B. phytopin. 551.*
- Polygonum Selinoides Maderaspatense* *Thymi capitati foliis incanum* *Phytogr. Tab. 120. fig. 2.*
- Polygonum Selinoides* s. *Knawel Gerard.* *Polygonum angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens* *C.B.P.* *Polygonum 3<sup>m</sup>. Dodonæi* s. *tenuifolium* *J.B. Tom. 3. 377.*
- Polygonum gramineo folio majus erectum* *C.B.P. 281.* *Polygonum minus alterum. Tabern. Icon. Part. 2. 835.* *Alchimilla gramineo folio minori flore* *Elem. Bot. Tom. 1. 409.*
- Polygonum Germanicum* incanum flore majori perenne. *Raij Hist. Pl. 213.* *Polygonum angustissimo & acuto vel gramineo folio montanum* *Schol. Bot. 120.* An *Polygonum alterum Germanicum* *Park. Tb. 446.* Fortè *Vermiculata* montan. nova *Col. ecphr. 295.* *Polygon. montan. Vermiculatæ foliis* *C.B.P.*
- Polygonum Germanicum* caule folioso, flosculis in summitate *Phytogr. Tab. 103. fig. 6.*



fig. 6. An Polygono angustissimo folio affinis *CBP.* s. Hæmorrhoidalis quæ ad Caryophylleorum Sylvestrium classem referri debere *Clusius* putavit *Hist. app. alt. ad libr. 6.* Forte etiam Polygonum *Polonicum* cocciferum *J B. Tom. 3.*

• Polygonum Juncoide Scoparium ex Insulis *Fortunatis*, *Phytogr. Tab. 311. fig. 3.* An Alfine alpina junceo folio *CBP. 251. & sub 4. In Prodr. pag. 118. proposita.*

Polygonum *Africanum* Juncoide frutescens Equiseti facie ramosum. An Equisetum montanum *Creticum Prosp. Alpin. exot. 141.*

Polygonum maritimum Equiseti folio minus bacciferum. Polygonum maritimum bacciferum minus *CBP. 15.* Tragos s. Uva marina *Camer. Lobel. & aliorum.*

• Polygonum maritimum Equiseti folio, s. Tragos vel Uva marina minor ex *Capite Bon. Spei. Phytogr. Tab. 310. fig. 7.*

POPULUS nigra *CBP. 429.* Populus nigra s. *αἰγίεα J B. T. 1. 159.*

Populus alba *Park. Th.* Populus alba *λαύκη J B. 160.* Populus alba, quæ *λαύκη* ab albedine dicitur, majoribus foliis *CBP. The White Poplar, or The Dutch Abele.*

Populus alba foliis minoribus *CBP. Park. Th.* Populus alba folio minore *J B. Tom. 1. The English Abele.*

Populus *Lybica Plinij κερνὴς Theophrasti J B. T. 1. 163.* Populus tremula *CBP. 429. The Aspen or quivering Poplar.*

PORRUM radicè Cepæ *Holmense* odore & sapore Allij. Scorodoprassum 1<sup>a</sup>. *Clus. Hist. 190.* Allium Sphæriceo capite, folio latiore s. Scorodoprassum alterum *CBP. 74.* fortè etiam Porrum sylvestre folio latissimo *ejusd. CBP.* Scorodoprassum dictum *J B. T. 2. 558. Raij Hist. Pl. 1120.* Item Allium montanum majus *Anglicum Neutoni ejusd. Raij Hist. 1125.* Allium maximum multis porraceis foliis latioribus, Sphærico capite ex floribus albis conflato. *Morif. Hist. 2. 387.* In parvâ Insulâ *Holmes* dictâ suprâ *Bristoliam* in *Sabrinæ* æstuario copiosè provenit, ut nobis etiam retulit idem *Neutonus inventor.*

PORTULACA latifolia s. sativa *CBP. 288.* Portulaca hortensis latifolia *J B. T. 3. 678.*

Portulaca sativa latifolia flavescent, s. foliis aureis *HRP. 146.* Portulac. sativ. lutea s. aurea *Raij Hist. 1039.*

Portulaca subrotund. foliis minor *Americana.* Fortè *Cueyauh-Quilitl* Nov. Hisp. *Terent. apud Recc. 375.*

Portulaca angustifolia s. sylvestris *CBP.* Portulaca sylv. minor, s. spontanea *J B. T. 3.* An Kara-Tsjira *H. Malab. Part. Tab. 36.*

Portulaca *Curassavica* angusto longo lucidoque folio procumbens, floribus albis *HRH. Phytogr. Tab. 216. fig. 1.*

Eadem floribus rubris. Portulaca *Americana* procumbens longo levique folio glauco, flore purpureo pulchro *Anagallidis Breyn. Prodr. 2.*

Portulaca *Curassavica* lanuginosâ Kali folio erectior & elatior flore rubente *PBP. Phytogr. Tab. 105. fig. 4. & Tab. 247. fig. 6.* Portulac *Americana* erecta lanuginosâ, foliis Psyllij, floribus in caulum summo rubro-obsoletis majoribus *Breyn. Prodr. 2. 86.*

Portulaca lanuginosa procumbens Vermiculatæ foliis *Americana Phytogr. Tab. 105. fig. 5.* Portulaca *Americana* procumbens Sedi teretifolii foliis & facie, floribus in ramorum summo pulchrè purpurascentibus *Breyn. Prodr. 2. Beldroga fortè Lusitanis*



- tanis* s. *Caaponga Brasiliiana* 3<sup>a</sup> *Pisonis* 244. *capsulis in summo concavis*.  
 Eadem capsulis in summo nonnihil acuminatis *Phytogr. Tab. 247. fig. 7.*  
*Portulaca Americana* latifolia ad foliorum ortum lanugine obducta, longioribus  
 aculeis horrida. *Phytogr. Tab. 215. fig. 6.*  
*Portulacæ* similis *Planta Ind. Orient. Phytogr. Tab. 216. fig. 3.* An *Brami Malabarorum*. *H. Malab. Part. 10. Tab. 14.* *Glaux Indica* *Portulacæ* folio, flore majore  
 dilutè cæruleo albicante colore *Commel.*  
*Portulacæ* affinis *Polygonoides Blitifolio* & facie *Maderaspatensis* *Phytogr. Tab. 120.*  
*fig. 3.*  
*Portulaca scandens* *Acetosæ* subrotundis foliis coevis *Americana* *Phytogr. Tab. 248.*  
*fig. 3.* *Acetosa* (fortè) rotundifolia viminea *Lusitana Griseii.* An huic spectat  
*Alhaut Theveti herba in Insula Succhen Æthiopico litori adjacente in rupibus sese*  
*latè diffundens de qua vid. J B. T. 2. 66. Folia habet ferè Capparis cujus fructus*  
*germina s. capitula sunt rotunda. Idem esse suspicor cum herbâ Sinus S<sup>ti</sup>. Augustin*  
*fructu Cappari simili, Purchesii Navigat. Tom. 1. 418. foliis rotundis viridibus &*  
*crassis; Incolæ Essac vocant. & in acetariis adhibent.*  
**POTAMOGEITON** pellucidum nostras foliis longis perangustis, apicibus acutis.  
 An *Potamogiton* foliis angustis splendentibus. *CBP. 193.* *Potamog.* aquis immer-  
 sum, fol. pellucido, lato, oblongo, acuto, *Raij Synop. 1. 61.*  
*Potamogiton perfoliatum Raij. Synops.* *Potamog.* foliis latis splendentibus *CBP.*  
*Potamogiton altera Dodonæi J B. Tom. 3. 778.*  
*Potamogeton lucens* folio plano mucronato brevi. *Fontalis media lucens J B. T. 3.*  
*777. Potamogeton racemosum angustifolium ejusd. J B. 778. CBP. & Prodr.*  
*101. Tribuli aquatici minoris nomine à D. Franco missum ex Lusatia. Idem pro-*  
*pè Monspelium ad Molendinum in aquâ fluitans reperitur; & in Angliâ nostrâ*  
*fatis frequens. Tribulus aquaticus minor Muscatellæ floribus Gerard. emac. Fo-*  
*liis planis brevioribus & in caule conjugatim dispositis à sequenti differt.*  
*Potamogiton s. Fontalis crispa J B. Tom. 3. Potamog. foliis crispis s. Lactuca rana-*  
*rum CBP. 193. Qui hanc speciem cum priori eandem perperam facit. Tribu-*  
*lus aquaticus minor Quercûs floribus Ger. emac.*  
*Potamogeton fluviale Sargazo simile lucens, foliis margine dentatis. Phytogr.*  
*Tab. 216. fig. 4. Fluvialis Pisana foliis denticulatis J B. Tom. 3. 779.*  
*Potamogeton perpulchrum nostras lucens, angustissimis longis & obtusis foliis,*  
*pallidè virentibus. Salici marinæ Park. Th. 1303. foliis haud multum dispar,*  
*& fortè Idem est.*  
*Potamogeton caule compresso, folio Graminis Canini Raij Hist. Pl. 189.*  
*Potamogiton pusillum gramineo folio, caule rotundo Raij Hist. Pl. 190. Potamo-*  
*geton pusillum fluitans Boccon. 42.*  
*Potamogiton Millefolium s. foliis Gramineis ramosum Hist. Pl. 189. An Potamo-*  
*giton gramineum ramosum. CBP. 193. J B. T. 3. 778. Park. Th. 1255.*  
*Millefolium tenuifolium Ger. emac. quoad Icon. 828.*  
*Potamogiton pusillum maritimum folio gramineo Raij Synops. 35. An Potamo-*  
*geton minimum capillaceo folio CBP. quod 3. in Prodr. 101.*

Potamogiton



Potamogiton maritimum gramineis longioribus foliis, fructu ferè umbellato. Potamogiton maritimum pusillum alterum, seminibus singulis, longis pediculis insidentibus *Raij Synops. ibid.* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab. 248. fig. 4.*

Potamogiton maritimum grandiusculis capitulis, capillaceo folio nostras. *Phytogr. Tab. 216. fig. 5.*

Potamogiton similis Graminifolia ramosa, & ad genicula polyceratos. *Phytogr. Tab. 102. fig. 7.* Potamogiton affinis Graminifolia aquatica *Raij Histor. Plant.*

Potamogiton foliis pennatis *Elem. Bot. Tom. 1. 200.* Millefolium aquaticum pennatum spicatum *C B P. 141.* Millifolium pennatum aquaticum *J B. Tom. 3. 783.*

POTERION quibusdam s. Pimpinella spinosa *J B. T. 1. 409.* Poterio affinis foliis Pimpinella spinosa *C B P. 388.* Pimpinella spinosa s. Sempervirens *Morif. Umbel. 57. H. Leyd. 496.*

Idem foliis densâ hirsutie pubescentibus.

POTERIUM latifolium *Asiaticum Breyn. Cent. 1. fol. 74.* Megasac Syrorum *Rawolf Hodæporic. 118.* qui pro Poterio *Matthioli* habuit; à quo tamèn (inquit *Breynius*) foliorum magnitudine, inque aculeum desinentium, permultùm differt, idèoque genus peculiare rarissimum constituere facit. Astragali (fortè) aculeati fruticosi genus *Syriacum*, folio amplo in aculeum desinente.

Poterium alterum densiùs ramificatum *Prosper. Alpin. exot. 51.* An *Tragacanthæ* tertium genus *Rawolfio Hist. Lugd. in append. 32.*

POUTALET SJÆ *Malabororum*, similis, Arbuscula *Maderaspatensis Phytog. Tab. 54. fig. 1. H. Malab. Part. 4. Tab. 57.* Baccifera *Indica* baccis oblongis in Umbellæ formam dispositis *Raij Hist. Pl. 1634.* Speciem esse *Ligustri* suspicatur *Commelin in Not.*

PRIMULA Veris *Turcica Tradescanti* flore purpureo *Park. Tb. 534.* *Carchichec Turcarum* s. *Primula Veris Constantinopolitana Cornuti 55.*

*Primula Veris Constantinopolitana* s. *Carchichec polyanthos Raij Hist. Pl. 1081.*

*Primula Veris perelegans* flosculis plurimis in communi calyce conglomeratis. An *Verbasculum D. Hesketi Park. Paradis.*

*Primula Veris Sylvarum* flore multiplici *Hist. Lugd. 835.* *Verbasculum sylv.* magno plenoque flore *C B P. 242.* *Prim. Veris floribus, plenis ex singularibus pediculis J B. T. 3. 497.*

*Primula Veris caulifera* pallido flore inodoro, aut vix odore *J B. 496.*

*Primula Veris* flore geminato inodora.

*Primula Veris odorata* flore luteo simplici *J B. 495.* *Verbasculum pratense odoratum C B P. 241.*

*Primula Veris caulifera maxima* flore pleno *J B. 496.* *Verbasculum hortense multiplex C B P.*

*Primula Veris* flore geminato s. altero alteri innato, *Verbasculum proliferum C B P. 242.*

*Primula hortensis umbellata* major caule & flore foliosa *H. Leyd. 506.*

*Primula Veris minor purpurascens J B. T. 3. 499.* *Primula Veris minor rubra Eboracensis*



*racensis* foliis parvis glabris Auriculæ Urſi inſtar *Moriſ. Hiſt.* 2. 555. Verbaſc. Alpin. Umbellat. minus C B P.

- PRUNUS Sebeſtena *Matthioli Hiſt. Lugd. Phytogr. Tab.* 217. fig. 2. Sebeſtena domeſtica, ſubrotundis foliis, àν *Ομαμαξίς Athenæo C B P.* 446. Sebeſten domeſtica *Pr. Alpin de Pl. Ægypt.* Myxa domeſtica s. Sebeſten *J B. Tom.* 1. 197.
- Prunus Sebeſtena longiori folio *Maderaspatenſis Phytogr. Tab.* 217. fig. 3. Sebeſtena ſylveſtris C B P. Sebeſtena ſylv. *Pr. Alp. Vidimaram H. Malab. Part.* 4. Prunus *Malabarica* fructu racemoſo, calyce excepto *Raij Hiſt.* An Igli arbor de Inſulâ *Solar Zanoni Iſtor. Bot.*
- Pruno Sebeſtenæ ſimilis *Americana P B P.* 374. Fortè Tezcapatli *Nov. Hiſp. Terentij* apud *Recc.* 413. Fortè etiam Tſjem-tani *H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 11. Myxa pyriſormis officulo triſpermo *Raij Hiſt. Pl.* 1556. àν *Calabura alba.*
- Prunus pentaphyllos *Malabarica* fructu calyci inſidente *Raij Phytogr. Tab.* 218. fig. 4. Karyl *H. Malab. Part.* 4.
- Prunus Sylveſtris cortice albicante, punctatis foliis *Americana, White Plumme Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 216. fig. 8.
- Prunus ſylveſtris *Virginiana* fructu luteo rubente rotundo, officulo lato & compreſſo. *Phytogr. Tab.* 216. fig. 7. An Macaxochotl s. Prunus Cervinns *Nieremberg. exot.* 318. Mezaxochotl *Nov. Hiſpan.* apud *Recc.* 384. Prunus *Curassavica* Macaxa dicta *P B P.* Forte etiam Prunus *Virginiana* rubra *Arbuto ſimilis Joſt. Dendrol.* 79.
- Pruniſera *Jamaicensis* fructu rubro, cujus antè maturitatem, folia non promi. An Arbor ſine foliis C B P.
- Prunus ſylveſtris Inſulæ *Barbados* Myrtifolia, fructu acerbo & ingrato ſapore *Phytogr. Tab.* 217. fig. 1. An Pruno cereo ſimilis fructus *Africanus C B P.* 444. Ergen arbor foliis Myrti, fructu pruni cerei, offe Amygdali magnitudine lineis binis diſtincto. in *Præſat. Part.* 1. *Ind. Orient.* Argan s. Erguen Nux aut potius Prunus in *Hea* Provinciâ regni *Morocce* ex cujus nucleis oleum exprimitur *Ogilv. Afric.* An Arbor tinctoria *J B. T.* 1. ex *Theveto.* Fortè etiam Arbore Tint *Terræ Nigritarum* ejuſd. *Ogilv. Afric.* 345.
- Prunus Myrtifolia ſpinofa, Umari *Brasilienſibus* dicta, fructu Argan s. Ergen haud diſſimili. Umari arbor *Piſon.* 174. cujus fructus Camarinhas appellant *Lufitani.*
- Prunus *Javanica* Atriplicis foliis *Commelin,* Kakouſa *Javanis H. Beaum. Phytogr. Tab.* 218. fig. 2. Elemniſeræ noſtræ *Sherardinæ Phytogr. Tab.* 173. exhibitæ quamproximè accedere videtur.
- Pruniſera Fago ſimilis arbor Gummi Elemi fundens, fructu figurâ & magnitudine Olivæ ex Inſulâ *Barbadenſi Phytogr. Tab.* 217. fig. 4. An Icicaraba *Brasilienſium Piſonis,* lib. 4. In hujus officulum *Veneris immunda verenda à Naturæ penicillo figurantur.*
- Pruniſera arbor s. Nuci-pruniſera folio dodrantali longitudine, lævi mollitiæ prædito *Barbadenſibus Bully-Bay,* nuncupatur. *Phytogr. Tab.* 218. fig. 1. Fortè Katou-Tſjerou s. Cheru *H. Malab. Part.* 4. An Acomas arbor *Caribeorum Montis ſerrati Rochforti Hiſt. de Antill. Ogilv. Amer.* 371.
- Pruniſera s. Nuci-pruniſera arbor *Americana* Lauri ſubrotundis denſioribus foliis, apicibus tantum mucronatis. *Damozen Tree Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab.* 217. fig. 6. Igcica (forte) de *Laet. lib.* 15. Fortè etiam huc ſpectat Arbor innominata Lauri foliis *Mareg. lib.* 3. cap. 9.



Prunifera vel Nucifera s. Nuci-prunifera arbor *Americana* præcella angustis Laurifoliis lætè virentibus Mastichen odoratam fundens *Phytogr. Tab. 217. fig. 5.* **The Mastike Tree** (i. e.) *Lentiscus arbor Barbadosium Ligonis.* An Jamboloniafera *Garcia Jambolins Acoft. Hist. Arom. Igiciga* (fortè) & *Igtaigcica Brasiliens. de Laet. Ind. Occid. lib. 15. cap. 8.*

Prunifera *Americana* Laurifolia diphyllous, Glycoxylum (i. e.) **Sweetwood Barbadosibus** dictum. Ibirae'e *Brasiliensium* (i. e.) Lignum dulce s. Guajacum *Pisonis* 146. *Sunt enim qui Guajaci s. Lign. sancti speciem esse contendunt.* Hiourace *Lerij & Thevet.* An Guaiaco viribus similis *Indica C B P. 448.* Maggai, Indi Morbum *Gallicum* curant, ejus suffimigio sudores movendo *Fragos.* Fortè Lignum sanctum *Castor. Durant. Herbar. 250.* Palma aut Palum sanctum *Indiæ Occid. Adversarior. 440.* An Lignum dulce ex *Bonairo P B P. 346.*

*Prunus Americanus* officulo magno ex filamentis lignosis reticulatim conflato *Hughesij Phytogr. Tab. 218. fig. 3.* *Acaja Brasiliensium Pisonis.* *Acaja* quæ & *Ibame-tara Brasiliensibus Marcgr.* *Prunus Brasiliensis* fructu racemoso, ligno intus pro officulo *Raij Hist. Pl. Pruna Congiana lutea C B P. 444.* *Ozeghes Æthiopie Ogilv. Afric. 529.* *Ogeghe arbor, fructu luteis prunis simili Pigafettae descript. regn. Congian. Ogeghe Indica JB. Tom. 1. 200.* *Prune's d'Momins à Tertreo. perperam nuncupantur.* An fortè sint *Prunes d'Icaque Rochforti des Antill. 56.* *Icaco s. Prunus Icaquensis* quorundam. **The large sweet scented Plum of America,** *Hujus quoque Arbor magna & procera peculiare hoc habet, quod in eâ Volucres Picæ magnitudinis, nigris & aureis plumis vestitæ pendulos nidos construunt, ut insidias serpentum aliorumque noxiorum Insectorum declinent. Hujus nidos varie constructos cum eorum Architectonicis Aviculis elegantè asservatis, in Musæo Cortiniano omnium rerum naturalium instructissimo, sæpè conspeximus; à Galbulis s. Galgulis Aldrov. (i. e.) Chloreis Aristot. & Icteris Plinij haud diversæ sunt.*

Prunifera arbor *Maderaspatana* Mali *Perficæ* foliis rugosis *Phytogr. Tab. 312. fig. 2* *Anninchil & aliquando Hoeligo Hottentottorum Capit. Bonæ Spei.*

Prunifera arbor *Americana* fructu luteo ovali, officulo majore, quorum nuclei ad Porcos saginandos ipsis glandibus præferuntur. *Moubain Caribeis & Fat-Porke Barbadosibus* dicta; Item **Dog-wood Jamaicensibus** *Anglis.* *Mombina & Mommina;* Arbor quâ crescunt folia habet *Fraxini & molem Quercus Europæ* è succo hujus fructus fit *Ouicon potus qui non secus atque optimum vinum inebriat.* An *Hobos* fructus cum nucleo, cujus Arbor alta *Hovos* dicta, umbraque grata *Monf. Fumee* Fortè *Hobos, Pacayes s. Guavas Part. 9. Ind Occid. lib. 4. cap. 26. C B P. 417.* Item *Myrobalanis flavis* similis fructus ejusd. *C B P. 446.* *Hovos* fructus in *Nov. Hispaniâ Gomar. Hobus s. Hovus Benzoni Part. 4. Ind. Occid. cap. 28. & Oviedo in Hist. Ind. Hobus & Hovus Indica Prunifacie JB. T. 1. 199.* ejusd. meminit *Petr. Martyr. de Nouo orbe lib. 9. decad. 2.* *Hovos* arbor prunis persimilem generat fructum & formâ & sapore, sed aliquantò grandiolem, hanc *Myrobalanum* esse pro certo habent; Est *Hispaniolæ* adco familiaris, ut ejus fructibus Porci-Saginantur. In *Novâ Hispaniâ* (inquit *Fragosus*) Fructum *Dactilorum* modo nanci *Hovos* nomine *Myrobalanis flavis* adco similem, ut plerique eundem esse contendunt.



Prunifera arbor *Americana* nucleo osseo scaphoide prægrandi. An Guiti-iba cujus fructus Guiticoroya dicitur *Pisonis & Marcgr. lib. 3. c. 9. 114.* Arbor prunifera *Brasilienf.* fructu maximo officulo ligneo *Raij Hist. Pl. 1554.*

PRUNO sylvestri affinis *Canadensis* *C B P. app. Phytogr. Tab. 218. fig. 5.* Hypericum frutescens *Americanum* flore albo *Park. Th. 575.* Hæc planta una cum spiræa frutice capsulas stellatas Sedi instar profert, ut nos monuit *D. Banisterus.* Spiræa Hyperici folio non crenato *Elem. Bot. 490.* & fortè Syringa alba s. *Philadelphus Athenæi* quoad Capsulæ convenientiam, cum his sortiri mereatur.

PTARMICA foliis profundius ferratis lætè viridibus elatior *H. Leyd. app. 694.* Dracunculus Alpinus latifol. ferratus *Schol. Bot. 173.*

Ptarmica Alpina incanis ferratis foliis *H. Leyd. ibid.* Dracunculus pratensis alter Alpinus foliis Agerati *H R P. Schol. Bot. 173.*

Ptarmica Alpina Millefolii facie, caliculis squarrosis apud *Collectaneas D. Wheeleri.*

Ptarmica incana humilis, foliis laciniatis Absinthii æmulus *H. Leyd. 510.* Absinthium Alpinum Umbelliferum latifolium *C B P. 134.* Absinth. albis floribus, capitulis squarrosis *J B. Tom. 3. 183.*

Ptarmica Alpina Matricariæ foliis *Triumphetti Obs. 83.* Ptarmica Alpina s. Dracunculus Alpinus Scabiosæ folio laciniato *Park. Th. 858.* Dracunculus Alpinus folio Scabiosæ *C B P. 98.* Corymbifera Millefolii Umbellâ, folio alato, & laciniato *Raij Hist. Pl. 345.*

Ptarmica *Virginiana* Scabiosæ *Austriacæ* foliis indissectis *Phytogr. Tab. 53. fig. 5.* & *Tab. 219 fig. 1.* Ptarmica *Virginiana* folio Helenij *Moris. prælud. 166.* & 297. Pseudocostus *Virginiana* s. Anonymos corymbifera *Virginiana* flore albo. *Raij Hist. Pl. 363.* Hujus specimen jam ante triginta circiter annos in Horto *D. Walkeri* apud *Westmonasterium* legimus, cujus filius hanc plantam cum aliis rarioribus è *Virginia* Patri suo in *Angliam* transmisit.

Ptarmicæ *Virginianæ* (quoad foliâ saltèm) similis Planta *Americana* floribus sparsis hexapetalis ex *Codice Beningiano Phytogr. Tab. 219. fig. 2.*

PULEGIUM densis furculis *Park. Th. 29. H R B. 166. Raij Hist. Pl. 533.*

Pulegium rotundifolium majus sativum. Pulegium latifolium *C B P.* Pulegium regium *Ger.*

Pulegium rotundifolium palustre minus. Fortè Pulegium foliis Nummulariæ *C B P.*

PULSATILLA purpurea cæruleavè *J B. Tom. 3. 409.* Pulsatilla folio crassiore & majore *C B P. 177.* Pulsatilla *Danica* *Park. parad.*

Pulsatilla flore clauso cæruleo *J B. T. 3. 410.* Pulsatilla flore minore nigricante *C B P.*

Pulsatilla polyanthos violacea, Anemones folio *Breyn. Cent. 1. 132.* Pulsatilla folio Anemones secundæ s. subrotundo *C B P. ibid.*

Pulsatilla flore obsoleto, caule nudo *Breyn. Cent. 1. 135.*

Pulsatilla alba *Lobelij Hist. Lugd 849. J B. Tom. 3.* Pulsatilla flore albo *C B P. Park, &c.*

Pyrethrum Umbelliferum *C B P. 148.* Pyrethrum Umbelliferum 1<sup>m</sup>. *Park. Th. Pyrethrum umbelliferum Matthioli J B. Tom. 3. lib. 27. 20.*

Pyrethrum Umbelliferum alterum *Park. Th. Pyrethrum foliis Anethi C B P. Pyrethr. Gesnero J B. 21.*



PYROLA *J.B. T. 3. 535.* Pyrola nostras vulgaris *Park. Th.* Pyrola rotundifolia major *C.B.P. 191.*

Pyrola rotundifolia minor flore amplo singulari. *Pyr. rotundif. min. C.B.P.* Pyrola 4<sup>a</sup>. minima *Clus. Hist. 2. 118.*

Pyrola folio serrato *J.B. T. 3. 536.* Pyrol. folio mucronato serrato. *C.B.P.* Pyrola tenerior *Park. Th.*

Pyrola fruticans *J.B. T. 3. 536.* Pyrola frutescens Arbutifolia *C.B.P. 191.*

Pyrolæ affinis Alsinanthes nostras Alpina. Pyrola Alsinæ flore *Europæa C.B.P.* Herba trientalis *J.B.*

Pyrolæ affinis *Virginiana* repens fruticosa, foliis rigidis, scabritie asperatis, flore pentapetaloide fistuloso. *Phytogr. Tab. 107. fig. 1.* Pyrola repens foliis scabris, flore pentapetaloide fistuloso *Banisteri.*

Pyrolæ affinis *Malabarica* Kurinti-kali *H. Malab. Part. 10. Tab. 21.* Violæ folio *Malabarica Baccifera Commelini.*

Q.



QUERCUS calice echinato glande majore *C.P.B. 420.* *Ægilops* s. *Cerrus* mas majore glande *Park. Th. 1387.* *Cerrus* s. *Quercus* 4<sup>m</sup>. genus *Hist. Lugd. 6.* *Cerrus* *Ægilops*, *Aspris Theophrasti* putata *J.B. Tom. 1. l. 7. 77.*

*Quercus Virginiana* fructu magno, calyce squamoso; *Mangum-menauck Indigenis.* Fructus peregrinus 21. *Clus. exot. lib. 2. cap. 16.*

*Quercus* foliis molli lanugine pubescentibus *C.B.P.* Robur 1<sup>m</sup>. *Clus. Hist. 19.*

*Quercus parva* s. *Phægus Græcorum* & *Esculus Plinij* *C.B.P.* *Phægus* vel *Esculus* *J.B. T. 1. 74.* *Phagus* s. *Esculus* *Park. Th. 1387.*

*Quercus Esculi* divisurâ, foliis amplioribus aculeatis. *Phytogr. Tab. 54. fig. 4.* An *Quercus alba Virginiana* *Park. Th.* *Quercus alba Banisteri* *Cat. Stirp. Virgin. apud Raij. Hist. app.*

*Quercus Virginiana* rubris venis, muricata. *Phytogr. Tab. 54. fig. 5.* The Scarlet Oake nostratibus dicta. in *Hort. Comptonian.* plurimas hujus Arbores ex glandibus natas observavimus.

*Quercus Americana* rubris venis, foliis media parte in ventrem tumentibus.

*Quercus Castaneæ* foliis, procera Arbor *Virginiana.* *Phytogr. Tab. 54 fig. 3.* *Raij Hist. app. 1916.*

*Quercus pumilis* *Castaneæ folio Virginienfis* The Chinquapin Oake, Adeo humilis est in hoc genere Arbor, ut sesquipedalem altitudinem vix unquam attingit, atque nihilo minus speciosas glandes & perpulchras profert. *Quercus pumila* *Castaneæ folio minore Americana* *Mus. Reg. Soc. Lond.* Hemeris quædam s. *Quercus pumila* in *Novâ Angliâ* nascens, cujus mentionem factam invenit in *D. Evelyni Sylvâ*; inque *Act. Philosoph. Londinensibus* *D. Raij Hist. Pl. 1388.* Robur 7. *Clusio* *J.B.*



*J.B. Tom. 1. 76. Quercus pumila fruticis specie, fronde Ilicis molliore Lobel. Icon. Part. 2. 157. Quercus pedem vix superans C B P. 420.*

*Quercus pumila Bengalenſium glandibus exiguis calyce dentato. Veloweſa Indigenis dicta.*

*Quercus Virginiana ſempervirens, foliis oblongis ſinuatis, & non ſinuatis. D. Baſiſter Ad Ilicem (fortè) accedit hoc genus.*

## R.



ANUNCULUS nemorosus flore majore *Morison. Hist. 2. 437.*

Ranunculus phragmites albus vernus *J.B. Tom. 3. lib 30. 412. Anemone nemorosa flore majore C B P. 178.*

Ranunculus phragmites purpureus vernus *J.B. ibid. Anemone nemorosa flore majore ex purpura-rubente C B P. variat etiam floribus albo, purpureo necnon cœlesti colore repletis.*

Ranunculus nemorosus foliis minoribus elegantèr incisis, flore luteo simplici. Anemone Nemorum flore luteo *Bobarti.*

Ranunculus Anemones 3<sup>a</sup>. *Matthioli folio procerus, flore parvo obsoleto Caroliniensis Fortè Anemone nemorosæ affinis peregrina 2<sup>a</sup>. flore herbacei coloris C B P. Anemone sylvestris peregrina viridis Park. Th. Raij Hist. Pl. 625.*

Ranunculus nemorosus Thaliætri foliis *C B P. Ranunculus præcox 2<sup>us</sup>. Thaliætri folio Clus. Histor.*

Ranunculus nemorosus Aquilegiæ foliis *Virginiana Asphodeli radice Phytogr. Tab. 106. fig. 4. Ranunc. Thaliætri foliis grumosâ radice Baſiſter. Cat. Stirp. Virgin.*

Ranunculus Thaliætri folio Asphodeli radice *Morif. Hist. 2. 438. Ranunc. Thaliætri folio minor Asphodeli radicibus Park. Th. 336. Oenanthe Hederæ foliis C B P. 163. Oenanthe Myconi J.B. T. 3. 192. verum eſſe Thaliætri ſpeciem affirmat Schola Botanica, 12.*

Ranunculus *Rupertianus* tuberosâ radice, flore cæruleo. Anemone Geranifolia *J.B. T. 3. 405. Anemone tenuifolia, s. Geranifolia cærulea Park. Th. Anemone Geranii Robertiani folio, cærulea; an Dioscoridis C B P.*

Ranunculus Nemorum Fragariæ foliis *Virginianus Baſiſt. Phytogr. Tab. 106. fig 3.*

Ranunculus nemorosus dulcis secundus *Tragi Park. Th. 327. Ranunc. nemorosus, s. syluaticus folio subrotundo C B P. 178. Ranunc. rotundifolius Vernus syluatic. J.B. Tom. 3 app. 841. Ranunculus auricomus Gerard.*

Ranunculus rotundifolius Vernus syluaticus major, s. *Cassubicus* foliis Thoræ s. Calthæ *Breyn. Prodr. 45. Inter delineationes nostras exhibetur.*

Ranunculus *Virginianus* parvo flore, teneriori folio *H. Leyd. 514. Ranunculus auricomus Virginiensis Bobarti.*

Ranunculus pratensis repens *Park. Th. 329. Ranunculus pratensis repens hirsutus C B P. 129. Ranunc. repens flore luteo simplici J.B. Tom. 3. 419.*

Ranunculus repens flore pleno *Park. Th. 328. J.B. Tom. 3. 420. & in Append. ubi consummatam*



- consummatam hujus historiam inveniat Lector. *Ranunculus hortensis inclinans* *C B P.* 179.
- Ranunculus pratensis* radice Verticilli modo rotundâ *C B P.* *Ranunc. bulbosus* *Park. Th.* 329. *Ranunculus tuberosus* *J B. T.* 3. 417.
- Ranunculus bulbosus* flore pleno *C B P.* 179.
- Ranunculus* maximo tubere, flore magno pleno. *J B. T.* 3. 418. *Ranunculus* radice tuberosâ, flore pleno & prolifero *C B P.* 179. *Ranunculus Anglicus bulbosus* *Park. Th.* 329.
- Ranunculus* *Rutæ* folio multiplex flore ex luteo pallescente, petalis reflexis. An *Ranunc. Rutæ* folio serotinus flore aureo pleno *H R P.* 152.
- Ranunculus pratensis erectus* dulcis *C B P.* 129. *Park. Th.* 327. Huic fortè pertinet *Hoitzilziltenxochitl* *Nov. Hispan. Terentij* apud *Recc.* 379.
- Ranunculus pratensis* dulcis flore multiplici *Park. Th.* 328. *Ranunc. rectus* non repens flore pleno *J B. Tom.* 3. 416. *Ranunc. dulcis* flore pleno *C B P.* 179.
- Ranunculus pratensis erectus* acris *C B P.* 178. *Ranunc. rectus* non repens flore simplici luteo *J B. T.* 3. 416. *Ranunc. pratensis erectus* acris vulgaris *Park. Th.* 329.
- Ranunculus rectus* foliis pallidioribus hirsutis *J B. T.* 3. 417. *Raij Hist. Pl.* 582.
- Ranunculus hirsutus* annuus flore minimo *Raij Hist. Pl.* 583. *Phytogr. Tab.* 55. fig. 1.
- Ranunculus arvorum* *Park. Th.* 329. *Ranunc. arvensis echinatus* *J B. T.* 3. *App.* 859.
- Ranunculus echinatus Creticus* *Park. Th.* 330. Itèm *Ranunculus Apuleij* quibusc. *ejusdem*, *Ranunculus echinatus stellatus Creticus* *C B P.* 180. Itèm *Ranunc. palustr. echinatus ejusd.* *Ranunc. stellatus palustris echinatus* *J B. T.* 3. *App.* 858. *Ranunc. Creticus echinatus latifolius* *Pr. Alpin. exot.* 263.
- Ranunculus palustris* *Apii* folio lævis *Park. Th.* 1216. *Ranunc. palustris* flore minimo *J B. T.* 3. *App.* 858.
- Ranunculus palustris* *Apij* folio lanuginosus *C B P.* 180. *Ranunculus Sardonius lanuginosus* *Park. Th.* 1216.
- Ranunculus aquaticus hederaceus* albus (non luteus) *C B P.* *Raij Hist. Pl.* 586. *Ranunc. hederaceus* *Rivulorum* se extendens atrâ maculâ notatus *J B. T.* 3. 782.
- Ranunculus hederaceus aquaticus* *Park. Th.* 1216. *quoàd* *descript.* Nam figura & *Synonima* sunt *Lenticulæ aquatic. trifulcæ* ut rectè animadvertit *Cl. Rajus. Hist. Pl.* 586.
- Ranunculus aquaticus Hepaticæ facie* *Park. Th.* 1216. *Ranunc. aquaticus* folio rotundo, & capillaceo *C B P.* 160. *Ranunc. aquatilis* albus tenuifolius *J B.* *quoàd* *Iconem. Tom.* 3. 781.
- Ranunculus aquaticus* omnino tenuifolius *J B. T.* 3. 781. *Ranunc. aquaticus* capillaceus *C B P.* 180. Itèm *Millefolium aquaticum* foliis *Abrotani*, *Ranunculi* flore, & capitulo ejusd. *C B P.* 141. *Ranunc. tricophyllos aquaticus* medioluteus *Column. ecphr.* 315. *Millefolium aquatic.* *Ranunculi* flore & capitulo *Park. Th.* 1257.
- Ranunculus* *aquat. Peucedani* foliis fluitans caule rotundo cavo, floribus ex alis foliorum longis petiolis innitentibus medioluteis odoris. *Ranunculo* s. *Polyanthemo* *aquatili* albo affine *Millefolium maratriphyllum* fluitans *J B. T.* 3. 782. *Millefolium* foliis *Fœniculi*, *Ranunculi* flore & capitulo *C B P.* 141.
- Ranunculus aquaticus* albus circinatis tenuissimè divisis foliis, floribus ex alis, longis pediculis inuixis *Phytogr. Tab.* 55. fig. 2. *Millefolium aquaticum cornutum* *quoàd*



- quoàd figuram *J.B. Tom. 3.* Item quoàd figuram ut & descriptionem *C.B. Prodr. 73.* Millefolium aquaticum cornutum majus *Park. Th. 1257.*
- Ranunculus longifolius palustris major, *C.B.P. 180.* Ranunculus flammeus major *Park. Th. 1214.* Ranunc. longo folio maximus, Lingua *Plinij J.B. T. 3. App. 865.*
- Ranunculus longifol. palustris minor *C.B.P. 180.* Et Ranunc. palustr. ferratus *ejusd.* Ranunc. longifolius, aliis Flammula *J.B. T. 3. App. 864.* Ranunc. flammeus minor, & folio serrato *Park. Th. 1214.*
- Ranunculus flammeus latiori Plantaginis folio, marginibus pilosis ex *Hiberniâ* ab Ornatissimo viro *D. Gideon. Bonaverit* accepimus.
- Ranunculus palustris, angusto Plantagineo folio, floribus albis. Plantago aquatica angustifolia *C.B.P. 190.* Plantago aquatic. humilis angustifolia *J.B. T. 3. 788.* Plantago aquatica minor globosa *Grisleij.*
- Ranunculus montanus foliis Plantaginis *C.B.P. 180.* Ranunc. Pyrenæus foliis soblongis non laciniatis albo flore *J.B. T. 3. 864.* Ranunc. Pyrenæus albo flore *Clus. Hist. app. 2.* Ranunculus dulcis foliis latis Rapistri perfoliatis floribus albis in *Apenninis Mentzel. Pugil. Rarior.* Fortè etiam Ranunculus montanus Graminis *Parnassi* folio *HRP. 153.*
- Ranunculus montanus folio gramineo *C.B.P.* Ranunc. pumilus gramineis foliis *J.B. T. 3. app. 866.* Ranunculus gramineus flore luteo simplici *Park. Th. 336.*
- Ranunculus montanus subhirsutus latifolius *C.B. Prodr. 96.*
- Ranunculus montanus subhirsutus Geranii folio *C.B.P.* Ranunc. tenuifolius montanus luteus *J.B. Tom. 3. 416.*
- Ranunculus Geranii tuberosi folio *C.B.P. 182. & Prodr. 95.*
- Ranunculus montanus lanuginosus foliis Ranunculi pratensis repentis *C.B.P. & pro 7º. in Prodromo* describitur. Ranunc. magnus valdè hirsutus flore luteo *J.B. Tom. 3. 417.*
- Ranunculus montan. hirsut. humilior Narcissi flore *C.B.P. 182.* Ranunc. alpinus Narcissi flore *J.B. Tom. 3. App. 861.*
- Ranunculus montanus latissimo folio hirsutus *C.B.P. 182.* Ranunculus montanus 5<sup>us</sup>. *Clus. Hist.*
- Ranunculus montanus folio Aconiti magno flore *C.B.P.* Ranunculus montanus major flore luteo *H. Eyst.*
- Ranunculus montanus Aconiti folio, flore albo minore *C.B.P.* Ranunculus albus simplici flore *J.B. Tom. 3. 859.* Ranunc. montan. albus minor simplex *Park. Th. 335.*
- Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore *C.B.P.* Ranunc. flore albo Alpinus major *J.B. T. 3. 860.* Ranunc. montan. maximus albus *Park.*
- Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici *C.B.P. 179.* Ranunc. albus flore denso *J.B. T. 3. 860.* Ranunc. albus multiplex *Park. Th. 340.* Helleborus Ranunculoides flore albo multiplici *H. Leyd. 309.*
- Ranunculus montan. albus hirsutus *J.B. T. 3. 861.* Ranunculus montanus *Pennæi* *Park. Th. 334.* Ranunc. montan. hirsutus purpurascens flore *C.B.P. 182.*
- Ranunculus autumnalis flore multiplici *Park. Th. 332.* Ranunculus latifolius multiplex serotinus *Cornuti de Pl. Canad. 94.*
- Ranunculus latifolius bullatus autumnalis parvo flore *C.B.P. 181.* Ranunculus autumnalis folio rotundo serrato *J.B. T. 3. App. 866.*



- Ranunculus rotundifolius* Alpinus flore parvo, grumosâ radice, Pthora major dictus. Aconitum Pardalianches s. Thora Park. Th. 317. Thora Valdensium Montis Baldi Clus. Hist. 238. Thora folio Cyclamini J B. Tom. 3. 650. Aconitum Pardalianches 1<sup>m</sup>. s. Thora major C B P. 184.
- Ranunculus Canariensis* hirsutus grumosâ radice Platani ferè foliis, flore pallidè luteo majore. An *Ranunculus Creticus* latifolius Clus. Hist. 239. *Ranunculus Asphodeli* radice *Creticus* C B P. Fortè etiam *Ranunc. lanuginos.* Apii folio *Asphodeli* radice ejusd. C B P. *Ranunculus alter saxatilis montanus Asphodeli* radice Columnæ Park. Th. 337.
- Ranunculus lanuginosus* grumosa radice minor. C B P. 181. *Ranunculus Illyricus* radicibus bulbosis, foliis longis J B. T. 3. 863. *Ranunculus Illyricus* minor Park. Th. 330. *Ranunculus grumosâ radice* 4<sup>us</sup>. Clus. Hist. 240.
- Ranunculus chærophyllos Asphodeli* radice C B P. *Ranunculus montanus leptophyllos Asphodeli* radice Columnæ. Ecphraf.
- Ranunculus Creticus* albo flore, majore quàm Papaveris rhæadis, J B. T. 3. 862.
- Ranunculus grumosâ radice*, flore niveo J B. Tom. 3. 864. *Ranunculus Asiaticus* vel *Creticus* flore albo Park. Th. 340. *Ranunc. peregrinus grumosâ radice* 1<sup>us</sup>. Clus. Hist. 241. Cui flos est pentapetalos albus suaviter rubente colore per oras mixto.
- Ranunculus grumosâ radice* flore flauo vario C B P. 181. *Ranunculus Asiaticus* flore luteo vario simplici Park. paradis.
- Ranunculus grumosâ radice ramosus* C B P. *Ranunc. Asiaticus* πολύκλων, s. grumosâ radice 2<sup>us</sup>. Clus. Hist. 241. J B. Tom. 3. 863. *Ranunc. Creticus* vel *Asiaticus* flore argenteo Park. Th. 340.
- Ranunculus Asiaticus* grumosâ radice 1<sup>us</sup>. Clus. Hist. 240. *Ranunc. Tripolitanus* flore phœniceo, vel *Asiaticus* grumosâ radice 1<sup>us</sup>. J B. T. 3. 863. *Ranunculus Asiaticus* s. *Tripolitanus* flore rubro Park. Th. 340. *Ranunc. grumosâ radice* flore phœniceo minimo simplici C B P.
- Ranunculus Asiaticus* grumosâ radice, pleno flore 1<sup>us</sup>. Clus. Hist. 242. *Ran. sanguineus* multiplex. Lob. Icon. 672. *Ranunc. Asphodeli* radice flore sanguineo C B P. 181.
- Ranunculus Asphodeli* radice, flore subphœniceo rubente C B P. *Ranunc. Asiaticus* grumosâ radice, pleno flore 2<sup>us</sup>. Clus. Hist. 243. *Ranunc. Constantinopolitanus* flore sanguineo pleno J B. T. 3. 864.
- Ranunculus Asphodeli* radice prolifer miniatus C B P. 181. *Ranunc. Asiaticus* grumosâ radice pleno flore 3<sup>us</sup>. Clus. Hist. 243. *Ranunc. Asiaticus* flore pleno & prolifero Park. Th. 341.
- Ranunculus* flore pleno flavescente, & rubris lineis elegantissimè variegato H R P. 152. *Le Seraphique*.
- Ranunculus Asphodeli* radice, flore sanguineo maximo H R P. *Le Monstre rouge*. Idem flore luteo variegato ejusd. H R P. *Le monstre Panaché*.
- Ranunculus Constantinopolitanus* Gigas flore coccineo H R P. *Le Geant de Constantinople, ou le grand Orange*.
- Idem flore elegantèr variegato ejusd. H R P.
- Ranunculus Alepus* grumosâ radice, flore purpureo-sanguineo maximo H R P. *Spherique ou Peone*.
- Idem flore lineis rubris & luteis striato. *Spherique Panaché* H R P.



- Ranunculus *Syriacus* grumosâ radice, flore miniato patulo. *Salamine* HRP.  
 Idem ex luteo pallescente & rubro mixtus. *Le grand Pontife, ou le Salamine Panaché* HRP.
- Ranunculus *Alepenfis* flore albo prolifero, chremesynis staminulis repleto.
- Ranunculi-folia Planta peregrina, floribus parvis pendulis atropurpureis, Liliij *Persici* multò minoribus, Martagonis more ad caulis fastigium coronata. *Fortè hæc fuit de genere Martagonum. In Horto Medico Chelsiano multis abhinc annis succrevit, ubi & nos fugientibus oculis observavimus.*
- Ranunculus *Chelidonides* rotundifolius præcox, radicegranulatâ. Ranunculus latifolius *Hist. Lugd.* 1036. *Chelidonia* rotundifolia minor *CBP.* 309. *Scrophularia* minor, s. *Chelidonium* minus vulgò dictum *J.B.T.* 3. 468. *variat interdum foliis nigris maculis, & aliquando ad basim auriculis donatus, ut & floribus repletis.*
- Ranunculus *Hepaticus* trilobatus vernus, flore cælesti, *Trifolium hepaticum* s. *Trinitatis* herba flore cæruleo *J.B.T.* 2. 389. *Hepatica nobilis* s. trifolia *Park. variat flore simplici albo, rubro, & carneo, flore & multiplici.*
- Ranunculo affinis Umbelliferis accedens in palustribus folio peltato repens *Americana* & nostras. Ranunculus aquaticus umbilicato folio *Column. ecphr.* 315. Ranunculus aquaticus *Cotyledonis* folio *CBP.* 180. *Cotyledon* aquatica *J.B. Tom.* 3. 781. *Erva do Capitaon Lusitanis* *Marcgrav.* *Acarizoba. Brasiliensibus* *Pison.* 260. *Hydrocotyle Elem. Botan. Tom.* 1. 278. *Cotyledon* repens *Brasiliensis Raij Hist. Pl.* 1323. At *D. Banister* se nullam potuisse observare differentiam inter hanc, & *Cotyledonem* palustrem nostratem planè profitetur. *Cat. Stirp. Virgin.*
- Ranunculo adfinis Umbelliferis accedens *Chelidonii* minoris folio *Curassavica* major *Phytogr. Tab.* 106. fig. 6. *Asarina* major *Curassavica PBP.* 315. An *Alchimillæ* vel *Perchepier* affinis *Capparis* folio & facie exotica *Breyn. Prodr.* 2. 12.
- Ranunculo adfinis Umbelliferis accedens *Chelidonij* minoris folio *Zeylanica* minor. *Phytogr. Tab.* 106. fig. 5. *Asarina* minor *Zeylanica PBP. ibidem.* An *Alchimillæ* vel *Perchepier* affinis *Zeylanica* procumbens, *Chamæcissi* foliis & facie, flosculis purpureis *Breyn. Prodr.* 2. 12. *Codagén H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 46.
- RAPHANISTRUM siliquâ articulatâ glabrâ minore *Morif. Hist.* 2. 265. *Rapistrum* luteum siliquâ glabrâ articulatâ *Raij Hist. Pl.* 805. *Rapistrum* arvorum *Park. Tb.* 862.
- Raphanistrum luteum maritimum nostras siliquâ articulatâ striatâ majore. *Raphanus maritimus* flore luteo, siliquis articulatis, secundum longitudinem eminenter striatis *Raij Synops append. novitèr edit.* ad oras maritimas invenit *D. Stonestreet* & à *D. Doody* accepimus. *Raphanistrum* (fortè) siliquâ articulatâ glabrâ majore *Morif. ibidem.* cujus Icon apud *Tabulas* videsis. *Seç. 3. Tab.* 13. fig. 2. *Rapistrum* alterum arvorum *Park. ibidem.*
- Raphanistrum flore albo striato, siliquâ articulatâ striatâ minore *Morif. Hist.* 2. 266. *Rapistrum* flore albo siliquâ articulatâ *CBP.* 95. Item fortè *Rapistrum* flore albo lineis nigris depicto *ejusd. ibid.* *Lampsana Apula* *Plinij & Dioscoridis Column.* *Rapistrum* flore albo striato, *Sinapi agreste* album *Trago J.B. Tom.* 2. 851. An *Eruca Romana* s. *Gentilis* siliquâ angustâ folio lato *J.B. T.* 2. 860. hæud sine ratione dubium movet *Cl. Rajus.* Rapha-



Raphanistrum s. Rapiſtrum *Hispanicum* flore albo multiflorum, ſiliquâ glabrâ non articulatâ, *Schol. Bot.* 80. *Hanc plantam ab Erucâ Romanâ, &c. J. B. parùm vel nihil differre videtur, ut monuit nos conſummatiff. Botanicus D. Sherard, qui nobis primum oſtendit.*

Raphanistrum monospermon capſulâ rotundâ in oblongum filamentum abeunte.

Rapiſtrum monospermon *C B P.* 95. *J. B. T.* 2. *Park. Th.*

Raphanistrum maximum monospermon rotundifolium capſulâ glabrâ *Moriſ. Hiſt.* 2.

Rapiſtrum maxim. monosperm. rotundifolium *Cornuti* 147. Rapiſtr. max. rotundifol. monospermum *Hispanicum Park. Th.*

Raphanistrum monospermum maximum *Chalepenſe* flore luteo, capſulâ rotundâ ſtriata *Moriſ. Hiſt.* 2.

Raphanistrum monospermum latifolium, ſiliquis fungoſis glabris articulatis *Moriſ. Hiſt.* 2. 267. Myagrum monospermum latifolium *C B P.* 190. Myagrum monospermum *J. B. T.* 2. 894.

Raphanistrum ſiliculâ minore rotundâ rugoſâ aſperâ *Moriſ. Hiſt.* 2. 267. Myagro ſimilis ſiliquâ rotundâ *C B P.* 267. Myagro affinis herba capitulis rotundis *J. B. T.* 2. 895.

Raphanistrum ſiliquoſum monospermum, maritimum *Anglicum* foliis craſſis latioribus *H. Leyd.* 520. *Eruca maritima Anglica*, ſiliquâ fungoſâ toroſâ, rotundâ, foliis craſſis latioribus *Moriſ. Hiſt.* 2. 231. *Cakile* s. *Eruca marina latifolia J. B. T.* 2. 868. fortè *Sinapi marinum Ægyptium Pr. Alpin. exot.* 251.

Idem diſpermon maritimum *Italicum*, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili *H. Leyd.* 520. *Eruca maritima Italica*, ſiliquâ haſtæ cuſpidi ſimili *C B P.* 99. *Moriſ. Hiſt.* 231. *Cakile* quibuſdam, aliis *Eruca marina*, & *Raphanus marinus J. B. T.* 2. 868.

Raphanistrum diſpermon *Monſpeliacum*, ſiliculâ quadrangulâ echinatâ *H. Leyd.* *Eruca Monſpeliaca* ſiliquâ quadrangulâ echinatâ *C B P.* 99. *Moriſ. Hiſt.* 232. *Sinapi echinatum J. B. Tom.* 2. 858.

RAPHANUS ruſticanus *Park. Th. C B P.* 96. *Raphanus ſylveſtris* s. *Aarmoracia* multis *J. B. Tom.* 2. 851. *Braba legitima Dioſcoridis Zanon. Hiſt. Bot.* 54.

*Raphanus aquaticus* foliis in profundas lacinias diviſis *C B P.* 97. & *Prodr.* 38. *Raphanus aquaticus Tabernæmontani J. B. Tom.* 2. 867. *Raphanus aquatic. Tabern. Icon.* 415.

*Raphanus aquaticus alter C B P.* 97. & *Prodr.* 38. *Park. Th.* *Radicula ſylveſtris* s. *paluſtris J. B. Tom.* 2. 867. *Rapiſtrum aquaticum Tabern. Icon.* 408.

*Raphanus paluſtris minor, Naſturtij foliis, floribus parvis luteis. Eruca aquatica Park. Th.* *Eruca quibuſdam ſylveſtris repens, floſculo parvo luteo J. B. Tom.* 2. 866. *Eruca ſylveſtris minor, luteo parvoque flore. C B P.* *Sium alterum aquatic. luteum vel Cardamine tenuifolia montana Fab. Column. Iconraphani minimi repentis, luteis foliis tenuitèr diviſis, quæ apud D. Moriſ. in Tabulis Sect. 3. Tab. 7. fig. 1. extat; Ut & quæ ſub Erucæ aquaticæ Gerard. titulo. ſect. 3. Tab. 6. fig. 17. habetur, plantæ nobis hoc in loco allatæ optimè reſpondent.*

*Raphanus ſylveſtris Naſturtii folio luteus, cùm ſiliquis curtis Virginianus. Naſturtium impatiens luteum ſiliquis curtis Banifieri. Cat. Stirp. Virgin.*



- RAPUNCULUS Alopecuroides longiore spicâ *Clus.* 2. 171. Rapunculus spicatus, spica longiore *C B P.* 92. Rapunculus spicatus alopecuroides *Park. Th.* Rapunculus spicatus spicâ breviori *C B P.* Rapunculus spicatus s. comosus cæruleus *J B. Tom.* 2. 809.
- Rapunculus spicatus flore ferè orbiculari, spissius corniculatus. Rapunculus petræus *Pr. Alpin. exot. pag. ult.*
- Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari *C B P.* 92. Rapunculus flore globoso purpureo *J B. T.* 2. 809. Rapunc. alopecuroides orbiculatus *Park. Th.* Rapuntium montanum rariùs corniculatum *Fab. Colum. ecphras.* 224.
- Rapunculus ramosus corniculatus, Scabiosæ capitulo cæruleo *Moris. Hist.* 2. 464. Rapunc. Scabiosæ capitulo cæruleo *Park. Th. C B P.* Scabiosa globularis quam *Ovinam* vocant *J B. Tom.* 3. 12. Rapuntium alterum leptophyllum capitatum *Column. ecphr.* 226.
- Rapunculus galeatus Salicis glabro folio *Bisnagaricus* floribus aurantiis *Phytogr. Tab.* 55. fig. 3. Hùc fortè spectat *Acaxochitl* *Nov. Hispan. Terent.* apud *Recc.* 347. & 454.
- Rapunculus s. Rapuntium *Virginianum* s. *Americanum* coccineo flore majore, *Moris. Hist.* 2. 466. Rapuntium maximum coccineo spicato flore, s. Flos Cardinalis *Barberini Fab. Column. Annot. in Hist Mexiocan.* 879. 880. Trachelium *American.* flore ruberrimo s. Planta Cardinalis *Park. paradif.*
- Rapunculus galeatus *Americanus* coccineo flore lineis albis elegantèr striatis.
- Rapunculus galeatus *Virginianus* flore violaceo majore *Moris. ibid.* Rapuntium *American.* flore dilute cæruleo *Dodart. Memoir* 105. Trachelium *American.* flore cæruleo. *Icon. Roberti.* Charapeti (fortè) *Mexicensibus Hernandez.* apud *Recc.* 227.
- Idem floribus immaculati candoris *Hort. Oxon.* An Rapunculus galericulatus *Americanus* Flori Cardinali similis albus *P B P.* 369. Rapunculus galeatus major *American.* latifolius flore albo *Breyn. Prodr.* 2. 87.
- Rapunculus galeatus *Blesensis* s. *Solonienfis* flore violaceo minore *Moris. Hist.* 467. Rapuntium urens *Solonienfe P. Bocc. de Pl. Sicul.* 21. Draba flore cæruleo galeato *C B P.* 116.
- Rapunculus galeatus *Creticus* s. Petromarula *Cretica Parkinsono Moris. Hist.* 467. Rapunculus *Creticus* s. Pyramidalis altera *C B P.* 93. Rapunc. *Cretic.* Petromarula *J B. Tom.* 2. 811.
- Rapunculus galeatus *Æthiopicus* s. Rapuntium violaceo flore, foliis Pinastris *Breyn. Cent.* 1. 173.
- Rapunculus galeatus *Æthiopicus* flore cæruleo glaber, oblongis foliolis crenatis. Rapuntium *Æthiopicum* cæruleo galeato flore, foliolis dentatis *Breyn. Cent.* 1. 175.
- Rapunculus galeatus *Æthiopicus* cæruleus, hirsutis & subrotundis crenatis foliolis.
- Rapunculus *Æthiopicus* pusilla planta, foliolis incis, galeato flore, labiis purpureis, summâ galeâ candidissimâ lanugine villosâ. An Rapuntium minimum glabrum in Uliginosis nascens *Virginianum.* *Banister. Cat. Stirp. Virgin.*
- Rapunculus galeatus *Virginianus*, s. Rapuntium minus glabrum, flore pallidiore *Banist. Cat. Stirp. Virgin.*



Rapunculus galeatus *Æthiopicus*, s. Rapuntium cæruleo flore, foliis Coronopî.  
*Breyn. Cent. 1. 174.*

Rapunculus galeatus *Æthiopicus* foliis multicifsis, flore cœlesti. Chamæpitoes  
spuriæ alterius, altera Icon apud Dodonæum. *Edit. Latin. 47. Huic nostro in*  
*quibusdam accedit.* (h. e.) Chamæpitys spuria multifido folio, Lamii flore *CBP.*  
*250. in plurimis autem discrepat.*

RESEDA maxima Calcitrapæ foliis, flore ex luteo albicante. Reseda alba *J B.*  
*Tom. 3. 467.* Reseda foliis Calcitrapæ flore albo *HRB. 176.* Reseda maxima  
perperam Pycnocomon *Anguillaræ Lob. Icon. 222.* Reseda lutea maxima *CBP.*  
*100.* Reseda candida, & Reseda lutea *Hist. Lugd.*

Reseda vulgaris *CBP. 100.* Reseda minor s. vulgaris *Park. Th.* Reseda lutea *J B.*  
*Tom. 3. 467.* Reseda *Plinij Neotericorum Belgis Eruca peregrina Italica vel*  
*Cantabrica Lob. Icon. 222.*

Reseda *Massiliensis* foliis latioribus crispis *Phytogr. Tab. 55. fig. 4.* Reseda crispa  
*Gallica Boccon 77.*

Reseda Phyteuma dicta *H. Leyd. 524.* Resedæ affinis Phyteuma dicta *CBP. 100.*  
Phyteuma *J B. Tom. 3. 386.*

Reseda latifolia minor Alpina, flore albo flavescente *Phytogr. Tab. 219. fig. 3.* fortè  
Reseda latifol. flore flauo *Morif. Prelud. Bot.* fortè etiam Sedum tridactylites  
Alpinum pallidè luteum *CBP. 284.* An Reseda minima *Grisleii Virid. Lusit.*

Reseda Linariæ folio *Pyrenaica* glauco folio *Schol. Bot. Phytogr. Tab. 107. fig. 2.* Lu-  
teola minima *Pyrenaica* Linariæ folio *Elem. Bot. 336.*

Reseda *Tinctorum* Salicis folio Luteola dicta *H. Leyd. 523.* Luteola herba Salicis  
folio *CBP. 100.* Luteola *Plinij* quibusd. *J B. Tom. 3. 466.*

Reseda Linariæ folio *CBP. 6 in Prodr. 42.* Sesamoides fructu stellato *Elem. Bot.*  
*Tom. 1. 337.*

Reseda alba minor *CBP. 100.* Sesamoides parvum *Salmanticum Clus. Hist. 295.*

Reseda minor *Indiæ Orientalis* Ptarmicæ pratensis folio, crenis exasperata; s. Sesa-  
moides parvum *Bengalense* ferratum *Phytogr. Tab. 55. fig. 5.* An Sesamoides  
parvum flore luteo *Grisleij.*

Resedæ affinis *Cretica* foliis Cannabinis alterno situ pinnatis, floribus luteis. Lutea  
maxima *Cretica Honor. Belli J B. T. 3. 466.* Luteola herba foliis Canabinis *CBP.*  
*100.* Itèm Luteola herba sterilis *ejusd. ibid.* Luteola maxima *Cretica* fœcunda  
& sterilis *Park. Th.* Cannabis lutea fertilis atque sterilis *Contareno Pr. Alpin. exot.*  
*296. 299.*

RHAMNUS spinis oblongis flore candicante *CBP. 477.* Rhamnus cortice albo  
*Monspeliensis J B. T. 1. 31.* Rhamnus 2<sup>us</sup>. *Monspeliensium* s. 1<sup>us</sup>. *Clusio Park. Th.*

Rhamnus cortice albo *Americanus* flore cæruleo. Rhamnus *Americanus* flore cæru-  
leo amplo *Breyn. Prodr. 2. 87.*

Rhamnus peregrinus Rosmarini foliis candidior, in *Hort Reg. S<sup>ci</sup>. Jacobi* apud *West-*  
*monasterium* supremâ æstate observavimus.

Rhamnus Salicis folio angusto fructu flavescente *CBP. 477.* Rhamnus 1<sup>us</sup>. *Dioscori-*  
*dis Lobelio* s. litoralis *Park. Th.* Rhamnus s. Oleaster *Germanicus J B. T. 1. lib. 6. 33.*

Rhamnus cordatis foliis subtùs cœsiis *Maderaspatanus Phytogr. Tab. 120. fig. 4.*

Rhamnus



Rhamnus Malabaricus Mail-anschi dictus è *Maderaspatan* *Phytogr. Tab. 220. fig. 1.*

Mail-Anschi *H. Malab. Part. 1. fig. 40.*

Rhamnus *Maderaspatanus* dependentibus foliis, spinis longissimis foliosis *Phytog. Tab. 219. fig. 5.*

Rhamnus *Maderaspatanus* foliis pendulis, spinis longioribus nudis. *Phytogr. Tab. 219. fig. 4.*

Rhamnus *Virginianus* Verbenæ nodifloræ foliis angustioribus.

Rhamnus Lycii Myrsinites facie *Gangeticus* foliis densis ferè convolutis, Jasmini floribus, & spinis gemellis. *Phytogr. Tab. 55. fig. 6.*

Rhamnus *Orientalis* spinis uncinatis atropurpureis, Oleæ s. Ligustri folio, cujus ad imum petiolus umbilico inarticulatur. *Phytogr. Tab. 55. fig. 7.* Rhamnus

*Orientalis* Ligustri foliis, spinis atropurpureis noster *Raij Hist. Pl. append. 1801.*

An Rhamnus Catharticus folio Oleæ *C B P. 478.* Hippophaes *Anguillaræ Epist. 8.*

An fortè Mahaleb *Arabum.* Quamvis enim hæc Plantam Phillyream esse contendit *J. Baubinus* eò tamèn quòd *Monachi* qui in *Mesuem* commentati sunt, Scribunt Mahaleb esse Arbusculam in *Syria* notissimam, spinosam, foliis Olivæ similibus, ferè granâ quasi racematim in ramis ut *Lentiscus* paulò crassiora tamèn, è quibus *Syri* oleum exprimunt valdè odoratum, ex quo conficiunt Sapones olfactu suaves, aliaque plura, Huic Rhamno nostro potiori jure Mahaleb *Arabum* adhibenda nobis esse videtur.

Rhamnus an potius Lycium Fingrego *Jamaicensibus* dictum *Phytogr. Tab. 108. fig. 2.* Fortè Katu-Karu-Walli *H. Malab. Part. 7. Tab. 17.* spinarum autèm positio huic parùm congruit.

Rhamnus *Maderaspatanus* Hyperici frutescentis folio, spinis brevibus duplicatis *Phytogr. Tab. 108. fig. 1.*

Rhamnus (fortè) s. Arbuscula spinosa Euonymi folio spinis gemellis *Maderaspatana.* *Phytogr. Tab. 218. fig. 7.*

Rhamnus (fortè) s. Arbuscula spinosa Euonymi folio, spinis singularibus *Virginiana.* *Phytogr. Tab. 218. fig. 6.* ab amiciss. viro & Pharmacopæo *Londinensi* pertiss. D<sup>no</sup>. *Benjamino Charlwood* nobis communicata.

Rhamnus Catharticus *C B P. 478.* *J B. Tom. 1. 55.* Rhamnus solutivus s. Spina infectoria vulgaris. *Park. Th.*

Rhamnus Catharticus minor *C B P.* Rhamnus Catharticus minor *Pannonicus* *Park. Th.* Rhamnus solutivus pumilus *Pannonicus* primus *Clusio J B. Tom. 1. lib. 6.*

Rhamnus folio subrotundo fructu compresso *C B P. vide Paliurus.*

RHUS folio Ulmi *C B P. 414.* Rhus s. Sumach *J B. Tom. 1. 555.* Sumach, s. Rhus Obsoniorum & Coriariorum *Park. Th.*

Rhus *Virginianum* *C B P. app. 517.* Sumach s. Rhus *Virginiana* *Park. Th.*

Rhus tenuifolia *Virginiana* humilis; Rhus angustifolium *C B P. 414.* sub Sumach angustifolio describitur in *Prodromo 158.* An Rhus *Virginianum* humile *H. Leyd. 524.*

Rhus *Virginianum* ramis ex stipite pullulantibus glabris *D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.*

Rhus Obsoniorum similis *Americana*, Gummi candidum fundens non ferrata, foliorum rachi medio alata. *Phytogr. Tab. 56. fig. 1.* Rhus *Virginianum* *Lentisci* foliis *Banisteri Cat. Stirp. Virg.* An Yztac-Quauxihotl alia *Galiopifera* *Hernand.*

apud



apud Recc. 57. Fortè etiàm Aroeira *Lusitanis* s. *Lentiscus Promontorii Olindæ Pison. lib. 4. cap. 13.* cujus baccas vœniunt in *Officinis nostratibus* aliquando pro vero *Carpobalsamo*. *Hujus quoque & altera varietas habetur, foliis quodammodo dentatis, quæ (nostro quidem arbitrato) eadem est cum Molle s. Lentisco Peruviana Hernandez. apud Recc. lib. 3. cap. 15. 54. & à Copalli-quahuitl Tepoztlani Terent. apud eund. Recc. 455. (i. e.) Copalli-quahiutl Patlahoac, seu Arbore Copalli latifoliâ Hernand. ibid. fol. 46. hæc admodùm abluere videtur. Errandi ansam nonnullis Scriptoribus, Hæc vel altera præbuit Arbor, quùm Lentiscum nostram Europæam, Virginiae plagis Indigenam esse contendere velint vid. Hond. Geograph.*

*Rhus Obsoniorum* similis *Peruviana*, ierratis *Fraxini* pinnatis foliis, summâ singulari pinna alas claudente longiùs exporrectâ. *Molle Petri Ciecæ Chronic. Part. 1. cap. 112. Clus. in Monard. cap. 24. Lentisci Peruani similis Molle dicta Park. Th. 1524. De hac multùm fallitur Excellentiss. Clusius, & post eum Casparus Bauhinus, qui utrique asserunt hanc Arborem variare foliis, quæ in tenellâ dissecta in adulta nec incisa nec crenata sunt, quemadmodum ramus adultioris arboris in Matthiolo Bauhiniano & Clusii Curis posterioribus exhibetur: At pace tantorum virorum, Iste ramus de hujus arbore non est; sed de Aroeira s. Lentisco Promont. Olindæ à Molle genuinâ Clusio plurimum diversa; At unâ cùm illâ jure meritissimo inter Rhoidum congenera à nobis collocata est.*

*Rhus Obsoniorum* similis leptiphyllis, *Tragôdes, Americana*, spinosâ, rachi med' o appendicibus aucto. *Phytogr. Tab. 107. fig. 4. An Coriaria arbor spinosa Acaciæ foliis & facie P B P. inter Addend. Fortè Quauhite copalli Pitzahuac, Copallifera leptiphylla alia Hernand. apud Recc. 49. Fingrego & Sabina arbor (i. e.) Savin-Tree Barbadosibus nostratibus dicta.*

*Rhus Myrtifolia Monspeliaca C B P. 414. Rhus Plinio putata J B. Tom. 1. 559.*

*Rhus Africanum* trifoliatum majus, foliis obtusis & incisis, hirsutis pubescentibus *Phytogr. Tab. 219. fig. 7.*

*Rhus Afric. trifoliat majus* foliis subtus argenteis, acutis & margine incisis *Phytogr. Tab. 219. fig. 5.*

*Rhus Afric. trifol. majus folio subrotundo, integro, molli & incano. Phytogr. Tab. 219. fig. 8.*

*Rhus African. trifoliat. minus, glabrum splendente folio subrotundo integro Phytogr. Tab. 219. fig. 9. Lentiscus Africana triphyllis Quorundam. Hujus est & varietas major. Sunt Plantæ sempervirentes.*

**RICINUS** vulgaris *C B P. 432. J B. Tom. 3. 642. Ricinus s. Cataputia major vulgaris Park. Th.*

*Ricinus Americanus* major, caule virescente *HRP. 156. Avanaçú s. Citavanacú H. Malab. Part. 2. fig. 32.*

*Ricinus Africanus* maximus, caule geniculato rutilante. *HRP. 156. Pandi-Avanacu H. Malab. Part. 2. fol. 60. sine Icone. An Ricinus major African. Syriacus vel Ægyptiacus Park. Th.*

*Ricinus Americanus* tenuitè diviso folio *Breyn. Cent 1. 116. French Physique-Nuts Barbadosibus nostratibus dicti.*

Ricinus



- Ricinus Americanus* major, semine nigro *C B P.* 432. *Ricinus Americanus Aldini Hort. Farnes.* 87. *Ricinus Americanus* Curcas dictus, & Faba purgatrix *Indiæ Occiduae* *J B. Tom.* 3. 643. *Munduy-Guazu Brasiliensium Pison.* 179. *Pinhones Lusitanis Marcgr. & Pison.* Avellana purgatrix *Novi Orbis Grevio Raij Hist. Pl. Barbado-Mut.* Ben magnum medicorum vulgò *Monardes cap.* 47.
- Ricinus Americanus* minor *C B P.* 432. Eraway, Ricini pusillum genus. *Clus. exot. lib.* 2. c. 21.
- Ricinus Indicus* pilosus trifidus, vel quinquifidus, flosculis atropurpureis, in *Umbellâ* aggregatis. *Phytogr. Tab.* 56. *fig.* 2. Hucipochotl *Huaxacensis* s. *Ricinus Nov. Hispan. Hernand. apud Recc.* 60. *Ricinus Americanus* folio *Staphisagriæ. C B P. app.* 522.
- Ricinus Maderaspatanus*, quinquifidis durioribus foliis in margine spinosis. *Phytogr. Tab.* 108. *fig.* 3. Humanitate & favore *Cl. D. Frederici Slare* obtinuimus.
- Ricinus Maderaspatanus*, flore purpureo, trilobato folio, mollibus spinulis dentato *Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 4. An *Ricinus American. lactescens*, trilobato folio perennis, flore nigricante *H. Beaumont.* 36.
- Ricinus urens* *Cannabini* foliis triphyllis, è *Maderaspatan. Phytogr. Tab.* 120. *fig.* 6. An *Urtica Indica* pentaphyllæa *Ciaffi Nich. Nutij. Cat.*
- Ricinus lactescens* Fici foliis, spinulis mordacibus armatis. *Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 3. *Ricinus humilis lactescens*, Fici foliis, flore lacteo pentapetalo, caule, foliis, & capsulis seminalibus spinulis *Urticarum* more pungentibus, armatis. *Banisteri, Ricinus Tithymaloides Americanus*, lactescens, & urens, floribus albis, *P B P.* Frutex innominatus pungens & urens. *Marcgr. lib.* 2. 79. *Brancamos Lusitanis.*
- Ricinus parvus urens*, foliis *Quercinis Virginianus* *D. Banister. Phytogr. Tab.* 107. *fig.* 5. *Folia præsertim ubi flores emittit, fert singulatim, & non è foliorum sinu, sed ex oppositâ caulis parte ramulus extruditur, vix uncialis, julo è flosculis plurimis tripetalis luteis, (at sterilibus) compacto, ornatus; ad cujus basin pediculo crassiusculo suffulta, crescit, capsula seminalis, staminulo trifurco coronata, atque tribus parvis & rotundis seminibus Ricino (Reduvio) animali non dissimilibus grvida.*
- Ricinus asperior*, *Alcæ Venetæ* foliis aliquatenus accedens. *Maderaspatanus ex Herbario vivo du-Boisiano. Phytogr. Tab.* 220. *fig.* 2.
- Ricinus Orientalis*, cujus fructus sunt *Pinei nuclei Malucani* à nobis putati, & *Grana-Tilli Officinarum.* *Cadel-Avanacu H. Malab. Part.* 2. *fig.* 33.
- Ricinus minor Indicus* *Solani* folio *Breyn. Cent.* 1. *fol.* 118. cujus semina sunt colore livido splendentia, nigris maculis variegata.
- Ricinus minor Indicus* folio magis cuspidato, pilis rigidioribus utrinque aspero, semine spadiceo rubro. *Naga-dante H. Malab. Part.* 10. *Tab.* 76.
- Ricinus aromaticus* spicatus *Ind. Orient.* folio *Circææ*, spinis ad imum duplicatis armato; laccam in granis fundens; *Cappathiia Cingalensibus* dicta. An *Ricinus Indicus Aromaticus*, fructu rotundo parvo, cum petiolo instar *Cubææ*, coloris *Ochroleuci* *Paul. Ammanni H. Bosiani* 31.
- Ricinus Indicus* *Patsjoti Malabaricæ* foliis, fructu majore rotundo hexagono, *Nilicamaram æmulo.* *Bengieiri H. Malab. Part.* 4. *Tab.* 51.
- Ricinus dulcis* arborescens *Americanus*, *Populneâ* fronde argenteâ, s. foliis *Populi* nigræ



nigræ argenteis *Breyn. Phytogr. Tab. 220. fig. 5.* Ricini fructu Arbor *Curassavica* foliis Zizyphi argenteæ *Zeylanicæ P B P. 370.* Cinamomum sylvestre vulgò. An Quauhayohuatli *Mexicensibus* 3<sup>a</sup>. s. semine Arboris Cucurbinæ, nuclei Pinus formâ, purgante. *Hernand. apud Recc. fol. 87.*

Ricini fructu parvo fruticosa, *Curassavica*, folio Phylli *P B P. Phytogr. Tab. 107. fig. 6.*

Ricinus *Malabaricus* fruticescens, Lathyridis facie, fructu in foliorum alis echinato. *Cody-Avanacu H. Malab. Part. 2. fig. 34.*

Ricinus Althææ folio molli, & incano, *Maderaspatanus Phytogr. Tab. 120. fig. 5.*

Ricinus (fortè) Althææ folio *Jamaicensis*, floribus exiguis *Phytogr. Tab. 259. fig. 5.*

Ricinus (fortè) Althææ folio *Jamaicensis*. glauco, profundè venoso, margine undulato, crispo. *Phytogr. Tab. 259. fig. 6.* At hæ duæ postremò recensitæ plantæ inter Althæas hujus *Almagesti* fol. 25. minùs rectè (ut opinor) jamjam enumerantur.

Ricinus *Americanus* fætidus, Ballote olens, Scammonææ foliis punctatis, ferrugineâ lanugine obductis. Balsamum Caprarium *Antegoanis & Nevissenfis* dictus. Vide Balsamum Caprarium, &c. hujus *Almagest.* fol. 63. & *Phytogr. Tab. 8 fig. 1.*

RICOPHORA magna *Virginiana* Bryoniæ nigræ modo Volubilis, singulari folio nervoso flexili, caule tetragono, ad angulos alato. *Okcepenauk* Indigenis nuncupatur. Fortè Ricophora s. Inhame *Indica* alato caule, Scammonii folio singulari. *P B P. 371.*

Ricophora *Indica* s. Inhame rubra, caule alato, Scammonii foliis nervosis conjugatis. *P B P. Rapum Brasilianum s. Americanum alterum C B P. 90.* Inhame de *S<sup>ro</sup>. Thome*, Cara *Quiquoaque-congo Marcgr. & Pison.* Katsjil Kelengu *H. Malab. Part. 7. Tab. 38.* Welala *Zeylanenf* variat radice albâ.

Ricophora *Indica* Bryoniæ nigræ similis, ad foliorum ortum verrucosa *H R H. Phytogr. Tab. 220. fig. 50.* Fortè Katu-Katsjil *H. Malab. Part. 7. Tab. 36.*

Ricophora s. Inhame *Malabarica*, folio rotundo in acutissimum apicem mucronato *P B P. 371.* Mukelengu *H. Malab. Part. 8. ult.* Hæc (inquit Commelin in Nor.) Species est Batatas Sylvestris, nascens etiam in Insulâ Ceylon, ubi porci cum radicibus saginantur.

Ricophora s. Inhame *Malabarica* spinosa *P B P. Podava Kelengu H. Malab. Part. 7. Tab. 52.*

Ricophora Melonis folio parvo, radice Rapi nigricante. in *Hort. Reg. Aulæ Hampt* mihi fuit ex feminibus nata.

Ricophora s. Inhame *Curassavica*, folio Bryoniæ aspero, hirsuto, & crenato *P B P. 371.*

Ricophora s. Inhame *Curassavica*, ferrugineâ lanugine pubescens *P B P. 371.*

Ricophora s. Inhame *Curassavica*, trifolia s. Phaseolôles *P B P. 371.*

Ricophora pentaphyllos caule spinoso, fructu oblongo triquetro. *Malabaræa.* Nuren-Kelengu *H. Malab. Part. 7. Tab. 35.* Huc referre oportet Maniel foliis Pœoniæ *Part. 3. Americ. ep. 2. de Brasil.* quæ ad Manihot Indorum à *Caspere Bauhino* in Pin. refertur. pag. 91.

Ricophora s. Inhame *Javanica*, Plantaginis rigido splendente folio *P B P. 372.*

ROSA rubra *Milefia Plinii C B P. 481.* Rosa rubra flore semipleno, & simplici ferè *J B. Tom. 2. 34.*



- Rosa *Provincialis* rubra Park. *parad.* Rosa rubra flore valdè pleno *J B. ibid.*  
 Rosa rubra humilis, s. pumilio Park. *parad.* Rosa rubra pallidior. *C B P.* 481.  
 Rosa saturatiùs rubens. *C B P.* Rosa 1<sup>a</sup>. *Prænestinæ* similis *Clus. Hist.* Rosa holosericea simplex, & multiplex. Park. *parad.*  
 Rosa rubello flore majore multiplicato s. pleno, incarnata, vulgò. *J B. Tom. 2.* 36.  
 Rosa purpurea *C B P.* Rosa *Damascena* Park. *parad.* *Clusio prænestina* dicitur.  
 Rosa incarnata multiplex, subrotundo folio crispo, barbulis s. Calycis radiis foliosis amplissimis. In amici nostri integerrimi *Thom. Payne. armig.* Hortulo amœnissimo jamdudùm collegimus, *cujus ramulum in Herbario vivo exsiccatum asseruamus.*  
 Rosa *Provincialis* s. *Hollandica Damascena* Park. *parad.* Rosa maxima multiplex *C B P.* Rosa *Hollandica* rubella plena, quibusd. Centifolia spinoso frutice *J B. Tom. 2.* 37.  
 Rosa sine spinis simplex & multiplex Park. *parad.* Rosa acanthos flore pleno, coloris rubelli *J B. Tom. 2.* 35. Rosa spinis carens flore majore *C B P.* 482.  
 Rosa spinis carens flore minore *C B P.* 482. Rosa sine spinis altera *Clus. Hist.*  
 Rosa rubello flore parvo simplici non spinosa *J B. Tom. 2.* 39. Rosa sylvestris minor, rubello flore, quæ vulgò à mense *Majo*, Majalis dicitur *C B P.* 483.  
 Rosa sylvestris rubella, parvo frutice *J B. Tom. 2.* 35. An Rosa sylvestris odoratissimo rubro flore *C B P.* quæritur à *Rajo Hist. Pl.* 1470.  
 Rosa sylv. inodora s. canina Park. Rosa sylv. vulgaris, flore odorato incarnato *C B P.* Rosa sylv. alba, cum rubore, folio glabro *J B. Tom. 2.* *Cynosbatos* & *Cynorrhodon Officinarum.*  
 Rosa sylv. flore majore & rubente *C B P.* 483. variat interdùm flore multiplicato, & tùm quæritur à *Casp. Bauhino* Annon sit Rosa *Alabandica* *Plinii ibidem.*  
 Rosa sylv. fructu majore hispido, *Dalæi. Raj. Synops. Stirp. Brit. recent. edit.* 296.  
 Rosa sylv. altera minor, flore albo nostras *Raij Hist. Pl.* 1471. Rosa sylv. folio glabro, flore planè albo *J B. Tom. 2.* Rosa canina humilior, fructu rotund. *D. Plot. Hist. nat. Oxon.* An Rosa arvensis candida. *C B P.* 484.  
 Rosa sylv. foliis odoratis *C B P.* 483. Rosa foliis odoratis, *Eglentina* dicta *J B. Tom. 2.* 41. Rosa sylv. odora s. *Eglenteria* flore simplici Park. in *Hortis culta*, flore pleno invenitur.  
 Rosa campestris spinosiss. flore albo odore *C B P.* 483. Itèm Rosa sylvestr. pomifera minor *ejusd.* Rosa pumila spinosiss. foliis *Pimpinellæ* glabris flore albo *J B. Tom. 2.* 40. Itèm Rosa sylv. pomifera *Lobelio* sine spinis pumila, *ejusd.* Item Rosa arvina *Tabernæmontani* spinosa *ejusd. ibid.* Rosa pimpinella s. pomifera minor Park. *Tb.*  
 Rosa pimpinella minor *Scotica* floribus ex albo & carneo elegantèr variegatis. Rosa *Ciphiana* *Sibbaldi. Hist. Scot. Prodr.*  
 Rosa sylv. pomifera major nostras *Raij Hist. Pl.* 1472. Rosa sylv. pomifera major Park. *C B P.* 484. Rosa pomo spinoso, folio hirsuto. *J B. Tom. 2.* 38.  
 Rosa *Cinamomea* simplex Park. Rosa odore *Cinamomi* simplex. *C B P.* 483. Rosa *Cinamomea* floribus subrubentibus spinosa *J B.*  
 Rosa *Cinamomea* multiplex Park. Rosa odore *Cinamomi* flore pleno. *C B P.* Rosa minor rubello multiplicato flore, asperis spinis armata *J B. Tom. 2.* 38.



Rosa sylv. *Virginienfis* Park. Rosa parvo rubello flore, foliis lucentibus *Hort. Edinburg.* 297.

Rosa alba vulgaris major *C B P.* 482. Rosa *Anglica* alba Park. Rosa candida plena & femiplena *J B. Tom.* 2. 44.

Rosa lacteola *J B. ibid.* Rosa alba minor *C P B.* 482.

Rosa humilis, flore albo *Clusii J B.* Rosa sylv odorata, albo flore *C B P.*

Rosa moschata minor, flore simplici. *J B. Tom.* 2. 45. Rosa moschata, simplici flore. *C B P.* 482.

Rosa moschata, flore pleno. *C B P.* Rosa moschata minor, flore pleno *J B. Tom.* 2. 47.

Rosa lutea *J B. Tom.* 2. 47. Rosa lutea simplex. *C B P.* 483. Park. *paradis.*

Rosa lutea multiplex. *C B P.* Rosa lutea flore pleno. *J B. Tom.* 2. 48. Rosa lutea multiplex, five flore pleno. Park. *paradis.*

Rosa sylvstr. *Austriaca* flore Phœniceo Park. Rosa punicea *Cornuti de Pl. Canad.* 11.

Rosa rubro & albo variegata, Rosa *Mundi* vulgò dicta. *Raij Hist. Pl.* 1475. Rosa versicolor *C B P.* 481.

Rosa omnium Calendarum. *HR P.* 156. Rosa *Italica* flore suaviter rubente perpetua. *Ferrar. Flor. Cultur.* 203.

ROSMARINUS hortens. angustiore folio *C B P.* 217. Rosmarin. coronarius fruticosus. *T. J B. Tom.* 2. 25. Libanotis coronaria, s. Rosmarinum vulgare Park.

Rosmarinum striatum, s. aureum Park. *Th.* 74.

Rosmarinus hortensis, angustiore folio argenteus. *HR P.* 158.

Rosmarinus tenuifolius, apicibus elegantissimè ex argenteo pictis.

Rosmarinus spontaneus, latiore folio. *C B P.* 217. Rosmar. coronarius fruticos. ignobilior. *J B. Tom.* 2. 26.

ROS-SOLIS *J B. Tom.* 3. 761. Ros-Solis folio rotundo *C B P.* 357.

Ros-Solis folio oblongo *C B P.* *J B.* Ros-Solis longifolius Park. *Th.*

Ros-Solis longifolius major *Septentrionalium.* An Rorella longifolia maxima *Raij Synops.*

Ros-Solis *Lusitanicus* maximus, foliis Asphodeli minoris, *Turnesfortij. Phytogr. Tab.* 117. fig. 2. Chamæleontoides *Grisleij Epist. Dedicat. ad Viridar. Lusitan.* munere D<sup>ni</sup>. Cortène accepimus.

RUBIA *Tinctorum* sativa *C B P.* 333. Rubia major sativa, s. hortensis Park. *Th.*

Rubia sylv. aspera, quæ sylvestris *Dioscoridi C B P.* Rubia sylv. *Monspessulana* major. *J B. Tom.* 3. 715.

Rubia sylvestris aspera *Ravennensis Zanoni Hist. Botan.* 167.

Rubia quadrifolia, asperrima, lucida, peregrina. *H. Leyd.* 513.

Rubia arborescens asperior Insularum *Canariensium*, foliis ad singula genicula ternis *Phytogr. Tab.* 311. fig. 4. Nettle-Tree à Mercatoribus dicta.

Rubia quadrifolia, rotunda, lævis. *J B. Tom.* 3. 717. Item Rubia quadrifolia, semine duplici hispido. *ejusd. Tom.* 3. 718. Rubia quadrifolia, vel rotundifolia lævis *C B P.*



- Rubia femine duplici hispido, latis & hirsutis foliis *Boccon. de Pl. Sicul.* 10. *Solâ foliorum hirsutie & magnitudine, à præcedente differt.*
- Rubia tetraphyllos glabra, latiore folio *Bermudensis*. feminibus binis atropurpureis. *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 6. à D<sup>no</sup>. *Petiver* habuimus.
- Rubia tetraphyllos erecta minor, aspera, *Virginienfis* à D D. *Robinsono* accepta.
- Rubia quadrifolia lævis *Cretica*, flore purpureo *Patavinorum*. *Phytogr. Tab.* 248. *fig.* 5.
- Rubia erecta quadrifolia. *J B. Tom.* 3. 716. *Raij Hist. Pl.* 478.
- Rubia montana alba, flosculis in summis caulibus, odorata. Rubiis accedens *Asperula quibusdam*, sive *Hepatica stellaris* *J B. Tom.* 3. 719. *Asperula* s. *Rubeola montana odora* *C B P.* 334.
- Rubia cærulea erectior, elatiorvè. *J B. T.* 3. 719. *Asperula cærulea arvensis* *C B P.* 334. *Asperula flore cæruleo* *Park. Th.* *variat etiam aliquando flore albo.*
- Rubia parvo flore cæruleo se spargens *J B. ibid.* *Rubeola arvensis repens cærulea* *C B P.* An *Asperula hexaphyllos purpurea ejusd.* *C B P.* quæritur à *Raij Hist. Pl.* 1483.
- Rubia *Cynanchica* *C B P.* 333. *J B. Tom.* 3. 723. *Gallium montanum latifolium cruciatum* *Column. ecphr.* 296. *Asperula repens Gesnero* s. *Saxifraga alba* *Cæsalpino* *Park. Th.* *Qui hanc plantam bis exhibet nimirum sub titulo superius allato, & Cruciatæ minoris montanæ nomine fol.* 566. & fortè etiam sub titulo, *Rubiæ minimæ Saxatilis fol.* 276. *Gallium album tripetalon* *HR B.* 98. *nil nisi hujus varietatem nobis esse videtur.*
- Rubia minor, Gallii lutei foliis, procumbens, *Pyrenaica*. Quam ex feminibus à D D. *Sherardo* datis in *H. Acad. Oxon.* enutrivit D. *Bobartus* & nobis communicavit. An *Asperula*, seu *Rubeola montana angustifolia*, D<sup>ni</sup>. *Fagon. Schol. Botan.* 252. *Fortè etiam Asperula verticillata muralis minima* *Fab. Column. ecphr.* 302. *Asperula verticillata luteola* *C B P.*
- Rubia quadrifolia, verticillato semine *J B. Tom.* 3. 719. *Qui eandem facit cum præcedenti, at minùs propriè, cum hæc revera sit Cruciatæ nova marina minima muralis* *Column. ecphr.* 298. (i. e.) *Rubeola echinata Saxatilis* *P B P.* *Rubia echinata saxatilis* *Park. Th.* 276. Item *Cruciatæ minima muralis ejusd.* 566.
- Rubia quadrifolia pilosa, floribus verticillatis luteis *Raij Hist. Pl.* 479. *Cruciatæ hirsuta* *C B P.* 335. *Gallium latifolium, Cruciatæ quibusdam, flore luteo* *J B. T.* 3. 717.
- Rubia quadrifolia glabra, floribus luteis verticillatis. *Rubia quadrifolia glabra angustifolia* *J B. Tom.* 3. 717. An *Cruciatæ glabra* *C B P.*
- Rubia argentea *Cretica* *Pr. Alpin. de exot.* 267. *Cruciatæ argentea* *Raij Hist. Pl.* 480.
- Rubia quadrifolia *Italica* hirsuta *J B. Tom.* 3. 718. *Rubia quadrifolia vel latifolia lævis* *C B P.* 334. *Rubia lævis Taurinensium* *Park. Th.*
- Rubia parva *Virginiana*, foliolis ad geniculum binis, flore fistuloso. D. *Banister.*
- Rubia parva latifolia, fol. ad genic. binis, flore rubente *Banisteri.*
- Rubia maritima diphylls *Malabarica*, ad nodos cauliculorum spiculis coronata. *Spicas habet parvas quadrangulas, cauliculos verticillatim coronæ modo ambientes, & propè quemlibet verticillum spicularum, bina foliola Alfinæ æmula.*
- Rubia maritima angustiori folio, spicâ laxâ compressâ. *Rubia marina Narbonensium* *J B. Tom.* 3. 722. *Rubia maritima* *C B P.* 334.



*Rubia spicata latifolia*, spicâ strictiore tereti. *Rubia latifolia spicata* C B P. *Rubia spicata Cretica* latiore folio *Park. Th.* *Rubia Spicata* J B. *Tom.* 3. 721.  
*Rubia tenuissimis foliis*, spicâ tereti graciliore. An *Rubia angustifolia spicata* C B P.  
 & in *Prodr.* 145.

RUBUS foliis elegantèr dissectis *D. Fagon. Phytogr. Tab.* 108. fig. 4. In *HRP.*  
 collegit *D. Sherard.* & nobis communicavit.

*Rubus Americanus* magis erectus, spinis rarioribus, stipite cæruleo. In *Hort. Medic.*  
*Chelseiano* vigentem conspeximus.

*Rubus* sine spinis *Valentinus* J B. *Tom.* 2. 61. Item *Rubus Idæus* non spinosus  
*ejusd. ibid.* *Rubus Idæus lævis* C B P. 479. The Maiden-Bryar, nostratibus  
 dictus.

*Rubus Idæus* fructu albo C B P. *Rubus Idæus leucocarpos* Camera. *Hort. Medic.* 149.

*Rubus Idæus* fructu nigro *Virginianus* *D. Banister.*

*Rubus Idæus* maximus *Americanus* non spinosus, flore roseo, fructu compressiori.  
*Rubus odoratus Cornuti de Pl. Canad.* 149.

*Rubus Alpinus humilis* J B. *Tom.* 2. 61. *Chamærubus* spinis carens 1<sup>us</sup>. sive *Saxa-*  
*tilis* C B P. *Rubus parvus Saxatilis Alpinus*, *Camer. Hort. Med.* 149. An *Ru-*  
*bus tricoccus* *Park. Th.*

*Rubus Alpinus humilis Anglicus*, *Vaccinia nubis* (i. e.) Cloud-Berries vulgò  
 dictus. *Chamærubus foliis Ribes*, *Anglica* C B P. 480. *Rubo Idæo* minori affi-  
 nis, *Chamæmorus* J B. *Tom.* 2. 62. *Chamæmor. Cambrobritannic. ejusd. ibid.*

*Rubus Alpinus Norvegicus*, *Ribesii folio humilis*. *Chamærubus foliis Ribes* C B P.  
*Chamæmorus Norwagica* J B. *Tom.* 2. *ibid.*

*Rubus Alpinus humilis*, folio *Vitis*. *Chamæmorus altera Norvegica. Clus. Hist.*  
*J B. ubi suprâ.* Huc verò non pertinet, quoniam *Ribesii species est.*

RUTA sativa, vel hortensis. J B. *Tom.* 3. 197. *Ruta hortensis latifolia* C P B. 336.  
*Ruta hortensis minor tenuifolia. Moris. Hist.* 507. *Ruta hortensis altera. C B P.*  
*ibid.*

*Ruta sylvestris major* C B P. *Moris. J B. Tom.* 3. 199.

*Ruta Chalepensis latifolia*, florum petalis villis scatentibus. *H. Leyd.* 431.


Eadem angustifolia *Moris. Hist.* 2. 508.

*Ruta sylvestris minor* C B P. 336. J B. *Tom.* 3. 200. *Peganium Narbonensium* *Lob.*  
*Icon. Tom.* 2. 54.

*Ruta sylvestris*, flore magno albo C B P. *Ruta* quæ dici solet *Harmala* J B. *Tom.* 3.  
 200. *Ruta sylvestris Syriaca* s. *Harmala* *Park. Th.* *Melanthium Syriacum* minus  
 fruticescens, latifolium, *Rutæ* flore, fructu tricapsulari. *Breyn. Prodr.* 2. 67.



## S.



**S**AAMOUNA *Pisonis*, s. Siliquifera *Brasiliensis* Arbor digitatis foliis ferratis, floribus Teucrij purpureis. *Phytogr. Tab. 56. fig. 4.* Arbor pentaphyllos *Virginiana*, floribus spicatis monopetalis. *Mus. Corten. Raij Hist. Pl. 1800.* Itèm Pentaphylla siliquosa *Brasiliensis*, caudice spinoso, media parte in ventrem intumesciente *ejusd. 1761.* Hujus exemplar cùm multis aliis exoticis ab insigni viro D. *Gulielmo Cortene* dono accepimus. *Poyson-Root* à *Carolinensibus* nostratibus dicta.

Saamoúnæ *Brasiliensium* floribus æmula, Arbor Salvifolia sericea, dipetaloides, ex *Insulis Fortunatis. Phytogr. Tab. 313. fig. 2.*

**SABINA** vulgaris *Park. Theatr. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis CBP. 487.* Sabina baccitera & sterilis. *J B. T. 1. 288. At neque sterilis est, neque baccifera, Ut ex observatione D. Samuelis Dale habuit Celeberr. Rajus Cui ille conos virgis adnascentes plurimos, Pisis multò minores, squamosos, & sub singulis squamis, ut in aliis hujus generis, bina semina occultantes, ut videsis in Hist. Pl. append 1916. idèòque nominari possit Sabina vulgaris conifera s. sterilis falso putata.*

Sabina conifera *Goensis* sœmina, rarioribus foliis. *Juniperus ex Goa H. Leyd. 346. Cedrus ex Goa vulgò.*

Sabina conifera *Goensis* mas, foliis crebrioribus coæsiis.

Sabina conifera *Goensis*, confertissimis crispatis foliis, circà virgulas triplici serie dispositis.

**SAGITTA** aquatica omnium minima D. *Plukenet Raij. Synops. 143. A minore angustifoliâ J B. specie differre videtur, quia nunquàm à parvitate suâ variat. Propè palatium Archiepiscop. Cantuariens. ad Thamesin apud Lambetham copiosè provenit.*

Sagittariæ foliis, Planta glomerato fructu monopyrene, Coriandri ferè figurâ. *Phytogr. Tab. 220 fig. 7. Culitamara H. Malab. Part. 11. Tab. 45. Sagitta Indica major folio obtusò, floribus minoribus candicantibus. Commelin. in Not.*

Sagittariæ quodammodo similis, Planta *Maderaspatana*, floribus medio caule quasi ex Utriculo prorumpentibus. *Phytogr. Tab. 220. fig. 8. ex Herbario Vivo du-Boisiano.*

Sagittariæ similis, Planta palustris *Virginiana*, spicâ florum cæruleâ D. *Banister.*

Sagittæ affinis *Malabariensis* latissimo folio, floribus ex albo trifoliatis. *Commel. Not in H. Malab. Ottel ambel H. Malab. Part. 11. Tab. 46.*

Sagittæ (lortè) cognata Planta, ex *Maderaspatân.* An Maravara *Tsjembu Hort. Malab. Part 12. Tab. 9. Ex caulibus Flores fasciatim proveniunt ordine decussato.*



*SALIX* vulgaris alba arborescens *C B P.* 473. *Salix* maxima fragilis alba hirsuta *J B. T. I.* 213.

*Salix* folio utrinque glauco, viminibus rubris *Raij Cat. Angl.* 260.

*Salix* folio lato, splendente, fragilis. *Raij Hist. Pl.* 1420. An *Salix* fragilis *C B P.*

474. *Salix* spontanea fragilis, Amygdalino folio, non auriculata *J B. Tom. I.* 214.

*Salix* vulgaris nigricans, folio non serrato. *C B P.* 475. *Salix* Phænicophleos, s. Phænicea. *Hist. Lugd.* 277.

*Salix* folio Amygdalino utrinque aurito, corticem abiciens. *Raij Hist. Pl.* 1421.

*Salix* folio auriculato splendente flexilis, corticem similiter exuens *Raij Hist. Pl.* 1420. & 1916. An *Salix* folio Amygdalino utrinque vircente aurito *C B P.* 473.

*Salix* viminalis nigra. *Park. Th.* Huic eadem est (nostrâ sententiâ) *Salix* corticem abiciens à *Thomâ Willisello Darkingæ* in *Surreiâ* observata, cum julo densissimo tomento, seu cotone confercto; *Ubi & nos etiam Observavimus.*

*Salix* rubra minimè fragilis, folio longo angusto. *J B. Tom. I.* 215. *Salix* vulgaris rubens *C B P.* succrevit in *Hort. Medico Edv. Morgan.* ubi *Salicis Belgicæ* viminibus rubris titulo, nobis primò innotuit; Amerina nigra & rubens *Plinio.* An *Salix* minimè fragilis, foliis longiss. utrinque viridibus, non ferratis. *D. Sherard. Raij Synops.* 293.

*Salix* folio longo subluteo non auriculato, viminibus luteis. *Raij Synops.* 293. *Salix* longifolia non auriculata, folio & viminibus subluteis. *Cat. Angl.* 263. An *Salix* folio longissimo, utrinque albido. *C B P.* 474.

*Salix* humilior, foliis angustis, subcæruleis, ex adverso binis. *Raij Hist. Pl.* 1421.

*Salix* tenuior, folio minore utrinque glabro, fragilis. *J B. Tom. I.* 213. *Hæc Salix à cæteris distingui solet, quòd plerùmque tuberculis quibusd. subrubentibus baphico cocco ferè similibus, folia onerata habere conspiciatur; & cum J. Bauhino nos sæpius observavimus hanc speciem Excrementum producere in Ramulorum fastigio Rosæ æmulum, foliis confertim stipatis compactile, partim hirsutis partim glabris. Unde*

*Salix* humilis capitulo squamoso. *C B P.* 474. *Salix* Helice *Theophrasti, Hist. Lugd.* 277.

*Salix* elatior, foliis latis crenatis, subtùs rore lucido cæruleis.

*Salix* folio laureo, s. lato glabro odorato. *Raij Hist. Pl.* 1426. An *Salix* latifolia non hirsuta, cum gallis. *J B. Tom. I.* 216. *Salix* montana major, foliis Laurinis *HRP.* 160.

*Salix* pumila montana, folio rotundo *J B. Tom. I. lib. 8.* 218.

*Salix* pumila, folio utrinque glabro. *J B. ibidè.* An *Salix* pumila latifolia prior. *Clus. Hist.*

*Salix* pumila angustifolia, pronâ parte cinerea. *J B.* Item *Salix* humilis repens, angustifolia. *Lobelij ejusd. J B. Tom. I.* 214. *Salix* pumila Linifolia incana. *C B P. malè.* *Salix* pumila angustifolia recta. *Park. Chamæitea* s. *Salix* pumila, *Gerard.*

*Salix* pumila angustifolia, infernè lanuginosa. *J B. ibidè.* *Salix* pumila, brevi angustoque folio incano. *C B P.* *Salix* humilis angustifolia repens. *Park. Th.*



*Salix pumila* subrotundis foliis, utrinque lanuginosis, & argenteis. An *Salix pumila* foliis utrinque candicantibus, & lanuginosis. *CBP.* 474.

*Salix saxatilis minima.* *CBP.* & in *Prodr.* In Alpium *Helvetiorum* jugis collegit *D. Sherard.*

*Salix hirsuta rotundifolia maxima.* Forte, *Salix hirsuta Alnifolia Commelin.* *Hort. Amst.* 310.

*Salix latifolia rotunda CBP.* *Salix caprea rotundifolia Gerard.* *Salix latifolia* infernè *hirsuta JB. Tom. 1.* Qui hanc à sequente non vult specie differre.

*Salix folio ex rotunditate acuminato. CBP.* *Salix caprea latifolia Gerard.* *Salix latifolia* infernè *hirsuta JB. ibid.*

*Salix longiori folio hirsuta, rosea nostras. Phytogr. Tab. 56. fig. 5.*

*Salix angustis & longissimis foliis crispis, subtus albicantibus. JB. Tom. 1. 212.* *Salix oblongo, incano, acuto, folio. CBP.* 474.

*Salix foliis longis, latis & crispatis, subtus cum nitore canescentibus.* An *Salix caprea acuto longoque folio D. Sherard. Raij Synops. 293.* Fortè etiam *Salix latifolia, folio splendente ejusd. Synops. ibid.*

**SALIX** *Conophora angusto, mucronato folio glabro PBP.* 372. Frutex *Æthiopicus* conifer foliis *Cneori, Salici æmulus Breyn. Cent. 1. fol. 121.*

*Salix Conophora Africana, major conis grandioribus.*

*Salix (fortè) Conophora angustissimo folio glabro PBP.* 373. sub titulo *Thymelææ capitatae angustæ Salicis folio Prom. Bon. Spei,* Hujus Icon habetur in *Phytogr. Tab. 229. fig. 6.*

**SALIX** arbor folliculifera, obtusis foliis candicantibus *Americana White-Willow Barbadosibus dicta, Phytogr. Tab. 221. fig. 1.*

*Salix folliculifera longissimis argenteis & acutis foliis Americana Phytogr. nondum edit. The Silver Sallow-Tree, or Codded Osier Barbadosibus Anglis nuncupatur.*

*Salix arbor folliculifera tetraphyllos, lucidè atrovirentibus acutis foliis, Americana Black-Sallow Barbadosibus vulgò. Phytogr. Tab. 221. fig. 2.* Huc fortè spectat *Guirapiriba, vel Urupariba Brasiliensibus Marcgr. Lusitanis Pao d'arco dicta Hist. Brasil. 118.*

*Salicis folio Canariensis Arbuscula impatiens τὸ ποδὲν δρῶ s. Arbor crepitus; The Snap-Tree nostratibus, & Satterel Insulanis dicta. Ab Ecbolii Indici s. Adhatodæ, cucullatis floribus Æmulâ, Hujus Almagest. 132. ex iisdem locis, parùm diversa. Eademque est, cùm Arbusculâ Canariensi Salicis aut potiùs Oleæ Sylv. Barbados. folio & facie, &c. Almagest. Botan. 44. Hujus Icon exhibetur in Phytogr. Tab. 313. fig. 1.*

**SALVIA** *ferrata crispa. JB. Tom. 3. 505. Salvia latifolia ferrata. CBP.* 237. *Salvia maxima s. latifolia. Park. Th. 49.*

*Salvia variegata 1. Park. paradis. Salvia perelegans tricolor argentea Belgarum HRP.* 160.

*Salvia Absinthium redolens. JB. Tom. 3. 307. Salvia minor altera, odore & sapore Absinthii. CBP.* 237.

Salvia



- Salvia Cretica* pomifera. *Clus. Hist. Phytogr. Tab. 57. fig. 2.* *Salvia baccifera* C B P.  
*Salvia gallifera Cretica* J B. *Tom. 3. Huic folia sunt viridia.*  
*Salvia Cistifolia* ex *Promon. Bon. Spei, Phytogr. Tab. 57. fig. 5.* Fortè *Salvia Syriaca* Cisti fæminæ foliis, acetabulis *Moluccæ Breyn.*  
*Salvia minor Æthiopica*, foliis *Chamæleagni asperis. Breyn. Cent. 1. 169.*  
*Salvia minor exotica*, Phylli foliis argenteis, apud *Collectaneas D. Sherard.*  
*Salvia auriculata*, mucronatis foliis crassis, lanuginosa, appendicibus aucta. *Phytogr. Tab. 57. fig. 3.*  
*Salvia trifoliata minor, Indica Phytogr. Tab. 57. fig. 4.*  
*Salvia minor auriculata. J B. Tom. 3. 305.* *Salvia minor aurita, & non aurita. C B P. 237.* *Salvia minor pinnata. Park. Th. 50.*  
*Salvia minor aurita, odoratissima, Hispanica Park. ibid.* *Salvia folio tenuiore. C B P. 237.*  
*Salvia perangustis sinuatis foliis, longis pediculis infidentibus, lanuginosa. Phytogr. Tab. 57. fig. 1.* An *Salvia angustifolia serrata. C B P.* *Salvia Cretica angustifolia, non aurita. Park. Th.* *Salvia tenuifolia J B. Tom. 3. 306.*  
*Salvia minor Cretica, folio tenui subluteo.*  
*Salvia fruticosa lutea latifolia, s. Verbasum sylv 4. Matthiolo Park. Th. 51.* *Verbasum latis Salviæ foliis. C B P. 240.*  
*Salvia fruticosa lutea angustifolia, s. Phlomos Lychnitis Dioscoridis Clusio Park. Th.* *Verbasum angusto Salviæ folio. C B P.* *Verbasum Monspeliense, flore luteo hiant. J B. Tom. 3. 307. cujus Figura transposita est.*  
*Salvia fruticosa, Cisti folio haud incano, floribus purpureis. Phytogr. Tab. 57. fig. 6.* *Verbasum verum, flore rubro, arborecens. Hort. Groning, Verbasum Salvi folium, flore rubro, Lusitanum Griseii. Verbas. sylv. Salvifolium exotic. folio rotundiore, Lobelij J B. Tom. 3. 307.* *Verbas. subrotundo Salviæ folio. C B P. 240.* *Verbas. Salvifolium exoticum Cistoides Park.* Et sub *Verbasci Cistoides* titulo ex *Hort. Cl. Contareni* habuit *Casparus Bauhinus.* *Hujus flores Lobelio videre nusquam contigit; At Cisti æmulos, appingit Parkinsonus, itèm pentapetalos esse, petalis subrotundis colore flavo staminibus rubentibus præditos describit; Sed hæc omnia per figmentum: nec minùs erroneè à Cl. Hermanno in Hort. suo Leydens, app. elegans hæc & minùs cognita species; Verbasci latis Salviæ foliis C B P. Synonymo proponitur. Ante triginta circitèr annos in Hort. Med. D. Morgani luxuriantem Observavimus.*  
*Salvia agrestis s. Sphacelus Dodonæi Hist. Lugd. Scordium alterum s. Salvia sylvestris C B P. 247.* *Scordotis, s. Scordium folio Salviæ J B. Tom. 3. 292.*  
*Scorodonia s. Scordium alterum quibusd. & Salvia agrestis Park. Th.*  
*Salvia sylvestris amplissimis Verbasci foliis, graveolens, flore albo parvo Canariensis inter Delineation. nostr. nond. edit.* *Arvida Salva Insularis vulgò. Flos ejus galeâ caret. Facie externâ cum Stachyde convenit. Vid. Stachys.*  
*Salvia Barbadosibus dicta, Spicâ florum compactiori Phytogr. Tab. 221. fig. 3.* *Huic fortè adfinis est Yztacpatli 7. Nov. Hispan. Terentii apud Recc. 450. ut & Amozotl Nov. Hisp. ejusd. 349. & 458.*  
*Salvifolia arbor Orientalis foliis tenuissimè crenatis Phytogr. Tab. 221. fig. 4.* An fortè  

T t Mallam



Mallam Taddali *H. Malab. Part. 4. Tab. 40.* Baccifera *Indica* racemosa, florum staminulis binis, acinis monopyrenis *Raii Hist. Pl. 1597.*

SAMBUCUS fructu in Umbellâ nigrò *CBP. 456.* Sambucus vulgaris *J B. Tom. 1. 545.*

Sambucus fructu albo *Park. Th.* Sambuc. fructu in Umbellâ viridi. *CBP. 456.* Sambucus acinis albis. *J B. ibid.*

Sambucus humilior frutescens, foliis elegantèr variegatis. *H. Edinburg. 305.*

Sambucus racemosa rubra *CBP. 456.* Sambucus racemosa, acinis rubris *J B.*

Sambucus laciniata *J B. Tom. 1. 549.* Sambuc. laciniato folio *CBP. ibidem.*

Sambucus humilis, s. Ebulus. *CBP. ibid.* Ebulus, s. Sambucus herbacea. *J B. Tom. 1. 549.*

Sambucus humilis, s. Ebulus laciniato folio. *CBP. Phytogr. Tab. 58. fig. 1.* Ebulus laciniata. *Ponæ Italicè.*

Sambucus humilis, s. Ebulus exotica, Marrubii aquatici laciniatis foliis. *Hort. Patav. Phytogr. Tab. 221. fig. 5.* à D. Doodio accepimus.

Sambucus aquatica, flore simplici. *CBP. 456.* Sambucus aquatica. *J B. Tom. 1. 552.* Sambucus palustris, s. aquatica. *Park. Th.*

Sambucus rosea *J B. Tom. 1. 553.* Sambucus aquatica, flore globoso pleno. *CBP. 456.*

Sambucus *Barbadensibus* dicta, Coryli foliis subincanis. *Phytogr. Tab. 221. fig. 6.* Aningaperi *Brasiliensibus* *Pison. 218.* Fortè etiam Xumatl *Mexicensibus*, s. Sambucus *Hernandez apud Recc. 99.*

SANICULA montana, rotundifolia major. *CBP. 243.* Sanicula Alpina guttata. *J B. Tom. 3. 707.* Sanicula montana altera. *Clus. Hist. 307.*

Sanicula montana rotundifolia minor, *Hispanica Raii Hist. Pl. 1047.* Itèm Sanicula rotundifolia, crenata, pilosa, *Herm. ejusd. 1048.* Saniculæ montanæ letariùs species secunda. *Clus. Hist. 308.* Sanicula montana folio rotundo, minus inciso, & flore pallidiore. *Schol. Botan. 26.* Sanicula montana rotundifolia minor *CBP. 243.*

Sanicula radice granulosa, flore albo. *H. Leyd. 535.* Saxifraga rotundifolia alba, *CBP. 309.* Saxifraga alba, radice granulosa. *J B. Tom. 3. 707.*

Eadem ad folia bulbos gerens. *H. Leyd.* Saxifraga ad folia bulbos gerens. *CBP. 309.* Saxifraga bulbifera *Park. Th. 423.*

Sanicula montana crenata, Umbilico rubro *HRP. 161.* Sanicula aizoides, foliis subrotundis ferratis. *H. Leyd. 535.* Sedum montanum ferratum, guttato flore *Park. Th. 738.* Cotyledon altera olim *Matthiolo J B. Tom. 3. 684.* Cotyledon media, foliis subrotundis. *CBP. 285.*

Sanicula montana crenata, umbilico pallido *HRP. ibid.* Sanicula aizoides, foliis oblongis ferratis. *H. Leyd. ibid.* Itèm Sanicula aizoides, foliis ferratis multiflora; *ejusd. ibid. (i. e.)* Sedum ferratum, flore albo multiflorum. *Dodart. Memoir. 113.* Cotyledon media, foliis oblongis ferratis *CBP. 285.* Sedum ferratum. *J B. Tom. 3. 689.* Cotyledon altera 4<sup>a</sup>, s. *Matthiolo Clus. Hist. 2. 66.* Cotyledon altera minor, folia subrotundo. *Park. Th. 740.*

Sanicula Alpina minima rosea, guttato flore, *HRP. ibid.* Sanicula Alpina rosea, oblongo,



oblongo, rotundo, crenato folio minima Umbilico pallido. *H. Leyd. ibid.*  
Cotyledon minor, foliis subrotundis ferratis. *CBP. & in Prodr.*

*Sanicula aizoides*, seu *Sedum ferratum*, flosculis compactis immaculatis. *D. Luidii Raij Synops. novissim. edit. 212.*

*Sanicula montana crenata*, folio longiore, pediculo folioso. *Schol. Bat. Phytogr. Tab. 222. fig. 1.* *Sedum Pyrenæum*, ferratum longifolium *HRB.* *Sanicula* (fortè) *montana longifolia*, ferrata. *CBP. 243.* *Sanicula aizoides*, foliis longiss. ferratis candicantibus. *H. Leyd. 535.*

*Sanicula montana minor*, s. *Sedi alpini* 3<sup>ii</sup>. *Gregor Rhegiensis* varietas 2<sup>a</sup>. *Column. Phytogr. Tab. 222. fig. 2.*

*Sanicula myosotis Alpina*, floribus albicantibus ferè umbellatis. *Phytogr. Tab. 58. fig. 2.* & *Tab. 222. fig. 4.* *Saniculæ Alpinae* aliquatenùs affinis. *J B. Tom. 3. 708.* Cotyledon hirsuta *Phyt. Brit. Raij Synops. 213.* Cotyledon aquatica hirsuta *ejusd. Hist. Pl. 1046.* An *Saniculæ montanæ* alterius species 2<sup>a</sup>. *Clus. Hist. 308.* At nunc mutata sententiâ, Hanc plantam nondùm à quoquam descriptam putat *Cl. Rajus*, neque enim (ut affirmat.) *Saniculæ alpin.* aliquatenùs affinis *J B.* neque. *Saniculæ montanæ* alterius secunda species *Clusij* descriptiones ei in omnibus conveniunt, ut aliquando opinatum se esse fatetur.

*Sanicula Virginienfis* alba, folio oblongo mucronato *Phytogr. Tab. 59. fig. 1.* & *Tab. 222. fig. 5.* *Saxifraga alba* folio oblongo acuminato *D. Banister. Cat. Mss.*

*Sanicula Alpina minor* hirsuta, floribus umbellatis, albis, suaveolentibus. *Sedum Alpinum hirsutum*, lacteo flore. *CBP. 284.* *Sedum minus x. alpinum* 3<sup>m</sup>. *Clus. Hist. 2. 62.* *Jasme montana Hist. Lugd. Chamæjasme alpina J B. Tom. 3. App. 868.*

*Sanicula Alpina Alsines* folio *Virginiana.* *Saxifraga petræa Alsine-folia Banisteri Cat. Mss.*

*Sanicula aizoides Alpina trifido folio major alba H. Leyd. 536.* *Sanicula alpina* s. *Sedum tridactylites alpinum majus album CBP. Phytogr. Tab. 222. fig. 3.* *Saxifraga alba petræa Ponæ* apud *Clus. 337. Park. Th. 425.*

*Sanicula aizoides tridactylites alpina minor*, flore albo majore *Phytogr. Tab. 57. fig. 7.* *Sedum tridactylites alpinum minus CBP. 284.* quod 2. in *Prodr.* *Sedo Alpino* 3<sup>io</sup>. similis altera *Column. ecphras. part. 2. 66.* *Sedis affinis trifulca, Alpina, flore albo. J B. Tom. 3. 696.* *Sedum alpin. laciniatis Ajugæ foliis Park. Th. 739.*

*Sanicula aizoides minor Pyrenaica* flore pallidè luteo, foliis variis. *Sedum Pyrenaicum* pallidè luteum, foliis partim integris, partim trifoliis. *Schol. Bot. 31.* An *Sedum Alpinum hispidum*, ferè spinosum, flore pallido *J B. Tom. 3. 695.* An *Sedum tridactylites Alpin.* pallidè luteum *CBP.*

*Sanicula aizoides tridactylites alpina minima* flore carneo. *Sedum alpinum minimum* carneo flore *Sch. Bot. 30.* *Tridactylites* (fortè) *Alpina J B. Tom. 3. 762.*

*Sanicula aizoides trydactylites Murorum.* *Tridactylites tectorum* flore albo *J B. Tom. 3. 762.* *Sedum tridactylites tectorum CBP. 285.* *Paronychia foliis incis* *Park. Th.*

• *Sanicula Æthiopica angustifolia* florum petalis magis acuminatis. *Phytogr. Tab. 313. fig. 3.*

*Sanicula aizoides Alpina* flore majusculo luteo, punctis croceis guttato. *Sedum minus*



minus Alpin. luteum nostras *Raij Hist. Pl.* 1042. *Sedum* parvum montanum luteum *J B. Tom.* 3. 693. *Sedum* alpinum flore pallido *C B P.* 284. *Park. Th.* An *Sedum* montanum, *Coris cæruleæ folio Sch. Bot.* 30. Fortè etiam *Sedum* alpinum floribus luteis maculosis *C B P.* Sedi minoris genus flosculis luteis vel croceis maculosis *Gesner. Montefract.*

*Sanicula aizoides Alpina minima* s. *Saxifraga Muscoides* flore albo. *Sedum* Alpinum album foliolis compactis *C B P.* 284. *Sedum* minus 9<sup>m</sup>. *Clus.* s. alpinum 3<sup>m</sup>. *Hist.* 2. 61. *Sedum* minimum alpinum *Muscoides Park. Th.* 736. *Sedum* Alpinum minimum, foliis cinereis flore candido. *J B. Tom.* 692. Hujus autem *Icon* transposita est ad fol. 592. *Sedum* Alpinum muscosum *Greg. Rbegiens.* Alpinum 4<sup>m</sup>. *Column. ecphr. Part.* 2. 66, 67.

*Sanicula aizoides Alpina minima* s. *Saxifraga Muscoides monanthos*, caule folioso. *Sedum* muscosum *J B. Tom.* 3. 695.

*Sanicula Alpina Ericoides* flore cæruleo. *Sedum* alpinum *Ericoides cæruleum C B P.* 284. *J B. Tom.* 3. 694.

*Sanicula Alpina angustissimo folio* flore albo. *Phyllo Dalechampii* aliquatenus similis *J B. Tom.* 3. 762. *Sedum* Alpinum gramineo folio, lacteo flore *C B P.* 284.

*Sanicula Alpina angustissimo folio*, flore carneo *Phytogr. Tab.* 108. fig. 5. *Sedum* Alpinum alterum *Francisc. Gregor. Rbegiens Column. ecphr. Part.* 2. 64. *Sedum* Alpinum angustissimo folio, flore carneo. *C B P. ibid.*

*Sanicula Alpina angustiss.* brevioribus foliolis per intervalla confertis. *Phytogr. Tab.* 108. fig. 6. *Sedum* Alpinum 1<sup>m</sup>. *Column. ecphr. ibid.* *Sedum* Alpinum exiguis foliis *C B P.* An *Sedum* Alpinum minimum carneo flore *Sch. Bot.* 30. Plantula quædam *Jasmini* lutei flore à *D. Turnefortio* in *Hispaniâ* nupèr inventa, ut monuit nos *D. Sherard.* in omnibus exceptò florum colore, huic nostræ conveniebat.

*Sanicula montana Americana* repens floribus albis spicatis. *Cortusa Americana* flore spicato petalis integris *H. Leyd.* 661. *Cortusa Indica* vel *Hedera terrestris Bod. à Stapel.* in *Theophr.* 366. *Sanicula* s. *Cortusa Americana* fruticosa *Park. Th.* 533.

*Sanicula* s. *Cortusa Americana* altera flore minuto fimbriato *HRP.* 161. *Cortusa Americana* spicato flore, petalis fimbriatis *H. Leyd. app.* 661. An *Pyaztlacotl Novæ Hispaniæ Terentij* apud *Recc.* 399.

*Sanicula* s. *Cortusa Americana* spicata floribus squallidè purpureis. *Phytogr. Tab.* 58. fig. 3. An *Cortusæ foliis Virginiana* floribus muscosis *P B P.* 328. Fortè *Colzitzicatztli Nov. Hisp. Terent.* apud *Recc.* 373.

**SATUREIA** hortensis s. *Cunila fativa Plinij C B P.* 218. *Satureia hortensis Park. Th.* *Satureia fativa J B. Tom.* 3. 272.

*Satureia montana C B P.* *Satureia durior J B.* *Satureia hortensis perennis* s. *Thymbra legitima Dioscoridis Grisleyi Viridar. Lusitan.*

*Satureia spicata C B P.* 218. *Satureia spicata S<sup>ti</sup>. Juliani Park. Th.* *Satureia* foliis tenuibus s. *tenuifolia S<sup>ti</sup>. Juliani* quorundam *J B. Tom.* 3. 273.

*Satureia Cretica C B P.* Itè *Hyssopus montana angustifolia aspera ejusd. C B P.* 218. *Thymbra Græca J B. T.* 3. 273. Itè *Hyssopum montanum Cilicium quibusd. J B. T.* 3. 277. *Satureia frutescens Arabica* folio fimbriato hirsuto *Breyn. Prodr.*



*Prodr.* 2. *Sathar Arabum Rauwolf. Hodepor.* *Thymbra Prosp. Alpin. exot.* 81.  
*Thymbra legitima Clus. Hist.* *Satureia hirsuta purpurea Libani Dodart. Memoir.*

SAXIFRAGIA maxima *Africana*, Umbellâ parvâ lutescente. *Pimpinella Saxifraga*  
 maxima *Africana Bot. Monsp. app.* 309.

*Saxifraga major umbellâ candidâ H. Leyd.* 537. *Pimpinella Saxifraga major Moris.*  
*Umb.* 12. *Saxifraga hircina major J B. Tom.* 3. 109.

Eadem Umbellâ rubente. *Pimpinella Saxifraga maj. umbellâ rubente C B P.* 159.

*Saxifraga hircina media J B. Tom.* 3. 111. An *Daucus Selinoides Cordi Histor.*

*Saxifraga hircina minor foliis Sanguisorbæ J B. ibid.* *Pimpinella Saxifraga major*  
*altera C B P.* 159. *Pimpinella Saxifraga major nostras Park. Th.* 946.

*Saxifraga hircina minima, Pimpinella crispa Tragi J B. Tom.* 3. 113. *Pimpinella*  
*Saxifraga minor C B P.* *Pimpinella Saxifraga hircina minor Park. Th.* Item *Pim-*  
*pinella Saxifraga minor nostras ejusd.* 946.

*Saxifraga tenui folio, umbellâ candidâ. Pimpinella Saxifraga tenuifolia C B P. J B.*  
*Tom.* 3. 112.

*Saxifraga multifido folio Pannonica J B. Tom.* 3. 19. *Saxifraga Pannonica Clus. Hist.*  
*Daucus montanus multifido, brevisque folio C B P.* 150. *Daucus montanus Pan-*  
*nonicus Park. Th.*

*Saxifraga Matthioli tenuifolia & Umbellifera J B. Tom.* 3. 18.

*Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, quibusdam Caucalis J B. Tom.* 3. *Caucalis Peucedani*  
*folio. C B P.* 153. *Caucalis Fœniculi folio Park. Th.*

SAXIFRAGA rotundifolia aurea *C B P.* 309. *Saxifraga aurea J B. Tom.* 3.  
 707. *Alchimilla rotundifolia aurea hirsuta H. Leyd.* 14. *Chrysofplenion Tabern.*  
*Icon.* 841. *Hujus Flos tetrapetalos est monente Rivino. Introduct. general. in Rem*  
*Herbar.* 34.

*Saxifraga aurea, foliis pediculis oblongis infidentibus Raij Synops.* 66. *Icon. J. Bau-*  
*hini huic optimè respondet. ubi supra.*

*Saxifraga rotundifolia aurea minor Montis aurei HRP.* 162. *Chrysofplenium foliis*  
*minoribus subrotundis Elem. Bot. Part.* 1. 122.

SCABIOSA Acanthoides conglobato capite, longis spinis munito. *Carduus*  
*Sphærocephalus capitulo longis spinis armato C B P.* 382. *Spina alba quibusdam*  
*capite echinato J B. Tom.* 3. 71. *Carduus Sphærocephalus acutus minor Park. Th.*  
*Scabiosa Cardui folio Sphærocephala humilior H. Leyd.* 539. *Carduus Sphæroce-*  
*phalus cæruleus minor C B P.* 381. *Echinopus minor J B. Tom.* 3. 72. *Crocodi-*  
*lium Monspeliensium Hist. Lugd.* 1476.

*Scabiosa Cardui folio Sphærocephala elatior H. Leyd. ibid.* *Carduus Sphærocephalus*  
*latifolius vulgaris C B P.* *Echinopus major J B. Tom.* 3. 69. *Carduus Sphæ-*  
*rocephalus s. globosus major Park. Th.*

*Scabiosa Cardui folio Sphærocephala media. Carduus Sphærocephalus medius*  
*D. Fagon. Sch. Bot.* 216.

*Scabiosa Centauroides Pr. Alpin. exot.* 205. *Scabiosa Alpina foliis Centaurii ma-*  
*joris C B P.* 270. *Scabiosa montana maxima Park. Th.*

*Scabiosa major communior hirsuta, folio laciniato J B. Tom.* 3. 2. *Scabiosa pratensis*  
*hirsuta,*



hirsuta, quæ *Officinarum* C B P. 296. *variat flore albo* & *purpureo-cæruleo, simplici* & *pleno*.

*Scabiosa montana* glabra foliis *Scabiosæ vulgaris* C B P. 270.

*Scabiosa peregrina rubra*, capitulo oblongo C B P. *Scabiosa rubra peregrina*, quibusdam *Indica* J B. Tom. 3. 6. *Scabiosa rubra Indica* Park. Th. *variat hujus species flore rubro, carneo, atropurpureo, variegato, & albo; Interdum etiam floribus prolifera, undè.*

*Scabiosa Indica prolifera* H. Edinburg. 309. Sch. Bot. 204. *Scabiosa prolifera Lobelii* Clus. J. Bauh. & aliorum. *Scabiosa prolifera folio latiore* C B P.

*Scabiosa pumila* Cotulæ folio, flore albo immarcescente *Africana* Phytogr. Tab 312. fig. 5. *Xeranthemoides Æthiopicum* flosculis albis fistulosis.

*Scabiosa Agrimonix foliis elatior Virginiana* à D. Bobarto recepta. *Scabiosa altissima annua*, foliis *Agrimonix* nonnihil similibus H. Leyd. 539. *Scabiosa annua Transylvanica* foliis *Agrimonix* Breyn. Prodr. 2. 88.

*Scabiosa montana calidarum Regionum major Lobelij* J B. Tom. 3. 8. Itè *Scabiosa glabra foliis rigidis viridibus ejusd. ibid.* *Scabiosa fruticans angustifolia alba* C B P. *Scabiosa major Pannonica* albo flore s. 8. Clus. Hist. 2. 3. Itè *Scabiosa alba Belgicorum Hortorum ejusd. ibid.*

*Scabiosa peregrina Thapsiæ majoris folio*, flore flavescente. Phytogr. Tab. 58. fig. 4. An *Scabiosa multifido folio*, albo flore, vel potius *ῥαγδαῖνα* J B. Tom. 3. *Scabiosa multifido folio*, flore flavescente C B P. 270.

*Scabiosa Africana perennis*, dissectis foliis subhirsutis, flore purpureo P B P. 373. *Scabiosa minor dicta Æthiopica*, foliis lanuginosis flore cæruleo purpurascente Breyn. Prodr. 2. 88.

*Scabiosa Africana perennis* dissectis foliis lucidis glabris. P B P.

*Scabiosa minor vulgaris* J B. Tom. 3. 3. *Scabiosa minor campestris* Park. Th. *Scabiosa capitulo globoso minor* C B P. 270. *variat flore purpureo cæruleo* & *albo; & interdum floribus prolifera, undè.*

*Scabiosa tenuifolia prolifera minor* C B P. *Quæ Præcedentis tantum varietas est.*

*Scabiosa parva odorata floris foliis maculis infestis* J B. Tom. 3. 6. *Scabiosa minor capitulo globoso odore* C B P. *Phyteuma minus* Fab. Column. Phytobas. part. 2. 32.

*Scabiosa maritima parva* J B. T. 3. 7. An *Scabiosa stellata minima* C B P.

*Scabiosa maritima Rutæ Caninæ foliis* Boccon. de Pl. Sicul. 74.

*Scabiosa cum pulchro semine minor* J B. Tom. 3. *Scabiosa stellata folio laciniato minor, sive maritima* C B P. 271.

*Scabiosa major Hispanica* Park. Th. *Scabiosa major cum pulchro semine* J B. T. 3. 9. *Scabiosa stellata folio laciniato major* C B P. *ibid.*

*Scabiosa Hispanica procumbens foliis integris prolifera.* An *Scabiosa stellata annua prolifera* Acad. Reg. Par. Sch. Bot. 207.

*Scabiosa Africana arboresc. maxima foliis rugosis & crenatis integris* P B P. 373. *Scabiosa maxima arboresc. African.* florib. pallidis Herm. Sch. Bot. 206.

*Scabiosa Africana foliis rugosis & crenatis integris minor* P B P. *ibid.*

*Scabiosa fruticosa folio non dissecto peregrina* J B. T. 3. 11. *Scabiosa stellata folio non dissecto* C B P. *Scabiosa arborea Cretica* Ponæ Park. Th. *Scabiosa arborea Prosp. Alpin. exot.* 34.

Scabiosa



Scabiosa montana latifolia, non laciniata rubra & prima *C B P.* Scabiosa latifolia, purpurante ex nigro flore *J B. T. 3. 9.* Scabiosa 4<sup>a</sup>. *Clus. Hist. 2. fol. 2.* Fortè etiam Scabiosa Virgæ pastoris folio *C B P.* Scabiosa latifolia peregrina *Tabern. Icon. 160.* Scabiosa folio Diplaci *Raij Hist. Pl. app. 1767.* Et fortè Scabiosa maxima dumetorum folio non laciniato *J B.*

Scabiosa latifolia rubro flore *J B. ibid.* Scabiosa latifolia rubra non laciniata secunda *C B P. 270.* Scabiosa rubra *Austriaca Gerard. emac.*

Scabiosa major integro angusto folio *Sherardi*, ex dictatis *Triumfetti.*

Scabiosa alpina minor angustifolia, penitus indivisa. *D. Sherard. summis Alpibus* hanc plantam collegit ipse *Sherardus* & nobis communicavit. An Scabiosa annua integrifolia, s. foliis Bellidis *Botan. Monsp. 231.*

Scabiosa argentea angustifolia *Park. Th. 487.* Scabiosa graminea argentea *J B. Tom. 3. 12.* *Hujus est varietas folio viridi*, undè.

Scabiosa gramineis foliis glabris *Moris. Præhud. Botan. 304.*

Scabiosa cærulea *Virginiana* flosculis tetrapetalis Caryophyllorum more] patulis & laciniatis. *Ad ramulorum summitates capitulum extrudit ex tribus, non numquam sex utriculis conflatum, & in singulis continentur 4. semina, ad numerum petalorum in flore.* Scabiosæ *Javanæ Bontij 158.* non multum *Banistero nostro dissimilis esse videtur.*

Scabiosa Conyzoides *Americana* capitulis & floribus albidis parvis *P B P. Phytogr. Tab. 109. fig. 1.* *Hujus ipsissima species è Maderaspatán nuperrimè allata est.*

Scabiosa Indica major caule & pediculis foliosis *Phytogr. Tab. 312. fig. 6.* ex *Oris Cormandel.*

Scabiosa major crispatis foliis alato caule *Malabariensis.* Aduca manjen *H. Malab. Part. 10. Tab. 43.* Planta Indica alato caule folio crenato piloso & viscoso, flore glomerato purpureo *Commelin. in Not.*

Scabiosa minor alato caule *Maderaspatensis.* Scabiosæ capitulo *Chrysanthemi Myconi* foliis, alato caule, *Maderaspatensis.* *Phytogr. Tab. 108. fig. 7.* Huic ritè referri nobis videtur *Gisti folio Arbor exotica Lob. Obs. 559. Adv. 387.*

Scabiosa Integrifolia glabra radice præmorsâ *H. Leyd. 538.* Succisa glabra *C B P. 269.* Succisa s. Morsus Diaboli *J B. Tom. 3. 11.* *Pycnocomon Dioscoridis Fab. Column. Phytobasan 35. variat flore cæruleo, purpureo, & albo.*

Scabiosa Integrifolia ramosior, floribus parvis cæruleis. Succisa angustifolia palustris *Triumfetti Observ. Plantar. 76.* An Succisa angustifolia Alpina *Raii Hist. Pl. append. 1867.*

Scabiosa Æstivalis *Clus. Hist. 2. fol. 4. Park. Th. 485.* Scabiosa fruticans latifolia alba *C B P. 269.*

Scabiosæ affinis, Chrysanthemi facie, Lamii foliis *Americana Phytogr. Tab. 222. fig. 7.* *Barbadensibus nostratibus Archangel & quibusdam Persum'd-Hops nuncupatur.*

Scabiosa 5<sup>a</sup>. montana repens *Clus. Pannon. x<sup>a</sup>. sive repens ejusd. Hist poster. 5.* Bellis montana frutescens *C B P. 262.* Aphyllanti affinis Scabiosa 5<sup>a</sup>. *Clusii Bellidi affinis J B. Tom. 3. lib. 25. 13.* Scabiosa minima Bellidis folio *Gerard.*

Scabiosa cærulea Bellidis minoris folio, Globularia dicta. Bellis cærulea, caule folioso *C B P. 262.* Aphyllantes *Anguillaræ Globularia Bellidi similis J B. T. 3. 13.* Globularia *Monspeliensium*, Bellis cærulea. *Park. Th.*



Scabiosa cærulea Bellidis minoris folio caule aphylo. Bellis cærulea caule nudo *C B P.* Aphyllantes 3<sup>a</sup>. *Hist. Lugd.* 864.

Scabiosa frutescens Myrtifolia, flore cæruleo villosa. *Alypum montis Ceti* s. *Herba Terribilis Narbonensium. Lob. Adv.* *Alypum Monspelianum* s. *Frutex terribilis* *J B. Tom. I. lib. 5.* 598. *Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ C B P.*

Scabiosa *Bisnagarica* s. *Globularia frutescens*, rigidis foliis ad radicem rotundioribus cordatis, ad caulem autem mucrone præditis. *Phytogr. Tab.* 58. *fig. 5.*

Scabiosa *Jamaicensis* *Hyssopifolia*, s. *Globularia capitalis* ad genicula, foliis plurimis stellatim ambientibus verticillata. *Phytogr. Tab.* 58. *fig. 6.* Fortè *Tzicatzon Tecomatl* s. *Caput formicæ Hernand.* apud *Recc.* 254. *Huc fortè spectat Caapotiragoæ Brasiliensib.* duæ species, præsertim secunda *Marcg. lib. I. fol. 8.*

Scabiosa dendroides *Americana*, ternis foliis circa caulem ambientibus, floribus ochroleucis. *vid. Arbor Americ. triphylla, fructu Platani quodammodo æmulante Hujus Almagest.* 47. & *Phytogr. Tab.* 77. *fig. 4.*

Scabiosa montana globoso flore, gramineis foliis latioribus. *H. Leyd.* 540. *Caryophyllus montanus major flore globoso C B P.* 211. *Statice Hist. Lugd.* 1190. flore semper albo.

Scabiosa montana glabro flore, foliis angustioribus *H. Leyd. ibid.* *Caryophylleus flos aphylocaulos vel junceus major J B. Tom. 3.* 336. *variat flore rubro & albo.*

Scabiosa montana s. *maritima minima* foliis angustissimis. *Caryophyllus montanus minor C B P.* 211. *Caryophyllus montanus minimus flore globoso H R P.* 42. *floribus perpetuo rubris.*

Scabiosa graminifolia nudicaulis, capitulis argenteis, s. *Statice minima Maderaspatana* ex *Herbar. Vivo du-Boisiano Phytogr. Tab.* 221. *fig. 7.* *Huic proximè accedit Plantaginella aurea alopecuroides Brasiliana foliis gramineis Breyn. Cent. I.* 108.

SCANDIX *Cretica* major *C B P.* 152. *Park. Th.* 916. *Pecten Veneris Creticum J B. Tom. 3.* 74.

*Scandix Cretica* minor *C B P. ibid.* *Scandix Cretica* minor, s. *Anthriscus Park. ibid.* *Pecten Veneris tenuissimè dissectis foliis, Anthriscus Casabonæ J B. Tom. 3.* 73. *Aniso-marathrum Apulum. Fab. Column. ecphr.* 90.

SCILLA rubentibus radicis tunicis, folio Aloes carinato *Lobel.* *Scilla vulgaris radice rubrà. C B P.* 73.

*Scilla radice albâ C B P.* 73. *Scillæ magnæ albæ J B. Tom. 2.* 618. *Scilla Hispan. Clus. Hist.*

• SCOLOPENDRIÆ five *Asplenii* facie planta *Æthiopica* summis pinnis acuminatis, subtus sericeâ lanugine ex ruffo candicante villosa. *Phytogr. Tab.* 313. *fig. 5.* An *Aster* vel fortè *Doronicum Saxatile folio Ceterach Capit. Bon. Spei. Breyn. Prodr. 2.* 21. à *D<sup>no</sup>. Alex. Brown.* accepimus.

SCORDIUM alterum lanuginosius verticillatum *C B P.* 248. *Scorodotis tomentosa Cretica J B. Tom. 3.* 294. *Scorodotis Plinii Hon. Belli epist. 5. ad Clus.*

SCORPIOIDES filiquis singularibus villosis *Raii Hist. Pl.* 930. *Scorpioid. Beupleuri*



Bupleuri folio, corniculis asperis hirsutis minùs contortis *Morif. Hist.* 2. 127. Scorpioides filiquâ campoide hispidâ *J.B. Tom.* 2. 898. Scorpioides Bupleuri folio corniculis asperis magis in se contortis & convolutis *Morif. Hist.* 2. 127. Scorpioides Bupleuri folio *C B P.* 287.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis crassioribus, & magis spongiosis litui instar contortis, & in se convolutis *Morif. ibid.* Scorpioides filiquâ crassâ *Boelii Ger.emac.*

Scorpioides Bupleuri folio filiquis lenibus *Parkinsono Raij Hist* 931.

Scorpioides filiquâ cochleatâ & striatâ *Olyssiponensis HRP.* 164.

Scorpioides *Bisnagarica* folio singulari rigido, filiquis articulatis erectis *Phytogr. Tab.* 59. fig. 3. *Onobrychis Zeylanica* folio singulari oblongo rotundo ex dictatis *Hermanni*, monente *D. Sherard.*

Scorpioides pinguifolium triphyllon, corniculis articulatis intortis. Scorpioides *Portulacæ* folio *C B P.* 287. Itèm *Telephium Dioscoridis*, sive Scorpioides ob filiquarum similitudinem *ejusd.* 217. *Telephium Scorpioides J.B. Tom.* 2. 889.

SCORZONERA gramineo folio flore luteo. *Tragopogon* gramineo folio, radice villosâ *C B P.* 274. *Tragopogon* folio gramineo, flore albo & luteo cùm tantillâ purpurâ. *J.B. Tom.* 2. 1060.

Scorzonera folio laciniato *H. Leyd.* 544. *Tragopogon* laciniatum luteum *C B P.* 274. *Tragopogon* folio laciniato *Monspeliense* flore luteo. *J.B. Tom.* 2. 1059. *Tragopog.* laciniatis foliis. *Column. ecphr. part.* 2. 22.

Scorzonera foliis Coronopi. *Tragopogon Coronopi* folio *C B P. ibid.* *Chondrilla τεραχοναριάνθεμον* major *Thalij Harcyn.* 22. *Chondrilla Sicula* *Tragopogonoides* maritima *Boccon. de Pl. Sic.* 13. *Xeranthemum Sesamoides* flore luteo, ex dictatis *Hermanni* monente *D. Sherard.* An *Stœbe Plantaginis* folio *Prosp. Alpini exot.* 287.

Scorzonera bulbosa *Bistortæ* minimæ foliis *Virginiana* *Phytogr. Tab* 59. fig. 4. *Chondrillæ* alterum genus *Dioscoridis Rawolfii* apud *Hist. Lugd. app.* 27. huic nostræ accedere videtur.

Scorzonera bulbosa *Attica* *Galacorta* dicta *Wheleri Itinerar.*

Scorzonera latifolia margine dentata. An Scorzonera latifolia sinuata *C B P.* 275. *Tragopogon Hispanic.* s. *Escorzonera* aut Scorzonera *J.B. Tom.* 2. 1060. Scorzonera *Hispanica* major *Park. paradis.*

Scorzonera maj. *Pannonica* latifol. *Park. Th.* 409. Scorzonera latifolia altera *C B P.* Scorzonera maj. vel *Pannonica* 1<sup>a</sup> *Clus. Histor.* Præcedentis tantùm varietas est, ut rectè ponit *Eruditiss. Rajus Hist. Pl.* 248.

Scorzonera latifolia humilis nervosa *C B P.* *Tragopogonis* species, s. Scorzonera humilis latifolia *J.B. Tom.* 2.

Scorzonera nostras pulveriflora *Morif. Præ lud. Botan.* 105. Scorzonera palustris pulveriflora *HRP.* 164.

Scorzonera *Germanica* angustifolia *Tabern. Icon* 602. Scorzonera foliis nervosis *C P P.*

Scorzonera angustifolia 1<sup>a</sup> *C B P.* 275. *Tragopogonis* species, s. Scorzonera humilis angustifolia *J.B. Tom.* 2. 1061. Scorzonera *Pannonic* 3<sup>a</sup> *Clus.*

SCROPHULARIA aquatica major *C B P.* 235. *Scroph. maxim. radice fibrosâ J.B. Tom.* 3. 421. *Betonica* aquat. major *Park. Th.*



*Scrophularia aquatica major hirsuta* *HRP.* 164. An *Scrophularia foliis & caule hirsutis* *Morif. Prælud. Bot.* 306.

*Scrophularia nodosa fætida* *CBP.* 235. *Scrophularia vulgaris & major* *J.B. Tom.* 3. 421.

*Scrophularia annua folio Urticæ* *Morif. Hist.* 2. 481. *Scrophularia peregrina* *Camerario Park. Th.* 611. *Scrophularia flore rubro* *Camerar. J.B. Tom.* 3. 422.

*Scrophularia annua folio Lamii flore luteo* *Morif. Hist.* 2. 482. *Scrophularia flore luteo* *CBP.* 236. *Scrophularia lutea magna, amplis foliis* *J.B. Tom.* 3. 422. *Lamium Pannonicum alterum, s. exoticum* *Clus. Hist.* *Scrophularia flore luteo* *Park. Th.* 611. Itèm *Galeopsis altera pallida* *ejusd.* 608.

*Scrophularia Scorodoniæ foliis* *Morifono Phytogr. Tab.* 59. fig. 5. *Jerseix nostræ Angliæ adjacentis Insulæ Indigenam esse monuit nos* *D. Sherardus.* *Scrophul. Scordianæ folio, præstans ad ulcera* *Grisleii.*

*Scrophularia peregrina frutescens, foliis Teucris crassiusculis, Breynio* *H. Leyd.* 545.

*Scrophularia Telephii foliis Æthiopica, Nobis.* An *Caa-ataya Brasiliensibus* s. *Erva de purga de Joan Pais Lusitanis dicta, Pisonis Hist. nat. Brasil. lib.* 4. cap. 53. 230.

*Scrophularia Sambuci-folia, flore rubro, luteo, vario pulchro, Grisleii* *Phytogr. Tab.* 313. fig. 6. *Scrophularia Lusitanica, flore luteo eleganti foliis incis* *Florent. Schuyt. H. Leyd.* 70. *Scrophularia peregrina altera* *Park. Th.* 611. Itèm *Scrophularia Indica* *ejusd. ibidem.* Ex *Oris Æthiopicis ad nos allata est.* *Scrophularia Indica Gerardi* 716. Quæ ab hujus *Emaculatore, Scrophularia Cretica* 1. *Clus.* perperam putatur.

*Scrophularia Sambuci folio* *Park. Th.* 612. *Icon. Roberti.* *Sideritis Sambuci folio* *Prosp. Alpin. exot.* 203.

*Scrophularia folio Filicis modo laciniato, vel Ruta canina latifolia* *CBP.* 236. Itèm *Scrophularia foliis laciniatis* *ejusd. ibid.* Quæ 2<sup>a</sup> in *Prodr.* 113. ubi ramulum sub titulo *Scrophulariæ Hispanicæ* non scriptæ, à *D. Gillenio Cassellis,* se accepisse tradit. *Scrophularia Cretica* 1. *Clus. Hist.* 2. 209. *Scrophularia foliis Filicis modo dispositis, s. foliis lobatis crispis.*

*Scrophularia Ruta canina dicta vulgaris* *CBP.* 236. *Ruta canina* *Clus. Hist.* 2. 209.

*Scrophularia* 3<sup>a</sup> *Dodonæo tenuifolia, Ruta canina quibusdam vocata* *J.B. Tom.* 3. 423.

**SCUTELLARIA** *aquatica vulgò Tertianaria dicta* *H. Leyd.* 546. *Lyfimachia cærulea galericulata, vel Gratiola cærulea* *CBP.* 246. *Tertianaria aliis Lyfimachia galericulata* *J.B. Tom.* 3. 435.

*Scutellaria palustris minor flore purpureo. Gratiola latifolia sive nostras minor* *Park.* *Lyfimachia galericulata minor* *Raij Hist. Pl.* 572.

*Scutellaria Virginiana* *Hyslopi angustis foliis, flore cæruleo.*

*Scutellaria cærulea Gratiolæ foliis Americana, radice nodosâ* *D. Banister. Cat. Mss.*

*Scutellaria cærulea Majoranæ foliis Americana* *D. Banister.*

*Scutellaria cærulea Virginiana* *Lamii subhirsutis foliis major. Lamium Astragaloides Cornuti de Pl. Canad.* 129. Fortè etiam *Lamium Hispanicum* *Park. Th.* 604.

*Scutellaria cærulea Virginiana glabra Lamii aut potius Teucris folio minor. Phytogr. Tab.*



- Tab. 313. fig. 4.* An *Veronica* similis fruticosa *Curassavica* *Teucrij* foliis, flore galericulato *PBP.* 383.
- Scutellaria* major *Nepetæ* foliis *Virginiana*. *Phytogr. Tab. 110. fig. 2.* An *Scutellaria* aquatica major *Americana* *H. Leyd.* 546. Fortè *Tochonxochitl* *Novæ Hispan. Terent.* apud *Recc.* 431.
- Scutellaria* *Teucrij* facie glabro, flore purpureo. *Scutellaria* *Teucrij* facie *J.B.* *Tom. 3.* 291. *Lamium* peregrinum s. *Scutellaria* *CBP.* 231. *Lamium* peregrinum *Scutellaria* dictum *Park. Th.* 606. *Cassida* *Fab. Column. ecphr. part. 1.* 187. A *pericarpii* formâ *galeum* *militarem* exprimente, nomen accepit.
- Scutellaria* *Teucrij* facie purpurea minor, flore amplissimo. *Phytogr. Tab. 110. fig. 1.* *Teucrium* *Astragaloides*, *Cassida* minor *HRP.* 173. In colle ex adverso *Cartusianorum Cœnobii* propè *Divionum (Dijon)* in *Burgundiâ* invenit *D. Sherardus*, & nobis communicavit. Fortè *Teucrium* alpinum inodorum, magno flore. *CB. in Prodr. descript.* 116. *Teucrium* *Alpinum* inodorum *Park.* Qui *Teucrium* foliis *Scorodonix* pro eâdem specie habet, ut videsis in *Theatro suo, fol. 110.*
- Scutellaria* *Americana* *Malvæ* folio *Morif. Prælud. Bot.* 307.
- SECURIDACA** lutea major *CBP.* 348. *Securidaca* flore luteo, filiquâ latâ oblongâ *J.B. Tom. 2.* 346. *Hedysarum* majus, s. *Securidaca* major vera *Park. Th.* 1087.
- Securidaca* *Indica* angustissimis & longissimis filiquis. *H. Leyd.* 548. *Galega* *Ægyptiaca* filiquis articulatis *CBP.* 452. *Sesban* *Ægyptiacum*, s. *Securidaca* *Ægyptiaca* articulata *Park. Th.* *Sesban* foliis *Hedysari.* *J.B. Tom. 1.* 386. ubi sub *Indico* nomine *Taxocoquamoclitl* *fol. 385.* figurari videtur. *Sesban* *Pr. Alpina. de Pl. Ægypt.* 81.
- Securidaca* *Maderaspatensis* filiquis falcatis, fulvis & villosis, plurimis circâ ramulos stellatim positis *Phytogr. Tab. 59. fig. 6.* *Stella Orientalis* fulgens.
- SEDUM** majus arborescens flosculis citrinis multiflorum. *Sedum* majus legitimum *Clus. Hist. poster.* 57. *Sedum* majus arboresc. *J.B. Tom. 3.* 686. flosculis ex flavo pallescentibus *H. Leyd.* 554. An *Sedum* majus arboresc. flosculis candidis *CBP.* 282.
- Sedum* maximum villosum ex *Insulis Fortunatis* *La Frecho de las uvas* *Insulanis* dictum. An *Sedum* maxim. arboresc. latifolium flore flavo, *Cap. Bon. Spei, D. ten Rhyne Breyn. Cent.* 179.
- Sedum* *African.* frutescens incanum foliis orbiculatis *H. Leyd.* 549. *Sedum* majus arborescens *African.* alterum, foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctis *Breyn. Prodr. 1.* 47. foliis rotundioribus glaucis, flore rubente *ejusd. Prodr. 2.* 89. *Sedum* arboresc. *Promont. Bon. Spei. Bod. à Stapel.* 335.
- Sedum* majus vulgare *CBP.* 283. *J.B. Tom. 3.* 687. *Cotyledon* altera 1<sup>a</sup> s. *Sedum* vulgare *Clus. Hist. 2.* 63. *Sempervivum* majus, s. *Aizoon* majus vulgò.
- Sedum* majus soboliferum, flore albicante magno, foliis in margine pilosis. *Sempervivum* s. *Sedum* majus crenatum, *Myrtifolium.* *Adversar. & Icon. Lob.* 373. *Sedum* vulgari magno simile *J.B. Tom. 3.* 688. *Cotyledon* altera 2<sup>a</sup> *Clusii ibid.* ubi *Figura* sub præcedentis titulo depicta, adhanc plantam pertinere videtur.



- Sedum majus montanum* dentatis foliis alterum *C B P.* Sedi latifolii flore albicante minor species, magis dentata *J B. Tom. 3. 689.* Cotyledonis alterius altera species *Clus. Histor. 2. 64.*
- Sedum majus montanum*, foliis non dentatis floribus rubentibus *C B P.* *Sedum montanum latifolium* flore purpureo *J B. Tom. 3. 688.* Cotyledon altera *Taurica Clus. Pann. 481.*
- *Sedum majus Canarinum* ἀγκυλον, pilis ad oras foliorum hispидis argenteo-lucidis fimbriatum *Phytogr. Tab. 314. fig. 1.* *Corozone Celio* ab Insulanis dictum.
- Sedum montanum tomentosum C B P. 284.* Sempervivum rubrum montanum γαλαλῶδες *Fab. Column ecphr. 292.* *Sedum rubrum tomentosum Park. Th.*
- Sedum Africanum* umbellatum album *H. Leyd. 552.* foliis glabris.
- Sedum African.* umbellatum minus foliis hirsutis, ex *Prom. Bon. Spei.*
- *Sedum Africanum* umbellatum flore flavescente glabrum *Phytogr. Tab. 314. fig. 2.*
- Sedum Africanum* umbellatum majus, foliis hirsutis fimbriatis. *Phytogr. Tab. 314. fig. 3.*
- Sedum minus Æthiopicum*, mucronatis foliis, ad margines cili inftar pilosis.
- Sedum Africanum* annuum Centaurii minoris facie, flore aureo. *H. Leyd. 550.*
- Sedum echinatum* vel stellatum flore albo *J B. Tom. 3. 680.* Cotyledon stellata *C B P. 285.* Aizoon peregrinum *Camer. Hort. Med. pag. 7. Icon. 2.* Sempervivum 3<sup>m</sup>. *Dioscoridis & Plinii Fab. Column. Phytobas. 40.* An *Sedum* annuum minimum stellatum rubrum *Bot. Monsp. 238.*
- Sedum Africanum* teretifolium flore Hemerocalidis è Codice *Comptoniano Phytogr. Tab. 223. fig. 1.*
- Sedum petraeum* teretifolium *Virginianum D. Banisteri Phytogr. Tab. 223. fig. 2.*
- An *Sedum Saxatile* parvum caule gracili aphylo floribus rubentibus *ejusd Cat. Mss.*
- Sedum purpureum pratense J B. T. 3. 692.* *Sedum palustre subhirsutum purpureum C B P.* *Sedum minus 3<sup>m</sup> s. palustre Clus. Hist. 2. 59.* *Sedum arvense s. palustre flore rubente Park. Th.* *Sedum parvum palustre flore incarnato Raii Hist. Pl. 691.*
- Sedum minus* flore luteo *J B. T. 3. 692.* *Sedum minus luteum folio acuto C B P. 283.* *Vermicularis & Crassula minor vulgaris, s. Illecebra major Park. Th.*
- Sedum minus luteum ramulis reflexis C B P.* *Sedum minus luteum flore se circumflectente J B. Tom. 3. 693.* *Vermicularis Scorpioides Park. Th.* Varietas potius præcedentis videtur, quàm species distincta, ut suspicatur *Celeberr. Rajus. Hist. 691.*
- Sedum minus à rupe S<sup>ti</sup>. Vincentii Raii Hist. Pl. 1879.* Præcedente minus est, foliis densius stipatis.
- Sedum minus πλατυκτύλον, s. fasciato caule Portlandicum.* *Sedum minus lato & crasso folio (caule) Portlandicum Belgarum H R P. 166.*
- Sedum parvum acre, flore luteo J B. Tom. 3. 694.* Sempervivum minus vermiculatum acre *C B P. 283.*
- Sedum minimum luteum non acre J B.* Sempervivum minus vermiculatum insipidum *C B P.*
- Sedum minimum non acre flore albo Raii Hist. Pl. 1041.*
- Sedum minus teretifolium album C B P. 283.* *Sedum minus folio longiusculo tereti, flore candido J B. Tom. 3. 690.* *Vermicularis flore albo Park. Th.*



*Sedum minus teretifolium alterum* *C B P.* 283. *J B. Tom.* 3. 661. *Aizoon minus Matthioli Hist. Lugd.* 1129. *Sedum minus teretifolium alterum* *Cepææ flore Sch. Bot.* 30.

*Sedum parvum folio circinato, flore albo* *J B. Tom.* 3. 691. *Sedum minus folio circinato* *C B P. ibid.* *Vermicularis dasypyllos* *Park. Th.*

*Sedum minimum Africanum album lanceatis foliis, ferè umbellatum.* In Horto Instructissimo *D. Uvedal* observavimus.

*Sedum Cepæa dictum* *H. Leyd.* 555. *Cepæa Matthioli* *C B P.* 288. *J B. Tom.* 3. 679.

*SENA Alexandrina* s. foliis acutis *C B P.* 397. *Sena* *J B. Tom.* 1. 377. *Sena Alexandrina* *Park. Th.*

*Sena Italica* *Park. Th.* *Sena Italica* foliis obtusis *C B P. ibid.* *Sena Florentina* foliis per extremum penè cordatis *J B. ibid.*

• *Sena spuria Maderaspatana*, caule ad foliorum alas, geminatis & subrotundis appendiculis auriculato. *Phytogr. Tab.* 314. fig. 4.

*Sena spuria humilis Americana* foliis *Herbæ mimosæ*, siliquis erectis. *Phytogr. Tab.* 223. fig. 3. Huc fortè spectat *Tlacoxiloxochitl* flore barbato *Hernand.* apud *Recc.* 104.

• *Sena spuria Virginiana* *Mimosæ* foliis; floribus parvis nictitantibus. *Phytogr. Tab.* 314. fig. 5.

*Sena spuria Occidentalis* *Mimosæ* foliis siliquâ singulari, seminibus spadiceis quadrangulis *P B P.* 375. *Chamæcrista Pavonis Americana* *Mimosæ* foliis latioribus major, flore aureo amplo. *Breyn. Prodr.* 2. 29. An *Herba Mimosa spuria* seminibus quadratis *Raii Hist. Pl.* 983.

*Sena Occidentalis* siliquâ multiplici, folio *Herbæ Mimosæ* *H. Leyd.* 558. *Chamæcrista parvonis Americana* *Mimosæ* foliis latioribus minor, flore luteo parvo. *Breyn. Prodr.* 2. 29. *Chamæcrista pavonis Americ.* siliquâ multiplici ejusd. *Breyn. Cent.* 1. 66.

Eadem siliquâ singulari *H. Leyd. ibid.* *Chamæcrista pavonis Brasiliiana*, siliquâ singulari *Breyn. Cent.* 1.

Eadem foliis angustioribus, flore luteo amplo. *Chamæcrista pavonis Indica* *Mimosæ* foliis angustioribus, flore luteo amplo *Breyn. Prodr.* 2. 30.

*Sena exigua Maderaspatana*, s. *Tetraphylla* siliquis glabra, florum pediculis ad foliorum exortum prodeuntibus *Phytogr. Tab.* 60. fig. 1, An *Absus Vesling. Observ. in Alpin.* 36. *Senna Orientalis Tetraphylla* *Absus* dicta *H. Leyd.* 558. *Absus* foliis *Trifolii* *J B. Tom.* 2. 361. *Loto* affinis *Ægyptiaca* *C B P.* 332. *Absus* s. *Lotus Ægyptiaca* *Park. Th.* Semen atro colore splendidum, parvis includitur siliquis, *Cicerum æmulis*; ut ex *Icone* videsis.

*Sena Tetraphylla* s. *Absi* congener hirsuta *Maderaspatensis*, flore flavo, siliquis punctatis scabris, folliculos sub terram condens. *Phyt. Tab.* 60. fig. 2. *Arachidna Indiæ* utriusque *tetraphylla* *P B P.* 314. *Arachus* ἄραχος. *Park. Th.* Fructus *Peruvianus* *Amygdaloides* sub terrâ nascens *Monard. Hist. Simpl. cap.* 60. Fructus *Manobi* *Lerio* dictus *J B. Tom.* 1. lib. 3. c. 31. Fortè *Mani Nieremberg. H. exot.* l. 14. c. 103. *Maragnanæ* *Incolis Mandovi* dicitur de *Laet Ind. Occid.* l. 16. c. 11. *Mandubi* & *Mandobi Brasiliens.* *Pison.* 256. *Pepingos Lusitanis.* An *Terfez Afrorum* vulgò



vulgò & Medicorum Kamha Ogilv. *Afric. fol.* 22.

Sena spuria *Orientalis* fætida glabra, foliis monetam *Japonicam* Kupang dictam referentibus, major *P B P.* 375. *Chamæcrisæ* pavonis affinis *Indica* *Cassia* folio, filiquis compressis latissimis propendentibus, floribus amplissimis, in summo ramorum spicatis. *Wellia-Tagera H. Malab. part.* 6. *Tab.* 9. & 10.

Eadem minor fætidissima *P B P.* 375.

Sena spuria *Occidentalis* Mimoæ foliis filiquâ singulari maximâ *P B P.* 374. *Chamæcassia Americana*, filiquâ maximâ maculatâ. *Breyn. Prodr.* 2. 28.

Sena spuria *Occidentalis* latifolia fætida glabra. *Chamæcassia latifolia Americana* spinosa, fætida, glabra. *Breyn. Prodr.* 2. 29. *Sed male inscribitur spinosa.* *Rhamnus Myrtifolius* ex Insulâ *S<sup>ti</sup>. Christophori* *Cornut. de Pl. Canad.* 83. *Cassia sylvestris* Insularum des *Antilles H R P. Vallot.* 43. Hujus ramuli auriculis acutis spinarum æmulis hinc inde ad exortum racheos cauli adnascentibus, sunt ornati. *An Tosunda s. Casunda Indiana Zanon. Hist. Bot.* 201.

Sena spuria latifolia fætida hirsuta; *Chamæcassia latifolia Americana* fætida hirsuta *Breyn. ibid.*

Sena *Occidentalis* odore *Opii* viroso *Orobi Pannonici* foliis mucronatis glabra *H. Leyd.* 556. *Pajomirioba Brasiliens.* & *Herva do Bidscho Lusitanis Pison.* 185. *Orobus Brasiliensis* flore luteo *Pajomirioba Marcgravio Raii Hist.* 912.

Eadem hirsuta *H. Leyd.*

Sena spuria *Maderaspatana* foliis numerosis pinnularum conjugationibus, *Viciæ* alicujus in modum compositis, & ferrugineâ lanugine villosis. *Inter Delineationes nostras.*

Sena *Occidentalis* odore *Opii* minus viroso, foliis glabris obtusis *H. Leyd.* 557. *Pajomirioba* 2. *Pison. ibid.* *Orobus Brasiliensis* *Tareroqui* dictus, *Metapasto Lusitanis Marcgravio Raii Hist.* 912.

Sena *Orientalis* fruticosa *Sophera* dicta *H. Leyd. ibid.* *Galegæ* affinis *Sophera* dicta *C B P.* 352. *Sophera Alpino & Bello J B. Tom.* 1. 384. *Securidaca Ægyptiaca* *Vitiosa Park. Th.* *Ponnam-Tagera, s. Ponna-virem H. Malab. Part.* 2. *Fig.* 52. *Ecapatli altera Hernandez.* 376. *Hoxocoquamoclit Camerar. Hort. Med.* 75.

Sena spuria angustifolia *Indiarum.* An *Chamæcassia angustifolia Indica Breyn. Prodr.* 2. 29. *Tlalhoaxin Nov. Hispan. Terent.* apud *Recc.* 425.

Sena *Orientalis* hexaphylla, filiquis longis incurvis, *Tora Indorum* vulgò. Sena *Orientalis* hexaphylla, *Tala Zeylanensibus H. Leyd.* 557.

Sena spuria *Orientalis* tenuissimis filiquis tetraphylla. Sena spuria *Malabarica Raii Hist. Pl.* 1743 *Tagera Hort. Malab. Part.* 2. *fig.* 43. *Chamæcassia* affinis tetraphylla filiquis tenuissimis, semine tereti, apicibus obtusis, quasi abscissis, suâ longitudine secundum longitudinem filiquæ posito *Breyn. Prodr.* 2. 29.

Sena spuria *Virginiana* filiquis hirsutis rotundifolia *D. Banister.*

SENECIO *Atticus*, *Vulgari* similis, flore petalis ferè inconspicuis radiato. à *D. Wheeler* accepimus.

Senecio hirsutus viscidus odoratus major *J B. Tom.* 2. 1042. Senecio incanus pinguis. *C B P.* 231. Senecio *Jacobææ* folio *Moris. Præ lud.* 309.



*Senecio viscosus Æthiopicus* flore purpureo *Breyn. Cent. 1. 139.* è Chinâ nobis allata est.

*Senecio pusillus Maderaspatanus* foliis crenatis crassis & hirsutis *Phytogr. Tab. 60. fig. 3.*

- *Senecio Trixaginis* specie àc mollitiâ, cauliculis subrubicundis. *Plin. l. 25. cap. 13. Phytogr. Tab. 315. fig. 1.* Senecionis genus *Myconi Hist. Lugd. 577.* *Senecio* quædam foliis *Bellidis*, aut *Jacobææ Senecionis* folio *Raii Cat. Exterar. 272.* *Senecio* folio non laciniato utriusque *Bauhin. ejusd. Cat. Exter. 153. & 235.* In Græciâ invenit *D. Wheler*, & nobis communicavit.

*Senecio Æthiopicus* an potius *Jacobææ Senecionis* folio, flore pulchro purpureo. *Inter Delineationes nostras.* Anno elapso curâ *D. Doodii* in *Hort. Chelseiæ* ex femine natus.

- *Senecio parvus pennatis foliis Æthiopicus Phytogr. Tab. 314. fig. 6.* A laudato viro *D. Alexandro Brown* accepimus.

*Senecio Americanus* *Blattariæ* vel *Hieracii* folio *Sch. Bot. Phytogr. Tab. 112. fig. 1.*

*Senecio Americanus* maximus foliis *Dipsaci* lacinati *P B P. 374.* *Senecio Cichorei* folio *Virginianus*, flore sulphureo, odore *Pastinacæ Cat. Mss. Hort. Oxon.*

*Senecio Indiæ Orientalis* amplissimis *Lampsanæ* foliis. *Erigeron Zeylanicum Lampsanæ foliis Breyn. Cent. 1. 140. ubi exhibetur Icon satis curiosè depicta.*

- *Senecio Indiæ Orientalis*, *Ocymi* majoris folio profundè crenato *Phytogr. Tab. 315. fig. 2.*

*Senecio sætidus Africanus* perennis, foliis confertim nascentibus *D. Seyn. Phytogr. Tab. 223. fig. 4.*

*Erigeron frutescens Æthiopicum* foliis *Hyssopi Breyn. Prodr. 2. 43.*

*Conyza Africana* *Senecionis* flore, retusis foliis *Herman. H. Leyd. app. 661.* Hæc à *Conyzâ Melitensi retusis foliis Boccon. Pl. Sicul. 26. abludit tantum floribus, qui Bocconiana radiata sunt in nostrâ vero discoidei, nudi, non radiati, Senecionis facie, & modo in umbellam dispositi, cætera conveniunt, sunt verba Cl. Hermanni, ut supra.*

*Senecio* perennis latiori folio *Promont. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 223. fig. 5.* quo loco ad se missum, nobis communicavit *D. Doodius.*

**SERPENTARIA** repens floribus stamineis spicatis, *Bryoniæ* nigræ folio ampliore pingui, *Phytogr. Tab. 117. fig. 3, & 4.* Huic spectat *Xaxahoactli Nov. Hispan. Terent. apud Recc. 438. Quod fortè idem est cum Saururo* repente lanceolato ad nodos villosa *Plumier. Tab. 78. Hujus etiam congenere sunt Tiri-Itti-Canni H. Malab. Part. 7. Tab. 30. Saururus Botryites* major arborescens foliis Plantagineis *Plumier Tab. 75. Jaborandi species apud Pisonem 216. ut & Piper caudatum Tiliæ folio Americanum (i.e.) Aguaxima Brasiliensium, Lusitanis Malva d' Isco ejusd. Pison. 197. quod idem nobis esse videtur, Saururo* arborescenti foliis amplis, cordatis, non umbilicatis. *Caroli Plumier. Descript. Pl. L' Ameri' que Tab. 73.*

*Serpentaria repens Americana, Dictamni Cretici* villosis foliis, apicibus nonnihil sinuatis. An *Saururus repens*, folio orbiculari *Nummulariæ* facie. *Plumier, Tab. 69.*

**SERPYLLUM** vulgare *J B. Tom. 3. 269. Serpyllum vulgare minus C B P. 220. flore purpureo.*

Serpyllum



- Serpyllum minus flore albo, foliis dilutè virentibus.
- Serpyllum vulgare majus *C B P.* Itè Serpyllum sativum *ejusd. ibid.* Serpylli vulgaris secundum genus *J B.* Serpyllum vulgare flore amplo *Raii Synops. 78.* Thym. latifol. *Park. Th.*
- Serpyllum argenteum versicolor sativum elegans. Serpyll. minus folio ex albo & viridi vario *H. Leyd.*
- Serpyllum vulgare repens capitulis lanuginosis. *C B P.*
- Serpyllum angustifol. hirsutum; vel montanum repens hirsutum *C B P.* Serpyllum vulgare hirsutum *Rai Synops. 78.*
- Serpyllum villosum fruticosius floribus dilutè rubentibus *Raii Synops.* Serpyllum angusto lanuginosoque folio *J B. Tom. 2. 270.*
- Serpyllum hirsutum minus repens inodorum, ex *Hiberniâ D. Bonavert.*
- Serpyllum majus latifolium *C B P.* Serpyllum majus *Park. Th. 8.*
- Serpyllum foliis Citri odore *C B P.* Serpyllum Citrii odore *J B. Tom. 2. 270.* Serpyllum citratum *Park.*
- Serpyllum citratum majus Serotinum foliis magis orbiculatis. Serpyllum foliis odore Citri frutescens facie Mari Mastichini *Sch. Bot. 50.*
- Serpyllum folio Thymi *C B P.* Itè fortè Thymus foliis candidis & graveolentibus *ejusd. Pinac. 219.* Serpyllum Sylvestre Zygis *Clusio,* Thymo vulgatori rigidiori simile *J B. T. 3. 271.* Serpyllum Moschatum *Park. Th. 8.* Fortè etiam Serpyllum *Narbonense ejusd. Park. Th. 7.*
- SESAMUM veterum *C B P. 27.* Sempsem *Prosp. Alpin. de Pl. Ægypt.* Bidsjam-Poeteh (i. e.) Bidsjam album à colore seminis *Malaccensibus* dictum; Sc'hit-Elu *H. Malab. Part. 9. Tab. 54.*
- Sesamum alterum foliis trifidis *Oriente* semine obscuro. *Phytogr. Tab. 109. fig. 4.* An Car-Elu *H. Malab. Part. 9. Tab. 55.* Bidzjam-Hitem, s. Bidsjam nigrum *Malaccensibus.* Sesamum *Indicum* folio amplo serrato, flore majore, semine nigricante *Commelini Not. in loc.*
- Sesamum *Oriente* trifidum, flore niveo *Hort. Comptoniani.*
- SESELI *Æthiopicum* Salicis folio *C B P. 161.* Sefeli *Æthiopicum* fruticosum folio Peryclymeni *J B. Tom. 3. 197.* Sefeli *Æthiopicum* frutex *Park. Th.*
- Sefeli pratense nostras *Park. Th. 905.* Itè Sefeli pratense *Monspeliensium ejusd. ibid.* Sefeli pratense Silaus fortè *Plinii lib. 26. cap. 28. C B P. 162.* Silaum quibusd. flore luteolo *J B. Tom. 3. 170.* Item Saxifragia *Anglorum* foliis fœniculi latioribus, radice nigrâ flore candido similis Silao, *ejusd. J B. Tom. 3. 171.*
- Sefeli pratense foliis densius pilis pubescentibus *Phytogr. Tab. 60. fig. 4.*
- Sefeli *Pyrenaicum* Thapsiæ folio nosler *Raii Hist. app. 1868.* Sefeli *Pyrenaicum* Thapsiæ facie *D. Fagon. Sch. Bot. 161.*
- Sefeli petræum minus, s. Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, *Caucalis* falsò dicta. *Caucalis* Peucedani folio *C B P.* *Caucalis* folio Fœniculi *Park. Th. 921.* Saxifragiæ tenuifoliæ affinis, quibusdam *Caucalis* *J B. Tom. 3. lib. 27. 19.*
- Sefeli tenerifolium *Vilnagæ* instar, tenuiter dissectum: fortè etiam *Sisum* *Prosp. Alpin. exot. 319.* Sefeli *Massiliense* *Nuperorum* aliquatenus similis *Vilnagæ J B. Tom.*



- Tom. 3. 33.* An Libanotis, Rosmarinum herbaceum *Tabern. Icon. 107.* Fortè etiam Sefeli montanum angustifolium 3. *Clusii* folio Sefeli *Massiliensis Matthioli*, semine Angelicæ *J B. Tom. 3. 34.* Sefeli montanum Fœniculi folio *C B P. 162.* Sefeli procerius rigidiusculo folio Ferulæ latiore & crassiore. Sefeli *Massiliense* Ferulæ folio *C B P. 161.* Sefeli *Massiliense* Nuperorum *Lob. Icon. 785.* Sefeli *Massiolotium*, Siler montanum *Tabern. Icon. 164.* Sefeli *Massiliense* Fœniculi folio, quod *Dioscoridis* censetur. *C B P. 161. Park. Th. 903.* Sefeli *Massiliense* folio Fœniculi crassiore *Lob. Adv. & Icon. 785.* Fœniculus tortuosus *Dalechamp. Hist. Lugd. 749.* Cujus *Icon* huic meliùs respondet quàm *Lo-beliana.*
- Sefeli, àn? Selinum Fœniculaceis foliis rigidioribus glaucis. Daucus glauco folio similis Fœniculo tortuoso *J B. Tom. 3. 19.* An Peucedanum *Pannonicum Clusii*; ut ipsi *Joan. Bauhino* videtur, ubi *suprà*, & ad melius Inquirendum proponit *Celeberr. noster Rajus Hist. Pl. 460.*
- Sefeli *Massiliense* Fœniculo tortuoso simile *D. Sherard.* An Dauco glauco folio (fortè) similis, Libanotis *Septentrionalium*, flore candido, semine ferè Ammi *J B. Tom. 3. 17.*
- SIDERITIS** *Anglica* strumosa radice *Park. Th.* Stachys palustris fætida *C B P. 236.* Galeopsis angustifolia fætida *J B. Tom. 3. app. 854* Panax *Coloni* & Marubium aquaticum acutum *Ger.*
- Sideritis arvensis angustifolia rubra *C B P. 233.* Ladanum Segetum flore rubro quorundam *J B. Tom. 3. 855.*
- Sideritis vulgaris hirsuta *J B. T. 3. 425.* Sideritis vulgaris hirsuta erecta *C B P. 233.* Sideritis hirsuta vulgaris humilior *C B P. 233.* Sideritis secunda *Clusio*, capitato flore *J B. Tom. 3. 426.*
- Sideritis foliis hirsutis profundè crenatis *C B P. 213.* Sideritis *Monspeffulana* *J B. T. 3. 426.* Sideritis tomentosa Scordioides *H. Leyd. 560.*
- Sideritidis genus spinosis verticillis *J B. T. 3. 428.* Fortè etiam Sideritis folio rotundiore *ejusd. 427.* Sideritis 5<sup>a</sup> *Clusii Hist. 2. 40.* Siderit. procumbens non ramosa *Ger. emac.*
- Sideritis humilis lato obtuso folio *Gerard. emac.* Sideritis Hederulæ folio *Park. Th.* Sideritis Alfine Trixaginis folio *C B P. 233.* à præcedente diversa est.
- Sideritis erecta, Teucris pratenfis folio *Æthiopica, Phytogr. Tab. 315. fig. 3.* Sideritis glabra *Betonicæ* ferè folio *Raii Hist. Pl. 565.* Fortè Gallitrichum flore minimo albo *J B. Tom. 3. 313.* Horminum minus supinum *Creticum Clusio C B P. 239. Park. Th.*
- Sideritis *Heraclea Dioscoridis*, s. Sideritis marina, Salvifolia nostras *Donato Park. Th. app.* Itèm Sideritis querno folio *ejusd. & Hist. Lugd. 1121.* Sideritis prima *Dioscoridis* s. *Heraclea Fab. Column. ecphr. 128.* ubi *Iconem ex vivâ plantâ in sylvestribus ortâ, satis artificiose exprimi curavit.*
- Sideritis *Cretica* Salvifolia, flore aureo, calyce amplo, spinoso. An Verbasculum Salvifolium *Prosop. Alpin. exot. 109.* Inter collectaneas ingeniosissimi Viri *D. Joan. Woodward* Stachydis spinosæ *Creticæ* Inscriptione observavimus. An Stachys exotic. *Lychnidis coronariæ* foliis & effigie apud *Sherardinas.*



- Sideritis (fortè) An Stachys minor Salvifolia *Æthiopica* floribus patulis pubescentibus rubris *Phytogr. Tab. 311. fig. 5.*
- Sideritis arvensis latifolia glabra *C B P.* Sideritis glabra arvensis *J B. Tom. 3. 427.* Vulgari tùm figurâ tùm hirsutie (ut dicit *Rajus* noster) quamplurimum accedit, ideòque miratus est, Cur omnibus qui de eâ scripsèrunt Botanicis, glabra dicta sit; Celeberr. autem Breynius huic Sideritidi glabritiem (in *Prodr. 2.*) Botanicorum sententiæ (contra *Cl. Rajum*) assentiens, restituere conatus est; ubi asserit Eam rectè dici glabram esse, atque à Doctiss. Rajo cum Sideritide quâdam hirsutâ malè confundi.
- Sideritis foliis oblongis glabris *C B. prodr. 111.* Siderit. glabra oblongo splendente folio ejusd. *Pinac. 233. Park. Th.*
- Sideritis Alpina Hyssopi folia *C B P. 233.* Sideritis montana Hyssopi folia *Park. Th.* Sideritis *Kalerandi Dourez.* brevi spicâ *J B. Tom. 3. 427.*
- Sideritis Hyssopi folia, seu folio angustissimo, caule rubro *Raii Cat. Exterar. 237.*
- Sideritis *Cretica* viscosa odore Bituminis *Zanon. Hist. Bot. 186.* Sideritis glutinosa Bitumen redolens *Moris. Prælod. Bot.*
- Sideritis *Æthiopica* major & ramosior, ramis Lycii more in aculeos rigidiores desinentibus. *Phytogr. Tab. 315. fig. 5.*
- Sideritis spinosa *J B. Tom. 3. 428.* Stachys spinosa *Clusii Hist. 2. 259. Park. Th. 47.* Stachys spinosa *Cretica C B P. 236.* Gaidaro-Thymum *Creticum Belli Ponæ Ital. Prosp. Alpin. exot. 86.* A penultimâ est planè diversa ut rectè notat *Cl. Breynius. Prodr. 2. 91.*
- Sideritis *Canariensis* Mocanes dicta, folio subtus incano, margine spinulis asperato, calyculis tomentosis. *Phytogr. Tab. 315. fig. 4.*
- Sideritidis facie, Thlaspeôs siliculis, binis feminibus *Æschynomenes* in modum arcû circulari utrinque adumbratis, septo membranaceo intergerino dispertitis, è *Maderaspatân Phytogr. Tab. 224. fig. 1.* An *Chamærops Plinii lib. 26. cap. 7. Hist. Lugd. 1339. J B. Tom. 3. 423.*
- SIDEROXYLUM *Africanum*, s. Lignum ferreâ duritie, folio oblongo; Lignum ferreum vulgò *P B P.* in *H. Reg. Hampt.* colitur, atque pictura exhibetur in *Phytogr. Tab. 223. fig. 6.*
- Sideroxylum *Americanum* s. Lignum duritie ferrum æmulans, *Iron Wood Barbadosibus* dictum *Ligonis 74. Phytogr. Tab. 224. fig. 2.* Fortè *Ibera Putterana Brasiliensium Marcgr. 120.* Sideroxylum *Charibæarum mucronatis foliis Ogilveii Americ. 371.*
- Sideroxylum seu Lignum ferreâ duritie *Americanum*, folio subrotundo *P B P. vid. Uvifera arbor Occidentalis folio rotundo, Obe vulgo, ejusd.*
- SILER montanum majus. *Moris. Umb. 7, & 8.* Ligusticum quod *Seseli Officinorum C B P. 162.* *Seseli* s. Siler montanum vulgare *J B. Tom. 3. 168.*
- Siler montanum minus *Moris. ibid.* Ligusticum s. Siler montanum angustifolium *C B P. 162. J B. Tom. 3. 170.*
- Siler *Aquilegiæ* foliis *Moris. ibid.* *Libanotis latifolia Aquilegiæ foliis C B P. 157.* *Libanotis latifolia Aquileg. folio Grisleei Virid. Lust. Ligusticum Rauwolfii foliis*



liis Aquilegiæ *J.B. Tom.3. lib. 27. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 223. fig. 7.*

**SIMPLA-NOBLA** *Canariensium*, Planta oblongis, amplioribus splendentibus foliis ternis circa caulem ambientibus, venosis.

**SINAPI** arvenſe præcox ſemine nigro *Moriſ. Hiſt. 2. 216. Rapiſtrum flore luteo C B P. 95.*

Sinapi ſiliquâ hirsutâ, ſemine albo, vel ruſſo. *J.B. Tom.2. 858. Sinapi Apii folio, s. album C B P. 99. Aſt folia Apii non habet hoc genus, ſed Rapi ut recte notavit Cl. Rajus Hiſt. Pl. 802. Ergo quærendum innet, Annon ſit etiam Sinapi Rapi folio ejusd.*

Sinapi album ex *Indiâ Orientali. An Sinapi Indicum C B P. 99. Sinapi Indicum maximum, Lactucæ folio. Sch. Botan. 81.*

Sinapi ſiliquâ latiuſculâ glabrâ, ſemine ruſſo, s. vulgare *J.B. Tom.2. 855. Sinapi fativum 2<sup>m</sup>. Gerard. emac.*

Sinapi Eryſimo *Tragi* cognatum s. ſimile, *J.B. Tom.2. 857. Sinapi Erucae folio C B P. Eruca latifolia caule aſpero D. Bobart. à quo habuimus. An Eruca ſylveſtris minor lutea caule aſpero H R P. 67. Eruca ſylveſtr. major lutea caule aſpero C B P. 98.*

**SISARUM** *Germanorum C B P. 155. Siſer vulgare Park. Th. Siſarum multis J.B. Tom. 3. 153.*

**SISON** vulgare, s. *Amomum Germanicum Park. Th. Siſon quod Amomum Officinis noſtris C B P. Siſon s. Officinarum Amomum J.B. Tom. 3. 107. Petroſelinum Macedonicum Fuchſii Gerard.*

Siſon alterum, vel Amomo congener Siſi foliis noſtras. *Selinum ſegetale Park. Th. Selinum Siſi foliis Ger. emac. Honewort noſtratibus dictum.*

**SISYNRYCHIUM** ex phœniceo ſuaverubente flore, *Æthiopicum Breyn. Cent. 1. 83.*

*Sifynrichium ramoſum Æthiopicum foliis plicatis, nervoſis & incanis, radice tuberoſâ phœniceâ Breyn. Cent. 1. 85.*

• *Sifynrichium Æthiopicum parvum non ramoſum, plicatis & nervoſis foliis, glabrum Phytogr. Tab. 315. fig. 7. An Sifynrichium Æthiopicum pumilum ſpicatum P B P. 377.*

• *Sifynrichium flore aureo pulchro Æthiopicum Phytogr. Tab. 315. fig. 6. Utrumque accepimus munere D. Alexand. Brown. An? Sifynrichium Æthiopicum flore luteo Breyn. Prodr. 2. 92.*

*Sifynrichium Africanum, flore amplo aurantiaco; Phytogr. Tab. 224. fig. 4. Fortè Sifynrichium flore aureo Æthiopicum P B P. 376.*

*Sifynrichium Africanum, flore pentapetalo obſoleti coloris. Phytogr. Tab. 224. fig. 5. Fortè Sifynrichium Æthiopicum, flore pentapetalo obſoleto P B P. ibid.*

*Sifynrichium Zeylanicum, flore cæruleo parvo, gramineis foliis. Phytogr. Tab. 224. fig. 6. Ex Inſulis Fortunatis hoc genus ſub Croci vernalis titulo nos etiam habuimus & inibi dicitur Raphan.*

*Sifynrichium minus polyanthemum, flore parvoluteo, radiis aurantiis s. pliceniceo-aureis*



aureis elegantissimè striato *Cap. Bon. Spei. Breyn. Phytogr. Tab. 225. fig. 2.* Haec lepidissimam plantulam in Hortulo D. Doodii diù florentem, summâ cum voluptate conspeximus. An *Sisynrichium* flore parvo flavescente. *P B P. 377.* Item *Sisynrichium Æthiopicum* floribus parvis flavescentibus *ejusd. 376.*

*Sisynrichium Africanum* tricolor, caule nodoso, angustifolium, ex *Codice Compton Phytogr. Tab. 224. fig. 7.*

• *Sisynrichium Africanum* trianthophoron ex *Codice Comptoniano Phytogr. Tab. 255. fig. 1.*

*Sisynrichium Viperatum Capitis Bonæ Spei. ex Cod. Compton Phytogr. Tab. 224. fig. 8.*

*Sisynrichium Bermudense* floribus parvis, ex cæruleo & aureo mixtis; *Iris Phalangides Quorundam Phytogr. Tab. 61. fig. 2.*

*Sisynrichium cæruleum* parvum, gladiato caule *Virginianum. Phytogr. Tab. 61. fig. 1.*

*Gladiolus cæruleus* hexapetalos, caule etiam gladiato. *Banister. Cat. Stirp. Virgin.*

**SIUM** majus latifolium *Ger. emac. Sium maximum latifolium J B. Tom. 3. 172.*

*Sium Dioscoridis* s. *Pastinaca aquatica major Park. Th.*

*Sium minus* alterum *Park. Th. Sium umbelliferum J B. Tom. 3. 172. Sium majus angustifolium, Ger. Sium erectum umbellatum, s. Pastinaca aquatica Lobelii.*

*Sium umbellatum repens Ger. emac. Sium repens & procumbens ad alas floridum, seu umbellis candidis ad genicula dispositis Moris. Prælund. & Umb. 63. Apium palustre minus, cauliculis procumbentibus ad alas floridum, H. Leyd. 50.*

*Sium minimum umbellatum, foliis variis Phytogr. Tab. 61. fig. 3. Sium minimum ferulaceis foliis Moris. Prælund. 193. Sium minimum Raii Hist. Pl. 444.*

*Sium alterum Olusatris facie Lob. Ger. emac. Sium majus alterum angustifolium Park. Th. Sium aquaticum rugosis foliis multifidis & dentatis Moris. Umbel. 12*

*Cicuta aquatica Gesneri J B. Tom. 3. lib. 27. 175. Cicuta aquatica Joh. Jac. Wepferi. Aquo hujus Historia & Noxæ, integro Commentario illustrantur. Angelica aquatica angustifolia Pyrænica foliis Canabinæ Creticæ Sch. Bot. 168. ex sententiâ D. Sherard, nihil aliud est quàm hoc ipsissimum Sium.*

**SMILAX** aspera fructu rubente *C B P. 296. Smilax aspera J B. Tom. 2. 115.*

*Smilax viticulis aspera, foliis longis angustis, mucronatis lævibus, auriculis ad basim rotundioribus. Phytogr. Tab. 110. fig. 3.*

*Smilax Caroliniana, stipite quadrato leni, foliis angustis asperis, auriculis ad basim angulosis Phytogr. Tab. 111. fig. 3.*

*Smilax aspera Bermudensis* grandioribus foliis cordiformibus, radice furculosâ *Phytogr. Tab. 110. fig. 6. Forte Quauhmeapatli s. Zarzæ species cujus radicem Hispani jam transferre solebant, ut a Francisco Ximene narrat Marcgravius fol. 12.*

• *Quauhmeapatli altera, Zarza 4<sup>a</sup> Hernand. 290. Fortè etiam Smilax aspera Zaccynthi Alpino J B. ubi supra An? Smilax aspera rotundifolia, baccis nigris Virginiana D. Banister.*

*Smilax foliis latis, in margine spinosis Caroliniana, stipite leni quadrato, Phytogr. Tab. 111. fig. 1. Hanc generosiss. Vir Dominus Courtene nobis benignissimè concessit.*

*Smilax viticulis asperis Virginiana folio hederacco leni, Zarza nobilissima nobis, Phytogr.*



- Phytogr. Tab. III. fig. 2.* Mecapatli, s. Zarza parilla *Francisc. Hernand. 288.*  
 An *Smilax aspera*, minus spinosa, fructu nigro *C B P. 296. J B. Tom. 2. 116.*  
 In *Horto exoticarum Plantarum instructissimo D. Fosteri invenimus.*
- Smilax claviculata* *Hederæ folia tota levis è Terrâ Marianâ. Phytog. Tab. 225. fig. 3.*  
 Huc fortè spectat *Iztacpatli-Quizefepin Nov. Hispan. Terent. apud Recc. 381.*
- Smilax viticulis asperis Virginiana foliis angustis lævibus, nullis auriculis prædita.*  
*Phytogr. Tab. 110. fig. 4.* Huic est radix geniculata crassa & intorta, indè suspicamur *Chinæ Mexicanæ* speciem esse, & fortè *Olcacatzan Hernandez. 212.*  
 An *Ivapecanga altera Pisonis 259.* saltèm quoad *Iconem.* Fortè etiàm *Radix Chinæ Acostæ Hist. Lugd. append. 10.* An? *Smilax aspera Laurifolia baccis nigris Virginiana D. Banister.*
- Smilax Virginiana* spinis innocuis armata, latis *Canellæ foliis*, radice arundinaceâ crassâ & carnosâ. *Phytogr. Tab. 110. fig. 5.* Fortè *China spuria nodosa, C B P. 297.* *Pseudo-China radix ex Virginia Clus. exot. China Michuacanenfibz Phacodicta Hernand. 213.* *Pocayo Nov. Hispan. Terent. apud Recc. 398.* *Ivapecanga s. Jupicanga Brasiliensibus Pison. 257.* An? *Kari-vilandi H. Malab. Part 7. Tab. 31.* *Pock-hout Belgis Orientalibus ut ibidè habetur. Apud nostrates Virginiam habitantes, ex hujus stipitibus parantur Scipiones, ut nobis affirmârit Amplissimus & Senatoriâ dignitate perhonorandus Vir D. Byrd.* Utraque, viz. Hæc simul & proximè præcedens *Ivapecangarum species*, fructum acinosum ac racematim dependentem, in summis caulibus copiosè proferunt; Fortè *Smilax non spinosa, baccis coccineis Virginiana D. Banister.*

**SOLANUM** *Indicum* vulgari simile, floribus albis parvis. Fortè *Aguara Quiya Brasiliensibus Erva di Bicho s. Erva Moura vel Piementa de Gallinha Marcg. & Pisonis 222.*

*Solanum lanuginosum hortensi, s. vulgari simile, baccis aureis, D. Morgano Raii Hist. Pl. 672* *Nelen-Tsjunda H. Malab. Part 10. Tab. 73.* *Spontaneum in Angliâ nostrâ interdum offendimus.*

*Solanum lignosum s. Dulc-amara Park. Th. Solanum scandens s. Dulc-amara C B P. 167.* *Glycypicros s. Amara dulcis J B. Tom. 2. 109.* *variat flore candido, nec non foliis ex albo variegatis.*

*Solanum lignosum s. scandens rotundifolium Indicum, fructu duriore racemosa. Natsjatam H. Malabarici Part. 7. Tab. 1.* *Frutex Malabaricus pentapetaloides scandens fructu racemoso, qui Coccus Indi, & Coculæ Officinarum dicitur. Solani furiosi fructus Cordi in Dioscoridem.*

• *Solani lignosi s. Dulc-amaræ alatis foliis, non auritis Frutex Indicus per summos ramos floridus, Phytogr. Tab. 317. fig. 1. nondum edit. An Pee-ula H. Malab. Part. 7. Tab. 23.*

*Solanum bacciferum Americanum fructu corymbozo, ex Insula Jamaicensi Phytogr. Tab. 226. fig. 7.*

*Solanum fruticosum bacciferum C B P. 166.* *Solanum fruticosum Americanum dictum Amomum Plinii Park. Th. Strychnodendros J B. Tom. 3. 614.*

*Solanum Americanum Strychnodendro accedens, fructu medio (antè maturitatem) quasi fisso Phytogr. Tab. 111. fig. 4.* An *Solanum frutesc. Brasilianum folio Capfici*



- fici baccis rubris *P B P.* 377. *Capficum* arborefc. *Africanum* vulgari fimile, foliis atrovirentibus, & aliquomodo contortis *H. Beaum.* 12. *Solanum Capficum* arborefc. dictum, *Americanum* nigrum foliis obfcuriùs virentibus, lævioribusque & magis obtufis, s. Sefeli *Æthiopici* frutescentis *Breyn. Prodr.* 2.
- Solanum* arborefcens è *Vera cruce* latifolium. Fortè Modera-Canni *H. Malab. Part. 2. Fig.* 19.
- Solanum Indicum* Laurinis anguftioribus foliis maximum *H R H. Phytogr. Tab.* 227. *Fig. 2.* An *Solanum* bacciferum vulgari fimile maximum *Sirinamenfe P B P.* 377.
- Solanum* spiniferum frutescens, spinis igneis *Americanum Phytogr. Tab.* 225. *fig. 5.* Cui folia *Biftortæ* sunt anguftiora. Huic proximè accedit *Enguamba Mechoacanenfibus Hernandez.* apud *Reccum fol.* 97.
- Solanum Americanum* perenne fubincanum, fructu pyriformi longiore, spinis plurimis armatum. *Phytogr. Tab.* 225. *fig. 6.* Huitz Tomatzin *Mexicenfibus* s. Tomal spinofa *Hernandez* apud *Reccum* 108. huic nostro Solano accedere nobis videtur. Fortè etiam *Coahuilxochitl Nov. Hispaniæ Terent. apud eundem fol.* 371.
- Solanum Barbadense* spinofum annuum fructu aureo rotundiore, Pyri parvi inverfi formâ, & magnitudine. *Phytogr. Tab.* 226. *fig. 1.* An Cucurbitacei generis Fructus peregrinus à *Francisco Peninio* miffus. *Cluf. exot.* Fructus *Indicus* pyriformis, granis intùs nigris, Cucurbitini generis *J B.* Huc fortè etiam fpectat *Tlalamatl Nov. Hispaniæ Terentii* apud *Recc. fol.* 420.
- Solanum* pomiferum fructu oblongo *C B P.* 167. *Solanum* pomiferum fructu rotundo *J B. Tom.* 3. 618. ubi tamèn mendum *Typographicum* fubefse fufpicatur *Cl. Rajus* & fructu oblongo fcribendum, perindè ac ejus pictura demonftrat. *Solanum* pomiferum fructu oblongo tereti. *Sch. Bot.* 142. Mala infana *Syriaca Park. Tb.* *Melongena* vulgò.
- Solanum* pomiferum fructu incurvo *C B P. Phytogr. Tab.* 226. *fig. 2.* Curbi-solanum *Princip. Frid. Cæfi* in *Tab. Phytoscop.* apud *Hernandez.* 935. Quod à præcedenti, fpecie non differt; Illius tantùm eſt Varietas. *Nila-barudena Malabarorum H. Malab. Part. 10. Tab.* 74. *Potlition* Hortulanis noſtratibus dictum
- Solanum* pomiferum, magno fructu ex albo & atropurpureo nitente, folio & calyce. spinofis. *Phytogr. Tab.* 226. *fig. 3.* *Solanum* pomiferum fructu nigro spinofum *C B P.* Solani fpecies *Fockii Fockii Javanenfibus* dicta *Bontii* 123. *Fokka-foka Ogytv. Cbin. Tom.* 2. Item *Oabi Chinenfium ejusd. Chin. fol.* 62. *Solanum* pomiferum fructu spinofa *J B. Tom.* 3. 619. *Melanzana nigra Rauwolfi Hiſt. Lugd. App. Brownjolly* noſtratibus vulgò.
- Solanum* spinofum fructu rotundo *C B P.* 167. Pomum de *Hiericho* *Melougenis* congener *J B. Tom.* 3. 619. *Solanum* pomiferum *Indicum* spinofum *Borraginis* flore, fructu croceo *H. Leyd.* 573. *Belingela Luſitanis, Tongu Angolenſibus, Macumba Congenſibus, Marcgr.* 24. *Schunda H. Malab. Part. 2. fig.* 37. Variat fæpenumerò spinis violaceis, ex albo virentibus, & aureis; Undè forſàn.
- Solanum* pomiferum *Portoricenſe* spinofum, foliis integris, aureis spinis armatum *P B P.* 378. Item *Solanum Indicum, Boraginis* flore, folio molli lanuginoſo, longis aculeis flaveſcentibus armato; *Sch. Bot.* 173.
- Solanum Zeylanicum* spinofum, folio amplo incano, ad pediculum ſtrictiori. *Phytogr. Tab.*



- Tab. 226. fig. 6.* Fortè *Solanum spinosum pomiferum Indicum* album s. foliis *Hyosciami albi* majoris *Breyn. Prodr. 1.*
- Solanum spinosum* maximè tomentosum *Boccon. de Pl. Sicul. 8.* Fortè *Anachunda H. Malab. Part. 2. fig. 35.*
- Solanum incanum Chinense*, minùs spinosum, floribus parvis ferè umbellatis. *Phytogr. Tab. 62. fig. 1.* à D. Petever. accepi. An *Zambal Frutex Indianus. 2. Balinggella de matto dictus Zanon. fol. 208. fig. 80.*
- Solanum Æthiopicum* maximè tomentosum, caule solummodo, non foliis aculeatum *Phytogr. Tab. 316. fig. 2.*
- *Solanum* maximè tomentosum, spinis carens *Virginianum Phytogr. Tab. 316. fig. 1.*
- *Solanum tomentosum Canariense* spinosum, fructu *Ceraforum* formâ & magnitudine. *Phytogr. Tab. 316. fig. 3.* *Hujus fructus sunt saturatè Laccæ coloris ex quibus fucum conficiunt Insulanæ Mulieres, quo faciem oblinunt, & ex pallidâ, rubicundam efficiunt, ut hoc modo Amasiis suis formosiores reddantur.* *Bella Donna Canarina* spinis armata; *Permenton* Insulanis vocatur. An *Planta spinosa incognita Bontii lib. 6. fol. 106.*
- *Solanum spinosum* profundè laciniatis foliis subtùs lanuginosis *Maderaspatanum Phytogr. Tab. 316. fig. 4.* An *Scheru-Schunda H. Malab. Part. 2. fig. 36.* *Juripeba læmina Pisonis 181.* *Solanum Indicum spinosum* fructu minimo miniato glabro *Raii Hist. Append. 1876.*
- *Solanum spinosum Jamaicense* glabrum, foliis parvis minùs profundè laciniatis. *Phytogr. Tab. 316. fig. 5.* An *Juripeba mas Pisonis ibidem.*
- Solanum pomiferum frutescens Africanum*, spinosum nigricans, foliis profundè laciniatis *H. Leyd. Phytogr. Tab. 226. fig. 5.* *Solanum spinosum arborescens Cap. Bon Spei Breyn. Fascic. 25.* An *Zambal frutex Indianus 1<sup>us</sup>. Zanon. Hist. Bot. 208. fig. 25.* Est *Planta perennis.*
- Solanum annuum nigricans Virginianum* spinosissimum, latè se spargens, flore cæruleo, glabrum. *Phytogr. Tab. 62. fig. 3.* *Planta spinosissima Virginiana Borriginis flore Tradescantio Raii Hist. Pl. 674. & in append. 1876.* Itèm *Solanum pomiferum frutescens Africanum*, spinosum nigricans, *Borriginis* flore, foliis minùs profundè laciniatis, spinis multò longioribus, majoribus, & crebrioribus horridum ejusd. *Raii Hist. Pl. 1799.* An *Solanum Americanum laciniatum spinosissimum P B P. 378.*
- Solanum Indicum spinosum atrovirens* & undique glabrum, foliis *Brancæ Ursinæ* divisuris. *Phytogr. Tab. 62. fig. 2.* An *Solanum pomiferum spinosum Indicum* fructu echinato foliis *Cardui*, s. *Acanthi spinosi Breyn. Prodr. 1.* In Horto quodam *Hollandiæ* celebriori collegit D. *London* & nobis transmisit. An non fortè sit *Yllamatlanti, Novæ Hispaniæ Terenti* apud *Recc. 443.*
- Solanum pomiferum* fructu rotundo striato duro, *C B P. Phytogr. Tab. 226. fig. 4.* *Mala Æthiopica Dodon.* *Solanum Æthiopicum pomiferum spinosum*, fructu sulcato rubro *P B P. 378.*
- Solanum pomiferum*, fructu rotundo striato molli aureo *C B P.* *Mala aurea* odore fætido quibusdam *Lycopersicon J B. Tom. 3. 621.* *Pomum amoris* majus fructu rubro *Park. paradis. Xitomama Nov. Hispaniæ Hernand. Hist. Mexic. 295.*
- Solanum pomiferum*, fructu rotundo, parvo molli *Morif. H Bles. 195.* *Solanum racemosum*



- racemosum Ceraforum formâ *C B P.* 167. Cerasa amoris racemosa rubra *ejusd.* in *Prodr.* 90. *Miltomamæ Novi Orbis Hernandez. ibid.*
- Solanum tuberosum esculentum C B P. ibid.* *Papas Americanum J B. Tom. 3. 621.* *Battata Virginiana Park. Th.* *Arachidna Theophrasti* fortè *Papas Peruanorum Clus. Hist. 2. 79.* Hujus radices in *Virginia* *Openauk* nuncupantur.
- Solanum quadrifolium bacciferum C B P.* 167. *Herba Paris J B. Tom. 3. 613.*
- Solanum Virginianum* tryphyllon, tripetalo flore atropurpureo, in foliorum sinu absque pediculo sessili. *Phytogr. Tab. 111. fig. 6.* Hujus florem (inquit *D. Banister*) nobis videtur sex foliis constare, quorum tria subjecta tota viridia sunt, & brevia, tria vero superiora, longiora atropurpureascent, quemadmodum in *Solano triphylllo Canadensi Cornuto* 166. Cujus nostra est varietas, aut fortè species diversa: Ab hac enim, Flore sessili, posito in Foliorum centro, sine pediculi sulcro; maximè differt *Planta Banisteriana.*
- Solanum Halicacabum vulgare J B. Tom. 3. 609.* *Solanum Vesicarium C B P.* *Solanum Halicacabum s. Alkekengi vulgare Park. Th.*
- Solanum Vesicarium Indicum* foliis splendentibus glabris. *Solanum, s. Halicacabum Indicum J B. Tom. 3. 609.* *Solanum vesicarium Indicum C B P.* 166.
- Solanum Vesicarium Americanum* caule quadrangulo, foliis *Stramonix H. Leyd.* 569. *Camarú Brasiliensium Pisonis* 223. *Tomatl, s. Planta acinosa Hernandez.* 295. *Inota Inodien H. Malab. Part. 10. Tab. 70.* *Solan. Virginian. vesicar. fructu luteo H R B.* 194.
- Solanum Vesicarium Mexicanum* molle & incanum. *Coztomatl, s. Solanum visicarium pallens Hernandez.* 203.
- Solanum Vesicarium Mexicanum* folio (uno latere) sinuoso, molle & incanum. *Coyotomatl, s. Tomatl-Coyoti, Vesicaria Mexican. Hernand.* 204.
- Solanum Vesicarium Indicum* minimum *H. Leyd.* 569. *Halicacabum s. Alkekengi Arabibus dictum Bontii* 149. *An Pee-Inota-Inodien H. Malab. Part. 10. fig. 71.*
- Solanum Curassavicum Vesicarium Solano Antiquorum* simile, foliis *Origani subincanis P B P. Phytogr. Tab. 111. fig. 5.* Fortè *Solanum Vesicarium Surinamense* lanuginosum *polycarpon Breyn. Prodr. 2. 92.*
- Solanum Verticillatum J B Tom. 3. 610.* *Solanum somniferum verticillatum C B P.* 167. *Solanum somniferum Park. Th.* 345. *Alkekengi Mexicanum Terent. ad Hernandez.* 296. *Solanum verticillatum angustiore folio, flore ochroleuco Banisteri Cat. Stirp. Virgin. apud Rajum in Hist. Pl. app. Peevetti H. Malab. Part. 4. Tab. 55.*
- Solanum verticillatum Virginienſe* latifolium molle, floribus obsoletè rubris, baccis luteis. *Banisteri Cat. Stirp. Virgin.* *Solanum somniferum Antiquorum Pr. Alpin. exot.* 71. *Solanum somniferum Antiquorum verum Park. Th.* 374.
- Solanum vesicarium scandens, Alsines majoris folio & facie. Alsine scandens baccifera C B P.* 250. *Alsine repens baccifera Park. Th.* *Cacubalum quibusd. vel Alsine baccifera J B. Raii Hist.* 682. *Cucubalus Plinii Hist. Lugd.* 1429.
- Solanum Furiosum* luridè purpureo flore calathoides, *Melanocerasos. Solanum μελανοκέρας C B P.* 166. *Solanum maniacum multis, s. Bella Donna J B. Tom. 3. 611.*



Solani folia *Malabarica* flore monopetalo flavo, diluto colore, fructu quadrangulato tribuloide. *Cacamullu* *H. Malab. Tab. 10. fig. 72.*

*Solanum racemosum Americanum Raii Phytogr. Tab. 225. fig. 4.* *Solanum racemosum tinctorium American.* foliis & seminibus *Amaranthi* *H. Leyd. 574.* *Solanum magnum Virginianum rubrum* *Park. Th. Forté Cuechiliz Tomatl Mexicanisibus Hernandez. 374.* *Pocan Virginienfisibus* ex monitu *Cl. D<sup>ris</sup>. Lister & nostratibus Poike-Physique* nuncupatur. *Blitum maxim.* caule rubente *Virginianum*, s. *Amaranthus Americanus baccifer Florentii Schuyl. H. Leyd. edit. 1672. pag. 16.*

*Solanum Barbadesse*, racemosum minus, tinctorium, *Circææ* foliis mollibus & incanis, *Phytogr. Tab. 112. fig. 2.* *Heliotropium Curassavicum Scammonii* foliis mollibus subhirsutis, *PBP. 340.* Item *Amaranthi* semine & facie *Americana* foliis *Circææ ejusd. PBP. 310.* *Heliotropium American.* majus, foliis *Populi* nigræ lanuginosis, flore albo minimo *Breyn. Prodr. 2. 55.* Item *Monophyllum Americanum* *Circææ* foliis & facie, flore albo parvo *ejusd. Breyn. Prodr. 2. 74.* An fortè *Chachalacometl Novæ Hisp. Terentii* apud *Recc. 361.*

**SOLANUM** mordens, fructu propendente oblongo crasso & obtuso. *Piper Indicum* vulgatissimum *CBP. 132.* *Vallia-capo-Molago* *H. Malab. Part. 9. Tab. 35.* *Chilli Mexicanis Hernand. 134.* *Quiya Brasiliensium Pison. 225.* *Piper Indicum* s. *Calecuticum* s. *Piper siliquastrum* *J B. Tom. 2. 943.* *Hujus siliquæ Hispaniolæ Incolis Axi nuncupantur.*

*Solanum* mordens fructu oblongo pendulo minore. *Capo-Malago* *H. Malab. Part. 2. fig. 56.*

*Solanum* mordens fructu propendente longo striato aureo.

*Solanum* mordens, fructibus oblongis luteis tetragonis, ad terram reclinatis. An *Piper Indicum* longum ventre tumido siliquâ per summum tetragonâ *HRP. 142.*

*Solanum* mordens, propendentibus siliquis, oblongis recurvis. *Capficum oblongum* majus, recurvis siliquis *Park. Th. 358.* *Piper Calecuticum* s. *Capficum oblongius* *J B. Tom. 2. siliquis rubris, variat etiam siliquis aureis.*

*Solanum* mordens oblongum minus, pendentibus recurvis siliquis puniceis. *Piper longum minus* siliquis recurvis *Fr. Gregorii* apud *Clusium Car. posterior. Tab. 3.*

*Solanum* mordens, fructu dependente subrotundo crasso. *Piper Indicum* propendentibus siliquis rotundis *CBP. 102.* *Capficum* siliquâ latiore & rotundiore *J B. Tom. 2. 943.*

*Solanum* mordens, siliquâ cordiformi pendulâ. *Capficum cordatum* propendens *Park. Th. 357.* *Piper Indicum cordatum* *CBP. 102.* An *Piper Indicum* cordatum majus siliquâ planâ & propendente *HRP. 142.*

*Solanum* mordens fructu cordiformi propendente rubro, spinulis asperato. An *Piper Indicum* fructu aculeato *CBP. 102.*

*Solanum* mordens fructu magno petaloide *Bonnet-Pepper* nostratibus vulgò. An *Piper Indicum* fructu dependente *Pomi amoris* formâ *CBP. 102.* *Piper Indicum* rotundum maximum *H. Eysl.* *Solanum* mordens s. *Capficum latifolium Mali Æthiopici* fructu magno, striato compresso, *Americanum. Phytogr. Tab. 227. fig. 1.*



*Solanum mordens* filiquâ rotundâ Ceraforum formâ. Piper cûm filiquâ rotundâ Ceraforum modo. *Clus. Cur. Posterior. 53.*

*Solanum mordens*, Ribesii fructu minimo, *Americanum* The Currant-Pepper nostratibus dictum. An Piper minimum filiquis rotundis, *H. Eysf.*

*Solanum mordens* filiquis surrectis rotundis. Piper rotundum majus surrectum *Clus. Cur. post. 51.* Hujus & varietas minor est, & alterum genus fructu parum acuminato.

*Solanum mordens* fructu cordiformi erecto majus & minus. Piper *Indicum* rubrum cordatum majus filiquâ surrectâ *HRP. 142.*

*Solanum mordens* filiquis oblongis sursùm tendentibus. Piper oblongum erectum majus & minus pyramidale *Gregor. Reg. apud Clus. Cur. post. variat etiam filiquis flavis.*

*Solanum mordens* foliis majoribus, surrectum, fructu parvo oblongo. Piper oblongum exiguum erectum pyramidale *Patr. Greg. Reg. apud Clus. Cur. post.*

*Solanum mordens* Olivari fructu sursùm rigente. An Piper *Indicum* perenne filiquâ magnitudine & formâ. *Sch. Bot. ex Hort. Fageliano.*

*Solanum mordens* *Americanum* perenne Berberidis fructu surrecto. *Berberis-Pepper Barbadosibus* vulgò. Fortè *Capicum Americanum* perenne fructibus oblongis erectis minimis rubris. *H. Beaumont. 12.* An *Capicum Brasilianum* *Clus. Not. ad Monard. 341.*

*Solanum mordens* *Ind. Orient.* perenne, filiquis pusillis plurimis simul, sursùm spectantibus. An *Capicum* arborescens *Orientale*, fructibus oblongis parvis erectis. *PBP. 319.*

**SOLDÆ** *Malabaricæ* similis arbor *Maderaspatana* nucamentis donata. *Phytogr. Tab. 61. fig. 4.* An Fructus juli figuram quasi exprimens cineraceus, grana spadicæ continens *CBP. 407.* Fructus miscellaneus 8<sup>us</sup>. *Clus. exot. lib. 2. cap. 25.*

**SOLDANELLA** Alpina rotundifolia *CBP. 295.* Soldanella montana quibusdam *JB.* Soldanella Alpina minor *Clus. Hist. 309.*

Soldanella Alpina folio minus rotundo *CBP. 296.* Soldanella Alpina major *Clus. ibid.* Hæ plantæ nihil cum *Convolvulis* hujus nominis habent affine, nisi folia, cum sint filiquosæ, aut corniculatæ, ad finem filiquosarum (impropriè sic dictarum) amandari debent.

**SONCHUS** lævis *Maderaspatanus* *Phytogr. Tab. 227. fig. 3.* Fortè *Muel-Schevii* *H. Malab. Part. 10.*

*Sonchus lævis* *Virginianus* caule alato, foliis laciniatis *D. Banister.*

*Sonchus lævis* *Virginianus*, caule alato, foliis non dentatis *Banisteri.*

*Sonchus lævis* laciniatus cœruleus s. *Alpinus cœruleus* *CBP. 124.* *Sonchus cœruleus* latifolius *JB. Tom. 2. 1005.*

*Sonchus latifolius* maritimus laciniatus *Massiliensis* *Sch. Bot. 194.*

*Sonchus angustifolius* maritimus *CBP. Phytogr. Tab. 62. fig. 5.*

*Sonchus ἀνυλίσταλον*, angusto & oblongo folio nostras, per foliorum ambitum creberrimis spinulis asperatus. *Phytogr. Tab. 62. fig. 4.*

*Sonchus* subrotundo folio nostras, levissimis spinulis, circa foliorum oras exasperatus



tus *Phytogr. Tab. 61. fig. 5.* An *Sonchus asper* subrotundo folio *CBP. 124.* *Sonchus asper vulgi*, flore *Hieracii Monspeliensibus Raii Hist. Pl. 225.* *Monspeli* spontè nascitur, & in *Anglia*.

*Sonchus repens* multis, *Hieracium majus* *J B. Tom. 2. 1017.* *Hieracium arborescens* *Ger.emac.* *Hieracium majus folio Sonchi*, vel *Hieracium Sonchites* *CBP. 126.*

*Sonchus lævis palustris altissimus Raii Hist. Pl. 226.* *Sonchus tricubitalis*, folio cuspidato *Meret. Pin. rer. nat. Brit. 115.* *Sonchus lævis altissimus Clus. Hist. 2. 147.*

• *Sonchus elatus s. dendroides Virginianus*, Ari in modum auriculatis foliis, ramossissimus, floribus luteis parvis pentapetalis. *Phytogr. Tab. 317. fig. 2. nondum edit.* Quem in *Horto Medico* apud *Chelseianos*, auspiciis *D. Doody* conservatum Observavimus. An *Sonchus altus* caule glabro *Virginianus* *D. Banister.* Qui hujus alteram proponit varietatem, vel speciem; viz. *Sonchus altus*; caule pilis duriusculis hispido.

*Sonchus Tingitanus* *Papaveris folio Elem. Botan. Vid. Hieracium Chondrilloides.*

**SORBUS** fativa *CBP. 415.* *Sorbus* *J B. Tom. 1. lib. 1. 59.* *Sorbus legitima* *Park. Th. 1420.* *Angliæ nostræ* indigena est, & in agris *Worcestersibus & Staffordiensibus* à *D. Pitt & D<sup>re</sup> Plot* nuperrimè inventa; ut videtis in *Hist. nat. Stafford. 208.*

*Sorbus sylvestris* pinnatis angustioribus foliis, undique glabris, fructu parvo miniatato. *Sorbus sylvestris foliis Domesticæ similis* *CBP. 415.* *Sorbus aucuparia* *J B. Tom. 1. 62.*

*Sorbus sylvestris Virginiana* rotundioribus pinnatis foliis, pronâ parte tomentosis. An *Sorbus sylvestris minor*, foliis subrotundis crenatis, & subtùs incanis *Banisteri.*

• *Sorbi Alpinae* (fortè) species *Arbor Americana* durioribus serratis foliis ex-*Insulâ Jamaicæ* *Phytogr. Tab. 318. fig. 1.*

*Sorbus spuria Malabarica*, *Katou-Calesjam* dicta *Raii Hist. Pl. 1643.* *Katou-Kalesjam* *H. Malab. Part 4. fol. 69.*

• **SPARGANIUM** ramosum *CBP.* *Sparganium* quibusdam *J B. Tom. 2. 541.* *Butomos dissectâ paniculâ*, vulgò *Platanaria*, quia pilulas habet *Platani* pilulis similes *Jo. Bod. in Theophr. 462.*

*Sparganium non ramosum* *CBP. 15.* *Sparganium alterum* *J B. ibid.* *Butomum alterum* *Jo. Bod. à Stapel. Not. in Theophr. 462.*

*Sparganium minimum* *J B. CBP. Park. Th.* *Sparganium minimum nostras Raii Hist app. 1910.*

**SPHONDYLIUM** vulgare hirsutum *CBP. 157.* *Sphondylium* quibusdam, s. *Branca Ursina Germanica* *J B. Tom. 3. l. 27. 160.*

*Sphondylium* foliis crispis, semine oblongo gracili. *Sphondylium hirsutum* foliis angustioribus *CBP. 157.* *Sphondylium crispum* *J B. Tom. 3. 163.* *Sphondylium majus aliud laciniatis foliis* *Park. Th.*

*Sphondylium hirsutum minus*, foliis tenuitèr laciniatis, semine lato. *Phytogr Tab. 63. fig. 3.* *Sphondylium montanum minus*, angustifolium, tenuitèr laciniatum nostrum *Raii Synops. append.* An *Sphondylium Alpinum parvum* *CBP. 157.* & in prodr. 83. Itemque *J B. Tom. 3. lib. 27. 163.*



Sphondylium maximum speciosum, Panax *Heracleum* dictum. Panax Sphondylii folio, s. *Heracleum C B P.* Sphondylium majus, s. Panax *Heracleum* quibusdam *J B. Tom. 3. 161.* Panax *Heracleum* verum Ficulneo folio *Park. Th.* Sphondylium maximum *Transylvanicum* Ricini folio *Breyn. Prodr. 2. 93.*

SPINACHIA mas & sæmina *J B. Tom. 2. 963.* Lapathum hortense s. Spinachia semine spinoso *C B P. 114.*

Spinachia semine non pungente, folio majore & rotundiore *J B. Tom. 2. 964.* Lapathum hortense, s. Spinachia semine non spinoso *C B P. ibid.*

SPIRÆA *Theophrasti* sortè *Clusio J B Tom. 1. 559.* Frutex spicatus foliis Salignis ferratus *C B P. 475.* Huic capsulas seminiferas Euonymi similes dat *Turnefortius Elem. Botan. Tom. 3. Plant. 389.*

Spireæ *Theophrasti* similis Frutex *Indicus*, latiori folio, spicis florum è foliorum alis. *Phytogr. Tab. 63. fig. 2.* Hujus ramulum noster amicus Reverend. D. *Dodsworth* in Horto cujusdam Ingeniosi Viri D. *Wilkinsoni* Pharmacopæi *Eboracensis* collectum, & optimè resiccatum, absque titulo, nobis *Londino* transmisit: Et sortè Euonymi nostræ Jujubinis foliis *Carolinensis* varietas haberi possit. vid. fol. 139. hujus *Almagest.* An Frutex *Virginianus* floribus albis instar Spirææ compactis *Cat. Mss. Hort. Oxon.* ex sententia D. *Bobart*, Idem est; sed refragatur illi *Sherardus.*

SPONGIA ramosa *C B P. 368.* Spongia ramosa *Britannica Park. Th. 1302.* Confervæ marinæ genus *Lobelii Hist. Lugd.*

Spongia parva sordidior, ex Ostrearum conchis. Fortè, Fucus tereti folius spongiosus parvus *Raii Hist. Pl. 71.*

Spongia ramosa fluviatilis *Newtono Raii Hist. Pl. 81.* In fluvio *Tare* agro *Norfolciensi* propè *Nordovicum* Urbem invenit D. *Newton* & nobis communicavit.

Spongia fluviatilis anfractuosa perfragilis, ramosissima nostras. *Phytogr. Tab. 112. fig. 3.* In *Isi* fluvio propè *Oxonium* invenit D. *Sherard* & nobis munere donavit.

Spongia marina fistulosa maxima muricata *Phytogr. Tab. 112. fig. 4.* An Spongia ramosa fistulosa *C B P. 368.* Dedit nobis D. *Doodii.*

Spongia formâ infundibuli *C B P. 369.* Spongia elegans *Clus. exot. lib. 6. cap. 11.*

Spongia Novi Orbis texturâ laxâ cincinnatâ, Cylindri cavi figurâ, lignicula circumnascens *Phytogr. nondùm edit. D<sup>n</sup>. Joan. Woodward* Medicinæ apud *Greshamienses* Prælectori dignissimo nec non *Regal. Societ.* Socio, minusque obviis Naturæ Phænomenis indagandis Viro sagacissimo, Hujus notitiam debemus. Cujus Icon habetur in *Phytogr. Tab. 322. fig. 3.*

Spongia elegans reticulata *Raii Hist. Pl. append. 1850.*

Spongia ramosa tuberculata *Musæi Corteniani Rajo Hist. append. 1850.*

STACHYS *Fuchsi J B. Tom. 3. 319.* Stachys major *Germanica C B P. 236.*

Stachys amplissimis *Verbasci* foliis, floribus albis parvis non galeatis, spicâ *Betonicæ*, ex *Insulâ Canarinâ*, *Phytogr. nondùm edit. Arvida salva* Incolis, & nostratibus *Sage-Tree* (i. e.) *Salvia* arbor nuncupatur. vid. fol. 329. Hujus habetur Icon *Phytogr. Tab. 322. fig. 4.*

Stachys latifolia major, foliis obscurè virentibus, flore galeato ferrugineo *Phytogr. Tab. 317. fig. 4. nond. edit. Pseudo-Stachys Alpina C B P. 236. & prodr. 113.*

*Salvia*



- Salvia Alpina* *Tabernæmont. Icon.* 372. An *Stachys* folio obscure virenti, flore ferrugineo *HRB.* 198. An *Stachys Cretica* maj. s. latifol. *Sch. Bot.* 66.
- Stachys Indica* procerior *Betonicæ* folio nostra *Raii Hist. append.* 1872. Fortè *Stachys Betonice* folio subincano *H. Leyd.* 580. *Stachys alpina*, *Betonicæ* folio. *Acad. Reg. Paris. Sch. Bot.* 66. *Nepeta maxima peregrina* *Breyn. prodr.* 2. 75. *Horminum spicatum*, *Lavendulæ* odore. *Boccon. de Pl. Sicul. Tab.* 25.
- Stachys minor Italica* *C.B.P.* 236. *Stachys Dioscoridis* *Park. Th.* *Stachys Lychnitis*, s. *Stachys spuria Flandrorum* *Lob. Icon.* 531.
- Stachys exotica*, *Lychnidis Coronariæ* foliis & effigie. An *Stachys Lusitanica* quorund. *Lob. Icon.* 531.
- Stachys angustifolia Lychnitis* non crenata. *Phytogr. Tab.* 64. fig. 1. *Stachys Cretica* *C.B.P.* *Stachys*, s. *Pseudo-Stachys Cretica* *Park. Th.*
- Stachys Lychnitis angustifolia crenata*, *Maderaspatensis* *Phytogr. Tab.* 64. fig. 2.
- STAPHIS agria *J.B. Tom.* 3. 641. *C.B.P.* 324. *Aconitum urens Ricini* ferè foliis, flore cæruleo magno, *Staphis agria* dicta *Nobis*.
- STELLARIA aquatica *Park. Th.* *Millefolium aquaticum* 13. s. *Stellaria aquatica* *C.B.P.* *Alfine aquis innatans*, foliis longiusculis *J.B. Tom.* 3. 786. *Callitrichen Plinii* *Fab. Column. in Ecphras. cum Stellariâ nostrâ eandem esse D. Dodii putavit, & non aliter distinctam, quàm ratione loci in quo crescit, & accidentibus inde ortis. Hujus varietatem aliquando invenimus, cum quatuor foliis caulem ambientibus, Rubiæ in modum.*
- Stellaria aquatica* foliis longis tenuissimis. *Raii Fascic. Stirp. Britan.* 20.
- STOEBE major foliis *Cichoraceis* mollibus lanuginosis. *C.B.P.* 273. *Stœbe Salmantica* 1<sup>a</sup> *Clusio* *Park. Th.* 476. *Stœbe Salmanticensis* prior *Clusii*, s. *Jacea Intybacea* *J.B. Tom.* 3. lib. 25. 36.
- Stœbe* major foliis *Erucæ* mollibus lanuginosis. *C.B.P.* *Stœbe Salamantica* 2<sup>a</sup> *Clusii* *Park. Th.* *Jacæ* genus *Stœbe Salamantica*, foliis mollibus lanuginosis, caule infirmo *J.B. ibid.*
- Stœbe* major caliculis non splendentibus *C.B.P.* *Stœbe Austriaca* elatior *Park. ibid.* *Centaurii majoris species tenuifolia* *J.B. Tom.* 3. 31.
- Stœbe* caliculis argenteis *C.B.P.* *Stœbe Salamantica* argentea s. 3<sup>a</sup> *Clusio* *Park. Th.* *Scabiosa squamosa argentea* *J.B. Tom.* 3. 30. *Stœbe minor* *Tabernæmont. Icon.* 156.
- Stœbe* caliculis argenteis minor *C.B.P.* 273. *Jacea alba* *Tabernæm. Icon.* 153.
- Stœbe Austriaca* humilis *Clusio Hist.* *Stœbe incana* *Cyano* similis tenuifolia *C.P.B.* Fortè etiam *Stœbe rubra Monspeliaca* parvis *Cyani* capitulis *ejusd.* *C.B.P. ibid.*
- STOECHAS *Arabica* vulgò dicta *J.B. Tom.* 3. 277. *Stœchas purpurea* *C.B.P.* 216. vulgaris *Park.*
- Stœchas* longioribus ligulis *Clusio* *Park. Th.* *Stœchas* cauliculis non foliatis *C.B.P.* 216.
- Stœchas Turcica* purpurea, ligulis brevioribus odoratissima.
- Stœchas latifolia* flore albo *C.B.P. ibid.* *Stœchas Arabica* cum ligulis albis *Botan. Monsp.* 246.



*Stœchas folio ferrato* *C B P.* *Stœchas ferrato & crispo folio* *J B. Tom. 3. lib. 28.*  
*Stœchadi ferratæ affinis* *C B P.* *Tragium alterum* *Dioscoridis* quibusdam, folio  
*Trichomanis* *J B. Tom. 3.* *Secades & Sucudus* *Avicennæ Rauwolfio Hist. Lugd.*  
*app. 29.* *Sucudus* *Avicennæ Mycon. H. Leyd. 1200.*

**STRAMONIUM** majus purpureum *Park. paradis.* *Stramonium* s. *Datura major*  
*fætida*, pomo spinoso oblongo *H Leyd. 583.* *Stramonium altera major*, s. *Ta-*  
*tura* quibuld. *J B. T. 3. 624* *Solanum fætidum* pomo spinoso oblongo *C B P.*  
*168.* *Solanum manicum* *Dioscoridis Column. Phytobas. 46. variat flore albo.*

*Stramonium* s. *Datura fætida* fructu spinoso oblongo caule & flore purpureo. *Variat*  
*flore albo striis purpureis, caule atronitente.*

*Stramonium* s. *Datura* pomo spinoso rotundo, longo flore *H. Leyd. 583.* *Stramonium*  
*multis dicta*, s. *Pomum spinosum* *J B. Tom. 3. 624.* *Stramonium fructu rotun-*  
*do deorsum spectante & aspero* *Fab. Column.* *Solanum* pomo spinoso rotundo,  
 longo flore *C B P. purpureo.*

*Stramonium* s. *Dutroa* fructu spinoso rotundo, flore candido. *Stramonium minus*, s.  
*Nux Metel* flore albo *Park.* *Stramonium Curassavica* humilior *Hyosciami folio*  
*P B P. 379.* *Humatu* *H. Malab. Part. 2. fig. 28.* *Tlapatl Mexicensibus* *Hernan-*  
*dez. apud Recc. 278.*

*Stramonium ferox* *Boccon. de Pl. Sicul. 50.* *Datura Cochinenfis* spinosissima *Zanon.*  
*Hist. Bot. 76.* *Datura fructu spinosissimo* *Garciaë lib. 1. Arom.* *Stramonium* s.  
*Datura ferox* pomo crassioribus & robustioribus aculeis donato *H. Leyd. 583.*

*Stramonium Ægyptiaca* fætida, semine pallido, pomo spinoso rotundo, flore violaceo  
 simplici, duplici, triplicivè *H. Leyd.* *Solanum fætidum*, pomo spinoso rotundo,  
 semine pallido *C B P.* *Stramonium minus* flore geminato purpurante *Park. para-*  
*dis.* *Stramonium fructu rotundo*, foliis per ambitum *Xanthii* modo incisus *Co-*  
*lumnæ.*

*Stramonium Indica* flore amplo albo pleno *Breyn. Prodr. 2. 97.*

*Eadem* flore pleno extrinsecus purpurascente, intus albente, punctis purpureis  
 asperfo *Bry. HRP. 168.* *Solanum Ægyptiac.* flore pleno *C B P. 168.* *Datura*  
*Ægyptia* *Vesling. Obs. 56.* *Datura Contareno* *Pr. Alpin. exot. 182.* *Datura Con-*  
*tareni*, flore pleno violaceo & albo *Belluc. H. Pisan. app. 61.*

**STYRAX** arbor *J B. Tom. 1. 341.* *Styrax folio Mali Cotonei* *C B P. 452.*

**SYMPHYTUM** majus vulgare *Park. Tb.* *Symphytum majus* s. *Consolida*  
*major* flore albo quæ sæm. *C B P. 259.* *Symphytum magnum* *J B. Tom. 3. 593.*  
*Symphytum majus* s. *Consolida major* flore purpureo, vel purpuro-cæruleo, quæ  
 mas *C B P.*

*Symphytum tuberosum* *J B. Tom. 3. 594.* *Symphytum majus & minus* tuberosâ  
 radice *C B P.* *Symphytum* flore subluteo, radice tuberosâ. *Camerar. H. Med. 164.*

*Symphytum minimum* *Acini* foliis bijugis *Maderaspatanum Phytogr. Tab. 227. fig. 7.*

*Symphytum maculosum*, s. *Pulmonaria latifolia* *C B P.* *Pulmonaria Italorum* ad Bug-  
 lossium accedens *J B. ibid.* *Jerusalem-Sage* nostratibus vulgò. *Variat* foliis  
 maculosis & non maculosis, Floribus etiam, cæruleo-rubentibus & immaculatis.

*Symphytum maculosum* s. *Pulmonaria maxima*, foliis quasi *Saccharo* incrustatis.  
*Phytogr.*



- Phytogr. Tab. 227. fig. 4.* An *Symphytum Alpin. latifol. maculatum asperius*, flore cæruleo *HRP. 171.*
- Symphytum maculosum* s. *Pulmonaria angustifolia*, rubente cæruleo flore *CBP. 260.* *Pulmonaria angustifolia*, cæruleo flore *J.B. Pulmonaria foliis Echii Lob. Icon. 586.*
- Symphytum non maculatum asperius perelegans*, flore multiplici *Phytogr. Tab. 227. fig. 5.*
- Symphytum* s. *Pulmonaria non maculosa*, foliis glabris, *Americana*, flore patulo cæruleo *Phytogr. Tab. 227. fig. 6.* An *Digitali* congener hæc planta?
- SYRINGA** cærulea *CBP. 398.* *Syringa* flore cæruleo s. Lilac *J.B. Tom. 1. 204.* Lilac *Matthioli* s. *Syringa* flore cæruleo *Park. Th. 1466.* Variat flore saturatè purpureo & lacteo s. argenteo undè.
- Syringa* s. Lilac flore saturate purpureo *H. Edinburg. 328.*
- Syringa* flore lacteo, s. argenteo *Park. paradif.*
- Syringa Laurifolia Jamaicensis* floribus ex flavo pallescentibus *Phytogr. Tab. 64. fig. 3.* Huic fortè pertinet *Totoncapatli Mexicensibus*, *Syringa lutea Hernandez.* apud *Recc. 115.* Fortè & *Jasminum Virginianum* flore albo *Laurifolium D. Banister. Cat. Stirp. Virginian.*
- Syringa Persica* s. Lilac *Persicum*, incisifoliis, *Jasminum Persicum* dictum *Park. Th. 1468.* *Jasminum Persicum* foliis laciniatis *H. Edinb. 169.* Agem *Lilag Persarum* s. Lilac inciso folio *Cornut. 188.* *Ligustrum* foliis laciniatis *CBP. 476.* *Ligustrum nigrum Pr. Alpin. exot. 179.*
- Syringa Persica* foliis indivisis, flore majore pallidè cæruleo. *Jasminum Persicum* foliis non laciniatis *H. Edinb.* Agem-*Lilag Persarum* folio integro *Cornut. 190.*
- Syringa Babylonica*, indivisis densioribus, confertis & minùs acutis foliis *Phytogr. Tab. 227. fig. 8.* sub *Ligustri Orientalis* titulo in *Hortis Patavinis siccis* haud femèl observavimus.
- Syringa volubilis Virginiana* Myrti majoris folio, alato semine, floribus odoratis luteis *Phytogr. Tab. 112. fig. 5.* *Gelseminum* s. *Jasminum Virginianum* scandens, & sempervirens *Park. Th. 1465.* *Pseudo-Apocynum Myrtifolium Virginianum Banisteri Cat. Stirp. Virg.*
- Syringa scandens Maderaspatana*, Fraxini foliis densioribus, claviculis donata, *Phytogr. Tab. 228. fig. 1.*
- Syringa alba*, s. *Philadelphus Athenæi* *CBP. 398.* *Syringa* flore albo *J.B. Tom. 1. 203.* *Syringa* flore albo simplici *Park. Th. 1468.* Ad hunc locum nequaquàm pertinet, verùm ob communionem Nominis, à *Syringarum* genere haud Separandam duximus; At potiori jure, proptèr capsularum convenientiam, ad *Euonymorum* censum fortè recenseri debuisset.



## T.



ACAMAHACA foliis crenatis, Sadelhout, s. Lignum ad ephippia conficienda aptum *PBP.* 379. *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 2. Tecomahaca *Mexicensibus Hernandez.* apud *Recc.* 55. An Tacamahac. Populo similis, fructu colore *Pœoniæ* *J B.* Arbor Populo similis, resinosa altera *CBP.* à *Prom. Bon. Spei* accepimus, & in *HRH.* antea collegimus. Tacamahaca foliis ferratis *Breyn. Prodr.* 2.

Tacamahacca foliis non crenatis *PBP.* Terebinthi minoris æmula foliis angustioribus & rotundioribus *Arbuscula Bisnagarica. Phytogr. Tab.* 64. *fig.* 5. Arbor *Americana* resinosa, *Pistachiæ* foliis & fructu *H. Beaum.* 9. Arbor Tacamahaccam liquidam fundens, foliis non ferratis *Breyn. Prodr.* 2.

TAGETES *Indicus*, maximus rectus, flore simplici & luteo pallido. *J B. Tom.* 3. 100. Tanacetum *African.* majus simplici flore *CBP.* 133. *Caryophyllus Indicus Hispanis* apud *Recc.* 154.

Tagetes *Indicus*, flore maximo multiplicato *J B. ibid.* Tanacetum s. Flos *Africanus* major flore pleno *CBP.* 132. Cempoalxochitl s. Giuhnaxochitl. Tzneycephual *Caryophyllus Mexicanus* 1<sup>us</sup>. *Hernandez.* apud *Recc. ibid.* variat aliquando flore saturatiori colore.

Tagetes *Indicus* medius, flore simplici luteo pallido *J B. Tom.* 3. 99. Oquichtli Cocaxochitl. *Caryophyllus Mexicanus* 3<sup>us</sup>. *Hernand. ibid.*

Tagetes *Indicus* minor, simplici flore, s. *Caryophyllus Indicus*, s. Flos *Africanus* *J B. T.* 3. 98. Tanacetum *Africanum*, Flos *Africanus* minor *CBP.* 133.

Tagetes *Indicus* minor, multiplicato flore *J B. T.* 3. 99. Macuilxochitl s. Maon. *Caryophyllus Mexicanus* 4<sup>us</sup>. *Hernand. ibid.* Horum omnia genera jamjam recensita nunc floribus petalosis, & interdum fistulosis variant. Indè.

Tagetes flore fistuloso simplici *H Leyd.* 588. Tanacetum s. Flos *Mexicanus* flore fistuloso simplici *CBP.* *Caryophyllus Mexican.* fistuloso flore simplex *Fab. Col. ecphr. p.* 2. 47.

Tagetes *Indicus* flore fistuloso duplicato *H. Leyd. ibid.* Tanacetum s. Flos *Mexicanus* flore fistuloso pleno *CBP.*

Tagetes *Indicus* s. Flos *Africanus* minor fistulosus, s. Flos *Mexicanus* fistuloso flore *H. Pisan. à Turre* 48.

Tagetes *Indicus* minimus, floribus ex luteo rufescentibus sericeâ hirsutie obsitis. Tanacetum *Africanum* sericeâ hirsutie obsitum *CBP.* Tlapalcozatli Coaxochitl *Caryophyllus Mexicanus* 5<sup>us</sup>. *Hernand.* apud *Recc.* 156.

Tagetes



Tagetes *Indicus* minimus sericeus, flore multiplici.

TAKKA *H. Malab. Part. 4. Tab. 27.* è *Maderaspatân.*

Takkada Frutex *Zeylanensium*, Fortè *Bellamodagam H. Malab. Part. 4. Tab. 59.* Prunifera *Indica*, fructu umbilicato sulcato, *Grossulariæ* simili *Raii Hist. 1481.*

TAMARINDUS *Park. Th. 237. JB. Tom. 1. 422.* Siliqua *Arabica* quæ *Tamarindus CBP. 403.* Balam-pulli, s. *Maderam-pulli H. Malab. Part. 1. fig. 23.* *Thamarindus Hernandez. apud Recc. 83.* *Tamarindus Bontii lib. 6. 94.*

*Tamarindus Americanus*, siliquâ ferè orbiculatâ monospermos *Mus. Corten. Phytogr. Tab. 64. fig. 4. a.*

*Tamarindus Bisnagaricus* siliquâ productiore dispermos, seminibus veluti isthmo interceptis. *Phytogr. Tab. 64. fig. 4. b.* *Jutay (fortè) s. Tamarindus Brasiliens. Pison. lib. 4. 157.*

TAMARISCUS folio latiore *Park. Th. 1479.* *Tamarix Germanica* s. minor fruticosa *JB. Tom. 1. 351.* *Tamarix fruticosa*, folio crassiore s. *Germanica CBP. 485.* *Myrica vulgò.*

*Tamariscus folio tenuiore Park. ibid.* *Tamarix major*, s. arborea *Narbonensis JB. ibid.*

• *Tamariscus Atle* vocata *Pr. Alpini de Pl. Ægypt. 32.* *Tamarix Ægyptia arbor CBP.* Hujus ramulum accuratiùs depictum videsis in *Phytogr. Tab. 318. fig. 3.*

• *Tamariscus Monomotapensis* *Ericæ* tenuissimo folio pilulifera, ramulis lanugine telæ araneæ instar implexis *Phytogr. Tab. 318. fig. 4.* Hujus capitula tomento candicante, in globulos summis ramulis orbiculatos, sunt conglomerationes. Fortè huc spectat *Tlacolcoatli*. s. *Coatli humilis Hernandez. apud Recc. 223.* tamen hæc planta fructum suum, Juli adinstar, in spicam ferat. De hujus, forte genere sit, *Cupressò-pinulus Cap. Bon. Spei. Breyn. Cent. 1. cap. 10.* An *Sanamunda Africana* *Ericoides minor*, ramulis admodum lanuginosis. *Breyn. Fascic. Fortè etiam, Frutex Corymbiferus Africanus Chrysanthemuli Ericoides facie, floribus Globulariæ ejusd. Breyn. Fascic. Rarior 23. ubi videas Descriptionem.* An non *Acacalis Dioscoridis & Pauli* qui *Dioscoridis* verba transcripsit; *Stephanus* enim in *Synon. Ut puto (inquit) esse Acacalidem, speciem Tarfi, quod est Tamariscus; idem sentit Michael Capella in Synon. apud Haly Abbatem, nec sine ratione, cum ipse Dioscorides lib. 1. statim post Ericen inter Frutices, hanc plantam recenset, Ἀκακάλις (inquit) fructus est Fruticis in Ægypto nascentis [καρπὸς ὅστις θάμνος γινώμενός ἐν Ἀιγύπτῳ] qui Myricæ (μυρίκας) fructu aliquomodo similis est. Fortè Arbor Atlantica Cupressò similis, frondibus tenui lanugine obductis Suetonii Paulini apud Plinium lib. 5. cap. 1.*

*Tamarisci* s. *Myricæ (forte) genus Æthiopicum*, muricato fructu intus tomentoso *Vid. Frutex. cineraceus muscosus. Breyn. Fol. 159.* Hujus *Almagesti.*

TANACETUM vulgare luteum *CBP. 132.* *Tanacetum vulgare* flore luteo *JB. Tom. 3. 131.*

*Tanacetum foliis crispis CBP. ibid.* *Tanacetum crispum* flore luteo *JB. T. 3. 132.*

*Tanacetum Hortense* *Lepidii* foliis serratis, *Ageratum* intensè redolens. *Mentha hortensis*



hortensis corymbifera *CBP.* 226. *Mentha corymbifera*, s. *Costus hortensis* *J.B.* *Tom.* 3. 144.

**TARCHON** *J.B.* *Tarchon Simeonis Sethi. lib. de Aliment. facult.* *Tarchon. Avicennæ & Sethi Gesn. Hort.* *Abrotanum mas Lini folio acriori & odorato Elem. Bot. Tom.* 1. 364. *Tarracon nostratibus vulgò.*

**TAXUS** *CBP.* 505. *J.B. Tom.* 1. 241. *Park. & omnium ferè Botanicorum. Μίλα* *Theophr.* 3. *hist.* 10. *Milax arbor Cordi in Diosc.* *Smilax arbor Cast. Durant.* *Variat aliquando folio ex argenteo-viridi.*

**TELEPHIUM** vulgare *CBP.* 287. *Telephium* s. *Crassula major vulgaris Park. Th.* 726. *Anacampseros*, vulgo *Faba crassa* *J.B. T.* 3. 682. *Cotyledon alterum Dioscoridis Fab. Col. ecphr.* 305.

*Telephium purpureum majus CBP.* *Anacampseros purpurea J.B. Tom.* 3. 682.

*Telephium latifolium peregrinum CBP. ibid.* *Teleph. s. Crassula maj. Hispanica Park. Th.* 726. *Anacampseros maxima J.B. Tom.* 3. 682.

*Telephium peregrinum rubens HRB.* 201. *Teleph. Lusitanic. hæmatôdes maximum HRP.* 173. *Yztacpatli-Manalismi x. Hernandez. apud Recc.* 452.

*Telephium maximum Africanum* flore aurantiaco, ex *Cod. Benting. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 3. *Itè ex Hollandiâ habuimus.*

*Telephium Africanum*, angustiori folio, flore aurantiaco è *Cod. Bent.* sub *Portulacæ* titulo in *Phytogr. Tab.* 216. *fig.* 2. *hujus Icon. exhibetur.*

*Telephium floribus purpureis Park. Th.* 727. *quoàd Iconem.* At *Telephium minus repens*, s. *Cepæa Pancii ejusd. Park. secundum descriptionem.* *Telephium repens folio deciduo CBP.* 287. *Anacampseros minor, rotundiore folio sempervirens J.B. Tom.* 3. 682.

*Telephium Portulacæ folio, HRB.* 201. & 311. *Telephium montanum Cepæa Pancii congener, foliis longioribus Sch. Bot.* 32.

*Telephium Virginianum petræum album Banisteri.*

*Telephium radice Rosam spirante majus & minus H. Leyd.* 589. *HRP.* *Rhodia radix utriusque Bauh. CBP.* 286. *J.B. Tom.* 3. *lib.* 35. 683.

**TEREBINTHUS** angustiore folio vulgatio *Park. Th.* *Terebinthus vulgaris CBP.* 400. *Terebinthus J.B. Tom.* 1. 279.

*Terebinthus major Pistaciæ folio Adv. Bot. Monsp.* 249. *Terebinthus latifolia Park. Th.* 1527. *Hanc Caspar Bauhinus cum Terebintho Indicâ proximè sequenti commiscet.*

*Terebinthus Indica* major fructu rotundo *J.B. Tom.* 1. 279. *Terebinthus peregrina fructu majore, Pistachiis simili, eduli CBP.* 400. *Hanc J. Bauhinus pro Terebintho Indicâ Theophrasti habet; quam plerique Botanici, Pistachiam esse putârunt.*

*Therebinthus Americana* polyphylla, *Palamalatta dicta Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 6.

*Therebinthus Americana* *Sorbi aucupariæ foliis, rachi medio appendicibus alata. Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 7. *Arbor Americana resinosa foliis ad Rosarum folia accedentibus, H. Beaumont.* A cujus celeberrimo Autore, *Tacamahaca* foliis crenatis *P.B.P.* huic, pro Synonimo (meo quidè arbitrato) minus rectè proponitur.

There-



*Therebinthus Americana* trifolia lucida, Palamalatta vulgo *P B P.* *Phytogr. Tab.* 229. *fig. 1* Nyrvala [fortè] *H. Malab. Part. 3.* An *Bitoncus Philippicarum* Insularum alumna *Hernand.* apud *Recc.* 93.

TEUCRIUM *C B P.* 247. *Teucium multis* *J B. Tom. 3.* 290.

*Teucium regium latifolium flore albo* *H R P.* 173.

*Teucium regium purpureum* *Morif. Prælud. Bot.* 311. An *Teucium Creticum* odoratum, flore purpureo *H R P.* 173.

*Teucium lucidum parvo folio, flore venustè purpureo* *Phytogr. Tab. 65. fig. 1.*

*Teucium Africanum* fruticans, folio viridi splendido *D. Magnol. Mus. Cortenian.*

*Teucium Hispanicum saxatile glabrum, Sch. Bot.* 57. *Chamædrys Alpina lucida* *H R P.* 47.

*Teucium Atticum molli lanugine incanum* *Phytogr. Tab. 65. fig. 2.* An *Teucium Creticum* *Clus. Hist. Park. Th.* *Teucium Creticum incanum* *C B P.* 247.

Fortè etiam *Scordium lanuginosum ejusd.* *C B P.* *Scordium lanuginosum Creticum* *Camer.* Munificentia *D. Wheler.* accepimus.

*Teucium latiori folio villosissimum, calyce ampliori* è *Maderaspatân* *Phytogr. Tab.* 228. *fig. 5.*

• *Teucium Æthiopicum* *Salvifolium crispum, ad oras foliorum inæqualibus laciniis.* *Phytogr. Tab.* 318. *fig. 5.*

• *Teucium Virginianum* *Melissophyllum, floribus cæruleis* *Phytogr. Tab.* 318. *fig. 1.*

*Teucium peregrinum folio sinuoso, C B P.* 247. *Teucium fruticans Bæticum* 3<sup>m</sup>. *Clus. Hist.* 348. *Teucium Bæticum & Creticum Clusii* *J B. Tom. 3.* 291. *Variat flore albo, & cæruleo.*

*Teucium argenteum subrotundis foliis non sinuosis, flore cæruleo.* Fortè *Teucium Bæticum, quod à Clusii diversum sit Camerarii.*

*Teucium Americanum procumbens, Veronicæ aquaticæ foliis subrotundis* *H. Leyd.* 590.

*Teucii facie Bisnagarica tetracoccus rostrata, pilis scatens, foliis profundè venosis* *Phytogr. Tab.* 64. *fig. 6.*

*Teucii foliis, Frutex Curassavicus* *P B P. Phytogr. Vid. Verbena Orubica, &c.*

THALICTRUM majus folliculis angulosis caule lævi *J B. Tom. 3.* 487. *Thalicttrum majus florum staminibus purpurascens* *C B P.* 336. *Thalicttr. montan. flore purpureo* *Park. Th.*

*Thalicttrum speciosissimum glaucum, semine & caule striato* *J B. Tom. 3.* 486.

*Thalicttr. majus flavum, staminibus luteis, vel glauco folio* *C B P.* *Thalicttrum majus album* *Hispanic. Park.*

*Thalicttrum Canadense* *Cornut. de Pl. Canad.* 186. *Thalicttrum American.* *Park. Th.* An *Cozticpatli* 2<sup>a</sup> *Hernandez.* apud *Recc.* 236.

*Thalicttrum majus vulgare* *Park. Th.* *Thalicttrum majus siliquâ angulosâ, aut striatâ* *C B P.* *Thalicttrum nigrius, caule & semine striato* *J B. ibid.*

*Thalicttrum pratense majus* *Monspeliensium* foliis rugosis *H R P.* 173. *Phytogr. Tab.* 65. *fig. 3.* Fortè *Thalicttrum pratense angustifolium* *C B P.* 337. *J B. Tom. 3.* 487.

*Thalicttrum minus lucidum, Libanotidis coronariæ foliis.* *Phytogr. Tab.* 65. *fig. 5.*

*Thalicttrum foliis lucidis Rorismarini instâr, Quorundam.* An *Thalicttrum pratense*



- elatus longioribus & magis atris foliis, & quodammodo splendentibus, *Clus. For-*  
*tè* etiam Thalictrum minus alterum *Parisiensium*, foliis crassioribus & lucidis.  
*HRP. 173.*
- Thalictrum angustissimo folio *Park. Phytogr. Tab. 65. fig. 6.* Thalictrum pratense  
 angustissimo folio *CB.* quod primum in *Prodr.*
- Thalictrum minus *CBP.* Thalictr. minus s. Rutæ pratensis genus minus, semine  
 striato *JB.*
- Thalictrum montanum minus, foliis latioribus. *D. Lhwyd. Raii Synops. 100.*
- Thalictrum *Canadense* minus *D. Fagon. Sch. Bot. 152.* Cozticpatli Acatlanensis  
 s. Thalictrum *Mexicanum Hernandez. apud Recc. 235.*
- Thalictrum minimum fætidissimum *Casp. Baubino JB. Tom. 3. lib. 30. 488.*
- THAPSIA Libanotidis folio glutinosa glabra *Phytogr. Tab. 67. fig. 2.* Thapsia  
 Thalictri folio *Bot. Monsp. 287.* Thapsia s. Turbith *Garganicum* semine latissimo  
*JB. Tom. 3. 50.*
- Thapsia latifolia villosa *CBP. Phytogr. Tab. 66. fig. 3.* Sefeli *Peloponense* majus  
*Lob. Icon.* Thapsia quorundam hirsuta & aspera, Cicutæ folio, flore luteo, se-  
 mine lato; Aliis: Sefeli *Peloponesiacum JB. Tom. 3.*
- Thapsia glutinosa, Pimpinellæ Saxifragæ foliis venosis ex *Hispaniâ Phytogr. Tab.*  
*66. fig. 4.* Thapsia 4<sup>a</sup> s. Tuero dicta *Clusio Hist.* Thapsia 4<sup>a</sup> *Clusii* Tuero vo-  
 cata foliis glutinosis, radice nigrâ foris, *JB. Tom. 3. 196.* Thapsia foliis Liba-  
 notidis fætidissima *CBP.* Itèm Cicutaria latifolia fætidissima altera *ejusd. CB.*  
*Phytopin.*
- Thapsia Carotæ facie *JB. Phytogr. Tab. 66. fig. 5.* Thapsia Carotæ folio *CBP.*  
 Thapsia vulgaris Carotæ effigie *Adv. & Icon. Lob.*
- Thapsia *Cæsalpini* semine candido crasso *J. Bauhini Phytogr. Tab. 66. fig. 2.*
- Thapsia glutinosa segmentis densioribus subhirsutis, alterno situ positis *Phytogr. Tab.*  
*66. fig. 1.* An Sefeli *Peloponense* folio Cicutæ *Adv. & Icon. Lobel.*
- Thapsia latifolia *Hispanica Park. Phytogr. Tab. 65. fig. 7.* Thapsia 1<sup>a</sup> *Clusii* latifolia  
 flore luteo, semine lato, similis Sefeli *Peloponensi Lobelio JB. Tom. 3.*
- Thapsia maximis foliis glutinosa, segmentis densioribus ex adverfo sitis *Phytogr.*  
*Tab. 67. fig. 1.* Thapsia *Salmanticensis*, s. 3<sup>a</sup> *Clusii* magna, flore luteo, semine  
 lato *JB. Tom. 3. 186.* Thapsia maxima *Hispanica Park. Th.* Thapsia maxima  
 latissimo folio *CBP.*
- Thapsia 2<sup>a</sup> *Clusii* flore luteo, foliis tenuioribus, Fœniculi penè instar *JB. Tom. 3. 186.*
- THLASPI vulgatius *JB. Tom. 2. 921.* Thlaspi arvense Vaccariæ incano folio  
 majus *CBP. 106.*
- Thlaspi vaccariæ incano folio perenne *Raii Hist. 831.* An Thlaspi vaccariæ incano  
 folio minus *CBP. communicavit nobis D. Doody.*
- Thlaspi arvense vaccariæ lato, lævique folio *CBP.* Thlaspi majus *Tabernæm. Icon.*  
*459.* Thlaspi. arvense Acetosæ folio. *CBP. Raii Hist. 831.*
- Thlaspi vaccariæ folio minus, glabrum *D. Lawson. Raii Synops. 175.*
- Thlaspi villosum capsulis hirsutis. *CBP.* Thlaspi capsulis hirsutis *JB. Tom. 2. 922.*
- Thlaspi arvense perfoliatum majus *CBP.* Itèm Thlaspi vaccariæ folio Bursæ pasto-  
 ris siliquis *ejusd. CBP. 105.* Thlaspi oleraceum *Tabern. Icon. 462.* Thlaspi alte-  
 rum mitius rotundifolium Bursæ pastoris fructu *Column. ecphr. 276.* Bursa pasto-  
 ris foliis Perfoliatæ *JB.* Thlaspi



- Thlaspi arvense perfoliatum minus* *C B P.* *Thlaspi minimum* *Clusio Tabern. Icon.* 467.
- Thlaspi Alpinum* *Bellidis cæruleæ folio* *C B P.* *Thlaspi foliis Globulariæ* *J B. Tom.* 2. 926. *Thlaspi montanum* *Bursæ pastoris fructu* 1<sup>m</sup>. *Column. ecphr.* 275.
- Thlaspi fatuum* *Bursa pastoris dictum Raii Hist.* 838. *Bursa pastoria* *J B. Tom.* 2. 936. *Bursa pastoris major, folio sinuato* *C B P.* 108.
- Idem folio integro. *Bursa pastoris major folio non laciniato* *C B P. ibid.*
- Thlaspi arvense, filiquis latis* *C B P.* 105. *Thlaspi cum filiquis latis* *J B. Tom.* 2. 923. *Thlaspi Drabæ folio* *Park. Th.*
- Thlaspi filiquâ cordatâ peregrinum* *J B. Tom.* 2. 927. *Morif. Hist.* 2. 297.
- Thlaspi parvum saxatile flore rubente* *C B P.* 107. *Park. Th.* 843. Itè *Thlaspi montanum carnosio rotundo folio ejusd.* *Park.* 844. *Lithothlaspi* 4<sup>m</sup>. *carnosio rotundo folio* *Column. ecphr.* 279. An *Thlaspi saxatile folio Casiæ Poetarum* *D. Wheeler. Itiner.*
- Thlaspi montanum luteum* *J B.* Fortè & *Alysson Anguillaræ ejusd.* *J B. Tom.* 2. 934. *Thlaspi montanum luteum majus* *Park. Th.* *Thlaspi montanum incanum, Serpylli folio majus* *C B P.* *Thlaspi supinum luteum* *Lobel. Icon.* 220. *Thlaspi Alysson dictum minus, capsulis majoribus, rotundis, non foliatis.* *Bot. Monsp.* 251. *Jonthlaspi luteo flore incanum, montanum* *Fab. Col.*
- Thlaspi Saxatile incanum luteum Serpylli folio minus* *C B P.* *Jonthlaspi luteo flore incanum discoides montanum* *Column. ecphr.* 281.
- Thlaspi Alysson dictum campestre majus flosculis albis & luteis* *C B P.* 107. *Thlaspi Græcum propinquius, fortè Dioscoridis.* *Lob. Icon.* 213.
- Thlaspi Alysson dictum campestre minus* *C B P.* *Thlaspi minus quibusdam, aliis Alyssum minus* *J B. Tom.* 2. 928. *Thlaspi minus clypeatum* 2<sup>m</sup>. *Tabern. Icon.* 466. *Alyssum minimum* *Clus. Hist.* 2. 133.
- Thlaspi Alyssum dictum maritimum* *C B P.* *Nasturtium vel Thlaspi maritimum* *J B. Tom.* 2. 927. *Cujus figura transposita est.* *Thlaspi maritimum* *Dalechamp. Hist. Lugd.* 1393. *Thlaspi Narbonense* *Centunculi angustifolio; Alysson Italicum* *Lob. Icon.* 215. *Tabernæm. Icon.* 461.
- Thlaspi alterum minus clypeatum, Serpylli folio etiam Narbonense* *Lob. ibid.* *Lunaria peltata minima, quibusdam ad Thlaspi referenda* *J B. Tom.* 2. 935. *Thlaspi clypeatum Serpylli folio* *C B P.* 107.
- Thlaspi Chalepense* *Linariæ foliis, filiculis hirsutis* *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 8.
- Thlaspi Spanospermon Americanum* *Park. Th.* 838. *Thlaspi luteum Spanospermon* *Cornut. de Pl. Canad.* 8.
- Thlaspi saxatile vermiculato folio* *C B P.* *Thlaspi montanum vermiculato acuto folio* *Park. Th.* *Lithethlaspi montanum fruticosius, vermiculato acuto folio* *Column. ecphr.*
- Thlaspi fruticosum folio Thymbræ hirsuto* *C B P.* 108. *Thlaspi fruticosum alterum* *Lobelio* *J B. Tom.* 2. 930. *Thlaspi fruticosum Hispanicum* *Park. Th.*
- Thlaspi fruticosius ramosum, Leucii acutis foliis argenteum, ex H. Patavino.* Fortè *Thlaspi clypeatum arborescens Creticum* *Pr. Alpin. exot.* 107. à præcedenti haud multum abludit.
- Thlaspi fruticosius Majoranæ foliis minoribus crassis.*



- Thlaspi fruticosum spinosum* C B P. *Thlaspi fruticosum spinosum Narbonense* Lob. *Icon.* 217. *Leucoium spinosum*, s. *Thlaspi spinosum* aliis J B. *Tom.* 2. 931. Fortè etiam *Tragacantha* 4<sup>a</sup> vel *Spartium spinosum* alterum Pr. *Alpini. exot.* 59.
- Thlaspi Halimi folio sempervirens* H. *Leyd.* 594. *Thlaspi montanum sempervirens* C B P. 106. *Thlaspi montanum candidum* Hist. *Lugd.* 1180. *Thlaspi sempervirens & florens* Dodart. *Memoir.* 117. *Thlaspi toto Anni curriculo florens* Griseb. *leii virid. Lusitan.*
- Thlaspi fruticosum umbellatum Persicum* foliis *Leucoii* instar semper virentibus Moris. *Hist.* 2. 296. *Thlaspi fruticosum Persicum* foliis *Keiri* flore odorato Zanon. *Hist. Bot.* 196. *Thlaspi sempervirens & florens* Dodart. *Memoir.* 115. *Thlaspi latifolium platycarpon Leucoii* foliis Boccon. *de Pl. Sicul.* 51. Fortè *Thlaspi arborescens folio viridi* J B. *Tom.* 2. 930. Hanc plantam Anno 1595. Spiræ ubi Camera Imperialis in Horto cultissimorum plantis D. Tengenagel Adfessoris vidit noster sagacissimus Autor.
- Thlaspi umbellatum Creticum Iberidis folio* C B P. *Thlaspi Creticum* quibusdam flore rubente & albo J B. *Tom.* 2. 924. *Thlaspi Creticum umbellatum* flore purpureo & albo Park.
- Thlaspi umbellatum arvense amarum* J B. *Tom.* 2. 925. *Thlaspi umbellatum arvense Iberidis folio* C B P. 506. *Thlaspi Allobrogicum Cretico* par Clus. *Hist.* 2. 132.
- Thlaspi umbellatum Nasturtii folio Monspeliacum* C B P. *Thlaspi umbellatum tenuiter diviso folio*, amarum *Narbonense* J B. *Tom.* 2. 925.
- THYMELÆA foliis *Lini* C B P. 463. *Thymelæa Monspeliaca* J B. *Tom.* 1. 591.
- Thymelæa Africana Linariæ folio*, floribus albis in extremo caulium odoratissimis, *Phytogr. Tab.* 113. fig. 3. *Thymelæa Linifoliæ similis Africana* floribus pallidis odoratissimis P B P. 381.
- Thymelæa Africana glabra*, floribus ruberrimis nostra Raii *Phytogr. Tab.* 67. fig. 3. An *Sanamunda* 4<sup>a</sup> foliis glabris acutis Breyn. *Fasc.* 25.
- Thymelæa Alpina glabra*, flosculis subluteis ad foliorum ortum sessilibus *Phytogr. Tab.* 229. fig. 2. *Sanamunda glabra* J B. *Tom.* 1. 593. *Thymelæa foliis Polygalæ glabris* C B P. 463. *Sanamunda viridis vel glabra ejusd.* in *Prodr.*
- Thymelæa Capensis Nepæ Theophrasti* foliis aculeatis, flore parvo purpureo. *Phytogr. Tab.* 229. fig. 5. *Thymbra Africana* foliis spinosis Bartholin. Anno 1673. Obs. 24. *Polygala Astragaloides frutescens Thymbrae facie & foliis*, flore minore purpureo, fructu corniculato s. duplici rostro corniculato prædito Cap. Bon. *Spei.* Breyn. *Prodr.* 2. 85.
- Thymelæa Africana*, *Sanamundæ facie*, *Ericæ foliis angustissimis* P B P. *Phytogr. Tab.* 228. fig. 9. Item *Erica Africana arborescens*, *Coris folio flore flavescente ejusd.* P B P. 332. An *Sanamunda Africana* 5<sup>a</sup> s. *Ericoides major* Breyn. *Fascic. Plant.* 25.
- Thymelæa foliis acutis*, floribus odoratis purpureis; *Cneoron Matthiolo dicta* H. *Leyd.* 597. *Thymelæa foliis acutis affinis facie externâ* C B P. *Cneoron Matthioli suffrutex* J B. *T.* 1. 571. Fortè etiam *Thymelæa minor Cordi ejusd.* J B. *Tom.* 1. 570. *Thymelæa minor*, s. *Cneorum Matthioli* Park. *Th.* 201.
- Thymelæa incana Mezerei folio & facie*, surculis admodum fragilibus *Phytogr. Tab.*



229. fig. 3. *Thymelæa* quædam incana *Genevensis Raii Exterar.* Proxima huic si non eadem *Chamelæa alpina*, folio internè incano *C B P.* *Chamelæa hirsutæ* nomine data *J B. Tom. 1. 569.* Forte etiam *Chamælea incana*, & lanuginosa ejusd. *J B. Tom. 1. 586.* *Chamelæa alpina incana Adv. & Icon. Lob. Belluc. Ind. Pisan.* *Chamelæa Sabaudica* folio utrinque incano, flore albo. *Raii Hist. 1588.*

*Thymelæa supina* lignosior *Cretica*, ingrati odoris major. *Oleander Creticus* fruticosus major fætidus *Zanon. Raii Hist. app. 1919.*

Eadem in omnibus minor. *Oleander minor* frugifer, fætidus, *Creticus, Zanon. Raii Hist. append. 1918.*

- *Thymelæa* affinis quadricapsularis *Cap. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 319. fig. 3.* An *Herba foliis Ocymi*, aut *Serpylli*, floribus *Valerianæ Raii Catalog. Exterar. 283.* Cui itidè monstravit *Joannes Maria Ferro Pharmacopæus Venetus & Periclymeni s. Caprifolii nomen eidem imposuit.*

- *Thymelæa* affinis *Æthiopica*, Polii montani lutei foliis tomentosis. *Phytogr. Tab. 319. fig. 2.*

- *Thymelæa* (fortè) affinis *Æthiopica*, foliis tridentatis, & ex omni parte hirsutie pubescentibus *Phytogr. Tab. 319. fig. 4.* An *Tlalyxtomium* s. *Yztomium humile Hernandez* apud *Recc. 219.* Fortè etiam *Chamæpitys Orientalis J B. Tom. 3. 297.*

*Thymelæa Capensis* sericeis & longioribus acutis foliis, caule geniculato piloso. *Phytogr. Tab. 229. fig. 4.* An *Thymelæa Æthiopica Passerinæ foliis Breyn. Cent. 1. 10.*

- *Thymelæa Æthiopica* folio Milii Solis, molli & hirsuto *Phytogr. Tab. 318. fig. 7.*
- *Thymelæa* procerior latis subrotundis & brevioribus Myrti sericeis foliis *Prom. Bon. Spei Phytogr. Tab. 323. fig. 6.* An *Thymel. Hispan. latifol. Sch. Bot. 39.*
- *Thymelæa* candicantibus & sericeis foliis, floribus inter folia *Phytogr. Tab. 318. fig. 6.* *Thymelæa foliis candicantibus, serici instar mollibus C B P. 463.* *Tartonnaire Gallo provinciæ Lob. Icon. 371.* *Tartonnaire Massiliensium, Sanamunda 1<sup>a</sup> Clusii J B. Tom. 1. 593.*

*Thymelæa* candicantibus sericeis minoribus, & magis acutis foliis, floribus in ramulorum cymis. *Thymelæa foliis Chamelææ minoribus subhirsutis C B P.* *Sesamoides majus multorum Dalechampii Hist. Lugd. 1669.* *Sanamunda 1<sup>a</sup> Clusii Lob. Icon. part 2. 217.*

- *Thymelæa Africana, Sanamundæ prioris Clusii facie, ex Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 323. fig. 7.*

- *Thymelæa Æthiopica Passerinæ foliis minimis lanuginosa Phytogr. Tab. 319. fig. 1.* An *Sanamunda Africana foliis angustissimis candicantibus Breyn. Cent. 1.* An *Thymelæa Æthiopica, foliis Passerinæ minor Cap. Bon. Spei. ejusd. Breyn. Fascic. rarior Pl.*

*Thymelæa foliis Kali lanuginosis salsis C B P. 463.* *Sanamunda 2<sup>a</sup> Clusii J B. Tom. 1. 594.* *Sesamoides parvum Dalechampii, Sanamunda 3<sup>a</sup> Clusio J B. Tom. 1. 595.* *Thymelæa foliis argenteâ lanugine utrinque nitentibus, An Cneoro albo affinis C B P. 463. (i.e.) Jaceæ Oleæ folio affinis ejusd. C B P. 272.* *Dorychnium Dioscoridis fortè Ponæ Ital.*

*Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ C B P. vid. Scabiosa.*



**THYMUS** vulgaris folio tenuiore *C B P.* 219. Thymum vulgare rigidius, folio cinereo *J B. Tom.* 3. 263. Thymum durius vulgare *Park. variat apicibus pictis.*

Thymus vulgaris folio latiore *C B P.* Thymum durius *Lob. Icon.* Thymus alter durior *Camerar. H. Med.* 169. *cujus exemplar à D<sup>no</sup> Cortene accepimus.*

Thymus repens *Pisanus J B. Tom.* 3. 264. Thymum supinum candicans odoratum *Bot. Monsp.* 254.

Thymum inodorum *C B P.* 219. & *Prodr.* 101. *ubi describitur.*

Thymus capitatus qui *Dioscoridis C B P.* 219. Thymum *Creticum* s. Antiquorum *J B. Tom.* 3. 262. Thymum legitimum capitatum *Park. Th.* legitimum *Clus. Hist.* 357.

Thymus capitatus è *Cithæra* foliis minimis confertis *Phytogr. Tab.* 116. fig. 4. An Thymus capitulis minoribus *Massiliensis H R P.* 175. A Rev<sup>do</sup> D. *Wheler* habuimus.

Thymum majus longifolium, Stæchadis foliaceo capite purpurascente, pilosum *Phytogr. Tab.* 116. Satureia Lagopoides *H. Oxon.* An Kali hirsuto affinis, Anthyllidis fortè aliqua species *J B. Tom.* 3. 705. Fortè Hyssopum montanum *Macedonicum Valerandi Dourez ejusd. Tom.* 3. àn Abs, Abes, aut Gusen *Arabum Anguillare* quærit & ipse *Joan. Bauhinus.* Itèm fortè & Libanotidis species *Rondeletii ejusd. J B. Tom.* 2. 25. (i. e.) Tragoriganum nothum *Dalech. Lugd. C B.* *Phytopin.* 422. At non possum ego (inquit *Joannes*) cum *Fratre*, Tragoriganum *Dalechampii* & Anchusam *Lobelii*; eandem facere plantam, quamvis adhuc in *Pinace* ejusdem sit opinionis, *Una enim frutex est, altera non itèm, &c.*

**THYSSELINUM** s. Apium sylvestre *Park. Th.* Apium sylv. lacteo succo turgens *C B P.* 153. Apium sylv. *Dodonæi* Thysselinum quorundam, planta lacteo succo turgens, locis humidis proveniens *J B. Tom.* 3. 188. *radice divaricatâ.*

Thysselinum palustre foliis tenuius divisis, radice integrâ. Thysselinum palustre foliis ferulaceis *H. Leyd.* 598. Sefeli palustre lactescens *C B P.* 162. Sefeli palustre lactescens acre, foliis Ferulaceis, flore albo, semine lato *J B. Tom.* 3. 188.

**TILIA** vulgaris platyphyllos *J B. Tom.* 1. 133. Tilia fœmina folio majore *C B P.* 426.

Tilia folio minore *J B. Tom.* 1. 137. Tilia fœmina folio minore *C B P. ibid.*

Tilia sylvatica nostras, foliis amplis hirsutie pubescentibus, fructu tetragono, pentagono, aut hexagono. An Tilia fœmina folio majore? *Græcis* Philyra *Guilandino* Phillyrea *Castori.*

Tilia Ulmifolia, semine hexagono *Merett. Pin. rer. nat. Britan.* 118.

Tilia mas foliis Ulmi *C B P.* à quibusdam sterilis existimatur, eò quòd fructum rarius edit.

**TINDA**-parva *H. Malab. Part* 1. Fig. 87. Arbor *Malabarica* baccifera, cortice albicante, glomerato flore *D. Seyne. Raii Hist.* 1569.

**TITHYMALUS** arborescens, caule aphylo *Phytogr. Tab.* 319. fig. 6. Tithymalus ramosissimus frutescens penè aphyllus *P B P.* 381. Tiru-Calli *H. Malab. Part*



Part 2. fig. 44. Planta lactaria, Xabra, & Camorronum *Rhasis*, *Rauwolfii* & *Lagd.* C B P. 293. Felfel-Tavil s. Piper longum *Ægyptium* *Vesling.* Obs. 34. Palàm enim hallucinatur egregius ille Botanicus, *Casp. Bauhinus* in *Pinac.* 412. ubi Piper longum, s. Felfel *Alpino*, idem statuit cum Pipere longo *Floridano*; Cujus pictura habetur in *Phytogr. nostrâ* Tab. 215. fig. 2. Tithymalus aphyllus, Planta *Mauritanica Imperati* 664.

Tithymalus dendroides ex *Codice Cæsareo Dodonæi* *Lugd.* C B P. 290. Tithymalus arboreus aphyllus *J B. Tom.* 3. 676. Ubi minùs rectè Hanc ad Plantam lactariam Xabram retulit. An Tithymalus arboreus *Pr. Alpini* *exot.* 63.

Tithymalus arboreus, floribus atropuniceis, cauliculis purpureis. Tithymalus dendroides *Matthioli* *J B. Tom.* 3. 675. Tithymalus Myrtifolius arboreus C B P. 290.

Tithymalus arboreus *Æthiopicus* *Mezerei Germanici* foliis, flore pallido; *H. Amstelod.* 351. *Phytogr. Tab.* 230. fig. 1.

• Tithymalus dendroides *Linariæ* foliis ex *Insulâ Canarinâ* *Phytogr. Tab.* 319. fig. 5.

Tithymalus *Curassavicus* Myrtifolius, flore Papilionaceo, coccineo parvo *P B P.* *Phytogr. Tab.* 230. fig. 2. Tithymalus (vel Tithymalo affinis, s. similis) aphyllus dictus major *Indicus* latifolius flore sanguineo, aviculæ capitulum representante *Breyn. Prodr.* 2. 100. Tithymalo similis frutescens *Americanus* Myrtifolius, flore difformi rubicundo *H. Amst.* 350. *Annôn fortè sit de Apocynorum genere, hæc planta.*

Tithymalus *Curassavicus*, *Salicis* & *Atriplicis* foliis variis, caulibus viridantibus *P B P.* *Phytogr. Tab.* 112. fig. 6. Tithymalus *Indicus* *Salicis* & *Atriplicis* foliis *Breyn. Prodr.* 2.

Tithymalus *Curassavicus* folio *Cotini* triphyllus, petalis flosculorum ferratis, *Phytogr. Tab.* 230. fig. 3. Tithym. *Sirinamens.* arboreus. *Cotini*, seu *Coccigriæ* foliis & facie *Breyn. Prodr.* 2. Tithym. *Curassav.* folio *Cotini*. *Massinilia sylvestris* *P B P.* 381.

• Tithymalus *Africanus* platyphyllus, hirsuto caule, medio folii nervo in spinulam abeunte, *Tab.* 320. fig. 1. Ben-pala (fortè) *H. Malab. Part* 10. *Tab.* 58. An Tithymalus *Africanus* platyphyllus *Breyn. Cent.* 1. 180.

Tithymalus exoticus, *Carobæ* foliis aliquatenùs accedens; *Phytogr. Tab.* 113. fig. 1. An Tithymalus *Siculus* polycoccus *Portulacæ* folio *Beccon.* 39. Tithymalus baccifer *Hyac. Ambrosini* *Phytogr.* 532. *Cametti* (fortè) *H. Malab. Part.* 5. *Tab.* 45.

Tithymalus arbor *Americanus*, *Mali Medicæ* foliis amplioribus tenuissimè crenatis, succo maximè venenoso *Phytogr. Tab.* 230. fig. 8. *Sub foliorum basi ad pediculos binæ (spinarum instar) nascuntur appendices, quod huic Arbori peculiare videatur.* *Tetlatia Mexicana* *Nieremb.* 340. *Tetlatia* arbor urens; & *Haitini* s. *Guao Hernandez.* apud *Recc.* 98. *Payson-Cree* *Barbadensibus* vulgò. *Aulæ Hamptoniæ* in *Plantarum rariorum ditissimo Horto Regio* collegimus: Et ab *Insulâ Barbadesi* transmissum accepimus *Hùc fortè spectat Frutex arboreus, qui circa Aldeam-Tapizirica luxuriat, Manaca Brasiliensium Pisonis* 184.

Tithymalus *Zeylanicus* spinosus arboreus *P B P.* *Phytogr. Tab.* 230. fig. 4. *Euphorbio* & Tithymalo media affinis aizoides *Indica* arboreus spinosa *Nerii* folio *Breyn. Prodr.* 2. 46. Fortè etiam Tithymalus *African.* arboreus spinosus & foli-



ofus lactescens, & Euphorbium fundens, s. Euphorbium *Africanum* arborescens foliosum & spinosum, *H. Beaum.* 39. *Ela-Calli H. Malab. Part. 2. Fig. 43.* In *HRH. florens, insigne præbet ornamentum.*

*Tithymalus Africanus* arborescens, squamato caule, spinosus ex *Codice Comptoniano Phytog. Tab. 230. fig. 5.* *Tithymali* fortè genus, *Planta lactaria Africana* Pini fructuum facie, *Breyn. Prodr. 2. In H. Med. Chelseiano auspitiis D. Doodii ex seminibus à Promont. Bon. Spei sibi allatis, præterito anno, plurimæ hujus plantulae sunt enutritæ & Teterrimi sunt odoris.*

*Tithymalus Africanus* spinosus *Cerei* effigie ex *Codice Comptoniano Phytogr. Tab. 231. fig. 1.* An *Tithymalus Africanus*, s. *Mauritanicus*, aphyllus, angulosus & spinosus, ex quo *Euphorbium Officinarum H. Leyd.* 598. At malè dicitur *Euphorbium Dodonæi, Figura enim à Dodonæo lib. 12. cap. 21. exhibita, non est Euphorbii, sed alterius Plantæ; Nec Cereus Peruanus spinosus, fructu rubro nucis magnitudine est de Euphorbiorum genere ut proposuit Casp. Bauhinus in Pinac. 458. Neque Jamarú 5<sup>a</sup> Pisonis pro Euphorbio haberi potest, quamvis ille de eâ re incertus dubitaverit.*

• *Tithymalus aizoides lactifluus* s. *Euphorbia Canariensis*, quadrilatera, & quinquelatera *Cerei* effigie, ad angulos per crebra intervalla spinis rectis atronitentibus, *Gazellæ cornua* referentibus, armata. *Phytogr. Tab. 320. fig. 2.* An *Tithymalus quadrangularis spinosus*, s. spinis geminis aduncis, ex eadem sede ortis armatus, succo lacteo acerrimo turgidus *H. Beaum.* 41. Fortè *Rangiferi cornua* referens planta *Zeylanica.* *Sandricalli Zeylan. PBP.* 368. An *Quauh-Cuetz Placuitlapilli Novæ Hispaniæ Terent. apud Recc. 402.*

*Tithymalus aizoides triangularis nodosus & spinosus lacte turgens acri.* *Tithymalus Indicus spinosus & angulosus, lacte turgens acri. H. Beaum. Schadida-Calli Hort. Malab. Part 2 Tab. 42. Ubi à Commelino pro plantâ legitimâ Euphorbium fundente proponitur, & pro varietate tantum præcedentis habemus.*

*Tithymalus Characias Amygdaloides CBP.* 290. Item *Tithymalus Characias* folio lanuginoso *ejusd. ibid. ut Rajo videtur Hist.* 864. Et *Nobis.* Fortè eiam *Tithymalus incanus hirsutus ejusd. CBP.* 292. & *Prodr.* 133. *Tithymalus Characias lanuginosus Moris. Præ lud.* 313. *Tithymalus Characias pratensis incanus Magnol. Bot. Monsp.* 255. *Tithymalus Sylvaticus* toto anno folia retinens, *J B. Hist. Tom. 3. 671.* An *Tithymalus Myrsinites incanus Park. Tithymalus palustris Pisanus Raii Exterar.* 251. Fortè etiam *Tithymalus lunato flore Column. (i. e.) Tithymalus Sylvaticus lunato flore CBP.*

*Tithymalus Characias rubens peregrinus CBP. Tithym. Amygdaloid. s. Characias J B. Tom. 3. 672. Tithymalus Characias primus Clus. Hist. post.* 188. *Tithymalus Characias Monspeliens. Park. Th.*

*Tithymalus Characias ferratus Monspeliensum Park. Tithymalus ferratus Dalechampii J B. Tom. 3. 673. Tithymalus Characias folio serrato CBP.* 290.

*Tithymalus Characias Salicis minoris folio Moris. Præ lud. Bot.* An *Tithym. Salicis angustifolio glabro Sch. Bot.* 126. Ad hoc Plantarum genus duæ illæ *Chucungaricarum Novæ Hispaniæ* species apud *Reccum* 368. & 369. satis propriè referri videntur.

*Tithymalus Lithospermi majoris folio Bot. Monsp. Append.* 305. An *Tithymalus Characias, radice repente Moris. Præ lud.* 313. *Tithymalus*



- Tithymalus latifolius* Cataputia dictus *H. Leyd.* 599. *Lathyris major* *CBP.* 293.  
*Lathyris* s. *Cataputia minor* *J.B. Tom.* 3. *App.* 80. *Lathyris major hortensis*,  
*Park. Th.* *Lathyris* s. *Cataputia major & minor* *Ger. emac.*
- Tithymalus segetum longifolius* *Append. Cat. Cantabrig. Raii Hist.* 868. Qui dubi-  
 um movet, An *Esula minor*, s. *Pityusa* *Ger. emac. Idem cum præcedenti.*
- Tithymalus magnus multicaulis*, s. *Esula major* *J.B. Tom.* 3. 671. *Tithymalus*  
*palustris fruticosus*, *CBP.* 292. *Esula major Germanica* *Park. Th.*
- Tithymalus arvensis latifolius Germanicus* *CBP.* *Tithymalus platyphyllos Fuchsi*  
*J.B. Tom.* 3. *Esula minor Dodonæi.* *Tithymalus peregrinus Clus. Hist.* 189.
- Tithymalus latifolius Hispanicus* *CBP.* 291. *Tithymalus platyphyllos Clus. Hist.*  
*post.* 190.
- Tithymalus Hibernus tuberosus* s. *Mackinbuoy* *Cat. H. Oxon.* 178. *Tithymalus*  
*Hibernus Mackenbuoy dictus Raii Hist. App.* 1888.
- Tithymalus Caracias radice pyriformi Moris. Prælud. Bot.* 313. Succrevit olim in  
*H. Med. Dni. Morgan.* apud *Westmonasterium.* An *Tithymalus tuberosus Germani-*  
*cus* *CBP.* 292.
- Tithymalus tuberosâ pyriformi radice* *CBP. ibid.* *Apios* *J.B.* 3. 666. *Apios* s. *Ti-*  
*thymalus tuberosus* *Park. Th.*
- Tithymalus* s. *Ischas*, *Ranunculi tuberosâ radice*, capsulâ mollitè echinatâ. *Sch.*  
*Bot.* 124.
- Tithymalus verrucosus* *J.B. Tom.* 3. 613. *Tithymalus Myrsinites fructu Verrucæ*  
*simili* *CBP.* 291. Fortè *Peplios* altera species ejusd. *Pin.* 292. (i. e.) *Tithyma-*  
*lus Epithymi fructu Fab. Column. ecphr. part.* 2. 51. An *Tithymalus folio longo*  
*glauco*, caule rubro seminibus verrucosis *Raii exterar.* 106.
- Tithymalus Myrsinites* *J.B. Tom.* 3. 674. *Park. Th.* 187. *Tithymalus Myrsinites*  
*latifolius* *CBP.* 290. Item *Tithymalus angustifolius Myrsinites* ejusd. *Raii Hist.*  
 865. *Tithymalus Myrsinites legitimus Clus. Hist.* 2. 189.
- Tithymalus paralius* *J.B. Tom.* 3. 674. *Tithymalus maritimus* *CBP.* 291 *Tithy-*  
*malus paralius* s. *maritimus* *Park. Th.*
- Tithymalus maritimus arboreus Juniperi foliis ex cinereo purpurantibus.* *Tithy-*  
*malus maritimus Juniperi folio* *Bocc. de Pl. Sicul.* 9.
- Tithymalus argenteus maritimus leptophyllos Lælii Triumphetti Cat.* apud *Fratr.* 65.
- Tithymalus maritimus Barbadenfis & Bermudensis* s. *Paralius minor Americanus* ra-  
 mosissimus *Phytogr. Tab.* 229. fig. 7. Fortè *Sanamunda Africana* *Park. Th.* 203.
- Tithymalus maritimus spinosus* *CBP.* *Tithymalus spinosus Creticus* *Pr. Alpin. exot.*  
 303. *Tithymalus maritimus spinosus Creticus* *Park. Th.* 184. *Tithymalus spi-*  
*nosus Naupactæus Vheleri. Itiner.* *Tithymalus Ragusinus* flore luteo pentapetalo  
*H. Leyd.* 600. *Esula fruticosa Ragusina Ciasii. Fascic. Herbar. Mich. Nutii* pag. 33.
- Tithymalus pusillus frutescens*, sarmentis longis, tanquàm spinis armatus. *Ment-*  
*zel. Pugil. Rarior.* Item *Esula minor frutescens spinis longis horridis ejusd. ibid.*  
*Glastivida altera Belli epist.* 4. ad *Clusium.*
- Tithymalus montanus non acris* *CBP.* Qui huc refert *Esulam dulcem Tragi &*  
*P. tyusam* s. *esulam minorem alteram rubris floribus* *Lob. Lugd.* *Tithymalus non*  
*acris flore rubro* *J.B. Tom.* 3. ubi optimè descriptam invenies.
- Tithymalus*, fortè dictus *Lucæ Ghino Pityusa*, quibusdam *Characias Pannonicus*  
 A a 2 *J.B. Tom.*



*J.B. Tom. 3. 665. Tithymalus Characias rubens Germanicus C B P. 290. Ejusdemque. Tithymalus Characias angustifolius ex sententiâ Raii Hist. 865. Tithymalus Characias angustifolius Park. Tithymalus Characias 3<sup>ius</sup>. Austriacus Clus. Hist. 2. 188.*

*Tithymalus Amygdaloides angustifolius Tabern. Icon. 591. Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio C B P. 291.*

*Tithymalus Cyparissias C B P. 261. J.B. Tom. 3. 663. Tithym. Cyparissias Dodonæi Hist. Lugd. 1648. Item Tithym. Cyparissias Matthioli ejusd. 1644. ubi pictura accuratior habetur. Tithymalus Cupressinus s. Humi-pinus Lob. Icon. 356.*

*Tithymalo Cyparissiae similis, Pityusa multis J.B. Tom. 3. 665. Tithymalus foliis Pini, fortè Dioscoridis. Pityusa C B P. Esula minor Dodonæi Hist. Lugd. 1653. Tithymalus Pineæ, s. Esula minor Park. Th. 192. quoad Iconem. Descriptio enim ad proximè præcedentem plantam, magis convenire videtur.*

*Tithymalus foliis brevibus aculeatis C B P. 292. Tithymalus annuus Lini folio acuto Bot. Monsp. 256. An Pityusa Matthioli s. Esula major Hist. Lugd. 1652. Tithymalus Cyparissias vulgaris Park. quoad figuram in Theatro Botan. 193. Descriptio autem priori respicit. An Tithymalus Linifolius, Paralio congener. ejusd. Park. 185.*

*Tithymalus Tingitanus elatior, lunato flore, Linariæ foliis creberrimis. Tithymalus Linariæ folio, lunato flore Moris. Prælod. 313. Tithym. Tingitan. Linariæ foliis, lunato flore H. Leyd. 600. Fortè etiam Tithymalus folio Linariæ lunato flore Column Ecphr. An Tithymalus Myrsinites 3<sup>us</sup>. angustifolius Tabernæmont. Icon. 592.*

*Tithymalus s. Esula exigua C B P. 291. Tithymalus minimus angustifolius annuus J.B. T. 3. 664. Tithymalus leptophyllos Park. Th. 193. Tithymalus exiguus erectus H. Leyd. 602. An Tithymalus annuus Pityusæ facie Lob. Obs.*

*Tithymalus exiguus saxatilis C B. prodr. Bot. Monspel. 259. J.B. Tom. 3. 664. Fortè Esula minima Montis D. Juliani Belluc. H. Pisan. 23.*

*Tithymalus maritimus purpureo colore procumbens, Peplis dictus. Peplis Clus. Hist. 2. 187. J.B. Tom. 3. 668. Park. Th. 193. Peplis maritima folio obtuso C B P. 293.*

*Tithymalus helioscopius Park. Th. 188. C B P. 291. Tithymalus helioscopius s. Solisequus J.B. Tom. 3. 669. Tithym. subrotundis foliis majoribus crenatis H. Leyd. 600.*

*Tithymalus rotundis foliis non crenatis H. Leyd. ibid. Peplos s. Esula rotunda C B P. 692. J.B. Tom. 3. 669. Esula rotunda s. Peplus Park. Th. 193.*

*Tithymalus exiguus procumbens Chamæsyce dictus H. Leyd. Chamæsyce C B P. Tithymalus procumbens Chamæsyce villosa major, cauliculis viridibus. Chamæsyce J.B. Tom. 3. 697. Hujus & habetur varietas minor.*

*Tithymalus s. Chamæsyce altera Virginiana foliis crenatis & maculâ fuscâ elegantèr notatis Phytogr. Tab. 65. fig. 8. Quadraginti ferè abhinc annis in Horto D. Walkeri, observavimus. Fortè Chamæsyce Americana minor Paronychiæ Hispanicæ Clusii facie, foliis Serpylli serratis Breyn. Prodr. 2. 31.*

*Tithymalus Indicus annuus dulcis, floribus albis, cauliculis viridantibus P B P. Phytogr. Tab. 113. fig. 2. Chamæsyce Americana major, floribus glomeratis Cynocrambes folio glabra Breyn. Prodr. 2. Caacica Brasiliensibus, seu Peplis major flosculis*



Hosculis albis *Marcgr. Hist. fol. 15.* An fortè *Beli-Tsjira H. Malab. Part 9. Tab. 84.* Idem majoribus ferratis foliis, cauliculis rubentibus. *Memeya (fortè) Tepecuacuilienfis Nieremberg. Hist. nat. 317.*

*Tithymalus Botryoides major Zeylanicus* procumbens, foliis & cauliculis villosis.

*Tithymalus Botryoides minor Americanus* foliis hirsutis. *Chamæsyce Americana* major, floribus glomeratis, *Cynocrambes folio*, hirsuta *Breyn. Prodr. 2. 31.* *Caa-cica Brasiliens.* Erva de Cobra *Lusitanis Marcgr. Fol. 7.* Fortè etiam *Caicotten Pala H. Malab. Part 10. Tab. 33.* Etsi *Commelino* in *Not.* Species hæc planta *Veronicæ* videretur; & *Veronicæ* similis *Indica*, albicante flore, ab illo (meâ quidem sententiâ) minùs rectè nominatur.

*Tithymalus esculentus Botryoides cordatis foliis Indiæ Orientalis Phytogr. Tab. 118. fig. 6.*

*Tithymalus botryoides Maderaspatensis Hyperici* foliis non crenatis, floribus ex alis, uno versu convenientibus. *Phytogr. Tab. 43. fig. 7.*

*Tithymalus botryoides Malabariensis* latiori folio, floribus in Surculorum cymis *Nir-Cottam-Pala H. Malab. Part 10. Tab. 51.* *Tithymalus Malabaricus Androsæmi folio*, flore rubro *Commelin. supr. loc.*

• *Tithymali facie planta Æthiopica*, Ilicis aculeato folio. *Phytogr. Tab. 319. fig. 7.*

**TORDYLIUM** maximum *Sphondylii* semine aculeato *Morif. Umb. 40.* *Tordylium majus vulgare*, seminibus limbo quasi lævi *ejusd. Umb. 66.* *Caucalis maxima Sphondylii* semine aculeato *C B P. 152.* Itè *Seseli Creticum majus ejusd. in Pin. 161.* *Caucalis major Clusio ejusd. ibid.* *Seseli Creticum* s. *Tordylium majus Park. Th. 905.*

*Tordylium Syriacum* semine majore granulato. *Tordylium minus*, limbo granulato *Syriacum Morif. Umb. 37. & 40.* *Gingidium foliis Pastinacæ latifoliæ C B P. 151.* *Caucalis Syriaca cùm maximo semine. JB. Tom. 3. 86.* *Gingidium latifolium Syriacum Park. Th. 890.*

*Tordylium Narbonense minus Elem. Bot. Tom. 1. 271.* *Tordylium* s. *Seseli Creticum*, minus *Park. Th. 905.* *Seseli Creticum minus C B P. 161.* *Caucalis minor pulchro semine*, s. *Bellonii JB. Tom. 3. 84.* Fortè etiam *Caucalis Lusitanica Pr. Alpini exot. 309.*

*Tordylium majus alterum luteum*, λεῖόκαρπον *Fab. Column. ecphr. part 1. 122.* *Seseli Creticum fructu majore C B P. ibid.*

*Tordylium mimimum Apulum. Column. ecphr. 124.* *Seseli Creticum minimum C B P. 161.* *Seseli Apulum Creticum minimum Park. Th. 905.*

Τερχυλίον Arbor *Americana* baccas ferens tetracapsulares, singulis capsulis bina semina includentibus. *Phytogr. Tab. 230. fig. 6.* *Shag-barke Barbadosibus dicta*, eo quod in hac Arbore, cortex scabritie valdè asperatus est. An *Fraxinus Indica Bontii lib. 6. c. 13.* Arbor *Javanensis* foliis *Fraxini Jonst. Dendrolog. 291.*

*Trachylepos altera Americana* foliis longis mucronatis *Phytogr. Tab. 230. fig. 7.*

**TRAGOPOGON** flore luteo *JB. Tom. 2. 158.* *Tragopogon pratense luteum majus C B P. 274.*

*Tragopogon flore purpureo JB. ibid.* *Tragopogon purpureo-cæruleum Porrifolio*, quod *Artifi* vulgo *C B P. ibid.* *Gerontopogon* s. *Sassifraga Italarum Hist. Lugdunens.*  
Tragopogon



Tragopogon purpuro-cæruleum Crocifolium *CBP.* 275. Tragopogon Crocifolium montanum flore nigro-purpureo *Column.*

Tragopogon alter gramineo folio, suaverubente flore *Fab. Column. ecphr.* Tragopogon gramineis foliis hirsutis *CBP. ibid.* Tragopog. *Apulum* suaverubens *Park. Th.*

**TRAGORIGANUM** Thymi latioribus foliis subtus incanis, flore magno suaverubente. Tragoriganum latifolium *CBP.* 223. Marum *Cortusi* *J. B. Tom. 3.* 423. Tragoriganum latifolium s. Marum *Cortusi Matthiolo Park. Th.* Thymum *Creticum* frutescens Marum fortè odoratissimum foliis Serpylli incanis *Breyn. Prodr. 2.* 99.

Idem minus & humilius.

Tragoriganum foliis Thymbræ majoribus duris nigricantibus punctatis, flore purpureo minore. Tragoriganum *Creticum CBP.* 223. Tragoriganum *Creticum* majus foliis asperioribus *Pr. Alpin. exot.* 79. Tragoriganum quibusdam nigrius, folio duro, flore purpureo *J. B. Tom. 3. lib.* 28.

Tragoriganum *Creticum* minus & tenuius *Pr. Alpin. exot.* 79. Tragoriganum angustifolium *CBP.* Tragoriganum *Hispanicum Park. Th.* Tragoriganum tenuioribus foliis, flore candido *J. B. Tom. 3.* Tragoriganum alterum *Clus. Hist.* 355. Tragorigan. 2<sup>m</sup>. *Clusio Hist. Lugd.* 890.

**TRIBULUS** terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato *CBP.* 350. Tribulus terrestris *J. B. Tom. 2.* 352.

Tribulus terrestris *Americanus* Argemones flore flavo *Phytogr. Tab.* 67. fig. 4. Tribulus terrestris major *Curassavicus. PBP.* 382. Tribulus terrestris *Americanus* Chamæcisti flore, fructu spinoso maximo *Breyn. Prodr. 2.* 100. *ex quinque velut triangulis conflato. Ab insigni Botanico D.D. Tancred Robinsono accepimus, qui in Hortis Bataviscollēgit, sed absque nomine.*

Tribulus terrestris trifoliatus *Creticus*, flore purpurorcæruleo, caule ad genicula quaternis spinis, aculeato. Trifolium spinosum *Creticum CB. prodr. sub* 15. *descriptum.* Trifolium spinosum *Creticum* ὀπσιτοχυετο *Belli Clus. Hist.* Fagonia *Cretica* spinosa *D. Turnesfort. Elem. Bot. Tom. 1.* 231. Cujus & alteram speciem, seminum integumento lævi, & caule spinis planè destituto, invenit in *Hispaniâ* Idem *Turnesfortius*, cui Fagonia *Hispanica* non spinosa, pro nomine imposuit.

**TRIBULUS** aquaticus, cujus Fructus sunt aculeis, tricuspidati. Tribulus aquaticus *CBP.* 194. *J. B. Tom. 3.* 775. & aliorum. Oris foliorum lævibus.

Tribulus aquaticus foliis ferratis *Malabaricus.* Panover-Tsjerava *H. Malab. Part 11. Tab. 33.* pro *Hedera palustri* habetur *Commelino Not. in loc.*

**TRIFOLIUM** pediculis foliorum longissimis *Bisnagaricum Phytogr. Tab.* 68. fig. 2. An Spica trifolia *Pr. Alpini exot.* 169.

Trifolium filiquosum rotundifolium glabrum, floribus luteis è *Maderaspatân. Phytogr. Tab.* 231. fig. 4.

Trifolium corniculatum minus supinum, & incanum filiquâ singulari *Maderaspatanum Phytogr. Tab.* 231. fig. 5. An Melilotus *Syriaca* s. *Cbalepensis* major coronata



coronata filiquis biuncialibus *Moris. Icon. Sect. 2. Tab. 16. numo 13.* An nostra saltèm sit Hujus species minor & procumbens.

Trifolium filiquosum Loto affine *Maderaspatense*, filiquis longis ex adverso binis propendentibus. *Phytogr. Tab. 113. fig. 8.*

Trifolium filiquosum Loto affine argenteum, flore luteo. Trifolium argentatum floribus luteis. *J B. Tom. 2. 359.* Lotus fruticosus incanus filiquosus *C B P. 332.* Lotus asperior fruticosior *Park. Th.* An Trifolium glutinosum Saxatile argenteum flore odorato *Zanon.* quærit *Celeberr. Rajus Hist. Pl. 969.* Cytisus humilis argenteus angustifolius *Elem. Bot. Tom. 1. 508.*

Trifolium filiquosum, Loto affine, filiquis Ornithopodii. *Phytogr. 68. fig. 1.* Trifolium filiquis Ornithopodii nostras *Raii Syn. ps.* Trifolium Meliloto affine Ornithopodii filiquis *Raii Hist. Pl. 952.* Trifolium pumilum supinum flosculis longis albis. *Phytolog. Britan. 125.*

Trifolium album tricoccum subterraneum reticulatum *Moris. Hist. 2. 138.* Trifolium semen sub terram condens *HRP. 180.* Trifolium subterraneum s. folliculos sub terram condens *Bot. Monsp. 265.* Trifolium hirsuto stellato capite, sub terram se condente perenne *Grisleii Viridar. Lusitan.* Trifolium parvum album *Monspessulanum* pilosum, cum paucis floribus *J B. Tom. 2. 380.*

Trifolium bitumen redolens *C B P. 327.* Trifolium Asphaltites odoratum *J B. Tom. 2. 366.* Trifolium bituminosum s. Trifolium cæruleum, aut violaceum bitumen redolens *Moris. Hist. 2. 136.*

• Trifolium *Æthiopicum* ex alis foliorum spicatum, bituminosi foliis angustioribus, s. Trifolium spicatum tenuifolium *Cap. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 320. fig. 3.* An Trifol. asphaltites alterum *Grisleii.* An Lagopus *Africanus* multicaulis, spicâ rigidiusculâ. An fortè Tlallantlaca Cuitlapilli *Nov. Hispan. s. Trifolium Tetraphyllon Terentii* apud *Recc. 281.*

Trifolium pratense album vulgare odoratum *Moris. Hist. 2. 137.* Trifol. pratense album *C B P. 327.* Trifolium pratense flore albo minus & Fæmina glabrum *J B. Tom. 2. 380. Variat flore carneo.*

Trifolium phæum fuscum luxurians quaternis, quinis & senis foliis *Moris. Hist. 135.* Quadrifolium hortense album *C B P. ibid.* Trifoliis affine Quadrifolium phæum *Lobelii J B. Tom. 2. 380.*

Trifolium album, umbellâ filiquosâ *Meretti Pin. rer. nat. Britan. 120.* An Trifolium pratense album, filiqua bivalvi, caule fistuloso, folio subtus nigro-purpureis maculis notato *Moris. Præ lud. 314.*

Trifolium pratense hirsutum majus flore albo-sulphureo, s. *ὄχρεοχάμο Raii Hist. Pl. 943.* Trifolium Lagopoides annuum hirsutum, pallidè luteum s. Ochroleucum *Moris. Hist. 141.*

Trifolium pratense album à *Fuchfio* depictum s. mas *J B. Tom. 2. 349.* Alii Botanici ut rectè notat *Celeberr. Rajus* Speciem hanc cum albo vulgari confundunt, à quo tamèn diversissima est. *Raj. Exterar. 108.* An Trifolium montanum album *C B P.* Trifolium majus flore albo incanum. *Clus. Hist.* Trifolium montanum majus flore albo *Park. Th. 1103.*

Trifolium pratense purpureum majus *Raii Hist. 944.* Trifolium majus *Clusii* secundum, non album sed rubrum *J B. Tom. 2. 375.* Trifolium montanum purpureum



- pureum majus, *C B P.* 328.
- Trifolium pratense purpureum C B P.* 327. *Trifolium purpureum vulgare J B.* *Tom.* 2. 374.
- Trifolium montanum majus purpureum Park. Th.* 1102. *Trifol. majus 3<sup>m</sup>. Clus. Hist.* 2. 245. *Trifolium spicâ longâ rubrâ C B P.* *Trifolium majus 3<sup>m</sup>. purpureum Clusio J B. Tom.* 2. 375. *The Great Dutch Clover, Variat etiam flore, qui purpureus reperitur & albus.*
- Trifolium Americanum C B P.* 327. *Trifolium Americum Lobelii Icon. Part.* 2. 31. *Loti sylvestr. genus latifolium ex Americâ Cæsalp. Tlalamatl s. Morbi Gallici dolorem sedans, & Herba Joannis Infantis Hernandez. apud Recc. lib.* 8. *cap.* 68.
- Trifolium purpureum montanum, radice reptratrice dulci, capitulo magno compressiusculo. Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 2. *Trifolium Glycyrrhizites Park. Th.* 1105. *Trifolium dulce montanum Monspeliensibus Raii Hist.* 956. *Fortè Lagopus supinus, capite compresso Grisleii Viridar. Lufit.*
- Trifolium Alpinum Rhæticum Astragaloides J B. Tom.* 2. 376. *Trifolium angustifol. Alpinum Park. Th.* 1104. *Trifolium Alpinum flore magno, radice dulci C B P.* 328.
- Trifolium Lagopoides majus hirsutum capitulo brevi Phytogr. Tab.* 231. *fig.* 3. *Lagopus Hispanicus major Clusii Hist.*
- Trifolium globosum s. capitulo Lagopi retundiore C B P.* 329. *Trifolium capitulo glomerato rigido. J B. Tom.* 2. 378.
- Trifolium globosum repens C B P. ibid. quod* 18. *in Prodr.* 143. *Accepi hujus exemplar ab insigni Botanico D. Jacobo Bobart. Trifolium glomerulis Personatæ Cherleri J B. ibid.*
- Trifolium Lagopoides minus folio acuto non crenato, flore minore dilutè purpureo Morif. Hist.* 141.
- Trifolium arvense humile spicatum, s. Lagopus C B P.* 328. *Trifolium Lagopoides purpureum arvense humile annuum, s. Lagopus minimus vulgaris Morif. Hist.* 2. 141. *Lagopus trifolius quorundam J B. Tom.* 2. 379.
- Trifolium montanum, spicâ longissimâ rubente C B P.* 328. *Trifolium purpureum majus, folio & spicâ longiore. J B. Tom.* 2. 375. *Lagopus major folio pinnato Park. Th.* *Trifolium purpureum, montanum, pinnatum, Lagopoides, spicâ longissimâ Morif. Histor.* 2. 140.
- Trifolium spicâ subrotundâ rubrâ C B P. ibid.* *Lagopus maximus flore rubro Park. Th.* 1106. *Trifolium albo-incarnatum spicatum, s. Lagopus maximus J B. Tom.* 2. 376. *Trifolium purpureum purpureum annuum, folio hirsuto rotundo, Trifolii pratensis albi formâ Morif. Hist.* 140. *Item Trifolium purpureum Lagopoides hirsutum annuum rotundifol. spicâ dilutè rubente ejusd. Morison. ibid.*
- Trifolium purpureum Lagopoides, hirsutum annuum, angustifolium, spicâ dilutè rubente Morif. ibid.* *Trifolium angustifolium spicatum J B. Tom.* 2. 376. *Trifolium montanum angustifolium C B P.* *Lagopus major angustifolius Park. Th.*
- Trifolium stellatum, C B P.* 329. *Trifol. stellatum Monspelianum Park. Th.* *Trifolium stellatum purpureum Monspessulanum J B. Tom.* 2. 376.
- Trifolium stellatum glabrum Ger. emac. Raii Hist.* 945. *Trifolium capitulis Dipfaci quorundam; ejusd. ibid.* *Hujus picturam videsis in Phytogr. Tab.* 113. *fig.* 4.
- Trifolium



Trifolium cujus caules ex geniculis, glomerulos oblongos proferunt *J B. Tom. 2.*

378. Trifol. dilutè purpureum, glomerulis florum oblongis, sine pediculis caulibus adnatis *Raii Cat. Angl. 292.*

Trifolium capitulo oblongo aspero *C B P. 329. Park. Theatr.*

Trifolium pumilum *Bisnagaricum* argenteo nitore sericeum, capitulis oblongis hispidis *Phytogr. Tab. 69. fig. 1.*

Trifolium parvum hirsutum, flore parvo dilutè purpureo in glomerulis oblongis, semine magno *Raii Hist. 945.* Trifolium nodiflorum glomerulis mollioribus, & rotundioribus, semine magno *ejusd. Cat. Angl. 292.*

Trifolium supinum cum glomerulis ad caulium nodos globosis, floribus purpurantibus *Raii Hist. Phytogr. Tab. 113. fig. 5.* Item Trifol. cum glomerulis ad caulium nodos rotundis *ejusd. Cat. Angl. 292.* Trifolium parvum rectum, flore glomerato cum unguiculis *J B. Tom. 2. 378. cum Icone.* Meritò autèm quærat<sup>ur</sup> (*inquit Celeberr. noster Rajus*) cur rectum dicat, cum in descriptione caulem supinum ei attribuit. An Trifolium capitulis Thymi, *C B. prodr. 140.* Fortè etiam Trifolium nodosum capitulis Thymi *Moris. Cujus Icon non omninò respondet.* Trifolium capitulis globosis sine pediculis caulibus adnatis *Raii Cat. Exterar. 108.*

Trifolium pratense folliculatum *C B P. 329.* Trifolium pratense *Salamanticum Clusio Park. Th. 1111.* Trifolium folliculaceum s. vesicarium minus purpureum *J B. Tom. 2. 379.* An Trifolium fragiferum s. vesicarium floribus nitidis rubellis *Raii Cat. Ext. 108.*

Trifolium *Hispanicum* caliculis spumosis, s. folliculaceum minus, flore niveo. An fortè Trifolium *Salmanticensi* affine *Morison. Præ lud. Bot. 211. & 315.*

Trifolium vesicarium ampullatum, rubello flore *Moris. Præ lud. 315.* An Trifolium aliud parvum cum glomerulis lignosum *J B. Tom. 2. 379.* Trifolium minimum supinum, flosculorum & feminum globulis plurimis confertim ad radicem nascentibus *Raii Hist. Pl. 942.*

Trifolium fragiferum *Friscum* folio cordato, flore rubro, *Moris. Hist. 144.* Trifolium fragiferum *Friscum Clus. Cur. Posterior. C B P. 329. Park. Th.*

Trifolium fragiferum tomentosum *Bot. Monsp. 365.* Trifolium glomerulis tomentosus per caulium longitudinem *J B. Tom. 2. 379.* Trifolium fragiferum *Lusitanicum* tomentosum. *Park. Th. 1109.* An Trifolium capitulo spumoso lævi *C B P. 329.*

TRIOPTERIS *Indiæ Orientalis* s. Arbuscula Amygdalæ nanæ folio, dispermos, filiquâ *Thlaspeos Dioscoridis*, ternis amplioribus extantibus alis donata. *Wænella Ceylanensibus* dicta.

Triopteris *Jamaicensis* angusto Salicis folio, fructu minore fusco.

TRITICUM spicâ muticâ *Park. Th. 119.* Triticum hybernum aristis carens *C B P. 21.* Triticum vulgare glumas trititando deponens *J B. Tom. 2. 407.*

Triticum spicâ & granis rubentibus *Raii Hist. 1237.* Tritici hyberni aristis carentis genus primum, *Ægæ Veteribus, Robus Columellæ C B P. Synops. Stirp. Brit. 177.*



Triticum spicâ & granis albis *Raii. ibid.* Triticum Siligineum *CB. Theatr. Bot. Græcorum & Galeni Σιλίγνις*, Hippocrati Τρύλις *ejusd.* *White Wheat* Utrumque hoc genus spicam aristatam interdum promit. Habetur etiam Triticum rubrum spicâ albâ aristatâ & non aristatâ, quod spurium, & ambiguum quoddam genus est inter album & rubrum; ut satis curiosè annotavit *Eruditiss. Rajus Synops. Stirp. Britan. 177.*

Triticum multiplici spicâ *CBP. 21. Park. Th. 1119.* Triticum cum multiplici spicâ, glumas facile deponens *J. B. Tom. 2. 408.* Triticum Michuacanense *Hernandez apud Recc. 247.*

Triticum multiplici spicâ, caule medullâ farcto *Raii Synops. Hujus specimen eruditus ille, & in re Botanicâ admodum versatus Vir, D. D. Moulin qui illud in Angliâ nostra observavit, & Cl. Rajo primum ostendit, nobis etiam humanissimè communicavit.*

Triticum aristis munitum, rubentibus granis, & spicâ glumis lævibus & splendentibus *Raii Hist. 1238.* Triticum aristis munitum *Park. Th. ibid.* *Red ear'd-bearded Wheat.*

Triticum aristatum, spicâ maximâ cinericeâ, glumis hirsutis nostras *Raii Hist. 1238.* Triticum cinericeum, maximis aristis donatum, glumas trititando deponens. *J. B. Tom. 2. 408.* An Triticum typhinum, simplici folliculo *CBP. 21.* Typha *Dodonæi Park. Th. 1125.* Fortè etiam, Triticum longioribus aristis, spicâ cæruleâ *CBP. ibid. (i.e.)* Triticum lucidum *Park Th. 1119.*

Triticum Polonicum *H. Oxon. Phytogr. Tab. 231. fig. 6.* Ab ingeniosissimo Hortulano *D. Harrison* accepimus, Triticum majus glumâ foliaceâ *D. Bobart. Qui dubium movet. An sit Triticum speciosum grano oblongo J. B. vid. Raii Synops. app. 236.*

Triticum longioribus aristis, spicâ albâ *CBP. 21.*

**TSJERIAM**-Cottam *H. Malab. Part 5. Tab. 11.* Frutex *Indicus* baccifer, fructu racemoso cuspidato Ribium simili monopolyreno *Raii Hist. Pl. 1596.*

**TSJEROU**-Kanneli *H. Malab. Part. 5. Tab. 50.* Arbuscula *Indica* baceifera, floribus hexapetalis plurimis simul in surculis, fructu tricocco.

**TSJOCATI** *H. Malab. Part 5. Tab. 48.* Frutex baccifer. *Malabaricus*, fructu calyculato tetracocco umbellato *Raii Hist. Pl. 1572.*

**TULIPA** præcox lutea *CBP. 57.* Tulipa præcox flava *J. B. Tom. 2. 666.*

Tulipa præcox rubra *CBP. ibid. J. B. ibidem.*

*Tuliparum præcocium, serotinarum & dubiarum, penè innumeræ varietates, pulcherrimis floribus coloribus jucundè ridentes inquit Cl. Hermannus H. Leyd. 610.*

Tulipa serotina, ramosa major, flore rubro *CBP. 61.*

*Caulis aliis etiam Serotinarum generibus interdum πολύκλων & ramosus est, quod proculdubio accidentarium est, & Soli ubertati, plantæque luxurie, tribuendum putat D. Rajus Hist. Pl. 1147.*

Tulipa serotina ramosa maxima, flore pleno flavo-vario *H. Leyd. 610.*

Tulipa serotina ramosa maxima, flore simplici fimbriato flavo vario *ejusd. ibid. Psittacus vulgò.*

Tulipa



*Tulipa centifolia* Robert. Icon. *Pæonisco* nostratibus dicta. *Tulipa miniata* flore pleno *H. Eyst. Moris. Hist.* 2. 399.

*Tulipa minor lutea Italica* C B P. 63. *Tulipa lutea Bononiensis* J B. Tom. 2. 678. *Tulipa Bononiensis* flore luteo Park. Th. Et aliquando ramosam evadit.

*Tulipa variegata Persica* C B P. 64. *Tulipa Persica præcox* Clus. Cur. poster.

*Tulipa Persica minor altera Clusii* C B P. 64.

*Tulipa peregrina* angustissimis foliis, radice reticulatâ. Hort. D. Darbii.

**TULIPIFERA** *Virginiana* tripartito Aceris folio, mediâ laciniatâ, velut abscissâ *Phytogr. Tab.* 117. fig. 5. & *Tab.* 248. fig. 7. Arbor *Tulipifera Virgin.* Aceris majoris folio, conis erectis *Raii Hist.* 1798.

*Tulipifera Caroliniana* foliis productioribus magis angulosis. Mas. Corten. *Phytogr. Tab.* 68. fig. 3. Fortè *Mecpalxochi-Quahuitl Mexicensibus* Hernandez. apud Recc. 383. & 459.

*Tulipifera Virginiana*, Laurinis foliis, aversâ parte rore cæruleo tinctis, Coni-baccifera. *Phytogr. Tab.* 68. fig. 4. *Laurus Tulipifera* baccis rubellis, cono erecto inclusis *Banisteri Cat. Virgin.* *Laurus Tulipifera*, foliis subtus ex cinereo aut argenteo-purpurantibus *Raii Hist.* 1798. Flores sunt suaviter odorati. An *Yoloxochitl Aristochyea* Hernandez apud Recc. fol. 40. Habetur ab Indigenis maximo pretio tum ob medicos usus tum ob floris ejus aspectum, & odoris præstantiam. Fortè Idem cùm *Eloxochitl Nov. Hispan. Terentii* apud Recc. 376. Nostra tamen est Arbor sempervirens.

*Tulipiferæ* Laurinis foliis facie, Arbuscula *Jamaicensis*, flosculis corymbosis.

**TYPHA** palustris major C B P. 20. *Typha palustris maxima* Park. Th.

*Typha palustris media* J B. Tom. 2. 540. *Typha palustris clavâ gracili* C B P. *Typha minor* Park. Th.

*Typha palustris minor* C B P. 20. *Typha minor* J B. Tom. 2. 540. *Typha minima* Park. Th.

V.



**VALERIANOIDES** *Alpinum Trachelii* folio, floribus cæruleis. *Trachelium umbelliferum cæruleum* Ponæ. Ital. *Cervicaria Valerianoides cærulea* C B P. 95. *Rapuntium umbellatum* Fab. Columnæ ex sententiâ D. *Raii Hist.* 745. sed maximè *Hallucinatus* est C. *Baubinus* ubi hanc plantam *Telephio* floribus purpureis *Lob. Icon.* 389. eandem faceret in *Pinac.* 287. Cum sint plantæ diversissimæ.

*Valeriana rubra* *Dodonæo* Park. Th. *Valeriana rubra* C B P. 165. *Valeriana latifolia rubra* J B. Tom. 3. 211. Variat flore candido.

*Valeriana rubra angustis & longioribus foliis* *Phytogr. Tab.* 232. fig. 3. *Valeriana rubra*



- rubra angustifolia *JB. Tom. 3. 211*. *Lychnidis rubrae Valerianae rubrae dictae alterum genus, oblongo & angusto folio CB. Phytopin. An Valeriana marina angustifolia, s. minor rubra. Moris. Umb.*
- Valeriana rubra angustis & brevioribus Lini foliis. Valeriana rubra angustifolia CB. Pin. & in Prodr. descript. A præcedenti admodum distincta est, ut rectè nos monuit D. Sherard.*
- Valeriana major odoratâ radice JB. T. 3. 209. Valeriana hortensis, Phu Olufatri folio CBP. 164. Phu majus s. Valeriana major Park. Th.*
- Valeriana sylvestris, magna, aquatica. JB. Tom. 3. 210. Valeriana sylv. major CBP. Quærendum hinc proponit Cl. Rajus Hist. 388. An ab hac, specie differat: Valeriana sylvestris maj. montana. ejusdem CBP.*
- Valeriana palustris minor CBP. 184. Valeriana minor pratensis vel aquatica JB. T. 3. 211.*
- Valeriana sylv. s. palustris minor altera Raii Synops. 98. Cum priore, quâ omnibus suis partibus major est exceptis floribus, qui quintuplò minores sunt, & densius stipati quàm illius. An Valeriana sylv. major altera, folio lucido HRP. 181. Fortè etiâ Valeriana palustris media, parùm laciniata, quæ 2<sup>a</sup> in Prodr. 86. CBP. 164.*
- Valeriana Alpina, foliis integris, radice repente, inodora. Raii Cat. Stirp. exterar. 259.*
- Valeriana Alpina minor. planta palmaris CBP. quæ 5<sup>a</sup> in Prodr. Phytogr. Tab. 231. fig. 7. An Montana Nardus Lob. Icon.*
- Valeriana Alpina minima, planta ut plurimum uncialis & biuncialis ex H. Patavin. collecta Phytogr. Tab. 231. fig. 8.*
- Valeriana Alpina prima, CBP. cujus Icon. exhibetur in Prodomo 86. Valeriana alpina JB.*
- Valeriana Alpina Scrophulariæ folio, quæ 4<sup>a</sup> in Prodr. CBP. 164. Valeriana sylvestris Alpina 1<sup>a</sup> latifolia Clus. Hist. posterior. 55. Valeriana Alpina folio Scrophulariæ JB. Tom. 3. 208.*
- Valeriana maxima, Cacaliæ folio D. Fagon. Sch. Bot. Phytogr. Tab. 232. fig. 1. Hujus folia inferiora sunt indivisa, penè rotunda, crenata Cacaliæ instâr. In hortulo Villari cultissimo D. du Bois ad Mitchamiam Vicum agri Surriensis collectam habuimus. An Valeriana montana, subrotundo folio. CBP. 165.*
- Valeriana Virgæ aureæ foliis Virginiana D. Banister.*
- Valeriana Cretica tuberosa Park. Th. 120. Valeriana bulbosa JB. Tom. 3. 207. An Nardus Cretica. Filipendulæ radice CBP. 165. Nardus montana Cretica Pr. Alpini 133. Ubi figura huic nostræ optimè convenit.*
- Valeriana Nardus Celtica dicta Raii Hist. Pl. 391. Nardus Celtica JB. Tom. 3. 205. Nardus Celtica Dioscoridis CBP. 165. Nardus s. Spica Celtica Park. Th. 116.*
- Valeriana Alpina parva, Nardo Celticæ similis, inodora Phytogr. Tab. 232. fig. 2. Nardo Celticæ similis inodora. CBP. Hanc in Baldo & Alpibus Sumano conterminis legit Casparus Bauhinus, & monte Draußenstein Austriæ D. Burserus collegit & Valerianæ Alpinae parvæ latifoliæ titulo insignitam ad Bauhinum misit. An Valeriana minima Nardi folio JB. Tom. 3. 206.*



*Valeriana peregrina* s. *Indica* *J.B. Tom. 3. 212.* *Valeriana Indica* s. *Mexicana* *Park. Th.* *Valeriana peregrina purpurea albavè* *C.B.P. 164.* *Valerianella cornucopoides rubra*, s. *Indica Clusio Moris. Umb. 53. æquo jure Italica, Lusitanica, Hispanica possit dici; iis enim in locis, spontè provenit, & circa Messanam Siciliæ copiose observavit* *Cl. Rajus Cat. Ext. 110. An fortè Anonyma 3. Novæ Hispanæ Joan. Terentii apud Recc. 353.*

*Valeriana annua*, s. *Æstiva Clusio Park. Th.* *Valeriana foliis Calcitrapæ* *C.B.P. 164.* *Valeriana annua foliis tenuissimè laciniatis, flore majore.*

*Valeriana annua splendens, imis foliis integris, cæteris parùm laciniatis, flore minore. Fortè Valeriana annua Sicula quæ à præcedente diversa videtur Raii Hist. 391. qui dubium movet, An sit Valeriana minor annua Park. Th.*

*Valerianella Curassavica*, semine aspero, viscoso. *P.B.P. Phytogr. Tab. 113. fig. 7.* *In Hort. Reg. Hampton. legimus, & ex Ind. Orient. allatam habuimus.*

*Valeriana campestris inodora major* *C.B.P. 165.* *Lactuca agnina* *Park. Th.* *Locusta herba prior* *J.B. Tom. 3. 325.* *Valerianella arvensis præcox humilior, semine depresso* *Moris. Umb. 53. cui folia sunt integra.*

*Eadem foliis cùm laciniis. Locusta altera foliis serratis* *J.B. Tom. 3. 324.* *Lactuca agnina* s. *Valerianella foliis serratis* *Raii Hist. 392.* *An Valeriana sylv. foliis tenuissimè divisis* *C.B.P. 165. quærit & ipse Rajus ibidem.*

*Valeriana* s. *Lactucæ agninæ species procerior, & serotina* *Raii Cat. Angl. 299.* *Valerianella vulgaris major, serotina* *HRB. 215.*

*Valeriana campestris minor, semine umbilicato rotundo nudo.*

*Valeriana umbilicato nudo, semine, oblongo.* *HRB. 215.* *Valerianella altera, nudo umbilicato & lævi semine. Column. ecphr. 208.*

*Valeriana minor, semine hirsuto, extremo umbilicato.* *Moris. Prælod. Botan. 319.*

*Valeriana echinata* *C.B.P.* *Valerianella cornucopoides echinata. Column. ecphr. 204.*

*Valeriana semine stellato* *C.B.P.* *Valeriana petræa* *Park Th.* *Valerianella altera tenuifolia, semine Scabiosæ stellato* *Fab. Column.* *Valerianella semine Scabiosæ major* *Lusitanica Moris. Umb. 53.*

*Valeriana cærulea* *C.B.P. 164.* *Valeriana Græca* *Park. Th.* *Valeriana Græca quorundam flore cæruleo* *J.B. Tom. 3. 212. flore est communiter cæruleo, aliquandò albo, indè.*

*Valerianella Græca quorundam, flore albo* *J.B. Tom. 3. ibid.* *Pseudo Valeriana (inquit Casparus) dici potest, nam præter foliorum similitudinem, nil cùm Valerianâ commune habet. Ad hujus genera, fortè accenseri possit, Matlalxochitl Novæ Hispan. Terentii apud Reccum 383.*

• **VANILLIA'S** *Piperis arbori Jamaicensis innascens* *Phytogr. Tab. 320. fig. 4.* *Vaynillas Hispanis à Vaginarum similitudine* *Pison. Mantiss. Arom. 200.* *Volubilis filiquosa Mexicana foliis plantagineis* *Raii Hist. Pl. 1330.* *Arachus aromaticus Tlilxochitl s. Flos niger Mexicanis dictus* *Hernandez apud Recc. 38. Hujus fructus ante aliquot annos Benzoenil, nunc dierum Vanigliæ dicti.* *Lobus aromaticus subfuscus Terebinthi corniculis similis* *C.B.P. 404. Lobus oblongus aromaticus.*



aromaticus *Clusii exot. Lib. 3. 72.* Lobus longus aromaticus odore ferè Belzivini *J.B. Tom. 1. 439.* Siliqua Thymiamatis odore *ejusd. ibid.* Lathyro affinis *Mexicana* filiquis longissimis, unctuosus, moschatis nigris.

VERBASCUM mas latifolium luteum *CBP. 239.* Verbascum vulgare flore luteo magno, folio maximo *J.B. Tom. 3. append. 871.* Verbascum album vulgare s. *Tapus barbatus communis Park. Th.*

Verbascum pulverulentum flore luteo parvo *J.B. Tom. 3. 872.* Verbascum mas foliis angustioribus, floribus pallidis *CBP. 239.*

Verbascum flore albo parvo *J.B. Tom. 3. 873.* Verbascum *Lychnites* flore albo parvo *CBP. 240.* Verbascum mas foliis longioribus *Park. Th.*

Verbascum nigrum vulgare *Park. descript.* Verbas. nigrum flore ex luteo purpurascente *CBP. 240.* Verbas. nigrum flore parvo, apicibus purpureis *J.B. Tom. 3. append. 873.*

Verbascum laciniatum *Park. Th.* Verbas. crispum & sinuatum *J.B. Tom. 3. 872.* Verbascum nigrum folio *Papaveris corniculati*, & *Camerar. CBP. 240.*

Verbascum humile *Creticum* laciniatum *CBP. ibid.* Verbascum sylv. *Creticum Alpini exot. 123.* Verbascum *Brassicæ* folio *Column. ecphr. part 2. 82.* *Arcturus Creticus Belli epist. 1. ad Clusium.*

Verbascum folio subrotundo flore *Blattariæ CBP. Park. Th.*

Verbasco congener è *Maderaspatân.* mucronatis foliis aversâ partè lanuginosis, flore parvo purpureo. *Phytogr. Tab. 114. fig. 1.* Chiantzolli alia *Hernandez apud Recc. 234.* huic pertinere videtur.

VERBENA communis cæruleo flore *CBP. 269.* Verbena vulgaris *J.B. Tom. 3. 443.* Verbena mas s. recta & vulgaris *Park. Th.*

Verbena supina s. fæmina *Park. Th.* Verbena tenuifolia *CBP.* Verbenaca supina *J.B.*

Verbena *Urticæ-folia Canadensis HRP. 183.* *Zanon. Hist. Bot. 203.* *H. Leyd. 619.* Verbena peregrina foliis *Urticæ Dodart. Memoir. 125.* Variat aliquando spicâ magis compactâ & floribus saturatè cæruleis.

Verbena *Americana Urticæ* foliis angustioribus, flore cæruleo *H. Leyd. app. 698.* Verbena *Urticæ-folia Canadensis*, foliis incisus flore majore *HRP. variat interdum flore carneo.*

Verbena nodiflora *J.B. Tom. 3. 444.* Verbena repens nodiflora *Park. Th.* E *Maderaspatân.* ad nos allatam habuimus, hujus varietatem, aut speciem minorem.

Verbena nodiflora incana *Curassavica* latifolia *PBP. H. Beaum. Phytog. Tab. 232. fig. 4.* Verbena nodiflora major *Indica* flore niveo *Breyn. Prodr. 2. 103.*

Verbena *Scutellariæ* s. *Cassidæ* folio dispermos *Americana Phytogr. Tab. 70. fig. 1.* Verbena *Curassavica Scutellariæ* foliis, flore purpurascente *PBP.* An Verbena *Indica Bontii Hist. Ind. Or. 150.*

Verbena spicata *Ocymi* folio dispermos *Americana.* Verbena *Americana* annua, folio *Ocymi PBP. append.* àn Verbena *Americana* media annua *Ocymi* folio lanuginosa, flore purpureo amplo *Breyn. Prodr. 2. 102.*

Verbena spicata *Jamaicana*, *Teucris* pratensis folio, dispermos. *Phytogr. Tab. 321. fig. 1.*

Verbena *Orubica* *Teucris* folio, *Primulæ Veris* flore, filiquis & seminibus longissimis



mis *P B P.* 383. *Cauda muris* vulgò. Item *Teucrui* foliis *Frutex Curassavicus* *P B P.* *Phytogr. Tab.* 228. *fig.* 4. *Verbena Americana* frutescens *Teucrui* foliis & facie, floribus cœruleo-purpureascentibus amplissimis *Breyn. Pr.* 2. 102. Itèm fortè *Verbena Americana* *Veronicæ* foliis, flore coccineo spicato. *ejusd. Breyn. Prodr.* 2. 103. qui plantam resiccatam ab *Illustriss. D<sup>no</sup> Simone à Beaumont* *Semina à spectatissimo viro D<sup>no</sup> Kiggelaer nomine Verbenæ ex Insulâ Arabua accepit.* Hujus & perfectior Icon habetur *Phytogr. Tab.* 327. *Fig.* 7.

*VERONICA Virginiana* procerior, foliis ternis quaternis & etiam quinis caulem amplexantibus, spicis florum candidissimis *Phytogr. Tab.* 70. *fig.* 2. An *Veronica Americana* erecta frutescens & ramosa folio *Verbenæ P B P.* 383.

*Veronica* spicata recta profunde serrata quam *Lysimachiam cœruleam* quidam vocant *J B. Tom.* 3. 284. *Lysimachia* spicata cœrulea *C B P.* 246.

*Veronica cœrulea* hirsutior foliis ferè ternis circà caulem ambientibus.

*Veronica major latifolia*, foliis splendentibus, & non splendentibus *J B. Tom.* 3. 283.

*Veronica spicata latifolia C B P.* *Veronica spicata latifolia major Park. Th.* *Hanc plantam nuper invenit D. Luidius ad latera montis cujusdam Craig-Ureidhin dicti in Comitatu Montis Gomerici Walliæ. Variat interdum & ex certis Intervallis folia terna ad caulium nodos habet.*

*Veronica major angustifolia*, caulibus viridibus *J B. ibid.* *Veronica spicata angustifolia C B P.* *Veronica recta angustifol. Park. Th.* 549.

*Veronica erecta spicata*, angustiori hirsuto folio, flore incarnato. An *Veronica spicata* flore purpureo *H R B.* 321.

*Veronica spicata recta major & minor J B. Tom.* 3. 282. *Veronica spicata minor C B P.* 246. *Veronica recta minima Clus. Hist.* 347.

• *Veronica Americana* erecta frutescens, & ramosa, folio *Verbenæ P B P.* *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 5.

*Veronica Chamædryas spuria dicta*, minor latifolia *C B P.* *Chamædryas falsa species, Teucrium 5<sup>m</sup>. Clusio J B. Tom.* 3. 286.

*Veronica petræa sempervirens Ponæ*, ad *Chamædryn* vulgarem falsam accedens *J B. Tom.* 3. 289. Itèm *Chamædryas Montis Sumani* quoad Iconem *ejusd. ibid.* *Chamædryas alpina Saxatilis C B P.* 248. *Hujus Icon. extat. in Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 3.

*Veronica mas supina & vulgatissima C B P.* 246. Item *Veronica mas erecta ejusd. ibid.* *Veronica vulgatiore, folio rotundiore J B. Tom.* 3. 282.

*Veronica mas repens Pyrænica* folio longiore glabro *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 1.

*Veronica s. Chamædryas spuria latifolia major*, non ramosa *Pyrænica Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 2.

*Veronica maxima Dalechamp. Hist. Lugd.* 1165. *Chamædryas spuria major latifolia C B P.* 248. *Veronica maxima latifolia s. Quercus folio Moris. Hist.* 2. 322.

*Veronica major altera frutescens Moris. Hist.* 2. 319. *Chamædryas spuria major altera, s. frutescens C B P.* *Chamædryas falsa maxima, an Teucrium 1<sup>m</sup>. s. majus Pannonicum Clusio J B. Tom.* 3. 286. *Teucrium 4<sup>m</sup>. Clus. Hist.* 359. *Chamædryas spuria major frutescens Park. Th.* 105.



- Veronica Teucris facie *Park. Th.* 552. Veronica supina, facie Teucris pratensis *Lob. Icon.* 473. Teucris 4<sup>a</sup> 3<sup>a</sup> species *Clus. Hist.* 349. Chamædryas spuria angustifolia *J.B. Tom.* 3. 285. Chamædryas spuria major angustifolia *C B P.* 249. Veronica Indica Teucris-folio, Nanschera Canshabu Malabaricis dicta. *Commel. Not. in H. Malab. Part* 10. *Tab.* 50.
- Veronica minor tenuissimè laciniato *Morif. Hist.* 2. 321. Chamædryas spuria tenuissimè laciniata *J.B. Tom.* 3. 287. Chamædryas Austriaca foliis tenuissimè laciniatis *C B P.* 248.
- Veronica minor foliis imis rotundioribus *Morif. Hist.* 2. 320. Teucrium pratense & Teucrium spurium Chamædryoides *Lob. Icon.* 490. Chamædryas spuria latifolia s. fœmina *J.B. Tom.* 3. 286. Chamædryas spuria minor rotundifolia *C B P.* 249. Chamædryas spuria sylvest. *Park. Th.*
- Veronica tetragona montana, recta minima, *Column. ecphr.* Chamædryas spuria latifolia minima *C B P. ibid.*
- Veronica rotundifolia scutellata, aut biseutata Hederæ folio *Morif. Hist.* 2. 321. Chamædryas spuria affinis rotundifolia scutellata *C B P.* Fortè etiam Chamædryas spuria hederacea repens s. Scutellata repens *ejusd. C B P.* 249. Alysson Dioscoridis montanum *Fab. Column. ecphr.* 286.
- Veronica parva saxatilis, cauliculis nudis *Raii Hist.* 846. Teucrium minimum *Clusii Hist.* 350. Chamædryas spuria minima *Park. Th.* 107. An Chamædryas Alpina minima hirsuta *C B P.* 248. Extat hujus pictura in *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 3.
- Veronica alpina fruticans Serpylli majoris folio longiore *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 5. Veronica saxatilis *J.B. Tom.* 3. 284. Veronica alpina frutescens *C B P.* 247. Veronica 3<sup>a</sup> fruticans *Clus. Hist.* 347.
- Veronica alpina fruticans Serpylli minoris folio circinato *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 6. An Veronica Alpina minima Serpylli-folia *Ponæ descr. Mont. Bald.*
- Veronica pratensis Serpylli-folia *C B P.* Veronica fœmina quibusdam, aliis Betonica *Pauli Serpyllifolia J.B. Tom.* 3. 285.
- Veronica pratensis Nummulariæ folio, flore cæruleo *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 233. *fig.* 4. in quibus à præcedente discrepat, mihi nondum compertum est.
- Veronica affinis Ind. Orient. Pulegii facie, calycibus tomentosis. *Phytogr. Tab.* 232. *fig.* 7.
- Veronica terrestris annua folio Polygoni flore albo *Morif. Hist.* 2. 322.
- Veronica minima Caroliniana Polygoni folia, flosculis parvis albidis; à priore diversa.
- Veronica affinis Indica tenuifolia, flosculis & caliculis barbatis, summo caule ferè umbellatis *Phytogr. Tab.* 114. *fig.* 2.
- Veronica Hederulæ folio *Morif. Hist.* 2. 322. Alsine Hederulæ folio *C B P.* 250. Alsine Hederulæ folio minor *Park. Th.* Alsines genus *Fuchsio* folio Hederulæ hirsuto *J.B. Tom.* 3. 368.
- Veronica cærulea triphyllos, nunc pentaphyllos, s. trifida & quinquifida *Morif. Hist.* 323. Veronica flosculis singularibus, foliis laciniatis erecta. *Raii Synops.* 178. Alsine foliis hederaceis Rutæ modo divisis *Lob.* Alsine triphyllos cærulea *C B P.* Alsine recta flore cæruleo *Park. Th.* 1268. Item Alsine recta triphyllos s. laciniata *ejusd. fol.* 760. Alsine folio profundè secto, flore purpureo s. violaceo *J.B. Tom.* 3. 367.



*Veronica* flosculis cauliculis adhærentibus *Morif. Hist.* 2. 322. Alfine *Veronica* foliis, flosculis caulibus adhærentibus *C B P.* 250. Alfine ferrato folio hirsutiori, floribus & loculis cauliculis adhærentibus *J B. T.* 3. 367. Alfine foliis subrotundis *Veronica* *Park. Th.*

*Veronica* flosculis oblongis pediculis insidentibus, *Chamædryos* folio *Morif. Hist.* 322. Alfine foliis *Triflaginis* *Park. Th.* Alfine *Chamædryfolia*, flosculis oblongis pediculis insidentibus *C B P.* 250. Alfine ferrato folio glabro *J B. Tom.* 3. 366.

*Veronica* aquatica, subrotundo folio, *Becabunga* dicta. *Anagallis* aquatica major folio subrotundo *C B P.* Itém *Anagallis* aquat. minor, folio subrotundo *ejusd. Pinac.* 252. Itém *Anagallis* aquat. foliis *Pulegii* *Serpyllivè* *ejusd. ibid.* *Anagallis* aquatica folio rotundiore majore *J B. Tom.* 3. 791. Itém *Anagal.* aquatica flore cæruleo, folio rotundiore minor *ejusd. ibid.* *Anagallis* aquatica vulgaris s. *Becabunga* *Park. Th.* 1236. Itém *Anagallis* aquat. s. *Becabunga* major *ejusd.* Ut & *Anagallis* aquatica foliis *Pulegii* *Park. ibid.* *Anagallis* aquatica minor 1<sup>a</sup> *Tabern. Icon.* 718. Itém *Berula* s. *Anagallis* aquatica *ejusd.* 719.

*Veronica* aquatica longifolia media *Raii Synops.* 179. *Anagallis* aquatica major, & minor, folio oblongo *C B P.* 252. *Anagallis* aquatica flore cæruleo, folio oblongo major *J B. ibid.* Itém *Anagallis* aquat. flore purpurascente, folio oblongo minor. *ejusd.* *Anagallis* aquat. folio oblongo crenato *Park. Th.* 1237. *Berula* major *Tabern. Icon.* 719. Itém *Anagallis* aquatica minor 2<sup>a</sup> *ejusd.* 1236.

*Veronica* aquatica angusto longiore folio scutellata. *Anagallis* aquatica angustifolia *C B P.* 252. Item *Anag.* aquat. angustif. scutellata *ejusd. ibid.* *Anagallis* aquatica angustifolia *J B. Tom.* 3. 791. Hæc est ni fallor (inquit) Celeberr. *Rajus* *Anagallis* aquatica 4<sup>a</sup> *Lob. quamvis minùs rectè picta sit, cùm floribus & vasculis in summis ramulis: exeunt enim ex alis foliorum præcedentium in morem. Synops. Stirp. Britan.* 179.

**VESICARIA** marina in pilam conglomerata, ex *Ostreorum* testis. *Vesicaria* marina non ramosa *J B. Tom.* 3. 818. *Alcyonium* 15. s. *Pila* marina ex ampullis constans ad spumæ similitudinem *C B P.* 386.

**VIBURNUM** *Park. Th.* *Viburnum* vulgò *C B P.* 428. *Lantana* vulgò, aliis *Viburnum* *J B. Tom.*

*Viburnum Americanum* odoratum, *Urticæ* foliis latioribus spinosum, floribus miniatis *P B P. Phytogr. Tab.* 233. fig. 5.

*Viburnum Americanum* non spinosum, *Melissæ* foliis, floribus coccineis *P B P. Phytogr. Tab.* 114. fig. 4. *Camara* flore rubro *Marcgr. fol.* 5. Fortè etiam *Camara* flore luteo ex ripa Fluvii *S<sup>ci</sup> Francisci* *ejusd.* An *Camara* *Juba Pison.* *To-cizquiuh* s. *Maizium* torridum, & calidum *Hernandez.* apud *Reccum.* 115. *Nostri* enim flores primùm lutei, deinde aurantii, tandèm miniati, & ultimò tanquàm coccinei sunt coloris. In *H. Reg. Aulæ Hampton.* sæpiùs conspeximus *Cayolizan* s. *Tepozan* *Mexicensibus* *Hernand.* apud *Recc.* 66. Itém *Yztacpatli* 7<sup>a</sup> *Nov. Hispan. Terentii* apud *Recc.* 451. Ut & *Piltzin* *Teuhxochitl* *ejusd. loci* apud *eund. Recc.* 397. sunt omnia (fortè) *Huic* congenera. *Chamæpericlymenum* *Brazilianum* *Raii Hist. Pl.* 655.



- Viburnum Cisti fœminæ s. Salviæ foliis mucronatis *Americanum* odoratum minus, floribus incarnatis. *P B P.* 384. Viburn. *Americ.* minus Cisti fœm. fol. crenatis, flore carneo *Breyn. Prodr.* 2. 103. Huc etiam spectat Apitzalpatli Tzontolotli *Mexicanis* (i.e.) Firmatrix *Hernandez* apud *Recc.* 199.
- Idem Salviæ foliis obtusis, floribus albis *P B P. ibid.* An Camara flore albo *Marcgr. Quæ pro Lychnidis speciè minùs rectè ponitur,* à D. Rajo *Hist. Pl.* 993.
- Viburnum *Americanum* odoratum, folio parvo orbiculato, floribus & baccis foliolis interceptis. *P B P. Phytogr. Tab.* 114. fig. 5. Idem (fortè) cùm præcedenti.
- VICIA vulgaris sativa *J B. Tom.* 2. 310. Vicia sativa vulgaris semine nigro *C B P.* 344.
- Vicia sativa alba *C B P. ibidem.* Ervum candidum vel Faba Veterum *Hieronym. Tragi.*
- Vicia *Narbonensis* maxima, fructu rotundo atro, foliis integris *Moris. Hist.* 2. 61.
- Faba sylv. fructu rotundo atro *C B P.* 338. Pifa nigra *Camer. H. Medic.* 128.
- Faba *Græcorum* sylvestris *Lobel.* Faba sylv. *Græcorum* s. Faba Veterum *Park. Th.* Aracus fabaceus & Faba Kairina, cui femina minora *J B. Tom.* 2. 286.
- Eadem foliis ferratis *Moris. ibid.* Aracus fabaceus ferratus & Cocco Vico semine majore *J B. Tom.* 2. 287. Faba Veterum ferratis foliis *Park. Th.*
- Vicia sylvatica maxima Pifo sylvestri similis *J B. Tom.* 2. 316.
- Vicia *Benghalensis* hirsuta & incana, filiquis Pifi *H. Leyd.* 623.
- Vicia vulgaris sylvestris, semine parvo & nigro frugum *J B. Tom.* 2. 312. Aracus s. Cracca major *Park. Th.* Vicia semine rotundo nigro *C B P.* 345. *Color autèm seminum, non penitus niger, sed ex pallidè-viridi & nigro varius.*
- Vicia sylvestris quasi incana flore albo *J B. ibid.* Vicia sylv. alba *Park. Th.* 1072.
- Vicia sylv. hirsuta incana *C B P.* 345.
- Vicia flore obsoletè purpurea filiquâ hirsutâ *Raii Hist. Pl.* 901. Aracus major *Bætica Boelii Park. Th.* 1068.
- Vicia flore luteo pallido, filiquis hirsutis crassis, brevibus erectis *Moris. Hist.* 62
- Itèm Vicia flore ochroleuco filiquis hirsutis erectis *ejusd. in Tabulis* Vicia multifolia cum filiquis latis *J B. Tom.* 2. 314.
- Vicia flore ochroleuco, filiquis hirsutis propendentibus *Moris. Hist.* 2. in *Tabul. Hujus ut & præcedentis semina, ab insigni Botanico D. Alexandro Balaam è Tingitaniâ in Angliam reduce nobis benignè communicata sunt.*
- Vicia luteo flore sylvestris *J B. Tom.* 2. 313. Vicia sylvestr. lutea, filiquis hirsuta, nondùm descripta. *C B P.* 345. An Vicia filiquâ asperâ *Grisleii Viridar. Lusit.*
- Vicia peregrina angustissimis foliis, filiquâ latâ glabrâ *Phytogr. Tab.* 233. fig. 6. An Vicia angustifolia purpuro-violacea, filiquâ latâ glabrâ *Botan. Monsp.* 276. Fortè etiam. Vicia sylv. cùm Lentis filiquâ *J B. Tom.* 2. 316.
- Vicia minor Segetum cùm filiquis paucis glabris *Moris. Hist.* 64. Viciæ s. Craccæ minimæ species, cùm filiquis glabris *J B. Tom.* 2. 315. Vicia segetum, singularibus filiquis glabris. *C B P.* 345.
- Vicia Segetum cum filiquis plurimis hirsutis *C B P. ibid.* Vicia parva s. Cracca minor, cùm multis filiquis hirsutis *J B. ibid.*
- Vicia s. Cracca foliis & filiquis longioribus. *Bot. Monsp.* 277. Viciæ parvum genus, folio longo *J B. ubi suprâ.* Vicia



- Vicia multiflora* major, angustifolia, glabra, floribus oblongis ex albo & cœruleo mixtis. *Phytogr. Tab. 72. fig. 1.* An *Vicia Onobrychidis* flore *C B P.* 345. & in *Prodr. descript.* 149. Fortè *Vicia* maritima multiflora alba *Messanensis Raii Cat. Stirp. Exterar.* 261. & *Hist.* 903. Fortè etiam *Aracus minor Lusitanicus Park.Th.* Legumen pallidum *Ulyssipponense Nonii Brandonii Gerard.emac.app.* Variat aliquando floribus impensè cœruleis.
- Vicia perennis* incana, multiflora. *Botan. Monspel.* 277 Dr. Hans Sloan jamdudum nobis communicavit.
- Vicia multiflora Nemorensis perennis* s. dumetorum *J.B. Tom. 2.* 314. *Vicia sylvestris multiflora* s. spicata *Park. Th.* *Vicia multiflora C B P.* Itèm *Vicia sylvestr. spicata ejusd. C B P.* 345.
- Vicia multiflora maxima perennis*, tetro odore, floribus albentibus lineis cœruleis striatis. *Phytogr. Tab. 71. fig. 1.* *Vicia sylvatica multiflora maxima Phytolog. Brit. Raii Hist.* 903. *Vicia perennis multiflora spicata major*, floribus albis lineis cœruleis notatis *Morif. Hist.* 2. 60.
- Vicia multiflora Cassubica frutescens*, Lentis siliquâ, *Breynii Phytogr. Tab. 72. fig. 2.* *Lens Ungarica Florent. Schuyt. Cat. H. Leyd.* 45.
- Vicia sepium perennis J.B.* *Vicia maxima dumetorum C B P.* Itèm *Vicia sepium folio rotundiore acuto ejusd. C B P.* 345. Fortè etiam *Vicia folio subrotundo brevi, obtusè mucronato, pediculo brevi insidente, flore Viciæ sepium s. dumetorum vulgaris Raii Synops. Stirp. Brit. noviss. edit.* 188. Variat interdum, floribus im-maculati candoris.
- Vicia similis* suprâ infrâque terram, fructum edens *C B P.* 345. *Arachidna Cretica* an potius *Aracoydes Theophrasti Ponæ.* *Araco ὁμοιον Theophrasti* an? *Clus. exot. lib. 4. cap. 16.*
- Vicia Lathyroides*, s. *Lathyrus Viciaoides* vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus cœruleis *Morisoni Phytogr. Tab. 114. fig. 6. siliquis Orobi.*
- Eadem siliquâ planâ *Morif. Hist.* 2. 56. *Lathyrus* s. *Cicerula Messanensis Raii Hist. Plant.* 898.
- Vicia Lathyroides* s. *Lathyr. Viciaoides* floris vexillo phœniceo, foliis labialibus subalbescentibus siliquis Orobi *Morif. Hist.* 55. *Lathyrus Bæticus elegans* siliquis Orobi *Park. Th.* 1063.
- Vicia Lathyroides nostras* s. *Lathyrus Viciæ formis Raii Phytogr. Tab. 71. fig. 2.* *Lathyrus* ex cœruleo & rubro mixtus *Meret. Pinac.* 70.
- VIOLA** *Martia purpurea J.B. Tom. 3.* 542. *Viola simplex Martia Park. paradis.* *Viola Martia purpurea*, flore simplici odore *C B P.* 199. Variat flore intensè purpureo, albo, cinereo, simplici & multiplicato, majore & minore.
- Viola Martia inodora sylvestris C B P.* 199. *Viola cœrulea Martia inodora sylvatica* in cacumine semen ferens *J.B. Tom. 3.* 543. *Viola Canina Tabern. Icon.*
- Viola Virginiana elatior*, floribus minutissimis, capsulis seminalibus canis *Banisteri.*
- Viola Martia major hirsuta inodora Morif. Hist.* 2. 475. *Viola foliis Trachelii serotina hirsuta radice lignosâ Merett. Pin. rar. nat. Brit.* 125.
- Viola cœrulea maxima Cucumerinis hirsutis foliis Virginiana Phytogr. Tab. 234. fig. 2.*
- Viola maxima, Cucumerinis hirsutis foliis Virginiana*, flore luteo.



- Viola palustris rotundifolia glabra* Moris. Hist. 475. *D. Plot. Hist. nat. Oxon.*
- Viola Americana* foliis Granadillæ HRP. 185. *Viola Maracoci* s. Granadillæ foliis Moris. *ibid.* *Viola Novæ Angliæ* Maracoci facie Londinensibus Raii Hist. pl. 1051 Variat floribus albis & cæruleis.
- Viola rotundifolia montana major*, s. *Pthoræ Valdensium* facie, floribus luteis. *Phytogr. Tab. 234. fig. 1.* *Viola alpina rotundifolia lutea* CBP. 199. *Viola Martia lutea* JB. Tom. 3. 544.
- Viola alpina rotundifolia minor lutea* HRP. *Phytogr. Tab. 233. fig. 7.* Gramen *Parnassi* aliud Hist. Lugd. 1005. Gramen *Parnassi* luteo flore. CB. *phytopin.* 611. Qui in *Pinace* 199. perperam præcedenti proposuit.
- Viola Martia* arborescens purpurea CBP. 199. *Viola assurgens tricolor* Ger. *Jacea tricolor* surrectis caulibus, quibusdam arborea dicta JB. Tom. 3. 547. *Viola surrecta purpurea* Park. variat interdum floribus albis.
- Violæ surrectæ* affinis, *Pinguiculæ* facie. *Prom. Bon. Spei. Phytogr. Tab. 234. fig. 5.* ex Cod. Compt.
- Violæ surrectæ* latiore folio species peregrina ex Cod. Benting. *Phytogr. Tab. 234. fig. 4.* Ad hanc *Violarum* speciem ritè referenda videtur *Tlalchipillin* alia *Hernandez* apud *Reccum* 255.
- Viola Pyrænica*, folio *Teucris* serotina Sch. Bot. 131. *Viola Pyrænica* longiùs caudata *Teucris* folio. *Elem Bot. Tom. 1. 333.*
- Viola surrecta Maderaspatensis*, Lini facie, rotundioribus imis foliis *Phytogr. Tab. 120. fig. 8.* Si folia non essent bina, ordine utrinque disposita, *Micui-Tlaxcolli Mexicenses* s. *Piscium intestina Hernandez.* apud *Recc.* 229. hùc referendam putarem.
- Viola bicolor arvensis.* CBP. *Viola tricolor sylvestris* Park. Th. *Jacea bicolor*, frugum & hortorum vitium JB. Tom. 3. 548.
- Viola tricolor major & vulgaris* Park. *Viola tricolor hortensis repens* CBP. 199. *Jacea tricolor* s. *Trinitatis* Flos JB. Tom. 3. 547.
- Viola montana tricolor odoratissima* CBP. *Viola montana* 3<sup>a</sup> s. *tricolor* Clus. Hist. *Jacæ tricoloris* s. *Floris Trinitatis* genus flore luteo, & purpureo magno, repens non annuum JB. Tom. 3. 548.
- Viola montana lutea grandiflora* CBP. 200. *Viola montana tricolor* 2<sup>a</sup> Clus. Hist. *Viola flammea lutea maxima* Park. *Jacea elegantissima*, flore luteo amplissimo. *Phytolog. Britan.* 61.
- Viola Virginiana* tricolor, foliis multifidis cauliculo aphylo D. Banist. *Phytogr. Tab. 114. fig. 7.* & *Tab. 234. fig. 3.* An *Viola alpina*, folio in plures partes dissecto CBP. *Viola montana laciniato folio* Clus. Hist. *Viola montana folio multifido* JB. Tom. 3. 544. *Viola montana Aconiti foliis* Quorundam.
- Viola acris Americana*, s. *Acriviola* folio peltato minor & vulgaris. *Violæ* affinis umbilicato s. (peltato) folio scandens sapore *Nasturtii*, *Americana* minor Breyn. Prodr. 2. 103. *Viola Indica* scandens *Nasturtii* sapore & odore H. Leyd. 628. *Nasturtium Indicum* majus CBP. 306. *Nasturtium Indicum* folio peltato scandens JB. Tom. 2. 175. *Cardamindum minus & vulgare* Elem. Bot. Tom. 1. 341. *Pelon Mexixquilitl* s. *Pelon Chilli Hernandez* 161. Flos sanguineus *Monardes* cap. 69. *Acriviola Italarum.*
- Viola acris Americana*, s. *Acriviola* folio peltato maxima, flore odorato eleganti. *Violæ* affinis umbilicato (s. peltato) folio scandens, sapore *Nasturtii Americana* maxima



maxima, flore variegato *Breyn. ibid.* 104. *Viola Indica* scandens *Nasturtii* sapore maxima odorata *H. Leyd. ibid.* *Cardaminum* ampliore folio, & majori flore. *Elem. Botan. Tom. 1.* 341. *Narhanzade* Indigenis dicta.

**VIRGA aurea major, vel Doria** *C B P.* 268. *Alisma Monspeliensium* s. *Doria* *J B. Tom. 2.* 1064. *Herba Doria* s. aurea *Park. Th.* 540.

*Virga aurea Noveboracensis* *Doriæ* affinis lato rigidoque folio *P B P.* 384. An *Herba Doria minor Americana* *Park. Th.* 541.

*Virga aurea Limonii* folio, paniculâ uno versu disposita *HRP. Phytogr. Tab.* 235. fig. 2. An *Virga aurea Mexicana* *Limonii* folio *Dodarti Memoir. Virga aurea Mexicana C B P. app.* 517.

*Virga aurea* s. *Solidago procerior Americana*, caule multiplici *Phytogr. Tab.* 235. fig. 5. *Solidago maxima Cornuti de Pl. Canad.* 168. *Semperviret.*

*Virga aurea ex Novâ York*, foliis *Symphyti* majoris hirsutis. *Sch. Bot.* 201.

*Virga aurea latissimo folio, Canadensis*, glabr. *Sch. Bot. Phytogr. Tab.* 235. fig. 4.

*Virga aurea angustifolia paniculâ speciosâ Canadensis* *HRP. Phytogr. Tab.* 236. fig. 1.

*Virga aurea* foliis lævibus non ferratis *HRB.* 322. *Virg. aur. fol. angustis lævib. non ferratis Hort. Jonquet. Virga aurea Virginiana* *Bod. à Stapel. in Theophr.* 365. *Virga aurea Virginiana* elatior, magis paniculosa.

Eadem foliis nonnihil crenatis, paniculâ non speciosâ. à *D. Doodio* apud nostrates primum observata.

*Virga aurea Bermudensis* spicata, *Tripolii* longis pinguioribus foliis lætè virentibus.

An *Virga aurea* longis glabris foliis nervosis *HRB.* 220.

*Virga aurea Americana* *Tarraconis* facie & sapore; paniculâ speciosissimâ *Phytogr. Tab.* 116. An *Oloxihuitl Mexicenses* *Hernand.* apud *Recc.* 395. de hujus sit genere, vel non, aliorum judiciis relinquo.

*Virga aurea Americana* frutescens glabra, foliis subtus cæsiis, comis ad summitatem in ramulos brachiatos implicatis. *Phytogr. Tab.* 235. fig. 6. An *Tlalchichino* *Patlahoal Mexicanis* s. *Herba usla* 3<sup>a</sup> *Hernand.* apud *Recc.* 292.

*Virga aurea* foliis *Linariæ* *Morif. Præhud. Bot.* 379. *Linaria* folioso capitulo luteo major *C B P.* 213. *Elichryson* *Linariæ* foliis *Quibusd. Heliochrysos Tragi*, s. *Linaria* 3<sup>a</sup> *J B. Tom. 3.* 151. *Chrysocome* verior, s. *Coma aurea Germanica & Neopolitana* *Park. Th.* *Chrysocome Dioscoridis & Plinii Fabii Column. ecphr.* 81. *Conyza* *Linariæ* folio *Elem. Bot. Tom. 1.* 361.

*Virga aurea* flore albo spicato *Breyn. Phytogr. Tab.* 114. fig. 8. *Virga aurea Noveboracensis*, floribus albis, foliis Bullidis ramosæ *Canadensis Cornuti. P B P.* 384. An *Tezompotonic* seu *Capilli lætidi* *Hernand.* apud *Recc.* 191. quam alii *Tlaco-chichit* s. *Virgam amaram*, alii vero *Amarum* florem vocant ejusd. *ibid.* & fol. 305. An verò Hujus altera species *Yztaçtlacochichic* apud *Huexocincenses* vocata ejusd. fol. 191.

*Virga aurea* ferratis foliis hirsutis *Americana* *Phytogr. Tab.* 236. fig. 2. *Virga aurea Canadensis* hirsuta, paniculâ minus speciosis. *HRP.* 186. *Virga aurea Americana* *Park. Th.* 542. *Virga aurea Virginiana*, foliis magis rugosis, & nonnihil incis. *Bod. à Stap. in Theophr.* 365. *Virga aurea Americana* hirsuta, radice odoratâ, foliis ferratis *Morif. Præhud. Botan.* 323.



Virga aurea rugosis foliis *Virginiana* paniculâ florum amplissimâ.

Virga aurea *Canadensis* hirsuta, longiore folio. *Sch. Bot.* 201. An *Virga aurea Americana*, foliis serratis angustis, subtus nervosis. *Morif. Præ lud.* 322.

Virga aurea montana *Scrophulariæ* folio *Roberti* *lc. Phytogr. Tab.* 235. fig. 3. An *Virga aurea montana*, latiore folio glabro *HRP.* 186.

Virga aurea montana latiore folio hirsuta *HRP.* 186. *Sch. Bot.* 201.

Virga aurea s. *Solidago Saracenica* latifolia, serrata *Phytogr. Tab.* 235. fig. 1. Confida *Saracenica* major *Hist. Lugd.* 1271. nbi figura magis, arridet. Item *Virga aurea altera Lobelii ejusd.* 1273. *Virga aurea* serratis foliis *Park. Th.* *Virga aurea latifolia* serrata *CBP.* 268. *Virga aurea* s. *Solidago Saracenica latifolia* serrata *J.B. Tom.* 2. 1063. *Icon. verò quoad folia minùs placet. Virga aurea Solidago altera, foliis minùs spissis HRP.* 220.

Virga aurea angustifolia serrata *CBP.* *Virga aurea angustifolia serrata, s. Solidago Saracenica J.B. Tom.* 2. 1063. *Solidago Saracenica vera, Salicis folio Park. Th.* 539.

Virgæ aureæ s. *Solidagini angustifoliæ* affinis, *Lingua avis Dalechampii J.B. Tom.* 2. 1063. *Conyza palustris Park. Th.* 1232. *Conyza palustris serratifolia CBP.* 266.

Virga aurea vulgaris *Park. Th.* 542. *Virga aurea vulgaris latifolia J.B. Tom.* 2. 1062. *Virga aurea angustifolia minùs serrata. CBP.* 268.

Virga aurea montana biuncialis pumila, foliis acuminatis *Phytogr. Tab.* 235. fig. 7. An *Virga aurea humilis Alpina Morif. Præ lud. Bot.* 323. *Virga aurea omnium minima HRP.* 186.

Eadem foliorum apicibus obtusis. *Phytogr. Tab.* 235. fig. 8.

VISCUM baccis albis *CBP.* 423. *Viscus Quercûs & aliarum Arborum J.B. Tom.* 1. 89.

Viscum arboreum s. *Epidendron Scillæ foliis Barbadosium.* Fortè *Arna* quero *Anavarecca Zanon.* 29. *Tupaipi & Uracatu Brasiliensium Pison.* 235. bulbosa planta; *Hujus species esse videntur.*

Viscum arboreum, s. *Epidendron flore albo specioso Americanum, foliis formâ siliquarum Nerii Phytogr. Tab.* 117. fig. 6. *Nerii siliquæ effigie Kaye Baka J.B. Tom.* 2. 142. *Fructus Nerii siliquæ figurâ CBP.* 464. per errorem. *Kaye Baka Clus. exot. lib.* 3. cap. 19.

VITEX s. *Agnus castus folio angusto Park. Th.* *Agnus folio non serrato J.B. Tom.* 1. 205. *Vitex foliis angustioribus Cannabis modo dispositis CBP.* 475. *Variat latiori folio, floribus albis & cæruleis.*

• *Vitex Orientalis angustis foliis, sempèr tripartitò divisis Phytogr. Tab.* 321. fig. 2. An *Vitex trifolia minor CBP.* 475. *Agni casti species multò minor cæteris, tribus tantùm firmis foliis donata Rauwolfii in Hodæporico.*

*Vitex trifolia minor Indica Breyn. Prodr.* 2. 104. *Cara-Nôsi H. Malab. Part.* 2. fig. 11. *Negundo altera s. Fæmina Acoftæ. Negundo arbor fæmina J.B. Tom.* 2. 189. *Piperi similis Fructus striatus CBP.* 412. *Hujus est pictura quæ extat in Phytogr. Tab.* 206. fig. 5.

*Vitex trifolia minor India serrata Breyn. ibid. Bem-nosi H. Malab. Part.* 2. fig. 12. *Negundo prior s. mas Acoftæ Negundo arbor mas J.B. Tom.* 2. *ibid. Frutex Indicus baccifer, fructu calyculato monopyreno Negundo dicta Raii Hist. Plantar.*  
Vitex



*Vitex trifolia major Indica*, fructu carnosio, floribus minoribus & rarioribus Breyn. *ibid.* Mail-Elou *H. Malab. Part. 5. Tab. 1.* Arbor baccifera trifolia *Malabarica* simplici officulo cum pluribus nucleis. *Raii Hist. Pl. 1557.* *Lusitanis* Carilha

VITIS arbutina latiori folio *Americana*, claviculis donata. An Ambuyaembo *Brasilienſium Piſonis* 260. Fortè etiam Befucus *Nieremberg. 331.* & Bezucus *Petr. Martyr.*

Vitis arbutina insipida, foliis in aculeum abeuntibus, Volubili nostræ *Gangeticæ* similis, *Americana Phytogr. Tab. 236. fig. 4.*

VITIS *Idæa* angulosa *J.B. T. 1. 520.* *cujus pictura transposita est.* Vitis *Idæa* foliis oblongis crenatis, fructu nigricante *C.B.P. 470.* *Vaccinia nigra vulgaris Park. Th. Myrtyllus vulgò.*

Vitis *Idæa* magna quibusdam, s. Myrtyllus grandis *J.B. Tom. 1. 528.* Vitis *Idæa* foliis subrotundis ex albidis *C.B.P.* *Vaccinia nigra fructu majore Park. Th.*

Vitis *Idææ* species *Malabarica* Vetadagou *H. Malab. Part 5. Tab. 30.* Baccifera *Indica* fructu rotundo, atropurpureo pentacocco *Raii Hist. 1633.*

Vitis *Idæa* fructu nigro *J.B. Tom. 1. 519.* Vitis *Idæa* foliis oblongis albicantibus *C.B.P. 470.* Qui Synonyma nonnulla penultimæ speciei huic attribuit, ut rectè notat *Celeberr. noster Rajus Hist. Pl. 1488.* qui eandem esse suspicatur cum illâ cujus mentionem fecit in *Cat. Angl.* sub titulo *Vacciniæ rubræ* foliis Myrtinis crispis D. Merett quam loco suo natali, sibi etiam ostendit Inventor Thomas Willisel verum neque florem ejus, neque fructum vidit. *Vaccinia nigra Pannonica Park.*

Vitis *Idæa Maderaspatensis* Niruri (fortè) *Malabaræis* dicta *Phytogr. Tab. 69. fig. 3.* Niruri *H. Malab. Part 2. Tab. 27.* Frutex Indicus baccifer Vitis *Idææ* 2<sup>a</sup> *Clusii* facie. *Breyn. Cent. 1. fol. 8.*

• Vitis *Idæa Æthiopica* Myrtinis foliis, flosculis dependentibus. *Phytogr. Tab. 321. fig. 4.* An Frutex *Æthiopicus* baccifer Myrtylli foliis *Breyn. Cent. fol. 9.*

Vitis *Idæa* foliis carnosis & velut punctatis, sive *Idæa* radix *Dioscoridis C.B.P. 470.* Radix *Idæa* putata, & Uva Urſi *J.B. Tom. 1. 423.* Uva Urſi *Galenii Clusio Park. Th.*

Vitis *Idæa Bengalensis* Uvæ Urſi baccâ singulari, ad foliorum exortum, barbulis donata. *Phytogr. Tab. 69. fig. 4.*

Vitis *Idæa Malabarica* baccis aurantiacis, Kal-Vetadagou dicta, Kal-Vetadagou *H. Malab. Part. 5. Tab. 31.*

Vitis *Idæa Americana*, longiori mucronato, & crenato folio, floribus urceolatis racemosis. Vitis *Idææ* foliis & facie *Unedonis* flore *Americana Phytogr. Tab. 236. fig. 3.* Nostratibus Gooseberry Tree nuncupatur. An Rawcomens *Virginienſibus Ogilv. Americ. 196.* Fortè etiam *Corylus Guadalupana.* Quæ quia modo *Coryli*, plurimos à radice stolones emittit, ab Incolis Gallis, Condier (i. e.) *Corylus* satis abusivè dicitur. Nam folia gerit *Lauri*, fructus autem rubros, & nigros, *Grossularum instar*, & earum ferè sapore. *Mundy Biochrestolog. 167.*

Vitis *Idæa* sempervirens fructu rubro *J.B. Tom. 1. 422.* Vitis *Idæa* foliis subrotundis, non crenatis, baccis rubris *C.B.P. 470.* *Vaccinia rubra buxeis foliis Park. Th.*

• Vitis *Idæa* s. Myrtillus *Ind. Orient.* subrotundo folio, non crenato. *Phytogr. Tab. 321. fig. 3.* ex Oris *Malabaricis* munere D. *Alexandri Brown.* Vitis



- *Vitis Idæa palustris Americana*, oblongis splendentibus foliis; fructu grandiore rubro plurimis intus acinis referto, à *Novangliæ* colonis *Craneberrys* *Uvæ* *Gruinæ*, & *Bearberrys* (*i.e.*) *Uvæ* *Ursinæ* nuncupantur, *Phytogr. Tab.* 320. *fig.* 6. Frutilla fortè in *Chile* *C B P.* 471. Fortè etiam *Rabih Barbarum* & *Oar quibusdam*. Cerasorum figurâ & sapore Fructus in *Temecene* Provinciâ *Ogilv. Afric.* 194. Unni *Chilensium Hispanis* illic habitantibus *Murtylla ejusd. Ogilv. Americ.* 634. In salsis palustribus Musco obductis oritur. Ex hujus fructu Liquor per expressionem elicitur ab Indigenis, Vinum Maderense valdè æmulans. Baccharum cum Saccharo conditarum usus creberrimus est in acetariis & condimentis ciborum, præcipuè carnis vervecinæ; Placentæ etiam *Carts dictæ* ex iis fiunt, quemadmodum ex *Uvis crispis*. Ad *Scorbutum* præstare creduntur. Hujus descriptionem videsis apud *Rajum* ex *Joannis Josselini libello* quem scripsit de *Nov. Angliæ rarioribus Animalibus, Plantis, Fossilibus, &c.* in *Latinum versam. Hist. Pl.* 685.
- Vitis Idæa palustris Americana* fructu albo chrySTALLINO. Variat etiam aliquandò fructu succini coloris.

*Vitis Idæa palustris C B P.* *Vaccinium palustre Park. Th.* *Oxycoccus* s. *Vaccinia palustris J B. Tom.* 1. 227.

*Vitis Idæa palustris Americana* foliis parvis circinatis, elegantissimè crenatis, ex *Insulâ Jamaicanâ*.

*VITIS Vinifera C B P.* 299. *J B. Tom.* 2. 67.

*Vitis Corinthiaca* s. *Apyrina J B. Tom.* 2. 72. *Uvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiæ C B P.* 299. *Uvæ Corinthiæ Park Th.*

*Vitis muscato* sapore, quæ *Apiana Plinio C B P.* 298.

*Vitis acinis oblongis magnitudine & formâ prunorum, quæ Pergulana dici potest C B P.* 298.

*Vitis Vinifera niger, sanguineo succo turgens.*

*Vitis alba dulcis J B. Tom.* 2. 73.

*Vitis folio Apii J B. Tom.* 2. 75. *Vitis laciniatis foliis. Cornuti* 182. *Park. Th.*

*Vitis sylvestris Labrusca C B P.* 299. *Labrusca dicta quod in marginibus terræ, seu labris quibusdam oriatur. Dioscoridi lib.* 5. *cap.* 2.

*Vitis Vulpina dicta Virginiana nigra. An Vitis sylvestris Virginia C B P.* *Vitis sylv. Virginiana Park. Th.*

*Vitis Vulpina dicta Virginiana alba. Vitis vinifera sylvestr. Americana* foliis aversâ parîe densâ lanugine tectis *White Fox-Grape* nostratibus dicta. *Phytogr. Tab.* 249. *fig.* 1. Hujus ramulum singulari amicitia, nobis communicavit. Botanicus ille exercitatissimus, *D. Samuel Doodius*, qui tandem ad *Horti Medici apud Chelsea* suburbani, ab Amplissimâ *Pharmacopæorum Londinensium Societate Præfecturam*, jure meritissimo, evocatus est.

*ULMARIA J B. Tom.* 3. 488. *Barba capri floribus compactis C B P.* 163. *Ulmaria vulgaris Park. Th.*

*Ulmaria major* s. altera *Park. Th.* *Barba capræ floribus oblongis, Melandryon Plinii C B P. ibid.* *Barba capri J B. ibidem.*

*Ulmaria major trifolia, flore amplo pentapetalo Virginiana D. Banist. Phytogr. Tab.* 236. *fig.* 5. Ulmaria



- *Ulmaria pentacarpus*, integris ferratis foliis parvis, subtus incanis *Virginiana Phytogr. Tab. 321. fig. 5.*
- Ulmus* *J.B. T. 1. 139.* *Ulmus campestris* *C.B.P. 426.* *Ulmus vulgaris* *Park. Th.*  
*Ulmus vulgatissima* folio lato scabro *Ger. emac.*
- Ulmus minor* folio angusto scabro, *Ger. emac.* *Ulmus minor* *Park. Th.*
- Ulmus pumila*, foliis parvis glabra, cortice fungoso.
- Ulmus* folio latissimo scabro *Ger. emac.* *Ulmus latiore folio* *Park. Th.* *Ulmus montana* *C.B.P. 427.*
- Ulmus major* *Hollandica*, angustis, & magis acuminatis samarris, folio latissimo scabro.
- Ulmus* folio glabro *Ger. emac. Park. Th. 1403.*
- Ulmus Virginiana* fructu Lupulino *D. Banister. Cat. Stirp. Virgin.*
- Ulmifolia Arbor Africana* baccifera floribus purpureis *Phytogr. Tab. 237. fig. 1.*  
*Ulmi* facie *Arbuscula Æthiopica* ramulis alatis, floribus purpurascens *H. Beaumont.* *Ulmifacie Arbor Curassavica* *P.B.P. 385.* An arbor foliis *Ulmi*, *Mexicanis* *Ayaquicuramo Tlacuilolquahuatl* s. *Arbor picta*; Et *Ocelolquahuatl* s. *Arbor Tigridis Nieremberg.* Pacal fortè *Arbor Peruviana Monard. cap. 58.* An fortè hujus sit cortex arboris *Ulmo* similis ad *Catarrhos ejusd. Monardes cap. 43.* *Lycium Afric.* non spinosum *Ulmifacie*, floribus speciosis.
- Ulmi angustifoliae* facie *Baccifera Jamaicensis* foliis supernè scrabris, subtus villosis, floribus flavis perpusillis, fructu botryoide monospermo *Phytogr. Tab. 328. fig. 5.*
- Ulmi folia arbor Bisnagarica.*

**VOLUBILIS** *Bengalensis*, mucronatis foliis leni hirsutie obductis.

*Volubilis capreolata*, longifolia, *Barbadensis* venenosa.

*Volubilis* s. *Baccifera Virginiana*, officulo compresso lunato, caudice lento, foliis hederaceis *Nasturtii Indici* more umbilicatis, *D. Banister.*

*Volubilis Africana* fructu tetragono, *Smilaci* similis, *Viticulis aspera*, foliis medio aculeatis, & in capreolatum mucronem circumvolutis. *Phytogr. Tab. 236. fig. 6.*

*Volubilis Gangetica* sapore acri & aromatico, *Phytogr. vid. Aristolochia.*

**URTICA** racemifera major perennis *Raii Synops. Stirp. Brit. 54.* *Urtica major vulgaris* *J.B. Tom. 3. 545.* *Urtica urens* 1<sup>a</sup> & 2<sup>a</sup> seu *Urens maxima*, & altera *Urens.* *C.B.P. 232.*

*Urtica racemifera minor annua*, *Raii ibid.* *Urtica minor annua* *J.B. Tom. 3. 446.*  
*Urtica urens minor* *C.B.P. ibidem.*

*Urtica pilulifera*, folio profundius (*Urticæ majoris* in modum) ferrato, semine magno *Lini*, *Rai Synops.* *Urtica Romana* sive *mas*, cum globulis. *J.B. Tom. 3. 445.* *Urtica urens pilulas ferens* 1<sup>a</sup> *Dioscoridis* semine *Lini* *C.B.P. 232.*

*Urtica pilulifera altera* *Parietariæ* foliis *H.R.P. 187. Dodart. Memoir. 131.*

*Urtica urens racemifera major*, *Ind. Orientalis.* *Ana-Schorigenám* *H. Malab. Part 2. Fig. 41.*

*Urticæ folia Jamaicensis* tricoccos *Mus. Cortenian.* *Urtica* (fortè) *Schorigenám dicta* *H. Malab. Part 2. fig. 39.* Fortè etiam *Ricinus parvus urens*, *Urticæ folio* *Banisteri Cat. Stirp. Virgin.*

*Urtica racemosa major Virginiana* mitior, s. minùs *urens* *Phytogr. Tab. 237. fig. 2.*



*Urtica racemosa Canadensis* Dodart. Mem. 129. Moris. Prælud. 323. *Urtica urens* major feminibus rotundis compressis, loculamentis viridibus inclusis, & in caulis summitatem ramatim positis. D. Baniſt. in Catalog. apud Raii Hiſt. 1928. *Urtica Braſiliana* Pinó Indigenis *Piſonis* 235. & Marcgrav. 48.

*Urticæ* genus *Indianum* minimè pungens. Fortè Batti Schorigenam *H. Malab. Part. 2. fig. 40.* Fortè etiam Lupulo vulgari ſimilis *Ind. Or. floribus in ſpicam ex origine foliorum prodeuntem diſpoſitis, Phytogr. Tab. 201. fig. 5. & Hujus Almageſt. fol. 229.*

**UTRICARIA** vegetabilis *Zeylanenſ.* Bandura *Cingalenſibus* dicta *Phytogr. Tab. 237. fig. 3.* *Nepenthes Zeylanicum* flore minore *Breyn. Prodr. 2.* Planta mirabilis deſtillatoria *Grim. Eph. Germ. Priapus Vegetabilis monorchis Amann. Charact. Plantar. Bandura Cingalenſium Gentianæ Indiæ ſpecies ejusd. ibid. Anramatico Flacourt Deſcr. Inſ. Madagaſc. Ogilv. Afr. 685.*

*Utricularia Africana* s. *Capitis Bon. Spei* Bod. à Stapel. in *Theophr. 336.*

**UVIFERA** arbor *Orientalis* folio longo Champacam *H. Malabarici Part 1. fig. 19. P B P. 385.* Arbor Laurifolia *Chinenſis* *Martin. Atl. Sinic. Raii Hiſt. Pl. Champe flores C B P. Flos Indicus Champacca dictus Bontii Hiſt. nat. & Medic. Ind. Or. Tſjampaca Indorum* s. Arbor *Uvifera Indica* foliis Lauri *Americanæ Breyn. Prodr. 2. 107.*

*Uvifera arbor Americana* per funiculos è ſummis ramis ad terram uſque demiffis prolifera; *The Mangrove-Grape Barbadenſibus* dicta *Phytogr. Tab. 237. fig. 5.* An *Nyalel H. Malab. Part 4. Tab. 16.* *Sambucus Indica Bontii. Hiſt. 108.* Fortè etiam *Jito* prior *Piſon. lib. 4. cap. 27.*

*Uvifera arbor Americana* convolvulacea, fructu aromatico punctato *Barbadenſibus Checquier-Grape* (i. e.) Uva teſſulata nuncupatur. *Phytogr. Tab. 237. fig. 4.* Huic fortè ſpectat *Valli-Teregam H. Malab. Part 3.* Huic etiam pertinet *Ibira vera Piſonis 145.* An *Ficus arborescens African. Lauri Americani* foliis majoribus, fructu racemoso punctato *H. Beaum. Ex Ind. Orientali* quoque ad nos allata eſt. An *Amomum racemolum Indicum* quod putamus *Amomum verum Antiquorum.*

*Uvifera litorea* foliis amplioribus, ferè orbiculatis craſſis *Americana Sea-side Grape Barbadenſibus* dicta. *Phytogr. Tab. 236. fig. 7.* *Raiſinier* s. *Uvifera arbor à Caribæis Ouliem dicta Rochforti.* *Uvifera arbor Occidentalis* folio rotundo, *Obe vulgò P B P. 385.* Itèm *Sideroxylum* s. *Lignum ferreâ duritie Americanum* folio ſubrotundo *ejuſd. P B P. 376.* Arbor *Inſulæ Tabago* materie ligno *Braſiliano ſimili de Laet. Joſt. Dendrolog. 458.* An *Vitis ſylveſtris Indica* acinis pruni ſylveſtris *C B P. 299. ex Benzo lib. 1. cap. 28. vid' Ogilv. Americ. 347. & 364.* Fortè *Papyracea arbor Guaiabara Barbaris, Hispanis Uvero,* ab *Uvâ* quod pro fructu *Uvas* ſerat *J B. Tom. 1. Guiberas D. Fume Hiſt. general. Guaiabara in Inſulâ Hispaniolâ ex Oviedo Hiſt. Ludg. C B P. Guaiabara arbor in Antilles D. Muſdii Biochreſt.* Fortè etiam *Papyracea arbor Copeia J B. Copey in Inſulâ Hispaniolâ C B P. Guaiabara & Copey Hiſt. Lugd. 1850.* Itèm *Populus Americana ejusd. Hiſt. Lugd. 1830.* *Populus rotundiſolia Americana Park. Th. Item Meſſamiſ. Virginienſibus ejusd. Park. Th. 1671.*



## W.

**W**ADOUKÆ *Malabaricæ* haud multum dispar, Frutex aculeatus è *Ma-deraspatân Phytogr. Tab. 69. fig. 7.* An *Idu-Mulli ejusd. H. Malab. Part 4. Tab. 18.*

*Watta-Taly H. Malab. Part 5. Tab. 32.* Baccifera *Malabarica* floribus spicatis dipetalis, fructu monopyreno *Raii Hist. Pl. 1595.*

## X.

**X**ERANTHEMUM Sesamoides flore cœruleo. Cichoreum Cyani capitulo *HRB. 361.* Chondrilla cœrulea Cyani capitulo *CBP. 131.* Catanance *Dalechampii folio Coronopi JB. Tom. 3. 26.* Sesamoides parvum *Matthioli vulgò.* Xeranthemum flore albo *Ericæ foliis tomentosis Prom. Bon. Spei,* An *Argyrocome Gnaphaloidi affinis, Xeranthemi flore, foliis Serpylli tomentosis. Breyn. Prodr. 2. 16.*

*Xylobœion Arbor baccifera frondosa, Lauri pinguioribus foliis Americana, Beef-wood (i. e.) Lignum bovinum Barbadosibus dicta. Phytogr. Tab. 238. fig. 1.* An Frutex innominatus 2<sup>us</sup>. ligno saligno foliis ad Myrti folia accedentibus *Marc. fol. 82. Hujus folia propter insignem lævorem, serici instar ad tactum mollia sunt.*

*Xylociste arbor Americana, Xylosteo similis, è cujus ligno cistas & scrinia conficiunt Barbadoses nōstrates, a quibus Prince-wood & Cabinet-wood nominatur. Phytogr. Tab. 239. fig. 2. Periclymeni genus fortè. An Camacari Brasiliensium Marcgr. lib. 3. cap. 5. Ex cujus ligno Cistæ fiunt in quibus Saccharum reponitur, folia alternatim posita Laurinis similia, &c. An hujus sit lignum Caoba, quibusdam Saccharinum quod Cistæ in quibus Saccharum ad nos defertur ex eo plerunque conficiantur Wormii in Musæo lib. 2. cap. 15.*

*Xylomastix arbor Americana Whip-wood (i. e.) Arbor flagellifera Barbadosibus dicta Phytogr. Tab. 238. fig. 2. A Xylomastice nostrâ Erima Taly H. Malab. Part. 7. Tab. 39. haud multum abludit; Huic etiam accenseri potest Schervalli caniram ejusd. H. Malab. Part 7. Tab. 4. Nostræ enim flores ex alis foliorum nascuntur, utcunque pictor aliter expressit in Icone. An potius Tsjeru Caniram H. Malab. Part 7. Tab. 2. Fortè etiam Quauhxiotl Nov. Hispan. Terentii apud Recc. 406. quoad Iconem. Hujus fructus totum ramum occupat, quaterni decussatim ex eodem loco prodeuntes, qui renem rubrum ex viridi referunt.*

*Xyloperisteron s. Lignum Columbarium Coryli folio singulari subtilius lanuginoso Barbadosibus Pidgeon-wood nuncupatur Phytogr. Tab. 238. fig. 3. Hujus Arbor utriusque Indiæ alumna est.*

*Xylopicon arbor Barbadosibus Bitter-wood (i. e.) Lignum amarum nominata Phytogr. Tab. 238. fig. 4. An Pitoma Insulæ Maragnanæ de Laet. Ind. Occid. lib. 16. cap. 11. Quinquina (fortè) Peruviana s. Arbor amara & Febrifuga, ex cujus cortice fit pulvis Jesuitarum.*



## Y.

**Y**UCCA foliis Aloës *C B P.* 91. Yucca five Jucca *Park. paradis.* Yucca nova gloriosè elata & opinata planta *Lo bel. Advers. Part alterà.*  
*Yucca Virginiana* foliis per ambitum apprimè filatis. Yucca foliis filamentosis *Morif. Hist. 2. 419.*  
*Yuccæ-folia* filamentosa & bulbosa, fortè Caraguata 2<sup>o</sup> s. Caraguata-guacu *Pisonis* 192. *Yuccæfolia*, folio in longissimum filamentum abeunte. *P B P.* 386.  
*Aloe arborea vulgò.*

## Z.

**Z**ANTHOXYLUM aculeatum *Carpini foliis Americanum*, cortice cinereo. *Phytogr. Tab. 239. fig. 3.* Tetaiba *Brasilensibus* *Pisonis* 163. *cujus Lignum flavum Fustick-wood Barbadosibus nostratibus dictum, Tinctoriis usitatissimum.* Arbor baccifera *Brasilensis*, fructu tuberculis inæquali, Mori æmulo. *Raii H. Plantar.* 1639.

*Zanthoxylum aculeatum* *Fraxini sinuosis, & punctatis foliis Americanum Prickly Yellow-wood Barbadosibus dictum, & interdum à foliorum vi causticâ Pellitory of Spain Tree Phytogr. Tab. 239. fig. 4.*

*Zanthoxylum spinosum*, *Lentisci longioribus foliis, Euonymi fructu capsulari, ex Insulâ Jamaicensi. Phytogr. Tab. 328. fig. 6.*

*Zanthoxylum Pyriforme* stipite spinoso *Americanum Phytogr. Tab. 239. fig. 5.* Arbor flava *Hercules minor The lesser Yellow Hercules Barbadosibus nominatur.*

*Zanthoxylum Americanum* s. *Hercules Arbor aculeata major, Juglandis foliis alternis Phytogr. Tab. 239. fig. 6.* Arbor flava *Hercules major The greater Yellow Hercules Tree Barbadosibus nostratibus dicta. An Mouli-lla Hort. Malab. Part 5. Tab. 34.* Fortè etiam. Arbor aculeata *Caroliniana* spinis grandioribus, crebris tuberculis innascentibus, cortice urens. *Hujus Almagesti fol. 43.*

**ZANZALAC** arbor *Virginiana D. Banister.* *Astergir Rhafis Incolis Zenzelacht. est species Azederaeth.*

**ZARZAPARILLA** *Virginensibus* nostratibus dicta, lobatis Umbelliferæ foliis *Americana Phytogr. Tab. 238. fig. 5.* An *Herbatum Canadensum* s. *Panaces Moschatum Cornuti, huc pertinet, aliis judicandum relinquo. Christophoriana specie Hujus. Almagesti fol. 98.*

**ZE A** *Briza dicta, vel Monococcos Germanica C B P.* 21. *Zea monococcos, Briza quibusdam J B. Tom. 2. 413.*

*Zea dicoccos* vel major *C B P.* 22. *Zea s. Spelta J B. Tom. 2. 412.* *Zea dicoccos, s. Spelta vulgò Park. Th.*

*Zeopyrum* s. *Tritico-speltum C B P. ibidè.* *Hordeum nudum, s. Gymnocrithon J B. Tom. 2. 430.*

ZEDOARIA



**ZEDOARIA** rotunda *C B P.* 36. Itē Zedoaria tuberosa nigricans. *ejusd. C B P. ibid.* Colchicum *Zeylanicum* flore Violæ odore & colore ephemero. *P B P.* 304. Malankua *H. Malab. Part II. Tab. 9.* Maha-Kaluwa *Cingalensibus* dicta, & *Belgicè* Blok-Zedoar.

Zedoaria longa *C B P.* 35. Itē fortè Zedoaria Geiduar dicta *ejusd. C B P.* 36. Zedoraria *Officinarum*, Zerumbeth s. Zurumbeth *Avicennæ & Serapionis Dodon.* 444. Zingiber latifolium sylvestre Zerumbet *Garcia ab Hort. Walinghuru s. Zingiber sylvestre Zeylanensibus H. Leyd.* 636. Kua *H. Malab. Part II. Tab. 7.* Zedoaria *Zeylanica*, camphoram redolens *Mus. Zeylan. H. Leyd.* 636. Harankaha *Zeylanensibus* dicta.

**ZINGIBER** *C B P.* 35. Zinziber mas *Pisonis. Mantiss. Aromat.* 189. Anchoa *Hernandez apud Recc.* 169. Katou Inschi-Kua *M. Malab. Part II. Tab. 13.*

Zingiber angustiori folio, fæmina, Utriusque *Indiæ* alumna. Zinziber fæmina *Pison. Mantiss.* 190. Chilli *Indiæ Orient. Hernandez. apud Recc.* 169. Inschi, vel Inschi-Kua *H. Malab. Part II. Tab. 12.* An Zingiber fuscum *C B P.* 36.

Zingiberis effigie *Costus Arabicus, & Syriacus, Adversarior.* *Costus Arabicus Dioscoridis C B P.* 36. Costi quoddam genus, Zingiberis radicibus simile. *Clus. Not. in Garc. Tsjana-Kua H. Malab. Part II. Tab. 8.*

Zinziberis facie, Radix longa intus flava, Malaicè Cunhet *Linschot Part 3. Ind. Or. cap. 14.* Crocus *Indicus*, s. Curcuma, à *Lusitanis Saffron de Terra ejusd. Linschot Part 4. cap. 3. & 7.* Manjella Kua *H. Malab. Part II. Tab. 11. vid. fol. 125. hujus Almag. Bontii delineatio fol. 117. nihil valet: Figura enim Cannæ Indiæ pro eâ ponit, Hermannii deficit. præsertim in progressu floris, qui multò meliùs ab Horti Malabarici Autoribus est observatus, ut ex proximè sequentis Icone patet. Radix hæc quæ apud Indos in magno est usu, Borri Borri ab illis vocatur. An Ganti radix ac Zinziber ex Chinâ quâ Indi corpora sua fucant. Part 4. Ind. Orient. cap. 8.*

Zinziberis facie, Radix intus flava rotunda. Crocus *Indicus* s. Curcuma radice rotundâ. Manja-Kua *H. Malab. Part II. Tab. 10.*

Soli Deo Triuni, & Uni Trino,

S I T

Honor & Gloria

In Sæcula Sæculorum

Emendanda



## Emendanda &amp; Supplenda.

**A** ~~D. Epigraphen lin. 14. lege Philophytosoporum. In Præfatione pag. 1. line 22. post discrimi-~~  
~~nârunt add edificamus. ibid lege Marcellus. verâ pag. lin. 25. post Medicus, leg. exurgat, pag. 3. lin. 12.~~  
~~post 429. pone Arbör Setan quæ & Alcharad appellatur Bellunensis in Interpretatione Vocum Avicen-~~  
~~ne. Quæ verba ad lin. 17. deleantur, & eorum loco add. Amgailem Avicennæ lib. 2. Traß. 2. cap. 15.~~  
~~pag. 8. lin. 26. subjungantur de novo.~~

Acetosa Cretica semine aculeato C B P. 114. & Prodr.

Acetosa Ocymi folio Neapolitana C B P. ibid. Acetosa Ocimi folio Neapolitana *Κυκκοαλησες* Fab. Col. ecphr. Hæc  
 cum præcedenti non est confundenda. Lin. 32. add. Huc (fortè) spectat Ribes Arabum Rauwolfii s. Lapathum  
 rotundifolium Montis Libani semine maximo Breyn. Prodr. 2. 60. Qui refert ex seminibus è Libano monte ad  
 Cl. Golium transmissis in Horto Leydensi, Adolf Vorstii temporibus procrevit. Istam enim plantam quæ in Spor-  
 tulis D. Colii s. Coolmans reperta conspiciebat Excellentiss. Clusius & sub hoc dubio titulo An Ribes Rauwolfii  
 aut illi congener planta lib. 4. exot. cap. 21. proposuit, nihil aliud esse suspicamur quàm Orellanæ arboris ra-  
 mulus imperfectus ab Indiâ Occidentali allatus. lin. 24. subjungantur de novo.

Aconitum cœruleum s. Napellus primus C B P. Aconit. magnum purpureo flore vulgò Napellus J B. Tom. 3. 655.

Aconitum cœruleum s. Napellus vulgaris Icon. Roberti.

Aconitum cœruleum Napelli flore C B P. 183. Aconitum Lycoctonon Autumnale Napello simile J B. 656.

Aconitum spicâ florum pyramidalis Moris. Prælod. Aconitum pyramidale multiflorum H R P.

Aconitum maxim. comâ nutante Park. Th. Lycoctonon coma nutante maximum J B. Aconitum inflexâ comâ  
 maximum C B P.

Aconitum Lycoctonon flore maximo J B. Aconitum cœruleo purpureo flore maximo, s. Napellus quartus C B P.

Aconitum Lycoctonon Judenburgense Clus. Hist. 2. 97.

Aconitum purpureum s. Napellus tertius C B P. Aconitum Lycoctonon Neubergense Clusii. Aconitum Lycocto-  
 nam Napello simile Neubergense foliis latioribus, flore purpureo J B.

Aconitum cœruleum hirsutum, flore Consolidæ regalis C B P. Aconitum Lycoctonum cœruleum calcari magno.  
 J B. Aconitum Lycoctonon flore Delphinii Clus. Hist. 2. 94.

Aconitum cœruleum, flore Consolidæ regalis glabrum. J B. Tom. 3. 657.

Aconitum cœruleum minus, s. Napellus minor C B P. Aconit. Lycoctonon 10<sup>m</sup> Thora Italica Clus.

Aconitum urens Ricini ferè foliis, flore cœruleo magno, Staphis agria dictum. vid. Staphis agria.

Aconitum salutiferum s. Anthora C B P. Anthora flore luteo Aconiti J B. Tom. 3. 669.

Aconitum salutiferum elatius, foliis atrovirentibus, flore majore Pyrenaicum Sch. Bot. 17.

Aconitum Pyrenaicum luteum, foliorum segmentis sibi invicem incumbentibus Sch. Bot. 16. Aconitum quartum  
 Matthioli edit. Valgrif.

Aconitum Lycoctonum luteum C B P. Aconitum folio Platani flore luteo pallescente J B. pag. 9. lin. 30. add.

An Trichomanes majus foliis longis auriculatis D. Baniß. Cat. Stirp. Virginian. lin. ult. post. f. 8. add. Adian-  
 thum minimum folio vario. Elem. Bot. 433. pag. 14. lin. 42. post. 255. dele a & add. fig. 2. pag. 15. lin. 33.

~~post viridibus lege cujus. pag. 18. lin. 12. post. 111. add. Hujus exhibetur Icon in Phytogr. Tab. 255. fig. 3.~~  
~~lin. 19. post fig. 1. add. An Spiræa altera Virginiana D. Baniß. Cat. Stirp. Virg. lin. 30. subjungatur~~  
~~de novo.~~

~~Aloe vulgaris C B P. 286. Kudanaki aut Catevala H. Malab. Part II. Tab. 3. Pag. 19. lin. 33. post. Beaumont.~~

~~add. An Yucca-folia, folio in longissimum filamentum abeunte P B P. 386. lin. 40. post. 336. pone. Huic~~

~~(fortè) Nequametl s. Metl. 51. angustifolia Hernand. apud Recc. 272. accenseri meretur pag. 21. lin. 2. post~~

~~Moris. pone Pyrolæ affinis Herman. H. Leyd. 503. lin. 40. post Tab. 24. add. Huc etiam spectat Tlalaco~~

~~Nov. Hisp. Terent. apud Recc. 423. pag. 28. lin. 30. pro 256. lege 304. fig. 4. pag. 26. lin. 5. post allata est,~~

~~add. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 19. fig. 5. pag. 27. lin. 9. post 243. lege Hujus exhibetur Icon in~~

~~Phytogr. Tab. 75. fig. 9. pag. 28. lin. antepenult. post Tab. 45. add. Anacardus s. Anacardium, Persea (fortè)~~

~~Plinii, Andr. Cesalpini pag. 29. lin. 19. subjungantur de novo.~~

Anagyris Africana, angustis siliquis flore cœruleo Phytogr. Tab. 133. fig. 5.

Anagyris flore luteo, angustis siliquis Æthiopica Phytogr. Tab. 133. fig. 6. Ex curiosissimo Codice Comptonian.

Rev. D. Henrici Londinens. Episcopi favore in nostras Tabellas transfulimus. Pag. 31. lin. 13. post 1497. add.

Picturam habes in Phytogr. Tab. 12. fig. 1. è sinu Gangetico, nobis advenit pag. 32. lin. ult. subjungatur  
 de novo.

Anonis alopecuroides annua purpurea D. Bobart. Anonis mitis annua purpurea H R B. 17. Anonis purpurea  
 spicata erecta annua latifolia, siliquis rectis lentiformibus Moris. Hist. 2. 169. Anonis annua, longâ  
 florum spicâ purpurea, ejusd. inter Tabulas Sect. 2. Tab. 17. n<sup>o</sup> 4. Ononis fortè non spinosa, flore rubello  
 spicato major annua Grisei Virid. Lusit. Pag. 33. lin. 16. post. 1708. add. Spiræa Opuli folio Elem. Bot.  
 Tom. 1. 490. pag. 34. lin. 14. post videtur add. Hujus Icon habetur Phytogr. Tab. 137. fig. 1. lin. 16. sub-  
 jungatur de novo.



*Aphyllon aquaticum Virginienſe petræum* D. Baniff. *Phytogr. Tab.* 138. fig. 1. An *Fucus ramosus ligneus fluvialis* Dris *Richardſon Raii Synops. app. noviff. edit'* 332. ex ſententiâ D. Doodii huic noſtro parùm diverſus pag. 35. lin. 27. poſt. P. 9. add. Noſtri ſemina ſericeo pappo ſunt deſtituta. pag. 37. lin. 2. poſt 34. add. An *Apocyno ſimilis. anguſtiſſ. folio Curaffavica, tuberoſâ radice, caule geniculato nodoſo* PBP. 314. lin. 38. poſt *habuinius, add. Apocynum ſcandens capſulis alatis Baniff. Cat. Virg. à D. Sherardo putatum* pag. 38. lin. 18. ~~pro fig. 2. lege fig. 4. Pag. 42. lin. 4. pro fig. 2. leg. fig. 4. lin. 6. ſubjungatur de novo.~~

*Arbor Americana Limonii magnitudine fructum ferens Jamaicensibus* Pinguin dicta *Phytogr. Tab.* 327. fig. 1. lin. 34. poſt *Hiſpanorum lege An. Cenanam de Quahunaboac Nov. Hiſpan. Hernandez. apud Recc. 361. lin. ult. dele. alis. Pag. 45. lin. 17. poſt 268. add. fig. 4. lin. 19. dele. Fortè etiam, & quæ ſequantur pag. 46. lin. 18. & 11. deleantur* An huic Fortè convenit *Pekeii arbor Maragnana Inſulæ de Laet. Ind. Occid. lib. 16. cap. 11. & eorum loco lege* An potiùs *Caaroba Piſonis Hiſt. Braſil. 143. lin. 32. pro 3. lege 4. pag. 47. lin. 29. pro fig. 9. leg. fig. 5. lin. 38. pro fig. 2. lege fig. 3. lin. ult. lege fig. 4. pag. 48. lin. 4. lege fig. 4. lin. 15. add.* An *Azorualala Inſulæ S<sup>c</sup>i Laurentii Ogilv. Afric. fol. 682. lin. 17. poſt. viget add. Hujus exhibetur Icon in Phytogr. Tab. 146. fig. 2. lin. 40. pro Cucurbitiferâ lege Ficus pag. 56. lin. 19. poſt Phytogr. add. Tab. 326. fig. 1. & dele. nondum edit. pag. 58. lin. 23. poſt quibuſdam add. Huc fortè ſpectat Jacobæa Æthiopica Lavendulæ folio Breyn. Cent. 1. 136. lin. 26. poſt 178. add. Itèm Conyza fortè Africana foliis Stæchadis citrinæ Gallicæ ejuſd. Faſcic. 21. lin. 27. poſt f. 19. add. Pictura hujus exhibetur *Phytogr. Tab. 326. fig. 2. pag. 59. lin. 16. pro 365. lege 330. pag. 60. lin. 12. poſt Luſitan. add. Fortè etiam Glauci leguminofæ affinis C.B. prodr. 150. pag. 61. lin. 9. poſt 192. add. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 326. fig. 3. pag. 68. lin. 37. poſt 568. add. Fortè etiam Planta Petafitidis folio Cap. Bon. Spri. ten Rhyne Breyn. Cent. 1. 179. Pag. 69. lin. 8. poſt. 176. An Kali fruticosum Hiſpanicum Tamarifci folio Elem. Botan. Tom. 1. 213. pag. 70. lin. 8. poſt. folioſo add. Phytogr. Pag. 72. lin. 26. lege Apurine. Pag. 75. lin. 2. poſt fig. 4. add. ut & Tab. 326. fig. 4. lin. 6. poſt dicta add. Phytogr. Tab. 327. fig. 1. lin. 11. poſt errore add. Hujus Icon exhibetur in Phytogr. Tab. 326. fig. 5. Pag. 77. lin. 24. pro Rapunculum lege Rapuntium. Pag. 79. lin. 16. ſubjung. de novo.**

*Camphoratæ ſimilis elatior, Planta Æthiopica circâ caulem Gallii lutei foliis conſtipata. In Horto Chelſeïano enutritam vidimus.* ~~Pag. 80. lin. 15. poſt Indorum add. Phytogr. Tab. 273. fig. 3. Pag. 81. lin. 21. ſubjungatur.~~

*Cardiaca Africana minor perennis Ballote folio, floribus Phœniceis. Cardiaca Africana minor, Nepetæ foliis Flor. Batav. 55. pag. 84. lin. 22. lege dictus. Pag. 86. lin. 31. poſt 378. add. Carlina ſylveſtris vulgaris Cluſ. Hiſt. 2. 155. lin. 32. poſt ſpinioſior lege alter flore aureo perennis ibid. poſt. 54. add. Heracantha fortè. Tabern. Icon. 697. Cnicus ſylveſtr. ſpinioſior polycephalos CBP. lin. 35. poſt. Comptoniano add. Phytogr. Tab. 154. fig. 6. pag. 89. lin. 10. add. An Caſſia Americana ſpuria fiſſilis dicta PBP. 320. lin. 29. Caſſia fiſſula Alexandrina; eadem eſt cùm proximè præcedenti. Pag. 91. lin. 33. poſt 106. add. Chitran arbor & Alſcerbin Avicen. lib. 2. tract. 2. cap. 164. Scerbin arbor & Alkitran ejuſd. lib. 2. tract. 2. cap. 675. lin. 37. lege Tom 1. pag. 95. lin. 35. ſubjungatur de novo.*

*Ceratia Braſiliana pinnatis Fraxini foliis, Ornus Hiſpanica s. Spaniſh Aſhe Barbadeſibus dicta. Caaroba Piſonis Hiſt. Braſil. 143. Hujus arbor magna eſt & procera, flores habet è cœruleo purpuraſcentes odoratos. Sub titulo Arboris Americane pinnatis Fraxini foliis habetur Fol. 46. hujus Almageſt & Phytogr. Tab. 140. fig. 3. pag. 96. lin. perult. pro major lege minor. Pag. 98. lin. 11. poſt minore add. Phytogr. Tab. 274. fig. 3. lin. 28. ſubjungatur de novo.*

*Chriſtophoriana Americana racemoſa baccis niveis Morif. Hiſt. 2. 8. Aconitum baccis niveis Cornuti de Pl. Canad. 76.*

*Eadem baccis rubris Morif. ibid. Aconitum baccis rubris Cornuti ibid.*

*Chriſtophoriana vulgaris noſtras, racemoſa & ramoſa Morifon. Aconitum racemoſum àn Actæa Plinio CBP. 183. Aconitum racemoſum, Actæa quibuſdam J B. Tom. 3. 660. Pag. 101. lin. 21. poſt 63. lege Vid. Picturam in Phytogr. Tab. 274. fig. 6. Pag. 102. lin. 4. ſubjungatur de novo.*

*Chryſanthemum elatius Hieracii fruticosi dentatis foliis ternis circâ caulem ambientibus, calyce florum triplici ſerie donato. In Horto cultiſſimo Dris Uvedal Æſtate præterlapſâ hunc plantam ſuperbientem obſervavimus. Pag. 103. lin. 36. poſt p. 9. add. Santolina Africana corymbifera. Coronopi folio Elem. Botan. Tom. 366. Pag. 104. lin. 24. ſubjungatur de novo.*

*Cichorio affinis Americana floribus villoſis albis PBP. ex Inſulâ Jamaiceniſi.*

*Eadem Floris Cardinalis folio, floribus villoſis rubris ejuſd. PBP. ex eodem loco. Pag. 106. lin. 8. ſubjungatur de novo.*

*Ciſtus longifolius hirtutus ex Inſulis Fortunatis. An idem cùm præcedenti. Pag. 107. lin. antepenult. poſt 466. add. Phytogr. Tab. 84. fig. 4. Pag. 109. lin. 16. dele nigrum eſt Lignum, & eorum loco. Pene Lignum eſt cinerei coloris, ſiliquæ autem nigræ. Pag. 110. lin. 5. ſubjung. de novo.*

*Clematis erecta humilis non ramoſa foliis ſubrotundis, flore unico ochroleuco. Baniff. Ex Virginia. lin. 9. poſt 380. add. Clematis purpurea repens, petalis florum coriaceis, D. Baniff. Cat. Virg. lin. 17. poſt Tom. 3. add. Hujus Icon exhibetur in Phytogr. Tab. 163. fig. 5. lin. 39. poſt fig. 2. add. An Origanum foliis ad ſummitatem caulium canis, floribus multis pallidè cœruleis in cymis ramorum denſè ſtipatis Baniff. Cat. Virg. lin. 13. lege circameinctus. Pag. 112. lin. 6. dele Cretica lin. 29. ſubjung. de novo.*

*Colutea ſiliquoſa Maderaspātana ad nodos caulium ſiliquis bigemellis. Phytogr. Tab. 165. fig. 3. An fortè Coluteæ foliis Anil. nominatum J B. Tom. 1. 384. parùm differt à præcedenti. Pag. 113. lin. 37. add.*



- ~~vid. Icon. in Phytogr. Tab. 324. fig. 1. lin. 40. add. vid. picturam Phytogr. Tab. 324. fig. 2. Pag. 114. lin. 8. add. Hujus figuram videtur Phytogr. Tab. 324. fig. 3. lin. 24. add. vid. Phytogr. Tab. 324. fig. 1. lin. 34. post villosa, add. Phytogr. Tab. 167. fig. 1. pag. 115. lin. 4. post Marcgr. add. lib. 1. cap. 14. At revera ad Convolvulorum genera minimè pertinet. Pag. 116. lin. 1. post Tab. 59. add. An Turbith nigrum Cleyerij (i. e.) Convolvulus Indicus hirsutus niger heptaphyllus flore luteo Breyn. Prodr. 2. 102. lin. 6. post divisa, add. Hæc planta fortè sit de genere Mechoacan, quæ speciem Convolvuli facit. Gulielmus Piso, quanquam inter Bryonias ponitur à Parkinsono lin. 28. subjung. de novo.~~
- *Convolvulus Canariensis* minimus, flore ochroleuco, semine nigro. Hartelauena Indigenis dictus Phytogr. Tab. 324. fig. 4. Pag. 117. lin. 39. subjung. de novo.
- Conyza Æthiopica*, flore bullato aureo, Pinastris brevioribus foliis lætè viridibus. Elichrysum Africanum foliis & flore Abrotani viridis D. Bobart. cujus munere & nos habuimus, à Jacobæa Æthiopica Laricis folio Breyn. Cent. 1. 136. abludit tantum floribus, qui in Breyniana radiati sunt & oblongi, in nostrâ verò discoidei, nudi & ferè globosi, cætera conveniunt: An Chrysocome angustifolia Africana Breyn. Cent. 1. 179. Icon habetur in Phytogr. Tab. 327. fig. 2. ~~Pag. 118. lin. 3 & 4. dele apud nostrates, quæ ad lin. 5. post Doodii transferantur. Lin. 16. lege eremefynâ incurvato. Pag. 119. lin. 6. add. Variat etiam segmentis angustioribus. Pag. 121. lin. ult. add. Hanc plantam à Neotericis penitus oblitam Casparus Bauhinus in Pinace suo, cum Crithmo Chrysanthemo per errorem confundit. Pag. 123. lin. 4. post 412. add. Vid. Fagaras. lin. 14. post fig. add. 6. Pag. 126. lin. 18. subjung. de novo.~~
- Cyanus spinosus Creticus* Pona & Pr. Alpin. exot. 163. à D<sup>no</sup> Bobart. nuperrimè accepi. ~~Pag. 128. lin. 21. lege pubescentibus lin. 39. lege incanus. Pag. 129. lin. 12. lege Acacia. lin. 22. lege Vismaga. Pag. 130. post ult. lin. subjung. de novo.~~
- Dentaria Virginiana* Nasturtii sapore pentaphyllæ. Viola Alabastrites pentaphyllæ, Cochleariæ sapore, Nasturtii species Virginiana Banisteri. An fortè de Sinapistrorum genere, quæ inter Papavera corniculata satis propriè nobis accenseri merentur. Pag. 131. lin. 15. subjung. de novo.
- Digitali* affinis *Canariensis* Solidaginis acutis foliis levitè pilosis, flore aureo cucullato, staminibus croceis cristæ cavo accumbentibus ornato Phytogr. Tab. 325. fig. 2. *Matera Insulanis* vulgò, Hujus folia sunt impensè amara. Huc fortè spectat Adel-Odagam. H. Malab. Part. 9. Tab. 43. propius autem accedit Bahel Tsjulli ejusd. H. Malab. Part. 9. Tab. 87. *Digitalis* affinis *Indica*, Blattariæ folio, flore rubicundo Commelin. Not. in loc. ~~lin. 37. lege folio. Pag. 133. lin. 30. lege Garab. lin. 31. post Avicen add. lib. 1. tract. 2. cap. 326. At quoque & Algarab ejusd. lib. 2. tract. 2. cap. 40. lin. 33. lege igniarium. Pag. 134. lin. 12. add. post Phytogr. Tab. 325. fig. 3. & dele nondum edit. Lin. 17. add. Icon habetur Phytogr. Tab. 328. fig. 1. Lin. 20. add. Fortè etiam Chrysocome Africana flore phoeniceo angustifolia Breyn. Fascic. Rarior. 20. Pag. 135. lin. 23. post Prodr. add. Phytogr. Tab. 174. fig. 2. Pag. 136. lin. 16. add. An Erica florulentis capitulis, alba noduligera D. ten Rhyne Breyn. Cent. 1. 179. Pag. 138. lin. 8. subjung. de novo.~~
- Erysimum Galeno & Theophrasto* s. *Erysimum* 3<sup>m</sup> Tabern. Icon. 449. Item *Myagrum* 2<sup>m</sup> ejusd. 866. *Myagrum* filiquâ longâ CBP. 109. *Myagro* affinis planta filiquis longis. JB. Tom. 2. 894. *Camelina* s. *Myagrum* alterum amarum Park. Th. 867. Pag. 139. lin. 21. post dictus add. Idem fortè cum *Spirææ Theophrasti* Frutice spicis florum è foliorum alis Phytogr. Tab. 63. fig. 2. ~~lin. 34. lege Planta lin. 41. leg. Eonymo. Pag. 140. post lin. 29. subjung. de novo.~~
- Eupatorium Africanum* Agerato affinis *Peruviana* s. *Quinquina* falsò dictæ foliis, floribus albis Phytogr. Tab. 328. fig. 2. *Eupatorium Indicum* flore albo Barthol. Ad. Med. Anni 1673. Obs. 24. In Horto Chelseiano ex semine natum habuimus. ~~Pag. 141. lin. 9. dele an Virga aurea, & verba quæ sequuntur. Pag. 142. lin. 27. lege altera. Pag. 143. lin. 7. lege agentibus. Lin. 21. post dicta add. fructu recurvo. Pag. 147. lin. 16. add. Mippi, nonnullis Indis Cahahaba quæ ossium Fracturis alligata, ea ferruminare solet Clus. exot. lib. 4. cap. 14. CBP. 458. Pag. 148. lin. 40. post notato add. Phytogr. Tab. 325. fig. 4. Pag. 149. lin. 40. lege Chrysanthemo. Pag. 150. lin. 15. lege hepatici. lin. 36. add. An Adiantum saxosum floridum Plumer. 29. Offmunda Americana Filiculæ folio Elem. Bot. Tom. 1. 437. lin. 42. lege Tab. 282. Pag. 151. lin. 14. add. An Filix pumila saxatilis altera Clus. Hist. poster. lin. 20. add. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 179. fig. 3. lin. 36. add. An Filix minor non ramosa alis foliorum alternatim positis, bifidis & multifidis Raii Synops. novissime edit. 48. lin. 38. add. An potius Filix pumila saxatilis prima Clusii ibid. lin. 43. lege spinosa. Pag. 152. lin. 7. post Tab. 287. add. fig. 2. An Filix Polypodium dicta parva Virginensis foliis minutim ferratis Banist. Cat. Stirp. Virgin. Lin. 30. add. An Trichomanes majus, foliis longis auriculatis D. Banister. Pag. 153. lin. 19. add. Lonchitis major Polypodii foliis Banist. Cat. Virg. ut monuit nos D. Sherard; Hæc enim atque etiam vulgaris, simili modo florida est. Pag. 155. lin. 27. post reflexa. add. Phytogr. Tab. 287. fig. 5. lin. 29. lege 285. Pag. 159. lin. 22. add. sub titulo sylvestris Indigo ex Insulâ Barbadosensi, aliquando habuimus lin. 27. subjung. de novo.~~
- Erutæ Africanæ* ambram spirans latioribus foliis circa caulem ambientibus Phytogr. Tab. 327. fig. 3. Curâ D. Doodii in Hort. Med. Chelseiano ex feminibus ortus. Lin. 29. add. muricato fructu parvò intus tomentoso. Pag. 162. lin. 9. post 155. add. Item *Alcyonii* species ejusd. Pinac. 368. lin. 14. post 143. add. Item *Fumaria* viticulis & capreolis plantis vicinis adhærens, ejusd. CBP. ibid. lin. 15. subjung. de novo.
- Fumaria alba* vesicaria capreolis donata, sub exitum Autumni florens Æthiopica. In Horto Med. Chels. observavimus



*vimus.* ~~lin. 17 lege compresso.~~ Pag. 164. lin. 8. add. Fungus pulverulentus *Crepitus lupi* dictus coronatus & infernè stellatus *Raii Synops.* nuper edit. 16. Pag. 168. lin. 12. subjungatur de novo.

*Geranium Æthiopicum* minus, subrotundis sanguineis foliis, flore parvo rubello. In *Hort. Med. Chelf.* collegimus, & à præcedenti quodammodo abludere videtur. ~~Lin. 18. post 516. add. Vid. Phytogr. Tab. 186. fig. 3. & Iconem invenies. Lin. 26. post Clusio add. J.B. Pag. 169. lin. 10. subjungatur de novo.~~

*Geranium Malvæ* folio minus procumbens, hirci odore s. *Tragodes Africanum*. In *Horto Med. Chelf.* observavi. ~~Pag. 170. lin. 6. post Africanum, add. Phytogr. Tab. 328. fig. 3. Pag. 171. lin. 2. add. Huic semina sunt Solida, arcuum modo inflexa monente Cl. Breynio Prodr. 2. 53. Ideoque inter corymbiferas floribus discoibus nudis, s. non radiatis accenseri debet, & dici mereatur, Gnaphaloides maritimum bullatis floribus corymbosum. Lin. 40. add. Hujus Iconem videtis in Phytogr. Tab. 323. fig. 1. Pag. 172. lin. 9. add. Gnaphalium parvum ramosiss. foliis angustissimis polyspermon. Raii Hist. Pl. 296. lin. 20. add. Chrysocome Africana flore phœniceo angustifolia Breyn. Fascic. 20. lin. 25. add. Ychcaxihuitl Nov. Hisp. Terentii apud Recc. 308. lin. 39. add. Fortè Arbor ex quâ Byssus nascitur apud Philostratum. Pag. 175. lin. 8. add. Sinapi simile Indicum semen CBP. 99. lin. 12. add. Hujus Icon habetur Phytogr. Tab. 189. fig. 7. lin. 27. add. Icon habetur in Phytogr. Tab. 92. fig. 1. Pag. 183. lin. 2. post Banister add. purpureis lineis striato. The *Moltasin Flower* dictus. Pag. 184. lin. 6. subjungatur de novo.~~

*Hieracium pulchrum ramosum Sprengerianum* J.B. Tom. 2. 1075. à D. Bobart ad nos missum. Pag. 185. lin. 12. add. An *Sclarea Lusitanica* glutinosa, amplissimo folio. *Elem. Bot. Tom. 1. 148.* ~~Pag. 188. lin. 22. leg. optimè. lin. 23. leg. consperimus. Pag. 189. lin. 4. post fig. 6. dele àn Hypericum frutescens & quæ sequuntur, & subjungantur de novo.~~

*Hypericum pumilum* sempervirens, caule compresso ligneo ad bina latera alato, flore luteo tetrapetalo, s. *Crux Sti Andreae* D. Banister. lin. 30. post fig. 1. add. An *Hypericum frutescens luteum Phillyreæ* foliis *Banisteri.* & subjungatur de novo.

*Hypericum* s. *Androsæmum Canariense* non foetens, capitulis brevioribus filamentis donatis D. Bobart. Idem fortè cùm præcedenti. Pag. 190. lin. 7. subjung. de novo.

*Hypericum parvum* caule quadrato, s. *Ascyrum minimum Virginian.* Banist. Cat. Virg. ~~Pag. 194. lin. 34. add. Hujus Icon habetur in Phytogr. Tab. 323. fig. 2. Pag. 200. lin. 19. add. Cyperus maritimus, capitulis glomeratis. Elem. Bot. Tom. 1. 419. Pag. 202. lin. 26. add. in Ficoidum Mesembrianthemorum censum non incommodè recenseatur. Pag. 208. lin. 20. leg. tamen. Pag. 212. lin. 3. add. foliis in acumen desinentibus cui subjungatur de novo.~~

*Lenticula palustris* ex Insulâ *Jamaicæ*, Sedi arborescens folio subrotundo molli. An *Stratiotes Niliaca* *Dioscoridis*, cujus folia sunt roseo confessu stipata *Vesling. Obs. in Alpin. 44.* ~~lin. 19. add. Tab. 304. fig. 6. Pag. 213. lin. 33. add. An Thlaspi Gallo-provinciale umbellatum gramineo folio Sch. Bot. 86. Pag. 218. lin. 30. subjung. de novo.~~

*Lilium* s. *Martagon pusillum Virginianum*, floribus minutissimis herbaceis Banist. Raii Hist. 1929. Hujus delineationem accepimus à D<sup>no</sup> Jacobo Bobart & Icon habetur in *Phytogr. Tab. 328. fig. 4.* ~~Pag. 220. lin. 20. leg. apud Hogden vicum. lin. 11. dele apud lin. 13. add. Lilio-Narcissus humilis albus D. Banister. Cat. Stirp. Virg. lin. 36. add. Smilax unifolia humillima Elem. Bot. Tom. 1. 512. Pag. 221. lin. 20. add. Phytogr. Tab. 95. fig. 6. Pag. 225. lin. 2. subjungatur de novo.~~

*Lithospermum scorpioides* floribus rostratis *Virginianum* D. Banister. Cat. Virg. ~~Pag. 228. lin. 14. leg. tamen. lin. 28. leg. erassifolius. Pag. 229. lin. 8. add. Lupinus flore purpurascens, latifolius hirsutus C.B. in Matth. Botan. Monspel. lin. 30. pre Phytogr. pone dispositis. Pag. 230. lin. 17. subjungatur de novo.~~

*Lychnis sylvestris marina*, flore purpureo pulcherrimo *Grisleii* à Rev<sup>do</sup> D. Stonestreet accepimus. Pag. 238. lin. 6. subjungatur de novo.

*Malva Africana* procumbens *Betonica* foliis, margine laciniis minutionibus elegantè fimbriato *Phytogr. Tab. 327. fig. 4.* Supremâ Æstate in *Hort. Med. Chelseiano* auspitiis D. Doody ex semine natam observavimus. ~~Pag. 241. lin. 14. pro brevis leg. bravat. Pag. 247. lin. 32. subjung. de novo.~~

*Melissa* fortè *Canarina* triphyllis odorem *Camphoræ* spirans penetrantissimum *Phytogr. Tab. 325. fig. 5.* Folia habet terna, quaterna, interdum quina serrata, asperiuscula, Rubi foliorum æmula; Odor & sapor, caulesque quadrati, & modus crescendi *Melissam* arguunt. Cui tamén *Aztaxochitl* Nov. Hisp. planta quadam corymbifera, apud Reccum 357. (i. e.) Trifoliata Americana *Urticæ* foliis serratis, Anemones flore cæruleo striis rubris notato; foliorum similitudine (non situ) plurimum convenit. ~~Pag. 254. lin. 29. lege industriâ. Pag. 267. lin. 28. add. Hujus multum perfectior Icon habetur in Phytogr. Tab. 322. fig. 1. Pag. 262. lin. 35. lege alantia. Pag. 269. lin. antepenult. post habuimus add. Hujus Icon exhibetur in Phytogr. Tab. 102. fig. 2. Pag. 270. lin. 7. lege Tab. 309. fig. 3. Pag. 272. lin. 37. add. An Ornithogalum angustifolium Prom. Bon. Spei. D. ten. Rhyne Breyn. Cent. 179. Pag. 278. lin. 19. add. Hujus fructus cortice externo denudatus exhibetur in Phytogr. 323. fig. 3. lin. 22. add. cujus Iconem videtis in Phytogr. Tab. 323. fig. 4. lin. 24. add. Hujus pictura habetur Phytogr. Tab. 323. fig. 5. lin. penult. leg. floris. Pag. 279. lin. penult. lege Chelidonium. Pag. 282. lin. 2. subjung. de novo.~~



*Passiflora Americana* triphylla, amplioribus foliis ferratis *H. Comptonian.* Pag. 285. lin. 24. lege cauliculo. Pag. 287. lin. 30. post fructu, add. rubro. Pag. 288. lin. 25. post Merett. lege Pin. Pag. 289. lin. 38. dele cleatur, & post Tom. add. 2. Pag. 290. lin. 22. leg. incurvum. Pag. 291. lin. 5. lege observavimus. *lin.* 24. lege ochroleuco. *lin. ult.* leg. in *H. M.* Pag. 292. lin. 16. add. Si folia non essent bina, ordine utrinque disposita; *Micui-Tlaxcolli Mexicensibus s. Piscium intestina Hernandez apud Recc. 229. huc referendam putarem.* *lin.* 26. lege sinuosâ. *lin.* 30. lege *Couhage.* Pag. 295. *lin.* pennlt. lege *Buxi.* Pag. 296. *lin.* 14. lege foetida. Pag. 298. *lin.* 25. lege paniculâ. Pag. 303. *lin.* 41. lege floribus. Pag. 304. *lin.* 39. post ramosum add. *Raii.* Pag. 305. *lin.* 6. lege *Potamogeito.* *lin.* 11. pro *Pimpinella* lege *Pimpinellæ.* Pag. 306. *lin.* 4. lege foliis. *lin.* 6. lege *Sebestena.* Pag. 307. *lin.* 7. post dictum add *Phytogr. Tab. 327. fig. 4.* Pag. 310. *lin.* 34. add. vid. *Phytogr. Tab. 311. fig. 6.* Pag. 311. *lin.* 4. lege *Ranunculus.* *lin.* 38. *Ranunc.* Pag. 312. *lin.* 9. lege *Bonavert.* *lin.* 13. lege *sublongis.* Pag. 315. *lin.* 15. lege *Siliculâ.* *lin.* 38. lege *Icon Raphani.* *lin. ult.* add. vid. fol. 261. Pag. 317. *lin.* 41. add. Habetur *Icon. in Phytogr. Tab. 322. fig. 2.* Pag. 328. *lin.* 25. post *Phytogr.* add. *Tab. 327. fig. 6.* & dele nondum edit. Pag. 330. *lin.* 20. pro *letarius,* lege *alterius.* Pag. 332. *lin.* 11. leg. *Part 2. 66. & 67.* Pag. 336. *lin.* 18. lege *globose.* Pag. 357. *lin.* 7. lege *triphyllon.* *lin.* 22. lege *vesicarium.*

Quædam alia minutiora errata in literulis & punctatione, Lectoris judicio relinquimus.

2

Prostat Venalis apud Autorem.



# Hortorum, Librorum, Autorumque Nominum Abbreviatorum, Explicationes.

**A**bel. Joan. Franciscus Abela in descript. Insul. Melitenfis.  
Ac. Reg. Par. Academia Regia Parisiensis.  
Acoft. Christophori Acoftæ Aromatum & Medicamentorum in Or. Ind. nascentium Historia.

Aff. Hafn. Caspari Bartholini Acta Medica Hafnienfium.  
Adv. Adversaria Pena & Lobelii.  
Almag. Bot. Almagestum Botanicum.  
Alp. de Pl. Ægypt. Prosper Alpinus de Plantis Ægypti.  
Alp. de exot. Prosper Alpinus de Plantis exoticis.  
Aman. Charact. Pl. Pauli Amanni Character Plantarum.  
Am. H. Bos. Pauli Amanni Hortus Bosianus Lipsiæ 1686.  
Andr. Cæsalp. Andreas Cæsalpinus de Plantis. libr. 16.  
Apul. Apuleius Platonicus de Herbarum virtutibus.  
Athen. Athenæi Deipnosophistarum lib. 15.  
Avic. Avicennæ s. Ebenfinæ Canones Medicinales.

Banist. Joannes Banister iu Catalogo Stirp. Virginienf.  
Bellon. Petri Bellonii observationum lib. 3.  
Belluc. Ind. H. Pis. Thomæ Bellucii Index Horti Pisani.  
Bellun. Andræas Bellunenfis notis in Avicennam.  
Benz. Hieronymi Benzoni Novi Orbis Historia.  
Bocc. Paulus Bocconus de Plantis rarioribus Sicilia, &c.  
Bod. à Stap. Joannes Bodæus à Stapel Comment. in Theophr.  
Bont. Jacobus Bontius in Historia naturali Ind. Orient.  
Bot. Monsp. Petri Magnol. Botanicum Monspeliense.  
Boym. Michaelis Boymii Flora Sinensis.  
Breyn. Cent. Jacobi Breynii Centuria 1a.  
Br. Prodr. 1 & 2. Jacobi Breynii Prodrum prim. & secund.  
Br. Fasc. Jacobi Breynii Fasciculus rariorum plantarum.  
Brunf. Otho Brunfelsius in Historiâ Plantarum tribus Tomis.

CBP. Caspari Bauhini Theatri Botanici Pinax.  
CB. phyt. Caspari Bauhini Phytopinax.  
CB. prodr. Caspari Bauhini Prodrum.  
Cam. H. Med. Joachimi Camerarii Hortus Medicus.  
Capel Michaël Capella in Synonym. apud Haly Abbatem.  
Card. Hieronymi Cardani de varietate rerum lib. 17.  
Cat. HRP. Catalogus Horti Regii Parisiensis.  
Cat. HRB. Catalogus Regius Blesensis.  
Cat. H. Joncq. Catalogus Horti Jonquet.  
Cat. Mss. H. Oxon. Catalogus Manuscriptus Horti Oxoniens.  
Cat. H. Ac. Lugd. Catalogus Horti Academici Lugdunensis.  
Cat. Amst. Catalogus Horti Medici Amstelodamensis.  
Cat. Edinb. Catalogus Plantarum Horti Edinburgensis.  
Cat. Altorf. Catalogus Altorfensis per Mauritium Hofmannum.  
Cat. H. Lips. Catalogus Horti Lipsiensis.  
Cat. Groning. Catalogus Plantarum Horti Groningensis.  
Cat. Pat. à Turr. Catalogus Horti Patavini à Georgio à Turre editus.  
Cat. Silesiæ Catalogus Stirpium Silesiæ per Casparum Schwenckfeldium.  
Cat. H. Beaum. Catalogus rariorum Horti Beaumontiani à Keggelero edit. 1690.  
Chab. Chabræi Sciographia Stirpium.  
Ciec. Petrus de Cieca.  
Clus. Hist. Carolus Clusius in Historia rariorum.  
Clus. exot. Carolus Clusius in exoticarum Historia.  
Cod. Bent. Codex Bentingianus Illustriss. Comit. Portlandiæ.

Cod. Compt. Codex Comptonianus Reverendiss. Episcopi Londinens.

Col. ecphr. Fabii Columnæ Plantarum rariorum ecphrasis.  
Col. Phytob. Fabii Columnæ Phytobasanos.  
Commel. Joannes Commelinus Notis in Hort. Malabaric. Ejusd. Catalogus Plantarum Hollandiæ.  
Cord. Valerii Cordi in Dioscoridem Annotationes. Ejusd. libri 4. de Stirpium Historiâ; cum Figuris.  
Corn. de Pl. Canad. Jacobus Cornutus de Plantis Canadensib.  
Cort. Jacobus Antonius Cortusus Horti Patavin 5us Præfessus à celebrrioribus Botanicis frequenter citatur ob Plantas ipsis communicatas.  
Cresc. Petrus Crescentius de Agriculturæ partibus libr. 12.

Dal. Ph. Samuelis Dalæi Pharmacologia.  
Diosc. Pedacius Dioscorides Anazarbeus de materiâ medicâ lib. 8.  
Dod. Mem. Dodarti Memoires Gallicæ.  
Dod. Remberti Dodonæi Pemptades Plantarum.  
Durant. Castoris Durantis Herbarium novum Italicæ.  
Duret. Claudius Duretas.

Elem. Bot. Elementa Botanica à Josepho Pitton Turnefortio edita; tribus Tomis. Gallicæ.  
Eph. Germ. Ephemerides Medico-Physicæ Germanicæ.  
Ferrar. Fl. Joannes Baptistæ Ferrarii Flora s. Florum Cultura.  
Ferrar. Hesp. Joan. Baptist. Ferrarii Hesperides.  
Flac. descr. Madag. Flacourt Descriptio Insulæ Madagascar.  
Fl. Bat. Flora Batava.  
Florent. Sch. Florentii Schuyt. Catalogus Leydensis, 1672.  
Floril. Ren. Florilegium Renovatum Joannis Theodori du Bry.

Fracast. Hieronymi Fracastorii opera 1590. Lugduni 8o.  
Fragos. Joannes Fragosus de utriusque Indiæ simplicibus Hispanicè scripsit.  
Fr. de Honuph. Francisci de Honuphriis Plantarum in Monte Pyncio Catalogus.  
Frid. Cæs. Fridericus Cæsius Princeps in Tabulis suis Phytoscopiæ.

Fuchs. Leonardi Fuchsi Historia Plantarum.  
Fum. Hist. Fumei Historia generalis Ind. Occidentalis.  
Galen. Claudii Galeni de Facultatibus Simplicium lib. 11.  
Gall. Press. Augustinus Gallus Pressanus de Agricultura.  
Garc. Garcias ab Horto aliquot rariorum simplicium apud Indos nascentium & Aromatum Historia.

Ger. emac. Joannes Gerardus emaculatus à Jonsono.  
Gesn. Conradi Gesneri Historia Plantarum & vires. Item de Lunariis, & Montis Fracti s. Pilati Lucernatum descriptio.  
Ejusdem de Hortis Germaniæ liber cum Appendice & Corallario.

Gomar. Francisci Lopez de Gomara Historia Indiarum generalis.

Guern. Rolf. Guernerus Rolincius de Vegetabilibus.  
Guiland. Melchior Guilandinus in Theone s. Apologia adversus Matthiolum.

Hermol. Barb. Hermolai Barbari in Dioscoridem libri 5. Corallariorum. Ejusd. in Caii Plinii libros Castigationes.  
Hern. Franciscus Hernandez, in Historiâ Mexicanâ.

Hist.



# Hortorum, &c. Abbreviatorum Explicationes.

- Hist. Lugd.* Historia Lugdunensis volumina duo.  
*Hond.* Hondii Geographia.  
*Hon. Bell.* Honorii Belli Epistolæ de Plantis ad Clusium.  
*H. Malab.* Horti Malabarici Volumina 12.  
*H. Eyst.* Basilii Besleri Hortus Eystetensis. Noriemburg.  
*H. Farnes.* Tobia Aldini rariorum Plantarum Horti Farnesiani descriptio.  
*H. R. H.* Hortus Regius Aula Hamptoniensis.  
*H. R. P.* Hortus Regius Parisiensis. ab Anton Vallot edit.  
*H. R. B.* Hortus Regius Blesensis. Roberti Morisoni.  
*H. Ac. Oxon.* Hortus Academicus Oxoniensis.  
*H. Ac. Lugd.* Hortus Academicus Lugdunensis à P. Herm.  
*H. Ac. Pat.* Hortus Academicus Patavinus.  
*H. Fag.* Hortus exoticarum Plantarum Fagelianus.  
*Hort. Amst.* Hortus Medicus Amstelodamensis.  
*H. Ac. Argent.* Hortus Academicus Argentinenfis à Marco Mappo editus.  
*H. Chels.* Hortus Medicus Chelseianus.  
*H. Compt.* Hortus rariorum Camptonianus Fulhamie.  
*H. Trad.* Hortus rariorum Plantarum Joannis Tradescanti.  
*H. Morg.* Hortus Medicus Edvardi Morgani apud Westmonast.  
*H. Triumf.* Hortus Baptistæ Triumfetti apud Bononienses.  
*Hugh.* Gulielmi Hughetii Medicus Americanus Anglicè conscriptus.  
*Hyac. Ambr. Phyt.* Hyacinthi Ambrosini Phytologia.  
*Ic Lob.* Matthias de Lobel in Iconibus.  
*Ic Rob.* Icones Roberti in Academ. Reg. Parisiensis.  
*Imp.* Ferrantes Imperatus in sua Historia naturali Italice.  
*Ind. Or.* India Orientalis. Partes 10.  
*Ind. Occ.* India Occidentalis partes 10. [Tomis.  
*J. B.* Joannis Bauhini Historia Plantarum Universalis tribus  
*Jo. Mat. Fab.* Joannis Matthæi Fabri Strychnomania.  
*Jo. Acoft.* Josephi Acoftæ Historia Indiae, addita Tomis Indicis à Clusio Latinitate donata.  
*Jonst.* Joannis Jonstonii Dendrologia, s. Historia naturalis de Arboribus. [Oribus.  
*Josselin.* Nov. Angl. Joannes Josselinus de Nova Angliæ Rari-  
*Knox.* Knox Historia Insulæ Zeylanensis Anglicè.  
*Lacyn.* Andreas Lacuna Commentar. in Dioscoridem Hispani.  
*Læli. Triumf.* Lælii Triumfetti Catalogus apud Fratrem.  
*Laet.* Joannis Laetii Historia naturalis Indiae Occident.  
*Lauremb.* Petri Lauremburgii Apparatus Plantarius.  
*Ler.* Joannis Lerii Historia Brasiliensis.  
*Lig.* Ligonis Historia naturalis Insulæ Barbados Anglicè scripta.  
*Linsch.* Hugonis Linschoti Itinerarium & Navigationes in O-  
*rientem Indiam.*  
*Lob. Obs.* Matthias d' Lobel. Observationes.  
*Lob. Ill.* Lobelii Stirpium Illustrationes à Gulielmo How editæ.  
*Marant.* Bartholomæi Marantæ Methodus cognoscendorum  
*Simplicium lib. 3.*  
*Marcgr.* Georgius Marcgravius de Plantis Brasiliæ.  
*Martin.* Martinii Atlas Chinesis. [Dioscoridem.  
*Matth.* Petrus Andreas Matthiæ in Commentariis suis in  
*Mentz. pug.* Christiani Mentzelii pugillus rariorum.  
*Merc. Bot.* Mercurius Botanicus Jonsoni. [taunicarum.  
*Meret. Pin.* Christophori Meretti Pinax rerum naturalium Bri-  
*Mich. Nut.* Nicholai Nutii Fasciculus Herbarum.  
*Monard.* Nicolai Monardis de Simplicibus Medicamentis ex  
*Occidentali India delatis libri 2.*  
*Morif. Hist.* Roberti Morisoni Historia Plantarum Oxoniensis.  
*Morif. Umb.* Roberti Morisoni Historia Umbelliferarum.  
*Morif. Præl. Bot.* Morisoni Prælia Botanica.  
*Muxd. Biochr.* Henrici Mundy Biochrestologia.  
*Munting.* Abrahamus Muntingius de re Herbaria Belgicè.  
*Munt. Aloid.* Muntingii Aloidarium Amstelodami 1680.  
*Munt. Brit.* Abrahami Muntingi de verâ Herbâ Britannicâ.  
*Mus. Reg. Soc.* Musæum Regiæ Societatis apud Londinenses.  
*Mus. Calc.* Musæum Calceolarianum.  
*Mus. Worm.* Musæum Wormianum.  
*Mus. Cort.* Musæum Cortenianum Interioris Templi.  
*Mus. Zeyl.* Musæum Zeylanicum nondum edit.  
*Nieremb.* Eusebii Nierembergii Historiæ naturalis lib. 15.  
*Nieu. Itin.* Johannis Nieuhoffi Itinerarium ad Chinam.  
*Ogilv.* Joannis Ogilveii Atlas Anglicè conscriptus.  
*Ovied.* Consalvi Ferdinandi Oviedi Ind. Occidentalis Histo-  
*ria generalis.* [canx  
*Palud.* Bernhadi Paludani Notæ ad Linschoti Historiam Indi-  
*P. B. P.* Paradisi Batavi Prodrum.  
*Park.* Joannis Parkinsoni Theatrum Botanicum Anglicè.  
*Pass.* Crispini Passæi junioris Horti floridi partes duæ formâ  
*oblongâ.*  
*P. Ren. Pauli* Rençalmi Specimen Historiæ Plantarum.  
*Petr. Mart.* Petrus Martyr de novo Orbe.  
*Phyt. Brit.* Phytologia Britannica.  
*Phytogr.* Phytographia Pluc'netiana.  
*Pigafet.* Philippi Pigafettæ Regni Congiani descriptio.  
*Pillet.* Caspari Pelleterii Plantarum Synonymia.  
*Pis. Hist.* Gulielmi Pisonis Historia Naturalis Brasiliæ.  
*Pis. Mant.* Gulielmi Pisonis Mantissa Aromatum.  
*Plin.* Caii Plinii Secundi Historiæ Mundi libri 37.  
*Plot. D.* Plot Historia naturalis Agri Oxoniens. & Staffordien-  
*sis Anglicè conscripta.*  
*Plumier.* Caroli Plumieri Descript. des Plantes de L' Amerique.  
*Pon. descr. M. Bald.* Joannis Ponæ descriptio Plantarum  
*Montis Baldi.*  
*Purch.* Purchellii Navigationes. [Tomis.  
*Raii Hist.* Joannis Raii Historia Plantarum Universalis duobus  
*Raj. Obs.* Raii Observationes Itinerariæ.  
*Raj. Cat. Stirp. ext.* Raii Stirpium exterarum Catalogus.  
*Raj. Cat.* Joannis Raii Catalogus Plantarum Angliæ.  
*Raii Syn.* Raii Synopsis methodica Stirpium Britannicarum.  
*Raleigh.* Gualterus Raleigh in Historia Mundi Anglicè con-  
*scripta.*  
*Rauwolf.* Leonardi Rauwolfii Itinerarium in Orientem.  
*Recc.* Antonii Recchi rerum Medicarum Nov. Hispaniæ The-  
*saurus.*  
*Redi.* Francisci Redi experimenta naturalia.  
*Rivini.* Angusti Quirini Rivini Introductio generalis in rem  
*Herbariam.* Lipsiæ 1690.  
*Robin.* Joannis Robini Hortus Regius Henrici IV. cum Figu-  
*ris 214.*  
*Rochf. Dni* Rochforti Histoire des Antilles. Gallicè.  
*Ruell.* Joannis Ruellii de natura Stirpium libri 3.  
*Saxon.* Hercules Saxonia.  
*Scalig.* Julii Cæsaris Scaligeri in Theophrasti libros de Histo-  
*ria Plantarum.*  
*Sch. Bot.* Schola Botanica Horti Reg. Parisiensis.  
*Serap.* Joannis Serapionis de Simplicium Medicamentorum  
*Historia.* [tia.  
*Sibbald.* Roberti Sibbaldi Prodrum Historiæ naturalis Sco-  
*Sim. Paul.* Simonis Pauli Quadripartitum Botanicum.  
*Spigel.* Adriani Spigeliî Itagoges in rem Herbariam.  
*Stad.* Joannes Stadius in Part. Indiae occident.  
*Stephan.* Caroli Stephani seminarium s. Plantarium earum  
*arborum quæ post Hortos conferi solent.*  
*Stirb. Citric.* Francisci van Stirbeck Citricultura.  
*Eiusdem* Theatrum Fungorum Antwerpæ 1657.  
*Swert.* Emanuelis Swertii Florilegium.  
*Tab. & Tabern.* Jacobus Theodorus Tabernæ montanus in  
*Historia & Iconibus.*  
*Terent.* Terentii Notæ in Antonium Reccum.  
*Terter.* Terterii Trait des Antilles. Gallicè edit.  
*Thal. Harc.* Joannes Thalius in Sylva sua Hareynicâ.  
*Theophr.* Theophrasti Erelii de Historia & de causis Planta-  
*rum libri plurimi.*  
*Thevet.* Andreas Thevetus in sua Cosmographiâ Gallicè edita.  
*Thurneif.* Leonardi Thurneisseri Historia & descriptio Plan-  
*tarum.* [ditæ.  
*Trans. Philos.* Transactiones Philosophicæ apud Londinum e-  
*Triumf.* Joannis Baptistæ Triumfetti Observationes.  
*Vesling.* Obs. Vesslingii Observationes in Prosp. Alpium.  
*Virgil.* Marcelli Virgilii in Dioscoridem Commentaria.  
*Virid. Lusit.* Gabrielis Grillei Viridarium Lusitanum.  
*Wepf.* Joannis Jacobi Wepferi Cicutæ aquaticæ Historia &  
*N. x. e.*  
*Whel.* Georgii Wheleri Itenerarium in Græciam.  
*Zanon.* Jacobus Zanonius in Historiâ sua Botanica Italice  
*conscriptâ.*















